






EX LIBRIS
✻ ARNO B. ✻
LUCKHARDT



Salam

21-7-18

Vol. 43



JOANNIS VESLINGII

Equitis, Professoris quondam Patavini, &c.

SYNTAGMA
ANATOMICUM,
COMMENTARIO *atque* APPENDICE

EX

Veterum, Recentiorum, Propriisque, Observationibus,
Illustratum & auctum

A

GERARDO *Leon.* BLASIO

Med. Doct. & in Illustri Athenæo Amstel. Profess.


EDITIO SECUNDA

Priori emendatior, & locupletior.



AMSTELODAMI,

Apud JOANNEM JANSSONIUM à WAESBERGE, & ELIZEUM
WEYERSTRAET. Anno cło 1666.



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

<http://www.archive.org/details/joannisveslingii00vesl>

*Nobilissimis, Amplissimis, Doctissimis Viris,
Medicis Celeberrimis, Experientissimis,*

D^N. NICOLA O TULPIO,
Augustæ Amstelodamensium Reipublicæ Exconsuli, & Senatori, in
Collegium Illustrium & Præpotentum D. D. Hollandiæ, West-Fri-
sique Ordinum, Delegato.

D^N. ARNOLDO THOLINX,
*in eadem Illustri Republicâ Consarum, ex bonis quæ non solvendo,
Iudici Delegato.*

DN. FRANCISCO de VICQ,
DN. GUILIELMO PISONI,
quondam Illustriſſimi Domini, DN. JOANNIS MAU-
RITII, Principis Naſſoviae, &c. Archiatro præſtan-
tiſſimo.

Salutem felicitatemque perpetuam P.

VIRI NOBILISSIMI, AMPLISSIMI,



Cognitum est, & more pervulgato receptum, omnes, qui cum ratione, & judicio prudenti adhibito, suos vel aliorum libros edunt, sive publicis commodis servire, sive nomen suum, ac potius rectè faciendi, beneque de multis promerendi studium, posteritati commendare conentur, labores suos Mecœnatibus quibusdam consecrare solere, quo sic & operi ipsi splendor concilietur, & contra lividos, omniaque Theonino dente corrodescentes, protectionis columnen habeant. Laudabili imprimis huic consuetudini cum & mihi hoc tempore obtemperandum sit, dum S Y N-

TAGMA ANATOMICUM, Viri Nobilissimi D. JOANNIS VESLINGII, in Gymnasio Patavino quondam Anatomix, atque Botanices Professoris celeberrimi, opus sane multæ eruditionis, singularisque ingenii, quo præstantius elegantiusque hætenus vix obtigit, Notis ac Commentariis ex Veterum, Recentiorum, propriisque observationibus illustratum, in lucem publicam emitte-re ausus fui, quibusnam potissimum laborem hunc meum sacrum facerem, haud diu deliberandum fuit; illico enim Nomina Vestra laudatissima in memoriam venire, quibus digniora mihi succurrere vix poterant. Si enim egregias Vestras & nunquam satis ex merito deprædicandas virtutes considero, Nominum-que Vestrorum æstimationem summam perpendo, Vos VIRI INCLYTI occurritis omnium primi. Vos eruditione & nobilitate excellitis, siquidem vera nobilitas est virum integerrimum & incorruptum se præstare; nullis otii & negotii ratio magis quam Vobis constat, qui perire tempus omne arbitramini, quod in litteris, proximique cura non infumatur. Vos humanitate, modestia, aliisque plurimis heroicis virtutibus, quas undique à doctissimis probatissimisque Viris, & in sermone quotidiano & in perpetuis scriptorum suorum monumentis, celebrari audio, & video, omnes qui Vobiscum versantur, tanquam fulgens actionum bonarum exemplar, ad verè Christianam vivendi normam incitatis & redigitis. Quis ignorat, Vos pro summa Vestra prudentia, pulchre, in quanto nunc, propter rerum omnium perturbationem, omnes bonæ artes agitentur periculo, intelligentes, illas juvare, atque extollere, ingeniosos fovere, litteratos amplexari, beneficiisque Vobis divinctos reddere? Tibi, Consul-tissime TULPI, Te Medicorum Æsculapium dici, non sufficit, sed ad majora Te vocat Patria, quam Atlantis instar humeris sustentas. Te Veteris Latii succo tam ornate politum & imbutum omnis fatetur, ut in gerendo consulatu Marcellus, in consiliis Cato,

D E D I C A T I O.

in ferendis legibus Solon , in judicando Zaleucus , in gravitate Brutus , & in lenitate Lælius haud immerito censearis. Neque Vobis fatis est **V I R I S P E C T A T I S S.** quod Practici florentissimæ hujus Reipublicæ Clarissimi habeamini , sed Vestris virtutibus debetur , quod & publica onera subire debeatis ; In quibus sane tam publicis quam privatis negotiis tales Vos , jam per multos annos , gessistis , ut neque momus ipse aliquid invenire potuerit , quod jure carperet. Cum itaque **A M P L I T U D. V E S T R A R.** **N O M I N A** tam sint **I L L U S T R I A** , quis dubitaret , fore , ut non solum ad id quod exhibemus minus elaboratum , magnâ ex parte ex aliis congestum opus , æstimationis plurimum inde sit redundaturum , sic ut operi huic præfixa instar hederæ sint , sub cuius signo tanquam generosum vinum exigatur , laudetur , atque vendatur , sed & horum tantorum Nominum rationem habentes mordaces Zoili , à maledictis suis improbis abstineant , ac à pravâ sua natura resipiscant. Nullum enim tam præclarum datur opus , quod suos Catones rigidos non experiantur , qui damnant in publico , quod legunt in privato , detrahunt omnibus etiam iis quæ non intelligunt. Animi est liberaliter à natura & doctrina instituti , virtutem ac decus amantis , aliquid communi hominum societati adjumenti conferre , atque ut id , quod confertur , sincere judicantium approbatione dignum videatur , expetere. Artifices autem ut de suis operibus bonorum atque peritorum judicium libentissime subeunt , deque eorum sententiis meliora ea facere student , ita non facile ineptas imperitorum censuras ferunt. Invidiæ vel obrectationis metu ab eo quod rectum est , & cum publica multorum utilitate conjunctum , abduci & dimoveri me non patior ; bonorum vero judicio contentus sum.

Quorum igitur potius quam Vestro patrocinio liber hic se committere debebat ? qui virtutum omnium ornamentis condecorati

D E D I C A T I O.

decorati estis, qui Reipublicæ nostræ fulcra, qui de re litterariâ optimè meriti, qui Medicorum coryphæi, qui Viri denique estis, nimirum quanto digniores omni laude, tanto omni præconio majores. Quod si quemadmodum Magnus ille Macedonum Rex edicto vetuit, ne quis ipsum præter Appellem pingeret, aut alius præter Lysippum sculperet, viros in utraque facultate & pingendi & sculpendi omnium tunc temporis præstantissimos, quod illorum artem cum ipsis, tum sibi gloriæ fore putabat, ita & Vos quoque, **AMPLISS. VIRI**, Vestra Nomina nisi à doctissimis scriptoribus celebrari, nullumque litterarium opus, nisi elegans, expolitum, omnibusque numeris absolutum Vobis dicari pateremini, facile intelligerem has meas Anatomicas lucubrationes, quas Nominibus Vestris inscribere volui, tanquam fumum, non lucem ipsis allaturas, rejiciendas esse. Sed quoniam ea est Vestra humanitas, ut non donum, sed donantis animum respiciatis, vereri non debeo, quin hoc munusculum, qualecunque sit, hilari fronte, à Vobis accipiatur atque agnoscat. Valete **AMPLISSIMI D.D.** atque hunc meum pertenuem laborem æqui bonique consulite, propediem majora quæpiam, Deo juvante, à me accepturi. Deus Opt. Max. Vos Reipubl. nostræ decora ac ornamenta, ad multos annos incolumes conservet, Nomina Vestra, temporum injuria vindicata, seræ posteritati, magis magisque indies inclarescant, & ut desinam cum Lyrico.

*Vos Colchus, & qui dissimula, metum
Mursæ cohortis Dacus, & ultimi
Noscant Geloni: Vos peritus
Discat Iber, Rhodanique potor.*

Amstelod. Script. mense
Majo, 1659.
Repetit. mense Novemb.
1665.

Nobiliss. Amplitud. Vestrarum

Devotiss. Cultor

G E R. B L A S I U S.





GERARDUS BLASIUS
MEDICINÆ DOCTOR, ET PROFESSOR.

E F F I G I E M

Celeberrimi VIRI

D. D. GERARDI BLASII.



*Ernitet hoc vultu BLASIUS, sed pagina mentem
Prodit, & arbitrium posteritatis habet.*

*Seu famam spectes, facilis seu pondera penna,
Virtutem laudat pagina clara Viri.*

*Quot jam miramur Libros, tot nomina BLASI
Scribimus. Hic doctus, quod legat, orbis habet.*

THOMAS BARTHOLINUS, D.
& in Acad. Hafn. Reg. Profess.
Honorarius.

I N E A N D E M.

BLASIUS an scriptus magis, an sit pictus, Apollo
Ambigit, atque notas nostit ubique suas.

*Sed praeferit animi. Quantum mens corpora praestat,
Tantum pictores BLASIUS ipse suos.*

S I V E.

BLASIUS hac olim facie post fata superstes
Pictus erit: tali vivet ubique Libro.

*Itē graves Parcae. Si corpus perditis, est mens,
Quae sibi, quae membris dat superesse suis.*

MICH. KIRSTENIUS, D.
& in Gymn. Hamb. Professor.

A D

Nobilissimum & Excellentissimum VIRUM, D.D.

GERARDUM BLASIUM,

Med. Doct. & Profess. Amstelod. Celeberrimum,

CUM

COMMENTARIA

IN

VESLINGIUM

rursus ederet.



Cilicet ut recipit flammæ à lumine Phœbi

Clari, luciflue Luna vigore carens:

Sic à luce tua lucem VESLINGIUS haurit,

O BLASI, Medici luxque decusque chori.

Auguror, ut fulget majori lumine Phœbus,

Quàm rectrix noctis Delia plena micat:

Sic tua, præ reliquis, clarissima fama vigebit,

Semper supremos nescia adire rogos.

En! blandos hilari reddo tibi corpore plausus

Perpetuo ut crescat gloria dia fovens.

CONRADUS VICTOR SCHNEIDERUS

Phil. Med. D. Prof. P. in Acad. Witteb.

& Celsiss. Princip. Anhalt Med.

AD

JANUM VESLINGIUM,

Equitem Mindanum,

A N A T O M I C U M

eloquentissimum, dexterrimum;

A

GERARDO BLASIO,

*Medicinæ Doctore & Professore Amstelodamensi,
doctissimo, celeberrimo,*

NOTIS ILLUSTRATUM & AUCTUM.

J *Ane disertorum Medicum decus, ARTIS alumne
Maxime, Mindanæ maxime gentis honos,
Multa quidem chartis, haud parvo parta labore,
Mandasti, nulli nota Machaonida;
Multa tamen nec nota tibi, quæ postera fato
Jam nunc progenies prosperiore videt:
NEMPE hodie Natura sinus plus pandit opertos,
Et nobis, alios quæ latuere, patent.
Illud, Apollinea non infima gloria gentis,
Vidit BLASIADES, vidit, opemque tulit.
Fane novâ fulges jam luce, nec aurea vestem
Fimbria purpuream dedecet illa tuam.
Cernis, Fane bifrons, atas quæ vidit avorum
Et quæ posteritas ingeniosa dedit.*

M. S L A D U S M.D.

I N
EXCELLENTISSIMI VIRI
JOANNIS VESLINGII,

Med. Doct. & Prof. Patav.

SYNTAGMA ANATOMICUM,
NOVO COMMENTARIO

illustratum, auctum & editum

A

Fratre suo unico

GERARDO LEON. BLASIO,

Med. Doct. & Prof. Amstelod.

J A M B U S.

Mortale Corpus, quisquis es Mortalis, hoc
Structum supremi Numinis sacrarium,
Hoc universi Circuli compendium,
Miraculorumque omnium miraculum,
Hominem, vide Homo; specta Juventus, hoc opus
Spectandum, & Hominem, cælitis flammæ virum,
Si Te cupis Homo nosse, compagem hanc, supra
Captum, supra sensus, Deus quam condidit
Sui ad imaginem, vide, quodque intus est
Rimare, cognosces inexhaustæ tuas
Superbiæ causas, deprehendes Te lutum
Mortale, fragile, vile, præterque hoc, nihil.
Quid arrogantiae, quid insani petis
Fastus tumores? quantus est, nil est, Homo.
Mirare potius, unde profluxit, Deum,
Mirare Te totum; Deus, non sequendo,
Tamen polito, quem unus absolvit, modo.
Mirare Cor, primam tuæ vitæ domum
Atque officinam sanguinis; folles vide
Pulmonibus bene respirandi datos;

Quid

Quid exta sint; quid Guttur, & quid sit Jecur;
 Quid Tendines, longique Nervorum finus;
 Quid Musculi, quid Pancreas, Arteriæ
 Venæque quid sint; quis sit humorum liquor,
 Vel spirituum motus, docebit te Typus
 Hominis, ô Homo! si nosse tu, quid sis, voles,
 Vel quid futurus, nulla pars sit corporis,
 Quam non recludas, nulla quam non consulas.
 En Corpus, intueri quid clam, quid palam.
 En vasa Lymphæ, cerne Chyli capsulas
 Atræque bilis; circumstantem sanguinis
 Vide meatum, & quem sibi motum trahit;
 Vertigo qualis non quiescentis poli
 In se relapsa: qualis Euripi liquor,
 Vel flexuosos culta Meandros secans
 Se semper urget, semper urgetur sibi.
 O quisquis es, mirare mortalis luti
 Non æmulandam fabrefacti fabricam.
 Latii soli & Patrum Togatorum decus,
 Sagax Machaon, docuit quem Cynthius
 Non invidendas omnibus vitæ moras,
 Phæbi sacerdos ille, qui subfellii
 Sublimioris Patavini Regulus,
 Ille orbis & artis decus VESLINGIUS
 Nos nosse dat, quod, ut vides, Homines sumus.
 Quis splendor Artis! quàm superbiens jubar
 Medici theatri est Æsculapudum duces!
 VESLINGIUS, dum, Chiragogorum arbiter
 Orbi recludit, quod latebat abditum,
 In frustra secat Hominem, sepulchris subtrahit
 Cadaverosis debitum Cadaver, &
 Quid sit, quid inde sit futurum, nos docet,
 Et ossium compagem & abstrusas specus,
 Sinusque cunctos exhibet, quod obvium,
 Vel quod latens est, tangit. Haud molesta sunt
 Nec odiosa, dum secat, VESLINGIO
 Semicocta quæ se ferula produnt, vel mali
 Stomachi micant sordes. Per assuetas ruit
 Secti cadaveris secator trux vias.
 Qui ventre matris pullus abditus latet
 Per *Sectionem Caesaris* natus cluit.
 Humana centum Vita læditur modis,
 Centum juvatur. Commodus mortalibus,
 Incommodusque est, dum secat, VESLINGIUS.

Objectat Hominem mortuum viventibus,
Et sic medetur singulis. Morbi fomes
Ante ora jacet, illis dum Medicina comes.

Et Tu GERARDE Frater, ô quàm passibus
Æquis sequeris, haud assequendam singulis,
VESLINGIANI æternitatem nominis.
Quem Tu secare jam ore *Germano* facis,
Jam *Belgico*. Nunc artis ad normam datæ,
Nunc more dissecas tuo. Nunc sub tuis,
Comprendis aliorum, notis, etiam notas,
Quas integro fert dextra *Commentario*.

Quiesce jam Germane; jam satis BLASI;
De Tabulâ jam tempus est tollas manum:
Etiam Nepotibus, quo supervivant, fave.
Tibi pro labore Publicæ sacro Rei
Æternitatis Fama spondet præmium,
Dum, quem resolvis, Hominem obstringis Tibi,
Hominemque Hominibus condis & reddis novum.

IN EFFIGIEM GERARDI BLASII.

BLASIUS *externâ præbet se parte videndum,*
Quod tenet interni non erat artis opus.

ALIUD.

Qui miseris Phœbo-Consultus consulit agris,
Et Phœbum cathedrâ nobiliore docet,
Hos Oculos, hæc ora refert. Hic cernimus illum
Pictum, cujus habent nomina scripta Libri.

ALIUD.

Qui Phœbum docet & sub recto pectore claudit,
Et libros genii parturientis alit,
BLASIUS *exiguo sic conspiciendus in ære*
Ingenii pretium non morientis habet.
Pro Phœbo Primus qui verba Professor agebat,
Debendi huic Phœbum credimus esse reum.

Meditando.

J. L. BLASIUS, JC^{us}.

Nobilissimum & Excellentissimum

D. GERARDUM BLASIUM,

Med. Doct. experientissimum, Anatomicum dexterrimum,
in inclyto Amstelod. Athenæo Professore celeberrimum,
Fautorem ac informatorem colendum,

de novo

V E S L I N G I I S Y N T A G M A

cum Notis edentem.



Criticem venerare manum Spectator, & Artem

Suspice, quæ nullo stat peritura die.

Arte tui morbos dignosces Corporis, Artus

Si, bene qui juncti, solveris intus, erant.

Hoc potuit dextro VESLINGI dextera nisu:

Hoc valet experti dextera dextra BLASI.

Invideas Mors atra Viris, qui compare fato

Æterna extinctæ præmia mortis amant.

Plus gaude Mors, ambo Tibi mortale rependunt,

Dum Famam ex fracto Corporis orbe tenent.

DANIEL GÖDTKE.

Dantisco-Pruss.

INDEX CAPITUM


IN

SYNTAGMATE

HOC

ANATOMICO

CONTENTORUM.

CAP. I.	 E Communibus Corporis velamentis.	Pag. I
II.	De Ossibus, & Musculis Abdominis, tum Peritonæo.	14
III.	De Omento, Ventriculo, & Intestinis.	30
IV.	De Mesenterio, Pancreate, Iecore & Liene.	52
V.	De Renibus, Ureteribus, & Vesica.	72
VI.	De Partibus Generationis in Viro.	86
VII.	De Partibus Generationi in Muliere servientibus.	98
VIII.	De Fœtu Humano.	112
IX.	De Partibus Thoracis externis.	130
X.	De Corde & Pulmonibus.	145
XI.	De Organis Vocis & Sermonis.	164
XII.	De Musculis Scapulæ, Dorsi, & aliquot Capitis.	180
XIII.	De partibus Capitis externis, earumque Ossibus, & Musculis.	186
XIV.	De Cerebro, & Cerebello.	210
XV.	De Oculis.	232
XVI.	De Auribus.	246
XVII.	De Ossibus Partium extremarum.	260
XVIII.	De Musculis Manus.	278
XIX.	De Musculis Pedis.	286
XX.	De Venis, Arteriis, & Nervis partium extremarum.	295

NOMI-

N O M I N A A U T H O R U M,

Qui præcipuè in C O M M E N T A R I O

Ad Syntagma Anatomicum Vesslingii occurrunt.

A.

H Ali Abbas,	Pag. 162
Actuarius,	296
Paulus Aegineta,	108. 157. 296
Ælianus,	202
Agellius,	149
Henr. Corn. Agrippa,	273
Salom. Alberti,	47
Ulysses Aldrovandus,	8. 104
Prosp. Alpinus,	6. 296
Amatus Lusitanus,	95. 112. 131. 135
Ambrosius,	187
Ætius Amidenus,	196
Joan. G. Andernacus,	198
Antigonus,	203
Apateus,	187
Hieron. Fabr. ab Aquapendente,	7. 22. 24. 80.
116. 117. 131. 166. 168. 169. 206. 209.	
248. 288.	
Ful. Cæsar Arantins,	66. 119. 216
Joan. Arculanus,	216
Alexand. Archillinus,	250
Aretæus,	68
Aristoteles, 6. 7. 14. 65. 106. 150. 190. 200.	
202. 214. 232. 249. 255. 261.	
Baal Aruch,	273
Cass. Afellius,	45. 52. 54. 58
Avicenna,	131. 166. 204. 266. 296
Cælius Aurelianus,	40. 68
Cælius Aurelius,	139

B.

Jacobus Baak,	154. 219
Rogerus Baco,	243
Paulus Barbette,	57. 150. 219
Ful. Cæs. Baricellus,	131
Fabr. Bartholetus,	76. 191
Thom. Bartholinus, 5. 8. 9. 11. 17. 18. 20. 23.	
30. 38. 39. 45. 47. 48. 53. 55. 58. 59. 60.	

63. 65. 67. 68. 72. 73. 75. 76. 77. 79. 80. 81.	
89. 90. 91. 92. 98. 99. 102. 103. 104. 105. 107.	
109. 120. 123. 125. 130. 131. 134. 136. 142.	
146. 149. 150. 153. 154. 155. 156. 158. 188.	
191. 195. 197. 199. 200. 201. 202. 203. 204.	
212. 214. 216. 218. 236. 266. 286. 287. 296. 300.	
Cass. Bauhinus, 4. 11. 22. 24. 47. 60. 73. 81.	
125. 135. 146. 156. 170. 189. 191. 197.	
200. 201. 214. 216. 248. 249. 250. 264.	
Laur. Bellinus,	72. 75. 76. 79
Alexand. Benedictus,	131. 203. 216
Anton. Benivenius, 5. 35. 59. 63. 82. 95. 104.	
109. 146. 156. 157. 242. 268.	
Cass. Berengarius,	212
Michaël Beclerus,	98
Joan. Beverovicus,	75. 214
Theod. Beza,	255
Fred. Bonaventura,	112
Jacob. Bontius,	59. 67. 159
Leon. Botallus,	123. 211
Tycho Brahe,	81
Hieron. Brassavola,	35
Brovardus,	81
Guilj. Budæus,	139
Daniel Bucrætius,	180
Joan. Buxtorf,	273

C.

Barthol. Cabrolus,	43. 65. 76. 90. 117. 133
Bernard. Cæsius,	200
P. Callimachus,	232
Joach. Camerarius,	131. 173. 232
Jacob. Camenicensus,	63
Bertin. Campanus,	68
Hieron. Capivaccius,	4. 197
Hieron. Cardanus,	8. 63. 231. 164
Jacobus Carpus,	150. 216. 250. 261
Ren. Carthesius,	159. 219. 245
Isaacus Cafaubonus,	188
Cornelius Celsus, 6. 38. 77. 139. 140. 189. 191.	
192. 261. 266.	

Gualth.

NOMINA AUTHORUM, IN COMMENTARIO.

<i>Guath. Charleton,</i>	89. 219	<i>Petr. Garfias,</i>	76
<i>M. Tul. Cicero,</i>	52. 247	<i>Corn. Gemma,</i>	243
<i>I. Caesar Claudinus,</i>	146. 265	<i>Matth. Glandorp,</i>	156
<i>Polcherius Coiter,</i>	81. 250	<i>Franf. Gliffonius,</i>	1. 16. 60. 61. 62. 63. 64.
<i>Theodorus Collado,</i>	67		66. 89. 219.
<i>Realdus Columbus,</i>	67. 92. 108. 120. 166.	<i>Joan. Gorraeus,</i>	131
	168. 192. 202. 216. 223. 212. 251. 301.	<i>Joan. Gualtherus,</i>	57
<i>Fabius Columella,</i>	101. 273		H.
<i>Herm. Conringius,</i>	59. 68. 150. 154	<i>Guilj. Harvejus,</i>	14. 60. 68. 101. 106. 112.
<i>Jacobus Corneltii,</i>	104		114. 115. 118. 119. 120. 122. 123. 131.
<i>Claudius de Couvre,</i>	112. 114. 122		149. 153.
	D.	<i>Joan. B. Helmont.</i>	37. 75. 187. 207
<i>Anton. Deusingius,</i>	100. 112. 114. 122. 171.	<i>Henr. ab Heer,</i>	95. 131. 243
	122. 134. 154.	<i>Herodotus,</i>	165
<i>Kenel. Digbæus,</i>	253	<i>Ortho Heurnius,</i>	67
<i>Rembertus Dodonæus,</i>	48. 67. 79. 82. 103. 104.	<i>Nathan. Highmorus,</i>	3. 6. 11. 12. 23. 27. 31.
	105. 154. 157. 214.		33. 34. 35. 37. 44. 46. 47. 53. 65. 66. 67. 68.
<i>Marcell. Donatus,</i>	15. 67. 131. 173		74. 75. 79. 87. 88. 91. 94. 107. 131. 141. 149.
<i>Leon. Doldius,</i>	76		154. 156. 159. 187. 198. 201. 216. 218. 219.
<i>Marcus Duncanus,</i>	171		224. 233.
	E.	<i>Fabr. Hildanus,</i>	61. 63. 76. 80. 82. 96. 115.
<i>Georg. Ent.</i>	112. 131. 154		117. 158. 211. 214. 234. 243.
<i>Thom. Erastus,</i>	156	<i>Hippocrates,</i>	3. 9. 35. 105. 120. 145. 147. 148.
<i>Erasistratus,</i>	68		149. 164. 169. 190. 219. 243. 255. 267.
<i>Anton. Everardi,</i>	86. 90. 98. 101. 105. 106.		301. 303.
	112. 114. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 134	<i>Cass. Hofmannus,</i>	60. 134. 139. 147. 158. 188.
<i>Barth. Eustachius,</i>	73. 76. 184. 203. 249. 251.		189. 204. 212. 216. 262. 266. 301.
	250.	<i>Corn. ab Hogeland.</i>	159
	F.	<i>Jacobus Hollerius,</i>	5. 15. 63. 65. 79. 156. 157
<i>Adr. Falcoburgius,</i>	37. 47. 43. 62. 63. 67. 75.		201. 204.
	102. 106. 140. 150. 158. 211. 217.	<i>Homerus,</i>	19. 232. 290
<i>Gabriel Faloppius,</i>	4. 62. 63. 65. 76. 82. 92.	<i>Horatius,</i>	133. 186
	103. 125. 127. 148. 166. 168. 175. 184. 188.	<i>Joan. van Horne,</i>	24. 33. 35. 53. 55. 75. 78
	292. 199. 240. 247. 250. 266. 281.	<i>Joan. Van. Horstius,</i>	33. 53. 67. 68. 118.
<i>Joan. Fernelius,</i>	3. 4. 15. 43. 48. 53. 61. 62.		153. 159.
	63. 68. 82. 117. 138. 145. 153. 170. 172. 173	<i>Georg. Horstius.</i>	243
	197. 222. 248. 261.		I.
<i>Leon. Fioravanta.</i>	68	<i>Joan. Phil. Ingrassia,</i>	196. 250.
<i>Robert. Flud.</i>	216	<i>Araginus Jonas,</i>	191.
<i>Cæcilus Folius,</i>	9. 123. 252	<i>Laurent. Joubertus.</i>	62
<i>Nicol. Fontanus,</i>	14. 104. 105. 136. 157. 165.		K.
	213. 214. 252.	<i>Joan. Keplerus,</i>	239. 243
<i>Petrus Forestus,</i>	63. 67. 214. 262	<i>Tob. Knoblochius,</i>	46. 68
<i>Leon. Fuchsius,</i>	168. 198	<i>Alb. Kyperus,</i>	17. 20. 68. 77. 112. 147. 154
	G.		L.
<i>Claud. Galenus,</i>	1. 2. 3. 4. 9. 18. 19. 22. 23. 24.	<i>Lactantius,</i>	40. 200. 255
	45. 53. 60. 61. 63. 64. 66. 82. 134. 139. 140.	<i>Joan. Langius,</i>	242
	141. 146. 147. 150. 151. 153. 156. 165. 168.	<i>Andr. Laurentius,</i>	3. 7. 20. 22. 24. 42. 61. 60.
	177. 184. 197. 212. 218. 219. 223. 224. 237.		62. 65. 76. 117. 123. 146. 188. 189. 197. 199.
	239. 241. 243. 263. 280. 289. 298. 303. 304.		201. 204. 216. 260. 261. 267. 268.

NOMINA AUTHORUM, IN COMMENTARIO.

<i>Petrus</i> , Laurembergius, 3. 5. 10. 22. 24. 33. 42.	<i>Joan.</i> Pecquetus, 55
45. 52. 54. 75. 101. 132. 133. 139. 140. 155. 186	<i>Philoxenus</i> , 265
<i>Eccardus</i> Leichnerus, 154	<i>Archang.</i> Piccolhomin. 3. 4. 20. 24. 42. 45. 58.
<i>Levinus</i> Lemnius, 68. 232	62. 73. 88. 90. 103. 147. 150. 158. 214. 216.
<i>Fortun.</i> Licetus, 104. 154	<i>Nicol.</i> Pietreus, 165
<i>Joan. Anton.</i> Lindanus, 4. 32. 40. 45. 57. 68.	<i>Sever.</i> Pinæus, 20
73. 77. 78. 86. 87. 88. 90. 91. 92. 95. 96. 101.	<i>Carolus</i> Pifo, 148
107. 120. 132. 134. 139. 145. 146. 147. 148.	<i>Georg. Valla</i> Placentinus, 247
165. 169. 172. 187. 189. 190. 194. 200. 206.	<i>Ful. Casser.</i> Placentinus, 36. 73. 166. 167. 168.
212. 213. 216. 218. 224. 234. 243. 252. 254.	169. 220. 221. 247. 248. 250.
262. 265. 273. 301.	<i>Felix</i> Platerus, 59. 82. 90. 108. 201. 204. 214.
<i>Guilj.</i> Lofelius, 75	216. 249.
M.	<i>Plato</i> , 140. 164
<i>Eduard.</i> Maii, 151. 155. 157	<i>Plautus</i> , 68
<i>Marcellus</i> Malpigijs, 157	<i>Francif.</i> Platonus, 76. 92. 93. 95. 147. 19
<i>Dominic.</i> Marchette, 20. 41. 46. 57. 62. 73. 76.	<i>Vop. F.</i> Plempius, 148. 154. 201. 204. 210. 214.
90. 92. 95. 99. 103. 104. 107. 116. 127. 138.	216. 220. 221. 233. 238. 239. 240. 241. 243. 299.
155. 159. 170. 171. 172. 182. 242. 252. 281.	<i>Primerofius</i> , 148. 154
283. 296. 288. 289. 290. 291.	<i>Plinius</i> , 18. 68. 101. 112. 140. 200. 202. 203.
<i>Petrus</i> Marchette, 80. 191	232. 261.
<i>Paulus</i> Marquard, 101	<i>Plutarchus</i> , 202
<i>Martialis</i> , 133. 203	<i>Ful.</i> Pollux, 169. 177. 265
<i>Nicol.</i> Massa, 24. 150. 212. 218. 250	<i>Ioan. Bapt.</i> Porta, 252
<i>Hieron.</i> Mercurialis, 104	<i>Ioan.</i> Posthius, 65
<i>Aristomenes</i> Messenius, 304	<i>Theod.</i> Priscianus, 169
<i>Gérard.</i> à Middelum, 57. 158	R.
<i>Gothofr.</i> Moëbius, 43. 47. 57. 59. 61. 62. 64. 65.	<i>Henr.</i> Regius, 93. 159
66. 68. 72. 81. 82. 87. 89. 90. 91. 93. 99. 112.	<i>Ioan.</i> Rhodius, 57. 61. 67. 72. 73. 74. 76. 86.
114. 116. 118. 119. 147. 150. 155. 157. 199	87. 135. 147. 152. 159. 188. 191. 206. 281.
200. 201. 202. 203. 213. 217. 219.	<i>Ioan.</i> Riol. Fil. 2. 5. 7. 9. 12. 15. 19. 20. 21. 22.
<i>Anton.</i> Molinetus, 191. 206	23. 24. 25. 31. 32. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 44.
<i>Mundinus</i> Mundinius, 47. 164	45. 46. 47. 61. 62. 66. 67. 68. 69. 73. 76. 78.
N.	80. 81. 90. 91. 92. 103. 117. 118. 120. 123.
<i>Michael.</i> Neander, 211	125. 130. 134. 137. 139. 147. 149. 150. 153.
<i>Gregor.</i> Nymmamnus, 112	154. 158. 166. 167. 171. 175. 177. 180. 182.
O.	184. 189. 197. 199. 200. 202. 204. 205. 206.
<i>Nicolaus</i> Olaus, 232	207. 211. 240. 249. 262. 263. 273. 280. 287.
<i>Oribasius</i> , 296	282. 283. 286. 304.
<i>Ovidius</i> Naso, 186. 187. 265	<i>Lasar.</i> Riverius, 79
P.	<i>Henricus</i> à Rodenhuyfen, 48. 103. 107. 109. 212
<i>Domin.</i> Panarolus, 58. 65. 78. 86. 152. 296	<i>Ioach.</i> Roelands, 67
<i>Nicol.</i> Papinius, 265	<i>Guern.</i> Rolfinkius, 14. 20. 35. 66. 294. 203.
<i>Ambros.</i> Paræus, 90. 156. 296	211. 262. 273. 275.
<i>Æmil.</i> Parifanus, 34. 151. 302	<i>Theoph.</i> Reynaud, 103
<i>Jacobus</i> de Partibus, 216	<i>Guilj.</i> Rondeletius, 92
<i>Guido</i> Patinus, 46. 68. 75. 89. 106. 165. 171	<i>Bald.</i> Ronfæus, 76
<i>Henr.</i> Pauli, 53. 56	<i>Ioan.</i> Rossus, 203
<i>Petrus</i> Pauw, 169. 191. 192. 193. 194. 144.	<i>Francif.</i> Roufettus, 68. 79. 102. 201
204. 252.	<i>Olaus</i> Rudbeck, 55
	<i>Ioan.</i> Ruellius, 15
	<i>Ruffus</i> , 19

NOMINA AUTHORUM, IN COMMENTARIO.

S.

<i>Joan. Dom. Sala,</i>	287
<i>Salius,</i>	157
<i>Philip. Salmuth,</i>	35. 39. 57. 60. 66. 80. 82. 104. 105. 118. 131. 157.
<i>Anton. Santorellus,</i>	131
<i>I. Cef. Scaliger,</i>	40. 101. 102. 200. 303
<i>Christoph. Scheinerus,</i>	240. 243
<i>Joan. Schenkius,</i>	47. 65. 67. 76. 80. 33. 96. 104. 131. 149. 203. 204.
<i>Com. Victor Schneiderus,</i>	41. 131. 132. 146. 165. 166. 195. 196. 197. 210. 212. 217. 220. 222. 225. 234. 250. 252.
<i>Sacra Scriptura,</i>	8. 146. 173. 186
<i>Arnold. Senguerdus,</i>	8. 17. 130. 136. 137. 175. 176. 177. 199. 200. 201. 233. 262. 264. 266. 271. 272. 274. 302.
<i>Georg. Segerus,</i>	122. 304
<i>Daniel Sennertus,</i>	104. 112. 156. 203. 204. 221. 234.
<i>Ludov. Septalius,</i>	135
<i>M. Aur. Severinus,</i>	33. 118. 151. 157. 295. 296
<i>I. Bapt. Silvaticus,</i>	76. 295
<i>Matthaus Sladus,</i>	57. 59. 64. 104. 150. 169. 219. 234. 240. 270.
<i>Marq. Slegelius,</i>	154
<i>Harro Sloomer,</i>	81
<i>Henr. Smetius,</i>	157
<i>Joan. Sperlingerus,</i>	37
<i>Adrian. Spigelius,</i>	4. 9. 17. 19. 62. 66. 67. 74. 76. 90. 91. 92. 93. 112. 114. 115. 117. 132. 135. 137. 149. 170. 180. 191. 197. 198. 203. 216. 243. 261. 264. 268.
<i>Nicol. Stenonis,</i>	141. 172. 252.
<i>Carolus Stephanus,</i>	59. 76
<i>Franciscus Sylvius,</i>	145. 211. 213. 216
<i>Jacobus Sylvius,</i>	24. 151. 192

T.

<i>Cornel. Tacitus,</i>	232
<i>Valescus de Taranta,</i>	174
<i>Aug. Thonerus,</i>	80
<i>Raphael Thorius,</i>	81
<i>Thuanus,</i>	151
<i>Alex. Tralianus,</i>	157

<i>Trafelmannus,</i>	67
<i>Nicol. Tulpus,</i>	19. 22. 25. 26. 47. 53. 57. 60. 79. 80. 90. 94. 95. 101. 105. 108. 118. 156. 157. 158. 203. 214. 243. 268

V.

<i>Valerius Maximus,</i>	165. 202. 304
<i>Joan. Valverda,</i>	20. 145. 223
<i>Varo,</i>	101. 171
<i>Constant. Varolius,</i>	47. 92. 117. 242
<i>Petrus Vascus Castellus,</i>	176
<i>Christ. à Vega,</i>	131. 156
<i>Red. à Vega,</i>	216
<i>Lamb. Velthuyfen,</i>	112
<i>Andr. Vesalius,</i>	15. 17. 66. 67. 76. 77. 92. 93. 103. 106. 108. 131. 135. 137. 139. 146. 157. 166. 168. 169. 177. 189. 192. 199. 204. 211. 212. 216. 221. 223. 238. 240. 248. 250. 253. 262. 263. 275. 789. 290.
<i>Joan. Veslingius,</i>	5. 10. 19. 21. 25. 35. 36. 39. 43. 44. 45. 46. 49. 56. 73. 75. 76. 81. 83. 91. 92. 93. 107. 108. 143. 147. 148. 151. 152. 180. 182. 186. 189. 196. 204. 205. 301.
<i>Vidus Vidius,</i>	68. 148
<i>Mich. de la Vigne,</i>	165
<i>Joan. de Viga,</i>	216
<i>Virgilius,</i>	18. 52. 246. 271
<i>Polydorus Virgilius,</i>	203
<i>Corn. Vitellius,</i>	243
<i>Ulpianus,</i>	139
<i>Gerard. Vossius,</i>	95

W.

<i>Joan. Walæus,</i>	20. 33. 37. 43. 46. 60. 64. 68. 69. 80. 88. 90. 93. 150. 154. 157. 173.
<i>Thom. Wharthon.</i>	93. 174
<i>Joan. Wierius,</i>	63. 157
<i>Thomas Willis,</i>	35. 36. 53. 82. 148. 165. 196. 211. 213. 214. 216. 217. 218. 219. 221. 223. 225.

<i>Menelaus Winshemius,</i>	1
<i>Olaus Wormius,</i>	5. 156. 166. 194

Z.

<i>Zacutus,</i>	35. 68. 104. 135. 157. 173
-----------------	----------------------------

NOMI-

NOMINA EORUM

Qui in

A P P E N D I C E

Ad Veflingium occurrunt.

A.

A Ctuarius.
Aëtius.
Salom. Albertus.
Ambrosius.
Amatus Lusitanus.
Hier. Fab. ab Aquapendente.
Aristoteles.
Casp. Afellius.
Adr. Auzotius.
Joan. Aicholtius.

B.

Andr. Baccius.
Guilj. Ballonius.
Paulus Barbette.
Thom. Bartholinus.
Eras. Bartholinus.
Casp. Bauhinus.
Mich. Beslerus.
Laur. Bellinus.
J. Cas. Benedictus.
Lud. Bilsius.
Blondus.
J. Alphons. Borellius.
Pastor Borellus.
Joan. Buxtorfius.

C.

Barthol. Cabrolus.
Hier. Cardanus.
Renatus Cartesius.
Petr. Castellus.
Caussinus.
Corn. Aurel. Celfus.
Joan. Chrysostomus.
M. T. Cicero.
Quirin. Cnoglerus.
Reinoldus Columbus.
Herm. Conringius.
Joan. Costæus.
Q. Curtius.

D.

Jacob. Dalechampius.
Dioscorides.
Ludov. Duretus.

E.

Erasistratus.

F.

Gabriel Falloppius.
Joan. Fincelius.
Nic. Florentinus.
Cælius Folius.

G.

Claudius Galenus.
Petrus Gassendus.
Aulus Gellius.
Giffartus.
Francisc. Glissonius.
Regnerus de Graef.

H.

Guilj. Harvejus.
Herophylus.
Joan. Heurnius.
Henr. ab Heer.
Nath. Hichmorus.
Fabr. Hildanus.
Hippocrates.
Horatius.
Joan. van Horne.
I. Dan. Horstius.
Maurit. Hofmannus.
Huitfeldius.

I.

Fr. Joël.
Isaachus Joubertus.
Juvenalis.

K.

Ashan. Kircherus.

L.

Andr. Laurentius.
Lampridius.
Andr. Libavius.
Titus Livius.
Mich. Lyserus.
Lucretius.

M.

Marcellus Malphigius.
Domin. de Marchettis.
Prosp. Martianus.
Andr. Marinus.
Domin. Massarius.
Ludovicus Mercatus.
Godofr. Mœbius.
Henr. Moinichen.
Joan. Montanus.

N.

Carolus le Noble.

O.

Oribasius.

P.

Jac. Henr. Pauli.
Onuphrius Panuinus.
Domin. Panarolus.
Jacobus de Partibus.
Ambrosius Paræus.
Guido Patinus.
Philip. Persius.
Joan. Pecquetus.
Carolus Piso.
Archang. Piccolhominus.
Plato.
I. Cas. Placentinus.
Plautus.
Felix Platerus.
Vop. Fort. Plempius.
Plinius.
Fulius Pollux.
Theodor. Priscianus.

*** 3

Abra-

Q.

Abraam Quina.
Quintilianus.

R.

Rabbi Abba.
— *Jehuda.*
— *Matthana.*
Abub. Rhafes.
Ioan. Rhodiginus.
Ioan. Riolanus.
Guern. Rolfinkius.
Guilj. Rondeletius.
Olaus Rudbeek.
Freder. Ruysch.

S.

Claud. Salmasius.
Phil. Salmuth.
Hercul. Saxonia.
Ioseph. Scaliger.

Ioan. Schenkus.
Conr. Viß. Schneiderus.
Georg. Segerus.
L. A. Seneca.
Dan. Sennertus.
Septalius.
Henric. Smetius.
Adrianus Spigelius.
Nicol. Stenonis.
Carolus Stephanus.
Franc. de le Boe Sylvius.
Ioan. Swammerdam.

T.

Alex. Tadinus.
Tertullianus.
Theophylus.
Theophrastus.
Titinius.
Alexand. Trallianus.
Andr. Trevisius.
Victor Trincavellus.
Nic. Tulpus.

V.


Constant. Varolius.
Varro.
Egbertus Veen.
Fr. Verulamius.
Andr. Vesalius.
Ioan. Vestingius.
Ioan. Georg. Virsungius.

W.

Ioan. Walæus.
Thom. Warthonus.
Martin. Weinrichius.
Thomas Willis.
Olaus Wormius.

Z.

Zacutus Lusitanus.
Nic. Zassius.
Gabr. Zerbus.



IN HONOREM JOANNIS VESLINGII, Equitis, &c.



Uⁱ septem gēminis aquora cornibus
Findis, Nile pater, qui tumidus rigas
Arentes pluvio supplicibus Iove

Tractus, quid caput oculis?

Te possunt Solymie, te Petra flagitat,
Terrarumque parens te facilem cupit,
VESLINGI memores dum capiti dicant

Caro munera Chloridos.

Ignotas Latio qui studiosior
Stirpes edocuit; qualis adulterat,
Mota lite diu, vis opobalsamum

Firmis explicuit modis:

Intellecta parum, quæ Dioscorides,
Et quæ doctor Arabs protulit, heic stylo
Evolvens dubiis cuncta Quiritibus

Certam promeruit fidem.

Vernantis genii ne juveniliter
Sectaretur opus, mox animantium
Advertens aciem prodigiis, gravem,

Laudis materiam petit.

Quam tirocinio Memphis adorem
Mirabunda tulit Dedalæ manus,
Nunc Antenorei pegmatis advena

Plausu nobilis adprobat.

Arctis impatiens gloria finibus
Claudi, corporeis libera vinctulis
Quintam Castaliæ jam trieterida

Famæ solvit in orbitam.

Id cui numen adest, quo Sapientiæ
Constans templa foræ, hic labor emtheus,
Te, Regina potens Hadriaci maris,

Longum vindice floreat.

JOANNES RHODIUS.

A^T imperato fena silentio
Laxare par est. Non ego Socratem

Tractabo nodosum, sodales,

Usque nec intemerata Coe

Præcepta mentis, Castalidum sacer
Vates, recessus Pierios jurat

Obire plerumque, ac tacentem

Voce nova reparare buxum.

Atqui medentum diffugio choros,

Paulum reductus sic temere; tamen

HEROA gratus non caduco

PÆONIUM celebrabo versu.

Te LIVIANÆ GLORIA PORTICUS

VESLINGI, Eques, dicam, & adorea.

Tollam superbâ, quam vel Albis

Invideat, patriusque Rhenus.

Quæ prima Famæ gēsta perennibus

Incido saxis? nominis ad tui

Caligat affectus nitorem, &

Mentem hebetat radiata Virtus.

Virtus capaci pectoris ambitu

Inclusa, miris fulgurat ictibus,

Arctique, ne parva laceßam

Carpathium pelagus phaselo.

Tu magna prisca nomina sæculi

Raris adæquas artibus, ingeni

Felix, potenti sive Pitho,

Seu numeris libet ire Chius.

Hoc ore, divinum, JAPETI velut

HERES, & ignem, membraque corporis

Dissecta mortalis docebas

Nuper, & interiora calvæ.

Quantus magistris, quantus erat bonæ

Sudor jurventæ, cum probè singuli

Adstare pugnarent cathedræ, atque

Ambrosium bibere aure succum!

Hic nunc Dioclem, nunc Erasistratum

Torto flagellas verberare, nunc AQUÆ

PENDENTIS exactos labores

Non humili redimis corona.

SUCCESSOR ejusdem, & validus pugil

Contra obloquentum murmura, plausibus

Id triumphæ! vive! tot An-

tenoreo resonante circo.

Cl. Præcept. suo observant. symbolum D.

JACOBUS GIBBES Anglo-Londinas.

Coclo propinquis pyramidum aktior
Fugis honorum congeries tibi
Cum voce VESLINGI Sororum, &
Lecta tuo capiti corona
Iam dudum apud me est. Redde cada veri
Vitale robur non Medico minor,
Cui fraude distractum norverce
Hippolitum eripuit Charonti.
Doctrina fati littora transiit,
Manesque vivo germine roborat:
Plutona dum demulcet Orpheus,
Eurydicæ redeunt amores.
Mortisne corpus conditio teret
Extreme? mentis quod genio imbutis
Tangente natura cacumen
Non humili ingenii volatu.
Ægyptiorum prodiga vanitas
Inane funus farciat unguine,
Clausumque Mausoli sepulchro
Per memores titulos in ævum
Æternæ. Eheu, quàm spatio brevi
Marcescit urnæ pondus, & aride
Telluris in scenam reductum
Nulla suis simulacra præbet.
Et pompa secti visceris utili
Commisssa prælo Mercurialium
Invitat examen virorum,
Totque tuos relegit labores

Fluente linguæ nectare perlitos
Artisque cedro. Quis gelidum putat
In frustra dissectum, renasci
Posse manu studioque truncum?
Non hæc latebris eruere efficax
Umbras patrarit Canidiæ furor.
Coctumne Medææ maligno
Cor Pelicæ juvenescit astu?
Ætatis alas non facies Dei
Tibhone tardat, nec teneræ oscula
Aut numen Auroræ morantur
Caniciem, senique rugas,
Palude quamvis se Stygia lavæ.
Contra furentes insidias Phrygum
Pastoris imbelli sagitta
Occubuit sine laude Achilles.
Absumfit atris ignibus Hercules
Vinci dolentem Palla cruoribus
Peruncta Centauri, Polumque
Oeta fuit tumulus ferenti.
Semen Deorum mors violentior
Extinguit; orbis cui pila terminus
Est visus, angustæ coercet
Vota avidi Iuvenis cavernæ.
At te Minervæ cura vetat mori, &
Apollinari consecrat agmini,
Nomenque lucratus perenne
Linqvis humum fugiente penna.

JACOBUS LIPSIUS.

Mysteriorum, quæ sinu abdito texi,
Detecta sacra, perviosque vix ulli
Parvi recessus, atque machinam mundi,
Mentem sagacem non latere mirata,
Post mille plausus, quos tuæ frequens arti
Dedit theatrum, jam tibi ipsa, VESLINGI,
Natura rerum mater omnium plaudo.
Videre vani, condidisse me casu
Qui cuncta dicunt, atque sorte jecisse
Partes, coirent unam ut orbis in molem,
Se errasse: providentiaque compactum
Systema mundi credidere majoris.
Minoris artem te docente convicti
Videre, nexu colligata prudenti
Sibi indicem servare quæque: sic ventrem
Parare toti corpori cibum, formam
Pulvis gerentem lactei, per angusta
Quem vasa raptum fortius jecur vincat,

Colore rubro sanguinem novum tingens.
Dehinc canales permeare venarum
Vitæ liquorem, leniter prolabi,
Humore dulci corpus ut riget squalens,
Reddatque egenti quod calor vorax edit.
Videre vestri regiam domum Solis,
Citum per artus unde spiritum didens,
Calore blando membra Cor fovet, tardum
Non congelata frigus enecet lethi.
Orationis poscerem mihi flumen
Illud tuum, si cuncta prosequi vellem,
Quæ melleo facundus ore dixisti.
Natura factis eloquens: at hæc pauci
Intelligunt, ni fidus adsit interpret.
Quem, MAGNE VIR, cum te mihi esse agnoscam,
Ut grata sim, meritum tibi offero nomen.
Quo posteris clarus vocaberis, SUMMI
INTERPRETISQUE, VINDICISQUE NATURÆ.

REINHOLDUS DEHNIIUS
Regiomontanus Borussus.

SYNTAGMATIS ANATOMICI.

CAPUT I.

De Communibus Corporis velamentis.



SI non fastidis cadaveri humano curiosè dissecto animum oculosque advertere, sive te sapientiæ sive rei pariter medicæ professio delectet, fructum spondeo operæ minimè contemnendum. Nam ex illa vel abjectissimarum partium mirabili structura opificem tuum cognosces, sapientissimum, optimum, potentissimum. Actionum stupendarum causas compendio disces, & consensum, concordiamque systematis hujus universi. Lustrabis secundæ, atque adversæ valetudinis fundamenta. Remedia deinde partibus afflictis certius admovebis, & horridioris quoque præsidii ingruente necessitate, neque audacia præcipitare, nec trepidabis metu.

Contemplandi autem humani corporis *tum* VENTRES erunt, *tum* ARTUS, quos communi Manuum Pedumque significato comprehendimus

COMMENTARIUS.

Anatomici] *Anatome* artem designat corpora composita in simpliciora debitè resolvendi. Hinc, ut benè *Cl. Glissonius Anat. Hepat. proleg. cap. I.* Subjectum hujus artis prout variè sumitur, ita & vocis *Anatomes* significationem variat; 1. Enim tam liberali sensu accipitur, ut *vel* Corpus quodcunque compositionem aliquam seu variam partium conjunctionem obtinens comprehendat, sicque omnia artificialia ut arte conjuncta, arte quoque separari plerumque possunt; *vel* Mixtum solum, & sic Chymia quoque Anatomies nomine venit, utpote quæ Elementa (ut vocant) mixtionis ab invicem separat. 2. Ad animalium duntaxat corpora refertur, sive viva sive mortua, sic tam brutorum quam hominis ipsius in partes separatio manualis Ana-

tome dicitur. 3. Denique ad solum hominem restringitur, cujus solius accurata dissectio Anatomie vocatur, & omnium propriissimè.

Tum ventres erunt tum artus] *Galenus* hæc est Corporis humani divisio quam *lib. de inæq. intemp. cap. 2. & lib. 7. de usu part. c. 21.* tradit. Et hanc naturæ maxime consentaneam esse dicunt, utpote quæ singulos hosce ventres propriis terminis circumscripserit, ac in singulis partem aliquam principem collocarit, cui & reliquæ omnes inserviant, & à quâ totum corpus aut facultatem aut materiam utilem & necessariam radicaliter & distributive accipiat. Ut inter alia docet *Winshemius disput. Anat. 2.* Quæ opinio de partium principatu quantum à vero aberret ex seq. clare constabit.

dimus. *Ventres* appellamus Cavitates corporis insignes, & veluti regiones, intra quas natura partes habitudine atque actione diversas collocavit. Horum *tres* spectantur. *Primus*, qui Inferior, expanso intus peritonæo definitus, *Abdomen* nuncupatur, quoniam abdit, involvitque viscera illa omnia quæ vel alimentis corpori toti præparandis, vel in spem sobolis generandæ producendo, fovendoque semini comparata sunt. Venter medius, qui *Secundus* est, obtentæ undique pleuræ terminis circumscriptus, fontem vitalis caloris, hujusque ventilabra pulmones possidet. *Tertius*, qui Supremus dicitur, caput includit, robustis cranii veluti mœniis cinctum. In eo partem principem Plato constituit, & quicquid in homine sidereum magis ac cœleste.

Cæterum vim putredinis declinaturi, dissectionem ordimur ab infimo ventre, seu abdomine, cujus anteriora, quæ cartilaginibus costarum infimis finitima, *Hypochondria* appellarunt *Veteres*, hinc dextrum, inde sinistrum. Quod ventriculo, proximisque ipsi intestinis imminet, *Epigastrium* clarioris doctrinæ studio dicimus: quod verò ab Iliis, ingui-

COMMENTARIUS.

Horum tres spectantur] Divisio trium majorum cavitatum elegantibus verbis hic expressa, sed nonnihil obscura ei, qui nondum sacris Medicinæ initiatus est, quia non designat propriis nominibus in ventre primo contentas partes, partes puta Genitales & Nutritivas, neque in secundo Cor, neque in tertio Cerebrum, quamvis faciliè Medicus intelligat per fontem vitalis caloris Cor, per partem principem in capite Cerebrum. Ut accuratè annotavit *Riol. in anim. ad Vesling.*

Abdomen] Venter inferior improprie Abdomen dicitur. Quod enim extrinsecus partes imo ventre contentas abdit atque obvalat, cutis scilicet cum cuticulâ, pinguedo &c. id universum Abdomen propriè perhibetur. Abdomen enim etiam Authori nostro ab abdendo nuncupatur, quoniam abdit, & abscondit omnes partes imo Ventre contentas, tam quæ ad nutritionem, quam quæ ad procreationem faciunt.

Fontem vitalis caloris] Cor intelligit.

Robustis cranii veluti mœniis cinctum] Non solo cranio cingitur, sed & præter partes exteriores toti corpori communes, pericranio, duplicique meninge.

Ab infimo ventre, s. Abdomine] Quæ horum nominum diversitas, jam ostendimus.

Anteriora] Lateralia magis sunt.

Hypochondria] Quasi subcartilaginea. Componitur enim vox Hypochondrion ex præpositione *ὑπο* sub, & nomine *χόνδρος* cartilago, quasi diceret partem sub cartilaginibus costarum constitutam. Rectius itaque locus infimi ventris sub costarum spuriarum cartilaginibus hypochondrion dicitur, quam ipsæ cartilagines & quæ iis connexæ partes.

Epigastrium] Verum est ita nominari à recentioribus, sed nunquam à *Galeno*, qui id pro toto Ventre, vel pro universali ejus integumento, quod abdomen diximus, accipit, ut inter alios ex *Fernelio* patet, rectius diceretur pars seu regio stomachalis.

Iliis] Ilii variis sunt duæ illæ abdominis partes inanes, id est molles & ossibus carentes, quæ mediæ interjectæ sunt inter costas adalterinas & ossa Ilium, at falluntur, designant enim verius loca ea quæ ossi Ilium vicina sunt, initium fumentia à partibus mollibus, quæ *Galeno Inanes & Lagones* dicuntur, se extendentia ad Inguina,

Ingui-

inguinum, pubisque spatio comprehenditur, *Hypogastrium*. Medium inter epigastrium, & hypogastrium *Umbilici regionem* nuncupamus. Reliquum abdominis ad posteriora porrectum, superius *Lumbi*, inferius verò *Nates* complectuntur.

E partibus autem in abdomine obviis, quædam universo corpori *communes* sunt, quædam ejusdem *proprie* habentur. Inter communes cutem recensemus, cum instrata sibi cuticula, tum pinguedinem, & membranam carnosam.

CUTIS est humani corporis velamentum Membranosum, quod partibus inductum externis aliquam adversus fortuitorum incursum tutelam iis præbet, qualitatumque tactilium excessus metitur. Velamentum est MEMBRANOSUM. Nam & membranarum instar expanditur, & communem iisdem substantiam obtinet; quamvis temperamento, conformatione, officioque proprio habeat, quo à membranis reliquis discrepet.

ORIGI-

COMMENTARIUS.

Inguinum] Per Inguina ea denotat Author loca, in quæ flexura corporis in femur incidit. Græcis *Bubones* dicuntur, quorum nomen etiam retinent tumores illi, qui in iis plerumque exoriuntur.

Pubisque] Per pubem eum designat locum, quem ossa duo Pubis circumscribunt & constituunt, quivè in adultis lanugine seu pilis tegitur tanquam velamentis naturalibus, ad partes eas tegendas, quas communis verecundiæ lex jubet abscondere. Sæpius tamen etiam voce Pubis ipsos Pilos in ea parte erumpentes vocari constat.

Hypogastrium] Appellatur ita Hippocrati, Galeno, aliisque Veteribus. *Venter inus* Latinis dicitur, imò & *Aqualiculus* & *Sumen*.

Inter communes recensemus pinguedinem &c.] *Pet. Lauremberg. in Colleg. Anatom. Exercit. 2. thesi 10.* minus recte pinguedinem communibus partibus annumerari vult, quod neque ubivis in homine sit, neque semper. Thesi tamen aliâ satis esse ad communitatem dicit, quod majori ambitu corpus investiat.

Cuti] De differentia Cutis, Corii, Pellis egregiè *Lauremb. in Collegio Anatom.* ubi Cutim tribuit soli homini, Corium brutis, Pellem verò tum corium tum cutim vult esse ab animali suo detracta.

Humanis corporis velamentum] Usus cutis

primus est, ut sit Corporis tegumentum, ideò figuram accepit ita rotundam, longam &c. prout partes subjæctæ requirunt.

Membranosum] Malè *Piccolb. & Laurentius* Cutim dicunt simpliciter Membranam.

Aliquam adversus fortuitorum incursum tutelam præbet] Pro ejus enim majori minori que consistentiâ homines variè ab externis injuriis læduntur, nam quibus tenuior & rarior est, hi plus nocimenti metuendum habent, quam quibus crassior & densior.

Qualitatum tactilium excessus metitur] An Tactus sit organum fusè declarat *Hichmor. pag. 7. Disq. Anat.* Sunt & Cutis usus alii non negligendi, quorum 1. est Conjungere partes, hinc est quod eam Colligationem & connexionem omnium partium pronuncia-verit Divinus Hippocr. de *Ossium natura*, facilius enim vincula partes connedentia aut rumpere aut extendi possent, nisi cute conjungantur, & in officio suo detineantur. 2. Transpirationi & pilorum generationi inservire, quod utrumque facit ratione pororum quibus scatet, per hos enim quod transpirationem spectat & fuligines exeunt, & medicamentorum vis ad interiora transit, imò & aer ipse. Pilos verò in eâ radices agere ocularis demonstratio evincit, hinc & in capite, ubi copia pilorum desiderabatur, cutis crassior.

ORIGINEM suam non Sanguini, Vasisque ad extrema porrectis debet, sed Semini. Id verò prima embrii rudimenta ostendunt, quæ fluida propemodum tenui cutis amiculo circumdare naturæ providentia voluit. Hinc reliquarum partium seminalium in morem, etiam in Æthiopibus Indisque sub nigra pellicula candicat. Neque amissam, secundum eandem, sed similem tantum substantiam, quæ callus, cicatrixque vocatur, opifex natura instaurat.

Sensus vigorem à NERVIS fortitur, quorum non extrema tantum, sed ramuli etiam exiles, fibræve, hinc inde in cutem propagantur, ut in tertio, quartoque nervorum pari, quod ad faciei partes, & sexto, quod ad brachia fertur, clarius patescit. Idem de VENIS, ARTERIISQUE accipiendum est, quas cutis pro extensionis situsque modo varias suscipit, ut sanguine, & vitali spiritu sufficienter subministrato, nativa parti membranosa frigiditas siccitasque temperetur. Quæ circa abdomen igitur huc pertingunt arteriæ, ac venæ, ab epigastricis, lumbalibus, mammariisque ramis derivantur.

HABITUS in cute ratio, pro temperamentorum, ætatis, sexus, regionumque varietate, omnino dispar est. CRASSISSIMA eadem est, quæ capiti incumbit: TENUIS, quæ per latera se diffundit: TENUIOR quæ in faciem manuumque volam panditur: TENUISSIMA, quæ labra vestit. Mediæ

COMMENTARIUS.

Non sanguini] Sanguini inter alios originem præbet. Cl. Lindanus *Physiologiæ cap. de Cute.*

Vasis ad extrema porrectis] Et si largiamur Venas, Arterias, Nervos pro nutrimento & sensu ad Cutem accedere, neutiquam tamen constat illorum vasorum in cute expansio.

Sed semini] Statuerunt hoc jam antea Galenus, Capi-vaccius, Fallopius, Fernel. Archan-gelus, aliique. Bauhinus ex semine & sanguine mixtam partem vult.

Neque amissam &c.] In pueris tamen teste Spigel. lib. 8. Anat. cap. I. propter cutis tum humiditatem, tum humoris glutinosi copiam, observata est vulneris per veram cutem consolidatio.

Cicatrix] Hæc semper reliquâ cute durior est, & poris caret, undè nec pilis tegitur.

Habitus in Cute ratio pro Temperamentorum, Ætatis, Sexus, Regionumque varietate omnino dispar est] Si Temperamenta spectes, frigidio-

ribus densior est cutis, minoribus pertusa poris, contra calidioribus spongiosa non nihil. Si Ætatem, pueris tenuis est & porosior, adultis crassior & densior. Si Sexum, foeminis ferè rarior est quam viris, totum enim Corpus foeminis spongiosum est, ut inquit Hipp. lib. de morbis. Si denique Regionem, in frigidis iis cutis crassior est multo & densior, quam in calidioribus, in quibus rarior ac tenuior, ut in Æthiopibus. Æstivo quoque quam hyberno tempore rarior cutis est, ex quo fit, ut pelles animalium quibus nos adversus frigora munimus, si ætate detrahantur, minus nostrum calorem servant, quam quæ hyeme, eò quod illæ difficilior pilos contineant, quam hæc. Ut hæc omnia latè deduxit Adr. Spigel. lib. 8. Corp. Fabr. cap. I.

Quæ Capiti incumbit] Dorsi etiam, collique cutis insigni duritie, densitate & crassitie prædita est.

Quæ in faciem] Adde & Scrotum.

Etc.

Mediæ conditionis est, ubi digitorum extremis induitur, aptius ibi tactus instrumentum præbitura. **MEATIBUS** patere debuit plurimis. E quibus *ampliores* alii, circa os, nares, oculos, aures, pudenda, &c. tanquam regiæ viæ, cum necessariis corpori suppeditandis, tum supervacuis eliminandis, requirebantur. Alii *minores, & innumeri*, per quos vapores, & excitata vi caloris fuligo transpirat.

Candido per naturam **COLORE** nitescit; inhæretque subjectæ pinguedini laxius, ut alicubi incisa, flatu ab ea deduci queat, barbaro in curandis leprosis experimento. Firmius carnosæ frontis membranæ **COMMITTITUR**, ac pedum plantis, manuumque volis, ut ad motus harum partium

COMMENTARIUS.

Etc.] De numero horum foraminum videatur Lauremb. in Proceſſ. Anat. & Collegie Anat. ubi & foramina papillæ in mammis, & ubi datur unguium connexio in digitis, inter alia adsumit.

Necessariis corpori suppeditandis.] Alimento, spiritu, luce, sono, odore, semine, &c. Videatur citatus Lauremb. in Coll. Anat.

Supervacuis eliminandis.] Aurium cerumine, narium muco, oculorum lachrymis, oris halitu, atque salivâ, sudore, menstruo sanguine, &c.

Alii minores &c.] Pori dicuntur, in cute quam cuticulâ majores, qui parvitate oculorum obtutum fugiunt, nonnihil tamen, ubi crassior est, ut in plantis pedum, conspicui maximè, cum aquâ fervente cutis aduritur. Solent quoque in nobis hyberno tempore conspici, cum derepentè cutis denudatur, ubi cuticula anferis deplumati cutem æmulatur, ut habet Spigel. loco dicto. His poris debetur, quod piscatorio reti Cutis à nonnullis comparatur. Fenestrarum loco Cutem posse usurpari, non video possibile, sive recens à corpore detracta consideretur, sive arte, ut alia coria præparetur, quidquid alii scribant.

Per quos vapores.] Rarum admodum sanguinem per eos effluere; cujus exemplum se vidisse testatur Ant. Benivenius libro de abditis Morb. causis cap. 4. testatur & Jacobus Hollerius inter rara. Rarius adhuc arenulas per eos exire, uti in illustri quodam viro, calculo & arthritide, domesticis hospitibus, sæpè obnoxio, copiose adeò cum sudore largissimo emanasse, ut inducta manu abstergere necesse

æger habuerit Cl. Olauum Wormium cum variis aliis Medicis saluti ejus excubantibus observasse scribit Bartholinus Observ. Anat. 34. cent. 1.

Candido per naturam colore nitescit.] Pro ratione tamen humorum abundantium in corpore, subjectæque partis, colorem variat. Sic in sanguineis, maximè si is vel colore vel aliquo animi motu, excitatur, copiosius ad partem aliquam, ut faciem, adfluat, rubet; in biliosis flavescit, in melancholicis nigricat. Ubi adhæret carni ut in malis, rubet magis, quam ubi pinguedini; ubi vasis & præcipuè venis, livet.

Inhæret subjectæ pinguedini laxius.] Iis saltem locis, ubi pinguedo adest, aliis panniculo carnoſo.

Ut alicubi incisa flatu ab ea deduci queat, barbaro in curandis leprosis experimento.] Dubitat an hoc fieri queat *Cl. Rioli. anim. suis in Vesling. & rationem dubitationis à firmissima cutis cum subjecta pinguedine cohærentia desumit, quam, pinguedinem à cute separans anatomicus, manifestissimè observat, si non omnibus locis, saltem plerisque.*

Firmius carnosæ frontis membranæ committitur.] Quam muscoli frontis nomine insigniri vulgò notamus.

Pedum plantis manuumque volis.] Cum membranâ carnosâ hic non modo unitur, sed omninò coalescit. Est tamen & locus ubi adeò cohæret subjectis partibus musculosis aut glandulosis, ut separari à se invicem non possint, ut in labiis externis.

Ut ad motus harum partium in plicis unâ & rugis sulcetur.] In animalibus aliis ferè mobilis est,

tium in plicas unà rugasque sulcetur, quas tanquam hieroglyphica, & indices futurorum notas, humani ingenii curiositas suspicit. *Arabes crebris*, latisque cauteriis bullatam cutem, roboris gratiâ, partibus subjectis magis impingere conantur.

Operit cutem exterius pellicula singularis, quam Græci scitè Epidermidem nuncuparunt, CUTICULAM Latini. ORIGINEM traxit, à subditæ cutis roscido madore, quem partim blandus formatrici naturæ

COMMENTARIUS.

est, ad fugandum quicquid molestum fuerit. Hujus rationem reddunt nonnulli, quod in homine cutis proximè connectitur pinguedini, hæc panniculo carnosio: in aliis animalibus interjaceat panniculus carnosus, non tam firmiter pinguedini conjunctus, quin facile separari, ac sine impedimento ad placitum moveri possit. His addi vult *Highmorus lib. I. Disq. Anatom. pag. I. cap. 5.* quod villas quasdam musculorum instar plures habeat cutis ea quam humana.

Arabes crebris Sc.] Non ferro non auro inquit *Prosp. Alpin. de Medic. Egypt. lib. 3. cap. 12.* neque alio metallo ignito ad inurendas partes illi utuntur, neque ut aliqui utebantur, buxæis lignis, sed gossypio & lineo panno ignito inuisionem moliri consueverunt. Volentesque inurere aliquam partem corporis, sumunt lineam petiam, cubiti longitudine, latitudineque trium digitorum, atque gossypii justam quantitatem, quod totum lineâ prædictâ petiâ involvunt, ac filo serico ligant ad formam pyramidis ipsiusque latioris extremitatem urendæ parti applicant, probeque cuti adherere student, alterumque caput, vel extremum succendunt, comburique permittunt, quousque fasciculus ille ex lineâ petiâ atque gossypio omnino crematus sit, continuo dum cutis uritur, carnem circumcirca ferro tangentes, ne ex eo calore oboriatur interea aliqua inflammatio. Observant etiam dum involucrium illud parant, ut in ejus medio sit foramen vel meatus per quem fiat aliqua respiratio, atque eventatio. Post inuisionem in parte exustâ utuntur ossium medullâ, quoad eschara cadat. Hicque est inurendi modus apud eam gentem observatus ac frequentatus.

Operit cutem exterius Sc.] Quod exterius in

corporis superficie se nobis primò exhibet pellicula est, cuti imposita, ideoque *Cuticula* nostris, Græcis vero *ἐπιδερμὶς* dicta est; quasi superiore pelliculam aut extimam cutem, aut cutis efflorescentiam quandam diceret, Unde à *Galeno* cutis etiam superficies dicta est: à *Celso* summa pellicula: Ab *Aristotele* verò cutis ultima, & primi ortus operculum.

Originem traxit à subditæ cutis roscido madore] Materia, ex qua generetur Cuticula, certa hæcenus determinari vix potuit: Omnium optimè hanc rem explicasse videtur *Cl. Highmorus l. I. Disq. Anat. part. I. c. 4.* dum eam primò in foetus formatione à particulis seminis, ut aliæ partes, in Utero formari docet, nutriri autem, novumque, cum continuitas ejus solvitur, generari ex particulis cognatis, quarum nomine nil ipsum intelligere credimus, quam subditæ cutis roscidum madorem, oleosam nempe, lentam, humidamque sanguinis partem, vaporis instar per poros cutis transeuntem.

Quam partim blandus Sc.] Causam efficientem meritò duplicem constituit author, internam nempe & externam. Illa remotior est, hæc proximior. Interna blandus ipsi Calor est, vaporem ad superficiem protrudens. Externa Siccitas corporis ambientis, humiditatem absorbendo materiam reliquam adstringens. Frigiditatem ego dicerem. Videtur quidem *Highmorus* calori soli committere, verum rationes tanti haud videntur. Quod enim dicit, in angue & cruce, pauxillo calore præditis, redeunte Sole, Spiritus cum calore, urgente hyeme ad interiora delatos, ad exteriora iterum revocari, naturamque tum in partium tutelam loco cutis crustaque propter defectum influxûs Spirituum, qui caloris vehicula, jam demortuæ, aliam formare, quid aliud ostendit,

naturæ ministrans calor, partim siccitas ambientis paulatim densavit Unde & tenello adhuc embryo, utcumque mollior, inhæret, & ætate procedente firmitudinem acquirit talem, ut quæ poros cutis permearent excrementa, sub hujus lentore non raro coerceantur. *Simplex* quidem cutis operimentum apparet, cumque illa quaquaversum extensum, ignea tamen vesicas excitantium vi duas in partes sæpè distrahitur. *VITÆ*, *SENSUSQUE* penitus expers est, quamvis ob nexum firmiorem, citra molestiam à cute separari vix queat.

Nec

COMMENTARIUS.

ostendit, quam ad generationem novæ cutis, crustæq; calorem internum necessarium esse, quod & nos statuimus, solum autem eum sufficere, adeoque frigiditatem aut siccitatem corporis ambientis excludi debere, minimè probat. Imò quod spectat speciatim magis cuticulam humanam. Largimur quidem in utero materno fœtum à frigore externo aëris ambientis naturæ solertiâ tutum magis esse, quam extra uterum degentem, frigus tamen nullum in ipso reperiri utero, non est quod credamus, minoris autem activitatis est, partim in aëre extrinsecus per os uteri admissio, partim in serosa humiditate fœtum ambiente consistens. Hujus beneficio ex materia apta vi caloris extrorsum propulsâ inchoationem suam accipit, tenello enim Embryoni, ut bene *Author*, mollior utcumque, inhæret, quæ extra uterum ætate procedente complementum suum & firmitudinem accipit. Opinari igitur æquum est ex *Aristotele*, cuticulam supra cutem perinde generari, ac supra refrigeratum lac, & pultacea omnia fercula, veluti tela quædam in superficie exsiccat & concrevit, quæ *vetulus* id est vetula ab *Aristotele* jure appellatur, quod rugas, & plicas quasdam contrahat vetularum rugositatibus similes, propter quas etiam umbilicus vetula dicitur.

Firmitudinem acquirit talem &c. Densa est, & cute compactior, non tamen nimis densa; ne prohibeatur corporis transpiratio. Hinc humores aquei, qui ad extrema corporis propelluntur, facillimè cutem permeant, à cuticula verò sistuntur, unde pustulæ variae exoriantur. Non est tamen hujus pelliculæ consistentia ubique eadem, in manibus enim pedibusque crassior est, ne dum aliquid attingimus, aut per loca aspera ambulamus, lædatur cutis.

Quas in partes sæpè distrahitur] Hanc aliquando sub vesicante medicamento duplicem observavit *Aquapendens*, superiorem & inferiorem, de quâ duplicitate statuit, eam quæ interior & inferior, veram cuticulam esse, eam verò quæ exterior & superior, potius apparentem quam veram. Cl. tamen *Riolanus Ench. Anat. lib. 2. cap. 5.* crassitiem cuticulæ majorem aut minorem augere ejus numerum omninò negat, maximè cum, licet alicubi in plures pelliculas dividua sit, nullâ tamen in parte ampliter divelli possit. Et certè nullam omninò in corpore nostro reperire est membranam, licet tenuissima sit, quæ non hinc inde in pelliculas quasdam dividi queat, inde tamen non licet tot ejus constituere partes, quot lamellas notamus.

Vitæ expers] Et hoc respectu cuticulam nostri corporis partem esse plurimi Anatomicorum negant. Verum neque perfectè totum humanum corpus est sine cuticulâ, & usus suos in humano corpore præstat, ut colligi inde possit, pertinere eam ad humani corporis constitutionem. Eâ ablata, ut cum bulla in ea ex aqua ferventi vel igne exorta descinditur, ita ut nudetur cutis, annon intolerabilem sentimus dolorem, sic ut objecta omnia cum dolore offerantur, & ne aëris quidem contactum tolerare valeamus.

Sensusque penitus expers est] Sensu prorsus omni Cuticula orbata est, quoniam ipsa quæ tangibilibus qualitatibus primo occurrit, non certè cutis subiecta, tactus sensorium existisset, si sensum Cuticulâ obtinisset.

Citra molestiam à cute separari nequeat] Contra rationem adeoque & experientiam est quod prodidit *Laurentius l. 6. c. 3.* Cuticulam sine dolore à cute separari posse.

Non

Nec tamen cuticulæ, quamvis rei tantillæ, exiguus *U s u s* est. Absque illa enim si cutis foret, non oscula vasorum ad hanc porrecta satis operirentur: non mador corporis inhiaberetur assiduus: nec citra dolorem calidi, frigidique contactus esset. Accedit corpori ab ejusdem lævore specimen quoddam elegantiae, & nitor à diffuso vitali spiritu, externisque detergentibus faciliè conciliandus.

Exuere cuticulam quotannis *Serpentes* videntur bestiae, in quibus spoliū

COMMENTARIUS.

Non oscula vasorum satis operirentur] Cum enim ad cutem & per cutem dispersa propagataque essent vasa sanguinea, in ipsa finem adsumptura, Cuticulam natura obduxit, uti fines operiret ac tueretur, quo fit ut vi ablata cuticulā sanguis continuè ex Vasorum dictorum extremis dimanet. Laborant quidem hīc varii, usum hunc ut evertant, at vano successu. Quod enim objiciunt, de vesiculis in cuticula excitatis ruptisque, ubi sanguinis nihil effluit, licet oscula vasorum sint detecta, nullius roboris est, cum ignis aut similis rei adurentis] ope haud ita aperiantur oscula, quam constringantur.

Non mador corporis inhiaberetur assiduus] Ufus ejus non minimus, ne Ichor ex venis atque arteriis emanet, quem usum faciliè natura ipsa ostendit, ubi cuticula decessit ex attritione vel alia causa, exsudat enim semper magno cum dolore humor. Facit huc quod Cutem cum partibus subjectis tueatur Cuticula, *partim* ab externo frigore, cujus vim infringit, ne cutem nimium constingat, ac transpirationem subjectarum partium legitimam impediat; *partim* ab ambiente calore, cujus vim hebetat, ne cutem nimium resolvat, & transpirationem præter modum augeat. Quin & densitas ejus alterius fortè non contemnendæ utilitatis causa est, ut sc. halituosi transpiratus ipsius caloris intus includantur, ne sicuti per cutis innumeros apertosque meatus faciliè exeunt, ita per cuticulam liberè & plus justo dissulentur exhalentque, & adeo non parca virium & nativi caloris resolutio sequatur.

Nec citra dolorem frigidi calidique contactus esset] Quare non sine ægritudine vivunt, qui sine cuticulā hāc nascuntur, quod de Ludovico Bohemiæ & Hungariæ Rege refert Barth. in Anatomia.

Accedit corpori ab ejusdem lævore specimen quoddam elegantiae &c.] Patet id ex adspēctū Vetularum & illorum quorum

rigidis horrent densissima setis

Corpora,

de quibus præter Sacras literas *Genes. cap. 25. & 27.* quæ Esavi villosi mentionem faciunt, plurima proponit *Aldrovandus in hist. monst.* Imprimis verò hic usus elucet in Mulierculis, & qui balneis, unguentis, frictionibus, molliorem eam reddunt, quæ per morbos prius inaruerat.

Exuere cuticulam &c.] Legi hāc de re merentur quæ habet de exuviis *Physicus summus Arn. Senguerdinus, Exercit. Physic. IX.* ubi inquit: Senectæ vel Senectutis nomine intelligitur pellis sive cutis exterior, quam varia animalium genera, ut serpentes, erucæ &c. exuunt & deponunt: unde ab exuendo *Exuvie* vocantur quæ ab illis deponuntur. Quærimus hic causam, propter quam animalia illa pellem exuant. *Cardanus lib. 9. de Subtilitate* hoc in serpentibus fieri putat à siccitate orta à diuturna fame, quam serpentes passi sint tempore latitationis, unde tempore verno illam mutationem fieri observat. In hac ratione acquiescendum non esse judico. Cum animalia temperamenti humidi & in locis humidis viventia, etiam senectutem mutant: & contra diversa sicci temperamenti animalia mutationi senectæ obnoxia non sint. Mihi probabilior ratio ex eo petenda videtur, quod cutis exterior constet ex partibus ita conjunctis, sive humidis sive siccis, vel temperamenti medii, ut amplius extendi nequeat, cum tamen majorem extensionem corpus contentum intra cutem requirit. Duo hic attendo: Unum est, quod illa animalia, cum primum nascuntur, vel cutem mutarunt, acquirant cutem de-

termi-

spolium corporis, senectaque vocatur. At hæc squamosæ cutis vera cuticula non est; sed ab ambientis siccitate, densatis viscidis sordibus, producta, atque oculis etiam ipsis obducta membranula est. Idque homini pariter per febres validiores, & præcipuè circa linguam accidit.

Cuti summissa est PINGUEDO, SUBSTANTIA corporis unctiosa, ex alimenti portione oleaginea *producta*, quæ straguli instar partibus injecta non minus penetrabiles frigidi noxas excludit, quàm immodicam insiti caloris discussionem prohibet. Itaque claustris uteri etiamnum detento foetui paulatim innascitur, & in lucem edito copiosior, densiorque apponitur. Imitatur naturæ solertiam ars, dum tenuibus, spirituque plenis liquoribus, ne citò nimis exhalent, olei tantillum addit.

Circumfusa autem est universo corpori, si palpebras excipias, si labra, & virile pudendum, quorum munus, vel pondere inutili, vel superflua humiditate vitare poterat. Abdomini, Lumbisque confertim inferniture, mediocriter Pectori, parcissimè Capitis convexo, providè

Naturâ

COMMENTARIUS.

terminatæ quantitatis laxam, quæ ulterius non crescat, sed crescente corpore contento intra cutem, tantum extendatur. In bombycibus apparet ea laxitas cutis, cum illam primum mutarent, & postmodum cernitur major extensio. Alterum est, cum, ob incrementum contenti corporis, cutis est extensa, quantum ejus natura fert, quod per ulteriorem adhuc extensionem, cutis sive involucrium capitis, separetur per rupturam à cute reliqui corporis: & inde sub illa cute alia generetur, priusquam producta senectus exueretur.

Pinguedo cuti submissa est] Revera non est pars corporis nostri continens, cum fluxilis sit, & instar olei tempore hyemali concreti, dici autem debet continens respectu membranæ cui undique adsita est.

Ex alimenti portione producta] Nomine alimenti sanguinem intelligimus, vel lympham ipsam, non lacteum succum, seu chylum, uti nuper scripsit *Cœcilius Folijs*, quam sententiam tam solidè refutavit *Cl. Barthol. Anatom. ref. cap. de pinguedine*, ut nihil causæ habere videretur, quò minus & nos ei subscribamus, hoc unum ipsi cum *Cl. Barthol.* concedentes, pinguiorem chyli portionem materiam pin-

guedinis esse, aut remotam. Ut hæc accuratè tractavit *Spigel. de corp. hum. fabr.*

Prohibet] Atque hac evaporationis impeditione etiam meliorem concoctionem in Ventriculo partibusque aliis promovet, unde omento excisso alia adhibere cogimur, quæ eum exterius tegant, ut patet ex historia quam tradit *Galenus 4. de usu part. c. II.* aliis tamen omentum ablatum coctioni non obfuit.

Imitatur naturæ solertiam ars &c.] Elegans sanè ista comparatio adipis circumjectæ ad conservationem caloris & spirituum, qui confestim exhalarent, ad oleum liquoribus superfusum. Sed præter istum usum *Riol.* credit esse emunctorium & spongiam totius corporis, & cum *Hippocr.* muliebre corpus dixit esse spongiosum, intelligere potius adipem quam carnem.

Si Palpebras excipias &c.] Adde & Aures Scrotumque.

Abdomini lumbisque &c.] Pinguedo in Thorace, si mammas excipias, non tantà reperitur, ne ejus pondere respiratio impediatur. Caput minimè pingue, ne gravitatem nimiam efficere, Abdomen pinguiissimum, quo coctio promoveatur, Lumbi autem tales, quo sessio commodior.

Naturâ singulorum indigentia subveniente. *Vitam* quidem, *sensusque vigorem* haud possidet pinguedo, utrumque tamen *ARTERIIS*, quæ juxta cum *VENIS* à mammariis, lumbalibus, & epigastricis ramis oiruntur, & *NERVIS* eam perreptantibus, tum *fibris villisque membranis* oleosum hoc spissamentum implicantibus, acceptum refert.

TEMPERAMENTI rationem materia indicat, ex qua produci-
tur, calore moderata, humidoque aërio plusculum perfusa. Effectus
item moderatè calefaciendi, attenuandi, atque uberiùs humectandi
evidentissimus. Cognitum aded laterum articulorumque doloribus mi-
tigandis, capillis defluentibus servandis, atque obliterandæ cicatricum
deformitati plurimum profuisse. Unde qui frigidam pronunciarunt ve-
teres, aliis eam partibus calidioribus saltem compararunt: cum ne con-
crescere quidem à positivo (ut dicitur) frigore in animantium corpo-
ribus queat. Adipe sanè mollior pinguedo est, atque ut ad concrescen-
dum difficilior, sic promptior ad liquefendum. *JUNGITUR* cuti,
subditisque membranis, quibus increfcit, & præter *U S U S* propositos
hume-

COMMENTARIUS.

Vitam quidem haud possidet pinguedo] Falli-
tur in hoc *Veslingius*, quæ enim deferri ad eam
ipse fatetur vasa, quid ipsi exhibent præter
sanguinem nutritivum. Cæterum ex quali san-
guine maximè nutriatur ambigitur. Censeo,
cum variis, ex sanguine moderato, & quidem
portione ejus pingui & butyrofa quasi, nam
in quibus talis sanguis redundat, ii pinguiores
sunt, & cum tali sanguine temperie maximè
convenit.

Fibris villisque &c.] Fibrarum harum ope
pinguedo unitur, & in suo situ continetur, &
hæ quandoquidem copiose admodum per pin-
guedinem dispersæ sint, videntur membranam
quandam constituere, quam adiposam autho-
res vocant, & cum panniculo eandem volunt.
Revera enim ab hoc distincta, mihi saltem vi-
detur. Contrarium quod si accuratores de-
monstraverint, libens sententiam mutabo.

Adipe sanè mollior pinguedo est] Adeps, Pin-
guedo, *Sevum*, nomina sunt Synonyma, ad-
eoque apud veteres ferè confunduntur, me-
liustamen mihi facere videntur illi, qui distin-
ctionem aliquam eorumdem admittunt, sic ut
nomen Pinguedinis generale sit, *Adipis* verò
& *Sevi* specialia; adeoque *Adeps* denotet
pinguedinem tenuiorem, molliorem, & hu-

midio rem, quæ ut ad concrescendum diffi-
cilior, sic facilior ad liquefendum; *Sevum* con-
tra designet pinguedinem crassiorē, durio-
rem, ac sicciorem, quæ quidem promptè
coëat, solvatur autem difficulter. Plura de
verâ distinctione hæc petere licet ex *Collegio
Anat. Laurembergi*.

Jungitur cuti] Firmiter adhæret cuti, nec
nisi scalpello ab ea divelli potest.

Subditisque membranis quibus increfcit] Uni-
ca tantummodò hic se exhibet Membrana,
quæ tamen duas in partes facillimè, maximè
in abdomine, dividi potest, distinctis nomi-
bus insigniendas. Una superior est, quæ quia,
in animalibus omnibus locis, in homine autem
variis, carnosas fibras pertextas habet, carno-
sa, & *panniculus carnosus* dicitur; Altera in-
ferior est, sub priore sita, quæ quia Musculos
tegere videtur, *Membrana* vocatur *Musculo-
rum communis*. Illa, *Externa*, pinguedini ad-
hæret, valideque connectitur ast separabili-
ter. Hæc verò, *Interna*, musculis subjectis li-
gamentisque ossium advincitur, non quidem
omnibus locis, acsi continuatum universale
esset, ut Authores scribunt, sed plerisque,
quantum quidem ex dissectionibus mihi ob-
servare licuit, alii si meliùs illa considerave-
rint,

humectat partes robusto motui destinatas, inediisque confectas reficit. Interfusa denique musculorum intervallis, æquataque fidentium superficie, formæ venustatem exauget.

Porro quæ sub pinguedine corpori toti circumtenditur MEMBRANA CARNOSA vulgo, & *Panniculus* quoque *carnosus* dicitur. Quamvis enim in adulti iam hominis abdomine carnosæ speciei non proferat; circa frontem tamen, ambitumque colli, occiput item, & aurium plagas, musculosæ carnis intextu fruitur. Adeoque non miuus excipiendæ, colligendæque pinguedini, quàm musculorum tenuissimorum delineamentis addmittendis, APTA nata est. VENA S,

ARTE-

COMMENTARIUS.

rint, impertiant quæso. Poterit tamen commode tota membrana ex duplici ejusmodi parte constans Carnosa vocari, adeoque communis Musculorum excludi.

Humectat partes robusto motui destinatas] Maximè si non abundet, adeoque servat eas, ne exsiccentur nimis, distendantur, & rumpantur.

Inediis confectas reficit] Hæc Anatomicorum plurimorum sententia est; at nil certitudinis eidem inesse censemus; verum quidem, calorem colliquationis esse authorem, at qua ratione, quo modo, qua viâ, colliquatum mutabitur in sanguinem, reddeturque ventriculo de novo elaborandum, dissipationi magis excretionique obnoxium quam in sanguinem mutationi.

Formæ venustatem exauget] Hinc in ætate aut morbo confectis corpora rugosa fiunt, ablatâ pinguedine, quæ spatia illa vacua inter musculos, vasa & cutem, implebat. Præter hos, & alios, non exiguæ considerationis corpori præbet usus, vasorum nempe propagationem reddere tutiorem, instar pulvinaris esse, maximè in clunibus plantisque pedum quibus natura copiosam dedit, internum partium calorem conservare & augere, sicq; chylificationem, simileque actiones promovere.

Quæ sub pinguedine corpori toti circumtenditur] In brutis plerisque proximè, ut diximus, substrata est ipsi cuti, quam totam hujus intervæntu movere videntur.

Quamvis enim in adulti Sc.] Simpliciter membranæ conditionem hic habet, à superinjecta pinguedine multum obscurata. Ejus substantia carnosæ evidentior est circa lum-

bos, in scroto, fronte, & collo, ubi musculosæ carnis munere hanc membranam fungi videmus. In scroto enim Dartos tunica nil est, quam continuatio hujus membranæ carnosæ, ut in collo *πλατφσμα μύοδης* propagatio est ejusdem; quæ juxta aures assurgens constituit Frontis vulgo dictos musculos & Aurium, imò & Occipitis.

Adeoque non minus excipiendæ colligendæque pinguedini Sc.] Membranam carnosam cum eâ quæ pinguedini mirè pertexta est, præcipuorum Anatomicorum vestigiis insistens Author confundit, ut ex dictis patet.

Apta nata est] *Baibinus* & cum eo *Cl. Bartholin.* membranam hanc carnosam ideò esse à natura factam volunt, ut pinguedinis liquefactionem à continuo musculorum motu impediret, quod sanè probabile nullo modo videtur; cum sic in macilentis & iis animalibus in quibus pinguedo huic membranæ subternitur, nullius esset usus, naturam autem aliquid facere frustra quis assereret. Melius mihi rem explicare videntur, qui ejus usum docent cum integumentis corporis aliis partium internarum calorem fovere, easque ab injuriis externis defendere: Præter quem tamen & alium ei assignare cum *Cl. Highmore* aliisque possumus, scil. ut vasa ad cutem abeuntia fulciat, adeoque totum corpus æquale & planum reddat. Addere libet considerandum annon respexerit natura eorum, quæ in sanis æque ac morbofis per habitum corporis ejiciuntur, meliorem expulsionem, ne alias circa cutem at in ipsa hærerent sicque mala gravia causerent.

ARTERIAS & NERVOS à propinquis partibus mutuata, porrigitur per tractus corporis omnes, etiam qua pinguedinis usus, aut exiguus futurus erat, aut nullus.

Non *simplex* tamen ejus constitutio est, cum in pinguibus corporibus sæpè duplex, nonnunquam multiplex occurrat. TEMPERAMENTI harmonia in frigido siccoque consistit: quam tamen, vel propinqua caro, vel affusa passim pinguedo non parum obtundit. *Sensu* prædita satis exacto, acribusque laceffita vaporibus, concussione quadam corpus, ac rigore convellit. COHÆRET externo latere pinguedini, & inductæ sibi cuti, interno, muscutorum partibus, ossiumque ligamentis, ac membranis proxima conspicitur.

COMMENTARIUS.

Non *simplex* tamen ejus constitutio est Sc.] Quid de duplicitate statuendum, monuimus.

Acribusque laceffita vaporibus concussione quadam corpus ærigore convellit] Qua ratione Rigor hîc excitetur, variè explicatur; Rigor, inquit *Highmorus cap. 7.* est motus æqualis virtutis expultricis, & validus, à re molesta, ab interioribus ad ambitum corporis mota & expultricem in hac membrana stimulante; quod autem omnis causa mordax, sive calida, sive frigida, animal in rigore ducit, exemplis plurimis illustrari potest: Si sano corpori ferventem aquam infundas, statim horrore vexabitur, & in febribus tertianis, quæ omnium maximè sunt biliosæ, multum rigore infestamur, à vaporibus acribus ad ex-

tra emissis; atque hoc in Symptomaticis videre liceat, quibus sine frigore præcedente, rigore vexamur. A frigore etiam Rigor, ut in hyeme; & post mictionem sæpè, aëre frigido derepente in vesicam irrupente, ejus membranas vellicante, per consensum expultricem in toto hoc panniculo facultatem, &c. Addo ego simplices aquæ frigidæ adspersiones corpori, aut hujus in hanc immersionem.

Cohæret interno latere muscutorum partibus Sc.] Negat hoc *Riolanus*, revera eam distare à partibus enarratis docens, eò quod interpositam habeat membranam communem muscutorum, quam exstare & à perito Anatomico facile à musculis abdominis quibus superposita separari posse scribit. Hâc de re supra.


TABULÆ CAP. I. Explicatio.

Figura Prima effigiem exhibet hominis viventis, in quo tum Abdominis partes Externæ, tum conspicuæ sub cute Venæ repræsentantur.

A Hypochondrium dextrum.	I Vena Temporum.	O Vena Cephalica manus sinistra.
B Hypochondrium sinistrum.	K Vena Jugularis externâ.	P Vena Salvatella manus sinistra.
CC Epigastrium. DD Illia.	L Vena Cephalica brachii dextri.	Q Vena Saphana descendens.
EE Hypogastrium. FF Inguina.	M Vena Basilica brachii dextri.	RR Vena Saphana in ipso pede.
G Pubis regio.	N Vena Mediana, qua pro corporum diversitate variat.	SS Vena Ischiatica.
H Vena frontis.		

Figura Secunda in homine communia corporis tegumenta exprimit, & Musculos sub iisdem detectos.

AA Cuticula. BBBB Cutis.	FFF Muscutorum, qui Serrati antici majores, initia aliquot.	IIII Tendo oblique descendentium muscutorum, sub quibus recti abdominis muscoli, cum nervosis inscriptionibus, transparent.
CCCC Pinguedo.	GG HH II Musculi abdominis oblique descendentes in suo situ.	KK Linea abdominis alba.
DDDD Fasciculus carnosus.	G HH Principia eorum dentata.	
EE Muscutorum Pectoralium pars detecta.		



CAPUT II.

De Ossibus, & Musculis Abdominis, tum Peritonæo.

QUÆ propriè tribuuntur Abdomini partes, vel *Externæ* sunt, quasque non immeritò *Continentes* dixeris, vel *Internæ*, quas *Contentas*. Externis Ossâ annumerantur, & Musculi, & connexum hisce Peritonæum.

Initium ab OSSIBUS ducimus, partibus humani corporis præ reliquis siccioribus, durioribusque, ad stabilimentum totius, nexuum firmitudinem, & motus quoque voluntarii robur comparatis. SUBSTANTIAM suam primò semini acceptam ferunt: unde per initia cartilaginea omnia, lentescente paulatim semine; temporis verò progressu soli-

COMMENTARIUS.

QUæ propriè tribuuntur Abdomini partes &c.] Imò Externæ solæ Abdomini debentur, utpotè quod constituunt, uti jam antea vidimus, Internæ enim non Abdominis partes sunt, sed Imi Ventris.

[*Ossibus*] De Ossibus, tam in genere, quam specie, quam accuratissimè, fusiore stylo, egit *Cl. D. Rolfinkius*, magno illo Opere, quod *Dissertationes Anatomicas* vocavit.

[*Siccioribus durioribusque*] Substantiâ ossa naturaliter dura sunt, at non arida, flexibilitatem aliquam habent ab unctuositate, hoc enim si non esset fracturis quam facillimè obnoxia forent, ut id calcinata testantur, & notare licuit, in grandæva illa muliere, cuius membra tactu levissimo dissolvebantur, ut in observ. suis refert *N. Fontanus*. Nectamen omnia ejusdem sunt soliditatis, sive respiciamus ætatem, sive sexum, sive morbos, sive etiam ejusdem subjecti diversa loca. Ita Ratione ætatis, *Puerorum* ossa mollia admodum & humida sunt, si conferas cum ossibus *Senioris*, quin imò pleraque cartilaginea potius, aut membranæ, quam ossa vera, donec progressu tandem ætatis solidiora & sicciora. ab interno calore indurata, fiant; siccissima è diverso sunt ossa decrepitorum, in quibus Cartilaginea quoque perquam multæ in ossium

naturam sæpè degenerant. *Virorum* quoque duriora esse sceminarum ossibus multi scribunt. In *Calidis Morbis*, sic exsiccari, ut ferè lapidescant, experientia demonstrat. In *homine adulto*, si invicem conferantur, durissima inveniuntur ossa Temporum à nimia duritie petris simili petrosa appellata, officula Auditus, os Femoris, Tibiæ, Humeri, Cubiti, & Radii: molliora, ut ossa Digitorum: mollissima denique, ut Vertebrae, ossa Carpi, Tarsi, imò omnes Epiphyfes.

[*Ad stabilimentum totius &c.*] Usus hi generales sunt, sunt & privati nonnulli, de quibus in speciali ossium singulorum historia.

[*Primo semini acceptam ferunt*] *Harvejus Exerc. 32. de gen. an.* nec sententiam Medicorum, qui generationem ex seminis utriusque sexus mixture deducunt: nec sententiam *Aristotelis* qui semen maris pro causa efficiente, & sanguinem menstruum pro causa materiali habet, adprobendam censet, sed alias causas materiales & formales, ex quibus generantur partes, inquirendas judicat. Ipse autem generationis omnium animalium principium remotum sanguinem maternum: proximum verò humidum primogenium (colliquamento crystallino, quod in ovo reperitur, absolute respondens,) constituit.

solidescunt. Tardiùs hoc fit in eorum extremis, quæ *Epiphyses*, id est, Appendices obtinent, donec ossæ reddita, exquisito tandem coalitu partibus proximis uniantur.

Membrana velantur singulari, quæ *Periosteum* appellatur. E V A S I S quæ suscipiunt, evidentiores sunt *Vena*, obscuriores *Arteria*, obscurissimi *Nervi*. Hos tamen non ad externam tantum membranam se diffundere, sed in recessus ossium penetrare profundiores, dolor arguit, quem non paucis in locis, cùm detecta chirurgiæ subjiciuntur, manifestant. In MAGNITUDE, FIGURAQUE ingens occurrit diversitas, adeoque in singulis potius expendenda, quàm in universis. N U M E R O ultra trecenta. Magna pars in *Sinus* curvantur, aut

C O M M E N T A R I U S.

Solidescunt] Soliditas hæc omnimoda nulli omnino ossi, etiam iis quæ à *Vesalio* pro planè solidis enumerantur *lib. I. fab. b. c. cap. I.* competit. Solidum etenim est quod nullam habet cavitatem, nullum autem os cavitare destituitur, quin omnia cavitatibus majoribus, vel etiam minoribus prædita esse, quivis rerum scrutator diligens percipiet. Accedit & naturæ prudentia summa, quæ ossa solida non fecit, ne & mole sua gravarent, adeoque difficiliorem redderent motum, & fracturis nimis essent obnoxia. Præter naturam omnia ossa adeo mollia deprehenderunt *Fernelius*, *Ruellius*, *Hollerius*, ut ceræ instar flecterentur, idque ex lue præsertim Venereâ, teste *M. Donato*.

Tardiùs hoc fit Sc.] Varia reperiuntur ossa, quæ ab utroque, aut saltem ab altero extremo aliud os adjunctum habent, quod Latini Appendicem, hoc est rem ad alia pendentem (licet improprie quodammodo) appellant. Græcis propriè magis *ἐπιφύσεις* dicitur, hoc est, quod ad aliud secundum naturam adnascitur. Miro artificio natura horum adnatorum ossium interventu succurrere voluit & firmitati, & unioni eorum. Plerumque enim in medio major firmitas postulat in iis, quibus pondus incumbit, hæc in ossibus, aut à crassitie, aut à duritie speranda, illa ob pondus & magnitudinem inconveniens, præstabat itaque hæc. Sic etiam quia muscoli affirmari ossibus debebant, mollius & rarius pro aptiori insertionem, alicubi sit requiritur.

Quæ appendices obtinent] Videntur verba hæc cautâ interpretatione indigere, potius enim hic per ossium extrema Epiphyses ipsæ intelliguntur, quam extremitates ossium inæquales, quæ similibus extremis os verum spectantibus, junguntur.

Donec ossæ reddita Sc.] In adultis, uti jam dictum, hoc maximè observamus, in iis enim in Apophyses degenerant nullo remanente vestigio prioris divisionis, servata tamen intus propriæ naturæ conditione, quæ pumicosa, cruentata.

Número ultra trecenta] Numerus ossium apud Anatomicos incertus est, convenientissimus naturæ videtur, quem tradit *Cl. Riolanus Ench. Anat. lib. I. cap. 25. § 21*. Plura autem numero sunt ossa, debuit namque homo cùm ad quærendum sibi victum & amictum, iisque conservandum vitæ vigorem, tùm verò præcipuè ad illustres eas ad quas ordinatus est functiones libere se huc illuc agitare, quod fieri non potuisset, si unico constaret Osse; constructus itaque est ex pluribus majoribus, minoribus, minutissimis, omnibus ea magnitudine, figura, firmitate, quam corporis robur, facilitas motus, atque officia membrorum exigebant. Monstruosum autem est hominem nasci absque ossibus.

In Sinus curvantur] *obscura locutio*, inquit *Riolanus in anim. clarius: Magna pars in extremis excavatur*. Sinus enim in ossibus dicuntur cavitates recipiendis aliis partibus, ut sunt vasa, ligamenta, &c. maximè verò processibus desti-

aut *Capitibus* protuberant, quæ cartilaginum molliore veluti crusta natura induit, quo flexus tutior, ac promptior adeo motus foret. Pars *Cavitates*, & quasi *fistulas* obtinent oblongas: pars spongiarum instar *foraminulenta* sunt, ut præsentia Abdominis ossa. Omnia tamen vel *Medulla*, vel *succo medulla simili*, redundant: quo frigidior TEMPERAMENTI, sicciorque conditio, non parum mitigatur.

Con-

COMMENTARIUS.

destinata, & quidem sinus profundiores, quibus capita prominentia commodè aptari possunt, appellantur *Κοτύλαι* seu *Acetabula*, sed superficiales & leviter excavati, *γλῶσσαι*. Sinuum extremitates *Labra*, *Oræ*, *Supercilia*, Græcis *ἴπες*, *ὀφρύες* & *χαίλιν* dicuntur.

Capitibus protuberant] Capitis nomine hîc Author generali significato utitur, sic ut idem ipsi sit, quod Apophysis, dicuntur hæc *ἀπὸ τῆς ἀποφύσεως*, aboriri, & nihil aliud est quam *ἐκφυσις*, *περὶ ἄλλης*, *Eminentia*, *Processus*, *Projeclura*, *Protuberantia*, seu pars ossis productior, non contigua, ut Epiphysis, sed continua, in ipsomet osse prorumpens, & extra superficiem planam protuberans, eo modo quo ex arboris trunco fami procedunt. Figura duplex est, rotunda, & longa. *Rotunda*, quæ nomen generis occupat, & *Caput* in communi dicitur, duplex est; Si enim Caput fuerit amplum, oblongum & magis prominens, absolute *κεφαλή* Caput; Si vero depressum magis & humile, *Κόρυμβος* vocatur. Longa item duplex est: Acuta & Obtusa. Acuta quæ in mucronem definit *Κορυμή* à figura rostri cornicis dicitur. Ejus species variæ, pro ratione figuræ diversis nominibus apud Græcos insignitæ: sic dicitur *εὐλοειδής* aut *γροφιοειδής*, qui stylo similis est, *μαστιχιδής* qui mammis, *ἀγκυροειδής* qui ancoræ, *καρχαροειδής* qui rostro corvino, *ὀδοντοειδής* qui denti. Obtusa, capite terminata, *Cervix* dicitur, longiuscule enim dum protenditur, quodammodo Cervicem cum superimposito Capite refert.

Spongiarum instar foraminulenta] Partim ut animali minùs gravitate molesta sint, partim ut vasa alimentum vehentia viam apertam liberamque inveniant; per quam excurrant.

Vel succo ei simili redundant &c.] Succo hocce, aut etiam ipsâ medullâ an nutriantur ossa, an vero sanguine plurimum con-

trovertitur. Ego sanguini hoc negotium cum *Spigelio* committerem, qui videatur. Medullam hanc non esse ossium alimentum, sed quoddam excrementum s. secrementum, judiciose docet *Cl. Glissonius tractatu de Rachitide, cap. 13*. Aliqui inquit Medullam esse proximum ossium alimentum existimant: sed perperam, cum hæc planè inepta sit ad ossium generationem & nutritionem. Ossa enim non tantùm durissima & solidissima atque ex se albioris coloris sunt, sed & constant ex substantiâ quâdam terrestri satis tenaciter coherente, quæ conditiones longè absunt à medulla. Hæc quippè in igne tota conflatur, & in flammam abit; ossa vero, nisi ratione medullæ, vix flammam concipiunt, sed in terrestrem substantiam ferè tota calcinantur. Deindè nulla arte ad illam firmitudinem quam in ossibuscernimus, perducipotest medulla. Porro medulla ad moderatum ignis calorem liquescit & dissolvitur, ossa vero ardentissimas ignis flammæ sine ullâ eliquatione sustinent. Præterea ossa per diurnam elixationem non in medullarem substantiam, sed gelatinam quandam resolvuntur. Tandem ossa in pulverem comminui possunt: non sic medulla. Certum ergò, medullam non esse ossium alimentum, sed quoddam eorum excrementum sive potius secrementum, utile id quidem, suisque adeò conceptaculis asservandum. Ossa enim naturâ suâ alioquin sicciora, frigidiora & asperiora, minus apta forent motui, nisi medullæ seu exudationibus, seu exhalationibus humectarentur & lubrica redderentur, blandoque ejus calore foverentur. Hæc omnia uno ferè experimento hoc confirmantur, quod in junioribus animalibus æstimatâ magnitudine ossium minus medullæ insit ossibus, plus sanguinis, quam in grandioribus, sed hæc ætate magis magisque augeatur, &c.

Carti-

Conjunctio ossium, & Cartilaginum, & Ligamentorum operâ firmatur. Ex his **CARTILAGINES** spermaticæ partes sunt, ossibus ferè commissæ, minus tamen duræ, flexuique semper obsequentes. **LIGAMENTA** & ipsa spermatica sunt, cartilaginibusque molliora deprehenduntur; quamvis cum vel teretia sint, vel in latum membranarum instar expansa, nunc plus, nunc minus mollia esse debuerint. Modum conjunctionis in singulis contemplari par est.

Sunt autem in **ABDOMINE OSSA**, numero quidem pauca, sed mole vasta, infimam posterioremque ejus regionem occupantia, ne antè necessarium distensionis officium solidior ossium compages impediret. Ex his lumborum Vertebrae, & os Sacrum cum Coccyge, tum os Innominatum veteribus dictum, vulgo Ischium sive Coxa, quod Ilium, Coxendicis, ac Pubis ossa complectitur.

LUMBORUM VERTEBRÆ quinque **NUMERO**, ad tutum dorsalis medullæ, nervorumque descensum comparatæ sunt. Harum inferiores superioribus ampliores, aptius impositum sibi dorsum veluti arcem sustinent. **PROCESSIONIBUS** ornatae sunt variis, quos *Apophyses* auctores nominant, è quibus *transversales* duo, quatuor *obliqui*, quorum duo superiores, totidemque inferiores: tum *acutus* unicus, qui spinam exprimit. Obliqui processus robur potissimum articuli spectant, transversales, & acutus ad commodam muscutorum insertionem producti sunt. Amplius in medio vertebrarum **FORAMEN** descendenti spinali medullæ patet: minora alia circum latera, ex concursu vertebrarum mutuo profecta, Paribus nervorum lumbalium distribuendis excavata conspiciuntur. **JUNGUNTUR** posterius per processum

COMMENTARIUS.

Cartilagines & ligamenta] Videantur de his inter alios *Vesalius* atque *Barthol.* De Cartilaginibus etiam lectu digna habet *Cl. Sen-guerdus* in *Osteologia*.

Modum conjunctionis] Conjunctionio ossium quot modis contingat non unanimiter Authores docent, videatur distributio ab Authore nostro *Cap. 17.* proposita, cum ea, quam *Barthol. lib. 4. Anat. ref. cap. 1.* & *Kyperus* ex *Spigelio Anthropol. pag. 62.* tradunt, conferenda.

Transversales duo] Aliis vertebrarum processibus transversis longiores & tenuiores sunt, exceptis primâ & ultimâ.

Superiores &c.] Superiores declives sunt, inferiores acclives.

Amplius in medio foramen &c.] Falluntur hîc cum *Valverda* plurimi, docentes foramen hoc vertebrarum spinæ minus fieri, quo ossi sacro proximiores sunt.

Minora alia circum latera] Duo tantummodo sunt, unoquoque latere unum.

Ex concursu vertebrarum mutuo profecta] Hoc tamen pacto, ut in Vertebra Lumbo-rum totum ferè foramen à superiore vertebra constituatur, inferiore pauculam partem conferente, quemadmodum contra in Cervicis vertebra inferior maximam tribuit, in thorace autem utraque æqualem, docente hoc *Spigelio lib. 2. cap. 20.*

cessus suos obliquos, nexu quem *ginglymum* Græci dixere, quo excipere sese mutuo, atque excipi sinibus suis videntur; antèrius per harmoniam. Cetera syndesmis, sive ligamentorum beneficio firmantur; quamvis laxius hæreant ne rigor immodicus flexum lumborum difficilem reddat. Sed hæc, aliis quoque vertebris communia, paucis præmittenda fuerunt.

Subjicitur lumbis, **OS SACRUM** *crasitie* inter alia, & robore spectatissimum, basis instar tot vertebrarum impositam struem sustinens. Constituitur **PARTIBUS** plerumque senis, vertebrarum æmulis, è latiore principio in angustum se paulatim contrahentibus, immobilibus omnibus, propectaque jam ætate unicum in os coalescentibus.

Adhæret offi sacro appendicis instar **OS COCCYGIS**, è tribus ferè ossiculis compactum, antrosum ad sessionis commoditatem recurvatis.

COMMENTARIUS.

Per harmoniam] de Harmonia vide *Cap. 17.*

Per ginglymum] Gynglymus qualis sit offium articulatio, vide *Cap. dicto.*

Anterius] Id est, in corporibus vertebrarum.

Os sacrum] Ita dictum, vel quod sit omnium in Spina maximum, antiqui enim magnum Sacrum vocarunt; vel quod partibus obliænis & à natura ipsa occultatis subjacet, sacrum enim etiam execrabile erat, ad illud *Virgilio*, auri sacra fames; vel quod sacra generationis membra contineat. Plura videantur apud Auctores.

Basis instar] *Hippocrati* Vertebra magna dicitur, aliis *σπονδυλὸς* seu Subvertebra, quod aliis vertebris sit substratum os.

Constituitur &c.] Ferè ex quinque ossibus componitur, rarius ex sex, atque tum os coccygis ex tribus constat, quod aliàs ex quatuor compingifoleat.

Vertebrarum æmulis] Nam & corpore constant, & processibus omnis generis, & foraminibus tum propriis, tum communibus: differunt tamen à veris vertebris, 1. quod Corpora harum vertebrarum non ita foris protuberant, quam quæ thoracis & lumborum sunt. 2. quod processus transversif conjuncti maxime sint, & unus aliquis ex omnibus constitutus videatur, Sinum tamen habent asperum & inæqualem pro excipiendo Offe Ilium. Obli-

qui verò obscuriores sint, licet in prima satis notabiles, cujus superiores processus sinuosi sunt pro excipiendis capitulis processuum vertebræ infimæ lumborum. Posteriores denique spinam constituentes minores etiam sint, quam in aliis vertebris, imò in ultima hujus ossis vertebræ vix Spina notatur, sed loco ejus tantum rotunda eminentia. 3. quod foramen proprium in aliis vertebris (excepto in prima colli vertebræ) æquali magnitudine deorsum ducitur, & in vertebris ossis sacri paulatim à superis deorsum decrescit, ita ut in ultimo minimum sit. Communia de hinc non ita à latere conspiciuntur, sed antèrius & posterius, impredientibus propagationem transversis processibus.

È latiore principio] Ita ut simul junctæ trianguli figuram non ineptè repræsentent.

Os Coccygis] A figura rostri cuculi sic dictum. Dicitur & barbarè Cauda.

È tribus ferè ossiculis compactum] Si quidem os sacrum ex sex ossibus constituerimus, aliàs ex quatuor, si illud ex quinque. Interdum quibusdam excrescit instar caudæ, ut de quibusdam Indis scribit *Plinius natur. histor. lib. 7. c. 2.* & de puero quodam Danico *Barthol. Anat. ref. lib. 4. cap. 15.*

Antrosum recurvatis] Et in mucronem desinentibus, undè psittaci rostro quoque assimilatur.

recurvatis. Horum quoque *conjunctio* cartilaginum interventu laxior est, ut intorqueri nonnihil, magno parturientium emolumento, & ad violentum occursum cedere possint.

Sequitur utrinque OS ILIUM superior ossis Innominati sive Coxæ pars: amplum, robustum, & latiore veluti dorso devexum, quod appendicis accessione à teneris succrevit. Hujus extrema antè, postè, & *spina* nuncupantur: quemadmodum conspicuæ à lateribus prominentiæ, *supercilia*, & *labra*. Nomen ossi Ilium fecit intestinum, vel quia multiplici gyro illi proximum, vel quia hoc fulciri eo subjecto videatur.

Huic statim committitur OS COXENDICIS, *Ischium* aliàs dictum, Coxæ pars altera, crassa pariter, ac firma. *Cavitatem* illi tribuunt

C O M M E N T A R I U S.

Conjunctio laxior] Maximè in fœminis & puerulis, & hanc causam esse cum *Spigelio* puto, quam propter puerulis, in quibus Cartilaginis naturæ quam ossis propius accedit, frequens fatis & familiaris morbus fit Ani procidentia, Sphincter enim Musculus ac ipsum quoque Rectum Intestinum huic officulo nexu coherens, & cum humida admodum sit puerorum temperies, fit ut harum partium fundamentum instabilius reddatur.

Cartilaginum interventu] Imò & ligamentorum validorum ope.

Ad violentum occursum] Dum excrementa majora fecernuntur, & fœtus in lucem emittitur. Absque eo enim si foret, sæpissime luxationem incurreret, ut videmus contingere quoque non raro in partu difficili.

Ossis innominati pars] Amplum illud os ad latera ossis sacri consistens Innominatum *Galenus lib. de Ossibus ad Tyr. cap. 30.* appellavit, quod suo tempore nomine careret, quamquam hâc ipsa occasione proprium nomen invenerit, quò à cæteris omnibus distinguitur, dum hodieque Innominatum vocamus.

Coxæ pars] Impropiè loquitur, verè enim Coxæ ossis innominati pars est quæ & os Coxendicis dicitur.

Latiore veluti dorso devexum] Hoc in mulieribus magis locum habet quam in viris, utpote in quibus ita excavatum utrinque hoc os est, ut in eo tanquam in Ephippio Uterus fœtus gravidus residere queat. Et hinc mulieribus Nates sunt latiores.

Quemadmodum conspicuæ à lateribus promi-

neptia: supercilia & labra] Egregiè hic *Riolanus in animadv.* inquit, Isthæc particula est obscura, lucem addo restituendo costam inter Spinæ, quam omisit, cujus margines seu prominentiæ supercilia & labra dicuntur. Illa nomina à recentioribus indita sunt ad distinguendas musculorum abdominis origines & insertiones, & ipse *Vesling. cap. 14.* in descriptione musculi oblique descendentes mentionem facit costæ ossis Ilium, nec externus margo ossis Ilium in origine intelligi potest, nisi Costæ addatur.

Os Coxendicis] Quod os Coxæ etiam & benè dicitur. Assigimur hâc parte sæpius ex decubitu humorum intolerabili dolore, ut inter alia exempla duo ab Amplissimo Viro Consulari *D. Nicolao Tulpio libro 3. Observat.* posteritati exhibita testantur.

Ischium aliàs dictum] Nomen totius sibi adsumens, meminit enim *Galenus* multis ante eum seculis doctissimum Poëtarum *Homerum* in Iliade ossi innominato ipsi dicto propriam appellationem imposuisse *ἰσχίον* vocando, quæ postea à *Ryffo* & qui post ipsum doctiores existere Anatomici, retenta fuit, vulgo os *ἰσχίον* aut Ischium dicitur.

Pars altera] Inferior nempe & exterior. Hujus autem ossis internæ partes seu tuberositates in mulieribus longiore intervallo distant, quam in viris, quæ idcirco pelvim habent multo ampliorem, ne egressus angustia & arctitudo fœtus per hanc viam prodeuntis exclusionem impediret.

Cavitatem illi tribuunt amplam] In ambitu

buunt amplam, *acetabulo* veterum similem, intra quam globosum femoris caput reconditum, & ossis sacri lateribus gemino vinculo firmiter conjungitur.

Ab hoc antrorsum utrinque porrigitur OS PUBIS, præcedentibus tenuius, amploque foramine pervium dicitur, ne moles nimia corporis agilitati officiat. *Cartilaginem* extremis suis induit, ligamentoque tum circulari, tum membranoso, proximi lateris ossi *colligatur*. Nec tamen obstat validus hic nexus, quin ut priora ossa duo ab osse sacro, ita hoc à proximi lateris osse in difficili partu diduci aliquantum possit.

At hæc Ossium descriptio, ex plurium auctororum consensu tradita, secus proponenda est, si ad naturalem eorum distinctionem respicimus, quam *puerorum* nobis corpora exhibent. In his enim ad septennium usque manifestè divisa certis limitibus dirimi possunt. Itaque portio quæ posterior, amplior, & latior, ad medium usque acetabuli producta,

os

COMMENTARIUS.

hujus cavitatis duo tubercula occurrunt, unum interius, alterum exterius, a quibus musculi quidam oriuntur.

Gemino vinculo] Ab osse Sacro enato, unum inseritur in processum Coxendicis acutum, alterum posterius in ejus Appendicem.

Intra quam &c.] Cavitatis hæc copiosa Cartilagine est suffulta, tum ad majorem magnitudinem acquirendam, propter magnum femoris caput recipiendum, tum ad faciliorem expeditioremque femoris motum.

Os Pubis] Quod & os Pectinis dicitur à pilorum hoc loco provenientium copiâ.

Amplaque foramine pervium] Amplum adeo est, ut non agnoscat æquale in toto corpore. Sedem autem præbet duobus femoris musculis, extrinsecus externo, intrinsecus interno Obturatori, qui à se invicem ligamento forti, quod foramen hoc subtendit, dividuntur.

Cartilaginem extremis suis induit] Crassior hæc & mollior in mulieribus quam in viris, in quibus aliquando planè disparere videtur.

Ligamentoque tum circulari &c.] Cartilaginem duobus ossibus pubis interjectam ad arctam commissuram adeo robustam esse docet *Replamus*, & cum eo *Rosfinckius*, ut non indigeant circulari & membranoso ligamento.

Alti sola eorum autoritas non sufficit, autopsia eam rem melius declarat.

Nectamen obstat &c.] Ossia hæc an in partu à se invicem diducantur variè omnino auctorum traxit. Sunt qui eorundem diductionem etiam lævissimam omnino negant, inter quos *Laurentius, Valverde, Piccolh. Marchette*, in *Anatomicis* alique plurimi. Sunt contra, inter quos agmen ducunt *Severin. Pineus Opusc. de notis Virg. l. 2. c. 4.* & *Replamus*, qui in omni omnino partu, etiam facillimo, diductionem istorum ossium volunt. Utraque sententia suis suffulta erroribus, quos hoc loco silentii supparo involvere cogor. Mea hæc est ratio, vestigiis Cl. Virorum *Wakei, Barthol. Kyperii*, aliorumque haud vulgarium Anatomicorum, inter quos & Author noster est, insistent; In partu facili, ubi foetus parvus, mollisque, adeoque pro loci angustia flexilis, via lubrica, ossa latius à se invicem distant, ipsaque cartilago ossibus interjecta mollis adhuc est, diductio istorum ossium omnino necessaria non est, quin sola Cartilaginis laxatio sufficit. In partu autem difficili, ubi foetus grandior, exitus angustior, ficciorque cartilago, nunc ossa Pubis, nunc ossa Ilium & Sacrum, nunc utraque divelluntur, magis minusque, prout necessitas imperat.

Musculos

os Ilium constituit, portio altera ab acetabulo antrorsum porrecta, bifariam distincta, parte superiore *os Pubis* inferiore *os Coxendicis* exhibet; quod non solum, sed reliquis duobus junctum, capiti femoris sinum suum efformat, & cum osse pubis foramen anterius amplum constituit.

MUSCULOS in abdomine ingens expellendorum redundantium necessitas exigebat. Partes scilicet organicas fibrosa carne, tendinibusque robustis prædita, quibus validam ventris, adeoque partium in eo contentarum compressionem Natura molitur. Eorum *quinque* spectantur *paria*, quibus diversi fibrarum ductus nominum quoque diversitatem pepererunt.

Primum *Obliquè descendentes* musculi constituunt, ampliores præ cæteris, & tendine admodum lato præditi, quem, ut fit in duobus aliis subjectis, peritonæi processus in viro, in muliere uteri ligamenta vermiformia, circa inguina pervadunt. *Principium* trahunt sub serrato pectoris

COMMENTARIUS.

Musculos in Abdomine] Musculi Abdominis nobis dicuntur, non tam quod Abdomini vulgo dicto seu imo ventri usum magnum præbeant, cum Thoraci non minus officii præstent, quam imo Ventri, quam quod in Abdomine suum situm habeant, non aliter ac eorum qui Thoraci adscribuntur Musculi plerisque brachii musculos esse constat.

Organicas] Organica musculus pars est, quia constat 1. Carne, 2. parte Tendinosa, & hæc duæ sunt musculi partes quæ actionem ejus spectant. 3. Venis alimento revehendo intervenientibus. 4. Arteriis calorem insitum custodientibus & alimentum advehentibus. 5. Nervis animales spiritus ad sensum & motum adducentibus. 6. Membranis tegentibus. 7. Pinguedine humectante & in nimio motu exsiccationem prohibente.

Quinque spectantur paria] Verus hic est numerus, ubi musculus Rectus pro unico musculo habetur, qualis etiam revera est, falsus autem ubi pro multitudine inscriptionum nervosarum, quæ in eo habentur, modo plures, modo pauciores, in diversos distinguitur musculos.

Quibus diversi fibrarum ductus &c.] Hoc quidem locum habet in primis quatuor paribus, quintum autem à figuræ similitudine nomen sortitum est, dum *Pyramidale* dicitur.

Quam ut fit in duobus aliis &c.] Arrogantiam suam laudisque cupiditatem summam prodere hic haud pudet *Riolanum*, dum Cl. *Vesling.* nostrum in anim. suis notare jubet, *Riolanum* primum indicasse traductionem processus peritonæi & ligamenti rotundi in mulieribus per tendines musculorum Abdominis circa inguina, ut proposuit, quod tamen, licet adhuc sub judice lis sit, num primus inventor sit, non negat ipsi *Veslingius*.

Circa inguina pervadunt] Traductionis artificium, cujus inventorem se gloriatur *Riolanus*, ita declarat in *Animad. suis in Vesling.* Perforatio illa non est in istis tendinibus directa, sed alternata, ita ut incipiat à tendine obliqui descendents versus Spinam anticam ossis Ilium, dein digiti distantia perforatur tendo obliqui ascendents, postea juxta inguem pertunditur tendo transversus. Ita autem perforati sunt tendines, ne præcipiti lapsu rueret intestinum in Inguen, sunt enim prius effringenda hæc foramina vel delatanda.

Principium trahunt &c.] Habet hic iterum aliquid quod reprehendat *Riolanus* parvi sanè momenti: Potuisses dicere, *inquit*, utrumque musculum dentatis productionibus invicem implexum esse; Propterea infra musculum serratum situs est musculus obliquus descendens, qui æque meretur nomen serrati propter

pectoris musculo majore, dentatis productionibus inæquales, tum retrò qua lumbalium vertebrarum transversus processus finiunt. A costa item ossis Ilium, atque in medio abdominis, concursu tendinum facto, in designata ibidem albicante linea *desinunt*. *Venas, Arterias, & Nervos*, ab intercostalium ramulis sortiuntur, qua parte pectori incumbunt.

Alterum par musculorum abdominis *Obliquè ascendentes* præbent, quibus similes prope lumbalium vertebrarum transversos processus, & ab ossis Ilium externo margine *exortus* est. Hinc assurgentes undecimæ duodecimæque costæ sese jungunt, & postquam rectos abdominis musculos geminato tendine exceperunt, ad lineam pariter albam *terminantur*. *Venas suas, & Arterias* habent à ramis venarum quæ musculæ dicuntur,

COMMENTARIUS.

mutuam intexturam firmam & stabilem ad exortum oblique descenditis. His verbis quid quæso novi infert *Riolanus*, quam quod loco vocabuli, principium, exortum, loco præpositionis, sub, infra, ponat, diversi quid hic non video, ostendant *Riolani* discipuli. Controversia est inter Anatomicos, ubinam sit horum musculorum exordium, ad costas scilicet an ad ossa pubis; *Lauremb. in Collegio Anatom.* acriter contra *Laurentium, Bauhinum, Aquapend.* militat pro communi sententiâ, à costis nempe eos originem sumere, qui videri potest.

Sub serrato pectoris musculo majore] Ex parte infimâ costarum sextæ, septimæ, octavæ, antequam in cartilagine desinant. Et hoc principium carnosum est.

Retro] Principio membranoso & ligamentoso.

Qua vertebrarum transversus processus finiunt] Terminantur neutiquam connexionem verâ Musculi hi descendentes ad transversos processus, sed mediante musculo transversali.

Concursu tendinum facto] Tendo hujus musculi obliqui, ubi ad Rectum musculum pervenit, validissimè cum subjecti obliqui adscendentis tendine jungitur, & sic miscetur, ut fiat individuus, & separari à se invicem citra dilacerationem nequeant.

In designatâ ibidem albicante lineâ] Appellatur hæc, intervallum Rectorum musculorum lineare, adipe candido refertum, & à Xiphoidæ Cartilagine directe per umbilicum ad conjunctionem ossium pubis protensum.

In mulieribus gravidis, cum ultimis gestationis mensibus valde distenditur abdomen, ex divulsione Rectorum musculorum linea quoddam sublivida dicto loco per duos vel tres menses à partu remanet, quæ sensim obliteratur musculis Rectis inter se junctis & coalescentibus, ut bene annotavit *Riolanus Ench. anatom. l. 5.*

Et Nervos] Immanem sæpè dolorem, imò inusitatam Abdominis convulsionem non rarò ex cruda flatulentâque pituitâ, in sensiles illos nervos, quos Spinalis medulla, tum per membranam ventrem succingentem, tum per musculos illi proximè incumbentes dispergit, sese sensim insinuante oriri, exemplo mirando probat Anatomicus summus *Nic. Tulpius lib. 3. Obs. Med. cap. 22.*

Hinc assurgentes] Carnosi procedunt, sursum versus per inania expansi, fibris contraria sede prodeuntibus, superioresque crucis in modum secantibus.

Geminato tendine] Duplicaturam hanc tendinis obliquè adscendentis fictitium esse, ejusque duntaxat rudimentum apparere supra umbilicum, infra autem prorsus inseparabilem esse docet *Riolanus*, quod non admitto, æque enim infra ac supra Umbilicum ab Anatomico indutrio & laboris patiente segregari hi tendines possunt, ægrius licet modo in parte superiore, modò in inferiore.

Terminantur] Prius tamen, mox ubi musculum Rectum superarunt hi tendines, conjunguntur atque coalescunt in unum.

Anasto-

tur, quorum à Vena cava, & arteria magna circa divisionem earum in ramos Iliacos ortus est. *Nervos* à lumbaribus, & infimis intercostalibus nanciscuntur.

Par tertium *Transversales musculi* exhibent membranoso principio, ab ipsis transversis lumbalium vertebrarum processibus, osse item Ilium, cartilaginosoque præterea Costarum confinio interius *profecti*, peritonæo subiecto inhærent, & ad eandem cum præcedentibus metam *ferviuntur*. *Venas, Arterias, & Nervos*, cum obliquè ascendentibus eisdem participant.

Musculi Recti quartum par suppeditant, in quo conditoris eximio artificio *Vena, Arteriaque Epigastrica* dictæ ascendunt, tum à mammariis internis propè mucronatam cartilaginem, aut per ejus fissuram descendunt, alimenti, vitalisque caloris vehicula. Venarum istarum, præcipuè in gravidis, & puerperis, evidens sæpe *Anastomosis*, adeoque utero graviter obstructo, aut ab amplis tumoribus compresso, veluti canalem, ab inguinibus ad mammas porrectum digiti crassitie quandoque repræsentant. *Nervos* suos intercostalibus debent, circa medium abdominis in longum porrecti, vixque palmo in latitudinem majores.

Inscriptio-

COMMENTARIUS.

Anastomosis] De Anastomosi hæc Vasorum Epigastricorum cum Mammariis varii varia proponunt. Communiter eam in Venis locum habere volunt, sic ut Vena Epigastrica jungatur Venæ Mammariæ; sunt qui idem in Arteriis evenire statuunt. *Cl. Hichmorus*, & qui eum sequuntur, Venas Arteriis uniri docet, sic ut Arteria Mammaria descendens jungatur cum Venâ Epigastrica ascendente, & contra Arteria Epigastrica ascendens cum Venâ Mammariâ descendente. Et per hanc deosculationem dictorum vasorum quocunque etiam modo celebretur Consensum uteri & mammarum fieri post *Galenum Riolanus* alique plurimi volunt. Paucis quid nobis videatur proponemus, ulteriorem materiæ hujus explicationem qui desiderant ad Authores Anatomicos ablegantes. *Primum* quod spectat, ipsam nempe Anastomosin, haud crediderim eam frequenter occurrere, ne dicam semper, hinc inter Anatomicos de existentia ejus contentio, aliis eam adstruentibus, aliis contra negantibus. Sæpius quamvis

etiam in cadaveribus humanis in eam inquisitionem, haud tamen nisi bis eam observare licuit; manifestissima utraque erat, Venæ cum Venâ. Exemplum egregium habet *Barthol. obs. Anat. cent. vi. hist. 47.* Alterum quod attinet, uteri nempe cum mammis consensum, certitudinis hîc nihil est. Objiciunt quidem quod in gravidis Vena epigastrica maximè distenta sit, & hoc putant esse, ut per eam ferri materia lactis ex utero ad mammas possit. Sed certè id potius contrarium arguit, sanguinem scilicet aut aliam materiam non ferri per eam ad mammas sed ad Uterum. Nec potest aliter fieri quam ut ea Vena sit tum temporis plus justo distenta. Idem enim hîc evenire censemus quod in pedibus gravidarum plurimarum, ubi Varices se exhibent, non aliam ob causam quam quod Uterus foetu distentus venas Iliacas comprimat, unde fit ut qui per arterias Iliacas impetu suo cordisque motu ad pedum extrema delatus erat, ascendere inhibeat, qui tum distendit venas.

Inscriptionibus binis, ternis, interdum & quaternis, in plures veluti musculos dirimuntur. Ad mucronatam pectoris cartilagine, costarumque cartilagine, exortu carnosus sunt; in ossa verò pubis, valido, tendinosoque corpore defixi.

His quintum par frequenter addunt *Musculi Pyramidales*, quibus figuræ qualiscunque similitudo, præsertim conjunctis, nomen dedit. *Basin* suam in ossibus pubis obtinent, à quibus assurgentes, paulatimque graciliores, tendinem suum ad proximam albicantem lineam *perducunt*, rectorumque musculorum auxiliarii, subjectas partes validius comprimunt. Horum defectus musculorum rectorum finis carnosior ac latior supplere solet.

At

COMMENTARIUS.

In plures veluti musculos dirimuntur] Apposite *Veslingius* dictionem *veluti* addit; Revera enim unicus utrinque musculus est Rectus, ut hoc optimè contra varios Anatomicos demonstravit *Riolanus*, cum quo etiam facit *Lauremb.* in *Coll. anat.*, Exerc. 3.

Costarumque Cartilagine] Trium scil. aut quatuor costarum, latitudine enim hic Musculus quatuor transversos æquat digitos.

Exortu Carnosi sunt &c.] Queritur quâ parte sit Musculorum horum principium, quâ parte finis? *Galenus*, *Piccolhomin.* alique initium ad sternum constituunt, finem ad pubem, *Laurentius*, *Baubinus* alique contra finem in sterno, principium in osse pubis collocant. *Lauremb.* in *Coll. Anat.* duplicem finem duplexque principium iistribuit, sic ut ad sternum & principium sit & finis, & etiam ad os pubis, diverso licet respectu, distinctoque usu.

Frequenter] Sæpe enim contingit utrumque, uti in muliere illâ recenter à partu emortuâ atque à Clariss. Profess. *Joh. van Horne* II. Jan. 1652. publicè dissectâ; sæpius unum eorum deficere.

Nomen dedit] A latâ enim basi in mucronem acutum terminantur. Vocantur & *Fallopiani* quod is primus inventor habeatur; quod tamen à multis negatur, qui multo ante descriptos esse volunt à *Niccolao Massa Medico Veneto* & *Sylvio Anatomico Parisiensi*, qui etiam illos vocavit *Succenturiatos*, ab eo officio, quod

cæteris Abdominis musculis in compressione Vesicæ cum Urinam reddimus, subsidio venire crediderit, quod tamen minimè credibile.

Partes subjectas validius comprimunt] Certè compressio quæ ab his procedit musculis exigua admodum est, & quod speciatim vesicam pro excretionem Urinæ promovendâ comprimere dicantur, probatione adhuc ager, maximè cum constet eos ad vesicæ regionem minimè pertingere, utpote longe inferiori loco sitam. quicquid etiam cum aliis contradicat *Lauremb.* in *Coll. Anat.* ubi & usus alios quos *Aquapendens* & *Laurentius* ipsis tribuunt, abdomen nempe elevare, ne intranea onere nimis premantur, aut rectorum musculorum tendines defendere, ne collidantur nullos aut spurios profitetur.

Horum defectum &c.] Atque hæc res occasionem dedit dubitandi, num revera muscoli sint à reliquis musculis Rectis distincti, an verò partes tantummodo eorundem. Certè non modo membranâ propriâ vestiuntur, cujus ope à musculorum Rectorum extremo inferiori segregantur, verum etiam fibras obtinent proprias à fibris Rectorum situs obliquitate manifeste distinctas, imò & tendinem exilem proprium, in lineam desinentem, non rarò etiam ad ipsum Umbilicum excurrentem, non video quid adferendum, siquidem Musculorum nomen ipsis derogare vellemus.

At

At majora enarrata paria, quemadmodum ad supervacuorum expulsionem Abdomen undique arctant, sic thoraci quoque, cum quid valide expectorandum est, suppetias ferunt. Accedit usus quoque singulorum non obscurus, dum carnosio dilatata corpore viscerum calorem fovent, atque ad formæ quandam concinnitatem faciunt.

Accenseri possunt infimi ventris musculi lumbares duo, & facer quadratus: sed hi rectius cum dorsi musculis deteguntur.

Inter continentes abdominis partes intimum est PERITONÆUM, membrana sic nuncupata, quod visceribus illius omnibus circumtensa sit. Quippe quæ non ambit solum & coercet, sed magnorum etiam auctorum consensu, communi tunica vestit, VENAS, & ARTERIAS, pro situs varietate, à phrenicis, musculis lumborum, mammariis item, & epigastricis habet. NERVOS è vertebriis thoracis, & lumborum. Nec SIMPLEX tamen membrana existit. Nam circa renes, ureteres, & vesicam manifestè duplicata conspicitur.

TENUIOR

COMMENTARIUS.

[At majora &c.] De Actione horum Musculorum, tam generali, quam speciali variæ sunt Anatomicorum opiniones. Dicimus breviter: *Obliquos* Musculos non adèò intervenire expulsionem eorum quæ in Imò ventre sunt, quam commotioni corporis ad latera. *Transversos* autem, dum contrahuntur, maximè expulsionem dicatos esse, eorum, quæ excernenda sunt. *Rectos* denique costis pubem adducere, ut in Agrytis videmus, & nos dum surgimus in lecto observamus hos musculi tumefieri & contrahi, atque ita has partes conjungi. Et licet os pubis dicatur immobile, costæ autem mobiles, perinde est hoc musculo, trahit enim contractus & corrugatus quod sequi potest, imò & os pubis Gynglymo ossi sacro junctum mobile satis est: Thoraci in Motu suo maximè obliqui & recti haud parum auxilii adferunt.

[Accenseri possunt &c.] Reprehendit hic *Veslingium Riolanus*, quod tantummodo duos hic nomen Musculos lumbares, Sacrum & Quadratum, adeoque Sacro lumbum & Spinatum omittat, cum æque sint lumbales & constituent cum vertebriis lumbalibus & ossi sacro posticam partem ventris inferioris, videlicet orti ab ossi sacro. Sed verò inanis hæc est a-

nimadversio, attendat enim *Riolanus* ad Caput 12. & videbit *Veslingium* hos duos à *Riolo* recensitos musculi, non lumbis, sed dorso adscribere, prudenter admodum meo iudicio, licet enim in lumbis situm suum maximè ex parte obtineant, usum tamen dorso Thoracique præstant, similiter ac in Thorace collocatos musculi varios improprie Thoraci, in Abdomine, Abdomini, absolutè adsignari docuimus.

[Coercet] Liqueat hoc manifestissime in Herniâ, simul enim ac rupta hæc est membrana, Omentum aut Intestina extrorsum erumpunt: adeoque nec Cutis nec Pinguedo, nec ulla partium exteriorum, sed solum hoc peritonæum firmiter viscera imi ventris continet.

[Communi tunica vestit] Non putem demonstrari ab Anatomico ullo posse continuitatem peritonæi, sic ut se ad omnia imi Ventris viscera extendat.

[Nervos] Exemplum intensissimi doloris à flatulenta pituita in hos nervos sese insinuante exorti ex *Nic. Tulpio* supra habemus.

[Manifestè duplicata conspicitur] Dictis quidem locis duplicatio hæc peritonæi manifestè observabilis, non tamen idcirco absolutè pro membrana duplici peritonæum habendum;

TENUIOR est antèriùs, circa dorsum crassior, utrobique tamen valida. Quin & humorum affluxu macerata cutis crassitiem æquat, duplicem ubique tunicam ob interfusam saniem ostendens, simili tunc membranarum quæ viscera cingunt densitate.

P E R V I U M est Peritonæum non gulæ tantum, vasisque sursum, & deorsum, atque in foetu extrorsum commeantibus; sed ligamentis etiam uteri vermiformibus. In corpore virili considerabiles sunt ejusdem **P R O C E S S U S**, geminam item tunicam præbentes, quibus spermatica

COMMENTARIUS.

hoc enim habet, quod intra suam substantiam variis in locis varias particulas recipiat, & ubi hoc fit, necessario velut iu duas laminas dividitur, intermediis autem locis una simplexque est. Dicit quidem Fernellius ad posteriora juxta Spinam conspicuè separatas cerni peritonæi membranas, parte autem ventris priore usque adeò cohærentes & implicitas esse, ut una eademque censeatur; Sed certè licet manifestè satis juxta spinam, hoc est lumborum vertebrae, duplicatura hæc appareat, ubi truncum Venæ Cavæ, & Arteriæ Aortæ, Ureteres, Nervos, Vasa Spermatica, Testesque muliebres complectitur, æque tamen manifesta duplicatio hæc modo explicato instituta in parte ventris anteriore, imò manifestior quam in postica, maxime spatio infra umbilicum, sic ut capaci laminarum ejus distantia præter vasa Umbilicalia, ipsam Vesicam urinariam & in mulieribus etiam Uterum contineri observemus.

Tenuior est antèrius] Tenuis est, maxime antèrius, si sola, per se, distincta à tendinibus Musculorum transversorum Abdominis, consideretur, at verò, si conjunctim hæ partes sumantur, crassa satis est. Crassior item in mulieribus ab Umbilico usque ad pubem, quo in gestatione foetus distendi magis possit, adeoque, juxta molem & amplitudinem uteri, dilatari. Et hæc etiam causa videtur cur mollis hac parte maxime facta fuerit, Ventriculi enim distensionem, qualis sæpè est summa in helluonibus, & potatoribus, hepatis aliorumque viscerum tumores, feri in imo Ventre aut flatûs collectionem, similiaque ut extraordinaria & ferè indecentia nunquam natura respexit. Nec distenditur tantum mollis hæc

membrana, sed & remotâ causâ extensionem illam producente continuè iterum in arctitudinem debitam contrahitur, similiter ac videmus Vesicam urinariam post excretionem urinæ iterum contrahi, quæ antè excretionem distenta erat.

Utróbique tamen valida] Propter robur, quo maximo eget, ut contineat insignem illam copiam viscerum, quorum pars impleri, etiam supra modum, consuevit.

Humorum affluxu macerata] Sæpè contingere Anatome docet, humores acerrimos, ferrosos, biliosos sese insinuare in spatia duplicaturæ, vel potius intra peritonæum & partem cui adhæret, & dolores acutissimos excitare, qui colicum nothum constituunt.

Ubique] Iis intellige locis, ubi duplicatio membranae observatur.

Ob interfusam saniem] Non hoc solum, verum & humores alios. Vide *Observ. 43. lib. 4. Nicol. Tulpii*, ubi de muliere 110 libras aquæ hic continente.

Pervium est] Non perforatur, sed cedens producitur & extenditur, instar vaginæ partes istas involvens, in Ventre adhuc hærentibus vasis spermaticis jam arcte adnatum.

Vasisque] Venæ scil. Cavæ, Arteriæ magnæ, cum adjuncta Vena azygos, Nervique sexti paris productioni.

Atque in foetu] Vasis umbilicalibus, & hæ perforationes in parte superiori sunt ad Diaphragma.

Processus] Peritonæi hi processus ad testes producti efficiunt, quod serosi humores qui ad scrotum defluunt, Hydrocelen pariant. In inguine, dilatata, aut ruptâ membranâ Peritonæi excipit intestinum Ilium aut aliud quoddam,

matica vasa cum testibus exipit. JUNGITUR passim, & subditis sibi partibus, & propinquis musculis, tum septo transverso, præcipuè verò supremis lumborum vertebriis, unde vulgò principium ejus deducitur.

COMMENTARIUS.

dam, imò licet rarius varia simul, aut Omentum, unde nascitur tumor Inguinis, dictus Enterocele aut Epiplocele, aut ab utroque delapso Entero-Epiplocele. ¶

Geminam tunicam præbentes] Processus hi ut communiter Anatomici, etiam inter recentiores volunt, non utriusque membranæ ex quibus constat peritonæum productiones sunt, sic ut utraque ejus lamina extra corpus cum vasis seminariis feratur, sed vasa hæc conjunguntur tantum exteriori peritonæi tunicæ, & cum ea obliquo ductu, simili omnino modo ac Ureter ingreditur Vesicam, tendines Musculorum transeunt ad testes usque quos invenit. Interior autem exteriori conjuncta tantummodo est, usque dum ad os pubis pervenit, ubi ab ea separatur, & ossi pubis adjungitur, ne ruptio tam facilis esset. Sed verò an hæc res veritati conveniat, valde dubito, putans utramque peritonæi membranam ad ex-

teriora ferri, testesque cum vasis spermaticis involvere.

Principium ejus deducitur] Non quod propriè loquendo à supremis lumborum vertebriis oriatur, nulla enim pars ab alia oritur, sed omnes à prima conformatione ex generationis principio originem trahunt; ast Principium ab iis ducere vulgò dicitur, eò quod iis vertebriis adeò validè annectatur ut citra ruptionem separari minimè queat. *Higlmorus lib. I. Disquis. an. cap. 9.* haud sine omni probabilitate à nervis per foramina primæ & tertię vertebriæ lumborum prodeuntibus oriri Peritonæum docet, quatenus tunica à dura tenuique cerebri membranâ omnibus nervis communicata hoc in loco in membranam hanc expandatur. Illincque consensum illum insignem inter membranas omnes partesque iis obtectas cum cerebro ejusque membranis exoriri credit.



TABULÆ CAP. II. Explicatio.

Tabula hæc figuris septem Ossa abdominis proponit: duabus aliis, videlicet octava, & nona, Musculos abdominis. Decima situm partium remoto peritonæo conspicuarum exhibet.

FIG. I.

Quinque lumborum vertebrae exprimit anrius observabiles, in quibus

aaaa Sunt Processus transversi.

FIG. II.

Vertebra lumborum posterius conspiciendam habet, in qua

a Foramen pro spinali medulla.

bb Processus transversi.

cccc Processus obliqui.

d Processus acutus, sive spina.

FIG. III.

Ossis coxæ externam faciem repræsentat, prout in adultis unitum, in quo secundum recensionem auctorum

A Os Ilium.

BB Os Coxendicis.

C Os Pubis.

FIG. IV.

Ossis coxæ externam faciem monstrat, in qua rursus

A Os Ilium.

aa Spina ossis Ilium.

B Os Coxendicis.

CC Os Pubis.

FIG. V.

Ossis sacri internam faciem refert, sex partibus distinctam, in eo

aaaa Foramina nervos demittentia.

b Particula tres Coccygis.

FIG. VI.

Ossis idem exterius videndum, in quo

a Foramen pro Medulla dorsæ descendente.

bbb Foramina minora pro nervis.

c Os Coccygis.

FIG. VII.

Figura singularis quæ os Coxæ, quemadmodum in pueris distinctum observatur, designat: in ea

A Os Ilium a reliquis omnibus distinctum.

BB Os Coxendicis.

CC Os Pubis.

aa Fissura os Coxendicis & Pubis distinguentes.

Nexum Ossium omnium Abdominis vide Tabulâ Cap. XVII.

FIG. VIII.

A Musculus Abdominis oblique Descendens, extra situm, & sinisterosum reflexus in quo

aa Principia dentata.

bb Ejusdem tendo linea alba inhaerens.

B Musculus Abdominis oblique Ascendens, circa Principium separatus, in quo

ccc Principium.

dd Portio tendinis, qui rectum musculus operis.

ee Musculus rectus abdominis.

FIG. IX.

A Musculus Transversalis, circa Principium solutus in quo

aaa Principium.

bb Tendinis portio.

B Musculus abdominis Rectus, in quo

c Principium.

ddd Inscriptiones nervosæ.

e Finis.

C Musculi recti alterius posterior facies, in qua

d Vena, & arteria mammaria descendens.

e Vena & Arteria Epigastrica ascendens.

f Anastomosis venarum.

gg Peritonæum Musculis denudatum.

DD Musculi Pyramidales.

EE Processus peritonæi in scrotum descendentes.

FIG. X.

A Pectoralis musculi pars detecta.

B Osterni seu pectoris.

C Ventriculus sub fecore omnibus occultatus.

D Fecur.

E Omentum in suo sitis, in quo

b Portio, quæ fecori adhæret.

cc Portio quæ Ventriculi fundo necitur.

ddd Reliquum omenti intestinis instratum,







FF Intestina in situ suo obhærentia.

G Vena umbilicalis.

H Ligamentum vesicæ, ex inclusio uracho, & duabus arteriis umbilicalibus productum.

I Vesica fundus.

aaa Peritonæum divisum.



De Omento, Ventriculo, & Intestinis.

AC de externis quidem abdominis partibus sic habendum est. Pergimus ad *Internas*, quarum *alia* publicæ coctionis officium sustinent, *alia* generandæ, concipiendæque proli operam navant. *Publicæ coctioni* dicatæ sunt Ventriculus, & Pancreas, tum Jecur, & Lien: quibus inferviunt Intestina, Omentum, Cystis fellea, & Renes, cum Vesica urinaria. *Generationem* respiciunt Vasa utriusque sexus spermatica, Pudendum virile, & Uterus mulieris: de quibus, prout in conspectum Anatomici veniunt, sigillatim agendum.

Primùm autem interiora rimanti sese exhibet OMENTUM, quod *Epiploon* antiquitus dictum, MEMBRANA gemina, pinguedine in

COMMENTARIUS.

[Interiora rimanti] Quò ad interiora debite perveniat Anatomicus, duabus sectionibus ad angulos rectos crucis in modum circa umbilicum sese interfecantibus partes dictas externas Abdomen constituentes discindit, easque partes quatuor manibus suis deducit.

Omentum] Omentum unde Latinis dicatur non convenit inter Authores; communi sententiâ dicitur quasi Operimentum, quod antè & quodammodo etiam à lateribus Intestina cum annexis partibus operiat & contegat, quanquam nomen sit generale omnibus particulis quæ alias integunt, sic Cerebri meninges Omenta cerebri vocat *Macrobius*, quod tegant investiantque cerebrum; Sic quæ tegunt partes vitales Omenta dici possunt. Attamen usus jam apud Anatomicos obtinuit nomine Omenti speciatim membranam hanc imi ventris partes tegentem insignire. Alii quasi Opimentum dicunt, quoniam valde opima est hæc membrana & pinguis, præsertim in obæsis. Alii ab Omine volunt nomen hoc desumi, quoniam Aruspices Extispices quo Regi regiones alias invadendi animum habenti an fertilis ea esset nec ne indicare possent, solebant examinare partes & præcipuè Omentum cuiusdam animalis, quod si pingue

esset, benè pascuam judicabant terram, si verò macrum agrorum prædicebant sterilitatem. *Riolanus*, licet ridicule lib. 1. Antr. cap. 13. quasi Ommmentum dictum esse vult, ab ommendo id est supra manando, quoniam semper supra intestina manet.

Epiploon antiquitus dictum] Græcis nimirum à verbo ἐπιπλῶν, innato, quod ut naves aut tabulæ lignæ fluctuant in aqua, sic hæc pars innatet & fluctuet libere in anteriore ventris parte, licet non totâ, tamen maximâ sui parte, nam sola ejus extremitas superior Ventriculi fundo, Colo & Spinæ dorsi adnascitur, totum verò corpus inferius usque ad pubem liberum est & solutum, & liberè intestinis innatat.

Membrana] Rarissimum est Omentum plane esse carnosum, quale in Nosocomio Leidensi exsectum vidit *Thom. Barthol.*

Gemina] Gemina est ubique, adeo disjuncta in certis locis, ut manus introduci queat: quod spectare licet in ea parte glomerata qua ventriculo & lieni juxta diaphragma interposita consistit.

Pinguedine in obæsis copiose perfusa] Pinguedine has membranas Omenti copiose perfusas esse dicit *Veslingius*, variis namque locis pinguedo dispergitur, ubi nempe venæ atque arteriæ habentur. Ut adeò si conjunctæ hæ partes

in obesis copiosè perfusa quæ ventriculo circa fundum conjuncta, ac potissimum intestinis INSTRATA, partium alioquin exsanguium debilem calorem blando incubatu fovet. Alam ejus inferiorem à peritonæo immediatè deducunt auctores; superiorem verò à tunica ventriculi communi.

VENAS adipiscitur à Vena Porræ; & Ala quidem superior, Gastroepiploicam dextram, & sinistram, Ventriculo quoque communem; Ala inferior Epiploicam dextram, & posticam. ARTERIÆ à ramo Coeliaco

COMMENTARIUS.

tes spectentur, non dissimilem retis texti effigiem ostendant. Pinguedo enim cum vasis insigniter errabundo ductu per utramque hanc tunicam discurrens fila æmulatur, quæ exiguæ particulæ divaricationibus vasorum ubivis interjectæ nodosa omnino exprimunt, membrana verò pars cancellos seu vacua illa spatia quæ retium chordis interjacent. Et hæc est Belgis Germanisque ratio, quare Reticulum hæc Per Omentum hoc appellant. Quamvis & alia quædam possit adferri hujus denominationis causa, quod nempe omnimodam similitudinem diductis maximè tunicis cum illo retium genere videatur habere, quo in extrahendis piscibus ex rete majori, finitâ capturâ, utuntur piscatores, aut nos eundem in finem ex locis istis in quibus ad usum domesticum recreationemque nostram pisces varii generis asservare solemus, quodque speciali nomine *ren Schepper* nostris dicitur. Quin & tertia hujus Etymologiæ dari potest ratio, ab usu utriusque desumpta: sicut enim reticulis capiuntur pisces, sic & Omento Intestina partesque connexæ.

Ventriculo circa fundum conjuncta] Alâ nempe seu membranâ ejus anteriore seu superiore, quâ tamen etiam Lienî, Hepatiquè jungitur. Inferiore autem seu posticâ non modo annectitur Peritonæo, sed & Hepati, Lienî, ipsisque Intestinis Duodeno & Colo, qua sub ventriculo recumbunt. Dum autem dicitur fundo ventriculi conjuncta, non tota ejus capacitas, quæ communiter eo nomine venit, intelligi debet, sed infimum ejus, à quo dependet, sic ut Ventriculo nil caloris adferre possit.

Intestinis potissimum instrata] Amplitudo Omenti ratione adhæSIONIS principalis & situs dividi cum *Riolano* potest in quatuor partes.

Prima est *Intestinalis*, intestinis supertensa; Altera *Hepatica* quæ à cavo hepatis enascitur, includens parvum hepatis lobum, quin etiam insinuata profundis cavitatibus hepatis. Tertia *Lienalis* dici potest, quoniam accumbit lienî. Quarta *Mesenterica*, productio est ipsius Mesenterii ad superiores partes, constituens Epiploon.

Blando incubatu fovet] Fovet autem calorem Intestinorum, quatenus coctionem eorundem juvat. Veritatem *Veslingiani* hujus asserti experientia ipsa probat. Testatur enim abundè, quibuscunque hominibus pars bona Omenti fuit adempta, in iis ferè omnibus coctionem insigniter læsam fuisse. Adimitur autem Omenti pars, dum vulnere in Abdomine facto excidit extra corpus & reponi in interiora nequit gangrænâ contrahit, & putrescit.

Interiorem alam] Hoc est posticam Omenti membranam.

Superiorem] Id est anteriorem.

A tunica ventriculi communi] Quæ extrinsecus Ventriculum investit, cum qua unitur, & continuatur, adeò ut totum Omentum suspensum teneatur à Ventriculo, quæ cum eadem sit cum peritonæo, non video ad quid illa distinctio.

A Peritonæo] Ab illa nempe portione Peritonæi quæ ossa lumborum, sacra, vertebraeque ipsas cingit, utpote eandem & continuatam cum eâ substantiam habens.

Posticam] In his omnibus Valvulas plures reperiri ad Splenicum ramum & Gastro-Epiploicas spectantes, easque ad venarum ostia positas, ne à Venæ portæ ramis dictis in minutilas has ressuat, & illas violaret sanguis *Higbm. lib. I. cap. 2.* tradit.

Coeliaco derivantur, & Mesenterico : N E R V U L I pauci, à plexu costalium nervorum sexti paris : atque hæc omnia, ne pabulo, vita, sensuque destituatur, *Glandulis* conspersum nunc pluribus, nunc paucioribus, spongiarum instar superfluas humiditates rapientibus.

Amplitudine pro corporum diversitate varium est. In multis infra umbi-

C O M M E N T A R I U S.

[*Ne pabulo vitæque destituatur*] Soli huic usui tam numerosa vasa sanguinea naturam Omento dedisse probabile minimè videtur, sunt enim partes multò crassiores, ut peritonæum, Pleura, Mediastinum, &c. quæ tamen non habent tantam copiam vasorum. Probabilius id factum, ut pinguedinis in eo generatio promoveretur, at non primariò, per unicum enim vas Adiposum Ren, Coronarium Cor suam accipiunt materiam pinguedini generandæ commodam. Imò in multis animalibus, maximè volucris, non est pinguedo, & tamen non minor vasorum in omento copia. Probabilissimum præcipuam hujus multitudinis vasorum, & præsertim Arteriarum in Omento esse causam sanguinis commutationem, non quidem in Vasis ipsis, sed in loco vicino, hepate nempe, celebrandam ; ut sic eò melius & majori copiâ sanguis queat ad hepar deferri, cum nulla sint propinquiora ipsi vasa sanguinea, quam quæ per Omentum & Mesenterium distribuuntur, nec etiam commodum vasa hæc distribui potuerint ; Addimus tamen & hoc, caloris in Intestinis ad concoctionem necessari omnino, augendi ergo, factum aliquomodo videri. Et licet *Riolano* in animadv. suis in *Bartholinum*, absurdum omnino videatur, per circulationem sanguinis, qui recurrit ad hepar, iterum ab hepate perfici, nihil est, modo consideretur hepatis non semper unum eundemque ac jam perfectum accedere sanguinem, sed qui semper crudiorē elaborationeque pleniori indigentem alium commixtum sibi habeat, quâ ratione autem perfectio aliqua sanguini in Hepate dici debeat tribui, alibi declarabitur.

[*Glandulis* &c.] Nunquam observare potui cum *Riolano* istas glandulas, sed tantum adipem crassiorem & densiorem interfusam divisionibus vasorum.

In multis infra umbilici regionem haud pro-

tenditur] In quamplurimis fursum contractum Omentum mecum varii adnotarunt, sic ut revolutum admodum variasque in spiras collectum intestinorum sedem quæ supra umbilicum consistit, duntaxat operiat : Imò in nonnullis totum fursum ita retractum vidi, ut conspectum nostrum omnino fugeret, Hunc autem Omenti situm omnino præter naturam esse existimo, cum sic ab usu suo non minimum defraudetur. Quænam autem vera sit causa, quare fursum adscendat & in se contrahatur, fateor me ignorare, maximè cum nullus hæctenus fuerit qui mihi hæc in re satis facere potuerit. Quidam fursum trahi non volunt nisi in iis qui strangulantur, eorum enim ultimo inspiratu dicunt etiam fursum trahi Omentum, at sine fundamento. Certum enim est, animal non inspiratione, sed expiratione mori : certum ex quamplurimis strangulatis paucos admodum esse, quibus fursum ita retractum, certum itidem est, in aliis spontaneâ morte extinctis fursum convolutum, Vir Celeberrimus *Joh. Ant. vander Linden* Physiol. lib. 2. c. 4. artic. 8. §. 89. In Mortuis retractum Omentum versus lienem semper inveniri docet, hocque accidere (verba ipsius sunt) quia animal expirando moritur, tunc enim Diaphragma secum fursum trahit appensa viscera. Verum in mortuis id versus Lienem semper retractum esse experientiæ contrarium est, & deinde dum expiratio fit ultima, & animal moritur, Diaphragma secum fursum trahere appensa viscera, primò omnium ob stare videtur partium Imi ventris, ipsiusve Omenti gravitas, quæ pro majori interni caloris imminutione magis magisque indies augetur. Cui accedit Respirationem ad ultimam expirationis finem semper imminui, imminutam autem eam adeoque naturali longè infirmiore expirationem tantarum virium esse, ut viscera interna fursum cum Omento trahat, percipere

umbilici regionem haud protenditur: in quibusdam ulterius demissum, auctaque pinguedinis mole ponderosius redditur, ut mulieribus uteri compressu sterilitatis causam invexisse visum fuerit. In omnibus sanè **DUPLEX** occurrit, tunicisque diductis, inter ventriculū, lienem, & intestinum colon, non rarò puri, serosis humoribus, flatuque receptaculum præbet. In sitam ejus **SICCITATEM**, & **FRIGIDITATEM**, ferè pinguedinis ubertas obliterat; quamvis ob hoc ipsum in prolapsu putredini facilius obnoxium fiat. **CONJUNGITUR** Jecoris lobo rotundo, Pancreati, Lieni, maximè Ventriculi fundo, atque Intestino colo, cui fovendo aptum pariter natum est.

Omento itaque subducto **VENTRICULUS** adest, pars infimi ventris organica, quæ cibum assumptum, dentiumque molitione præparatum, in succum albicanti cremori similem convertit, quem chylum

COMMENTARIUS.

re difficile est, doctioribus hanc rem penitendam relinquo, quam si veram probaverint, assensum polliceor.

In quibusdam ulterius demissum] Quousque sese demittat Omentum in vivo corpore variè disceptatur. Dicam quæ observavi, & vera alii confirmarunt. **I.** In omni subjecto, cujus dissectioni interfui, deprehendi Omentum tantæ longitudinis, ut manibus faciliè extendi deorsum usque ad ossa pubis possit. **II.** In pluribus observavi per se suâ naturâ spontè fuisse actū extensum ad fundum usque Imi Ventris, suâ naturâ dico, situs enim talis omninò naturalis ipsi est, cum non tantum intestina superiora, sed & inferiora, tegere debeat. Consule hæc de re *Highmorum* loco citato, ubi Vesalii errorem de situ Omenti egregiè refellit. In Anatome Lugd. Bat. anni 1656. Omentum ad pubem arctè alligatum ipsi Peritonæo, adeò ut cultro separare cogeretur, oculis spectatorum exposuit *Joh. van Horne*. Aliquando utero arctè nexu unitur, ut in fatuâ Neapoli singularis prudentiæ vir *M. Aur. Severinus* reperit, & fundo uteri in aliâ Venetiis *Barthol.* præsentè alligabatur.

In omnibus sanè duplex &c.] Reprehendit hîc *Veslingium Riolanus*, quod non declaret magnam portionem Omenti glomeratam interjectam lienî & ventriculo, cujus usum admirabilem instar spongiæ sordes excipere, in sua Antropog. se declarasse gloriatur, qui an

verus sit, judicent Doctiores, mihi saltem non fit verosimile, eum usum naturalem esse.

In prolapsu putredini facilius obnoxium] Imò etiam in suo naturali loco quandoque putredine consumptum varii observarunt, inter alios *Joh. Dan. Horslius in Observ. Anatom. Decade.*

Omento subducto] Eleganter hîc Author loquitur, non enim, simul ac examinaverimus Omentum, novaculâ refecandum est, sed ad tempus integrum servandum, & inflexum sternò insternendum, quo postea accuratius videatur, quâ ratione cum fundo Ventriculi, Colo, & Spinâ dorsi connexionem habeat.

Ventriculus,] Dîctus ita, quasi parvus venter, Græcis *κῆλη* audit, quæ vox notat **1.** Universum ventrem infimum. **2.** Cavitatem omnem conspicuam, ubi ubi sit. **3.** Ventriculū propriè dictum. **4.** Excrementa alvi. Ut *Lauremb. in Coll. Anat.* habet. Quandoque & *Stomachus* vocatur, quæ tamen vox parti ejus propriè magis competit.

Dentiumque molitione præparatus] Ciborum hæc in ore præparatio quâ ratione peragatur alibi plenius.

Albicanti cremori similem] Chylum semper candidum esse minimè verum esse, quin ex rubris assumptis rubrum, ex viridibus viridem &c. observavit primus oculatissimus Anatomicus *Joh. Walæus*, comprobant quotidianæ corporum dissectiones.

Convertit] Sano sensu hæc locutio *Veslingii* acci-

chylum prisci nuncuparunt. **CONSTITUITUR** è Triplicis *membrana* complexu, quo diduci recipiendo cibo possit, eodemque digesto rursus adduci. Membranarum *exterior* communis dicitur, & peritonæo accepta refertur; quæ situ *media*, carnosior est, ut caloris plusculum possideat: *intima* nervosior, palatoque pariter inducta conspicitur. Hæc *rugis* quibusdam inæqualis, ad facilem cibi amplexum, & ne succorum acrium morsu promptè vexaretur, mucilaginosâ veluti crustula munienda fuit. *Fibrarum* in media, intimaque tunica singularis varietas occurrit, in orbem, obliquum, rectum exporrectarum, quas ut præcipuè robur harum partium, sic multiplex in iis facilisque motus exigebat.

VENAS sumit Ventriculus partim à Venæ portæ trunco, partim ab ejusdem ramis, tam dextro, qui Mesentericus, quàm sinistro, qui Splenicus dicitur. A *Trunco venæ portæ* oritur vena Gastrica dextra, aliàs Pylorica nuncupata, quod ad inferius ventriculi orificium præcipuè spargatur. A *ramo Splenico* prodit vena Gastrica major, quæ superiorem ventriculi regionem, & superius orificium coronæ in modum cingens, Coronaria vocatur, & cum pylorica osculis aliquot sese jungit: tum Gastricæ minores & Vas breve seu Vena brevis, quæ nunc extra, nunc intra lienem ipsum, à splenici rami superiore propagatione, versus ventriculi fundum protenditur, sæpe non simplex, sed multi-

COMMENTARIUS.

accipienda est, nil enim magis falsum, quam Ventriculum Cibus in Chylum convertere, similiter ac Ollam materiam contentam convertere in Jusculum asserere absurdum omnino esse constat. Conversio autem hæc Cibi in Chylum res plena difficultatum est. Paucis quid nobis de eâ videatur, in Medicinâ nostrâ exhibuimus, alibi exhibebimus plenius.

Palatoque pariter inducta] Non palato solo, sed omnibus oris partibus. Hinc quæ palato partibusque vicinis grata sunt atque amica, etiam Ventriculo grata sunt, & contra quæ iis ingrata & inimica, ab illis etiam abhorret Ventriculus. Hinc ex labiis trementibus futuri vomitus signa petuntur.

Ad facilem cibi amplexum] Rugosa est ac veluti villosa, non tam ad retentionem Chyli, quam fomentationem caloris, fortè & ampliationem & robur majus.

Ut præcipuè robur harum partium exigebat]

Sicut sportulæ quo pluribus intexuntur viminibus (verba sunt *Hichmori*) eo fortiores redduntur.

Vas breve] Ita dictum quod brevissimo tramite à Lienis viciniâ ad Ventriculum tendat. Hoc in rerum naturâ dari negat *Æmil. Parisan. lib. 4. subt. micr. exer. 2.* sed ligamentum subtile esse docet. Ligamentum id dicere nugarium, autopsiæ contrarium, ut pro separato à gastricis minoribus diverso vase id venditare, nil causæ habemus, nisi nomina authoribus usitata retinere omnino constitutum, eademque abrogare religio habeatur. Ut vena ita & arteria datur, variè divisa.

Nunc extra] Quod frequentissimum est.

Versus Ventriculi fundum protenditur] Usus hujus vasis variis varius, Melancholicum succum ex Liene per idem ad Ventriculum, vel etiam Chyli portionem tenuiorem ex Ventriculo ad Lienem deferri, Humorū motui natu-

multiplex: denique Vena *Gastro-epiploica* sinistra, quæ ab inferiore venæ splenicæ propagine, cùm ad ventriculi fundum sinistrorsum, tum ad omentum spargitur. A *Mesenterico* ramo oritur *Gastro-epiploica dextra*, quæ & ipsa partim ad fundum ventriculi antè, & posterius, partim ad omentum diffunditur, & sinistram *Gastro-epiploicam* osculis pariter excipit. Atque has omnes *Tabula capitis sequentis Figura sexta* delineatas intueri licet.

ARTERIÆ ventriculi ab arteriæ magnæ ramo *Cæliaco*, ejusque cùm dextra, tum principuè sinistra propagine productæ, venis enarratis veluti conjugibus sociantur.

Spiritum animale NERV I conferunt, à Sexti paris externo ramo, tam dextro, quam sinistro, copiose ad superius orificium præcipuè deducti. Hinc sensus ille tam promptus, tam exquisitus, & cum visceribus omnibus corporis maximus ventriculi consensus. Id verò nervorum par, cum non ventriculo tantum, sed etiam reliquis in abdomine demonstrandis partibus sensum largiatur, hoc loco breviter, utiliterque describemus, publiceque porro in theatro demonstrabimus.

Oritur

COMMENTARIUS.

naturali, & experientiæ, omninò repugnat. Infervire illud similiter ut aliæ gastricæ huic vicinæ sanguinis à Ventriculo ad Ramum splenicum reductioni credo, ut Arteriam brevem cum sanguine & Spiritu vitali Humorem acidum Ventriculo, præter gastricas alias, adferre putamus.

Multiplex] Quatuor ejus ramos in Anatomie publica aliquando ostendebat *Joh. van Horne*. Sex observasse se scribit *Rolfinckius*; quid nobis de numero ejus videatur ex dictis satis patet.

Arteriæ &c.] Cum itaque tam multa eaque præsignia vasa habere ventriculum videamus, quis Ventriculum Chylo nutriri assereret, nisi qui arteriarum usum ignorat. Has Ventriculi arterias referari censemus in magnis illis Sanguinis vomitionibus, quarum *Zacutus*, *Hichm*, *Salmuth*, *Hippocr*, *Brassarvolus*, *Benivenius* aliique mentionem faciunt, & exempla sæpius praxis exhibet.

A sexu paris externo ramo] Præter illas, à primâ secundâque Vertebrâ dorsi emergens costalis nervus, decurrit ad fundum Ventriculi & pylorum.

Ad superius orificium &c.] Quod admirabili quâdam texturâ, à Nob. *Willis* accuratissimè descripta & delineatâ, cingunt & amplexantur. Ita verò expedit quia sedes ibi esse debet appetitus naturalis, hoc est vellicationis illius, qua excitatur animal ad quærendum fumentumque cibum & potum.

Præcipuè diducti] Rami enim Nervorum ex his quoque deorsum mittuntur ad fundum usque.

Demonstravimus] Verum locum agendi de Nervo Sextæ conjugationis, atque demonstrandi ejus progressum usque ad renes, esse in demonstratione partium Thoracicarum vult *Riolanus* anim. in *Vesling*. eò quod plexus ille Mesenterii conspici & ostendi non possit, nisi removeantur Intestina, Vena portæ quoque prius demonstrata fuerit, & quicquid faciat, totum ejus ductum & continuationem non possit publicè in Theatro demonstrare *Veslingius*, nisi aperto Thorace, & multis partibus revolutis & dissectis vel laceratis. Sanè inutilis est hæc animadversio, tantoque Anatomi co indigna; non minori enim difficultate Nervi hujus distributio in Thoracis quam Ab-

Oritur Nervus sexti paris intra cranium à principio spinalis medullæ, paulò infra par quintum, è plurium nervulorum veluti fibrarum concursu productus.

Cranio egressus, connectitur nervo septimi paris, quod linguæ, musculisque ossis hyoidis dicatum est, & utroque in latere dirimitur in Ramum Externum, atque Internum.

Externus lateris dextri ramus, postquam musculis Cervici incumbentibus primò, deinde in progressu interioribus Laryngis musculis, tum sphincteri gulæ propagines exhibuit, inter jugularem Venam, Arteriamque Carotidem, sub clavicula in thoracem delabitur, & promissis aliquot furculis denuò unitis, nervum constituit Recurrentem dictum, quia circa arteriam subclaviam, juxta latus dextrum Arteriæ asperæ fursum recurrens, tum in ipsam Tracheam, tum in musculos Laryngis spargitur. Hinc progressus, eductisque ad Pleuram, & Pericardium ramulis, non tantum ad Pulmonum externam tunicam, sed asperæ quoque arteriæ Bronchos in Pulmones abeuntes multis furculis porrigitur. Tandem Stomachici nomen adeptus in duos se jungitur ramos, & cum gula diaphragma penetrans, superius ventriculi orificium reticulato plurium nervulorum contextu implicat, & Jecori pariter ramulum largitur.

Internus sexti paris in latere dextro ramus fibras suas oblongâ, rubraque sed callosa substantia circumfusa roborat, progressu vero per anteriora cervicis, dum plexui sese applicat, qui ex cervicalibus nervorum

COMMENTARIUS.

dominis partium examine demonstratur, cum vel tyroni Anatomæ constet, demonstrationem eam institui non posse, multò minus exactè & completè tractari, nisi in subiecto unico ad ejusmodi examen ordinato, *Veslingio* autem animus fuit ea indicare quæ in quavis corporis cavitate, etiam in unico subiecto, observari possunt.

Nervus sexti paris Nominatur par ambulatorium, vagum, quia non determinatur ad specialem aliquam partem, sed per omnia viscera vagatur, vix enim in Thorace & infimo Ventre pars dari potest, præter Diaphragma, quæ non de eo participet.

Cranio egressus Per foramen ossis Sphenoidæ, per quod Venæ jugularis internæ ramus ascendit. Sed de hoc Nervo, ejusque

verâ distributione ac divisione consulat Lector Clariss. *Thomam Willis* in eruditissimo *Tractatu Anatomæ Cerebri & Nervorum*.

Recurrentes Dicuntur & hi Nervi *Currentes*, *Recurſivi*, & *Retrocedentes*, imò & *Vocales*. Illud ipsis nomen competit, quod haud secus ac equi in campis currant & recurrant; Hoc verò, quod virtutem ac spiritum vocis modulandæ necessarium deferant; quod si cuiquam dubium est, vario modo Nervos hos tractet manibus, animadvertet namque varias vocum differentias exsurgere, imò liget, & vox imminuetur, quæ vinculo soluto redibit, omni modo abolita manens, si refecentur. Etiam hæc egregiè declarat *Jul. Cass. Placentinus lib. 1. de Organis vocis cap. 8.*

rum paribus constituitur, furculis ab iis eductis, callosique denuò corporis accessione crassescens, ad thoracem deferitur, in quo sub pleura membrana, juxta costarum radices descendens, assumpto à singulis intercostalibus nervis furculo, (unde & *costalis* nomen obtinuit) tandem superato diaphragmate, demissis ad Mesenterii orgines aliquot ramis, juxta cum altero interno socio sibi ramo *plexum* producit *nerveum*, callosis, ganglioque similibus corporibus varie stipatum; à quo per dextram mesenterii regionem copiosi nervi ad Intestina, tum ad Omentum, Jecur, Cystin felleam, Renemque dextrum furculi excurrunt. Reliquum ejus, quod à plexu liberum, partim in Os ipsum sacrum absumitur, partim ad fundum Uteri, Vesicamque dextrorsum dispergitur.

Similem in modum per latus sinistrum pectoris, atque abdominis, nervus sexti paris distribuitur. Nisi quod *sinister externus* ramus Recurrentem suum sub trunco deorsum inclinantis Arteriæ magnæ reflectat, propaginem item insignem ad Pericardium pluribus furculis diffusam, & Cor ipsum educat. Denique partim per se, partim stomachico dextro unitus, emissio prius ad Jecur singulari furculo, ad plexum Mesenterii nerveum contendit. *Sinister etiam internus* sexti paris ramus, veluti dexter, partem enarrati plexus componit, à quo per sinistram mesenterii regionem ad Intestina, Lienem, Renemque sinistrum nervi feruntur; quod extra plexum superest, ad Os sacrum Uterique fundum, & vesicam sinistrorsum demittitur.

Ab hoc tam mirabili nervorum pari ad Ventriculum revertimur, cujus in homine **SIMPLEX** tantum structura, & **MAGNITUDO** medio-

COMMENTARIUS.

Cujus in homine simplex tantum structura] Numero unicus est in homine, *Riolanus* tamen bis duplicem observavit, continuatum, sed ore angusto interscissum. Idem in foeminâ Wittebergenâ *Sperlingerus*. Sacculum lapidibus refertum Ventriculo adnatum vidit *Helmontius*.

Magnitudo mediocris] In iis nempe qui parvè & frugaliter vivunt. Varia alias prout homo variè vivit. Plerisque namque ejus est amplitudinis, ut sesquialteram capiat, qui verò helluones potatoresque se præstant, tantæ, ut vel duas cum dimidiâ stopas capiat; imò vidi Cl. Dom. *Ad. Falcoburgium*, Anatomicum diligentissimum, in publico Theatro coram

tudine auctâ substantia ventriculi maximè attenuatur, unde cruditates, chylicationis læsæ effecta, quo enim crassior ejus substantia eo coctio fortior, quod avium ventriculi docent, qui legumina durissima conficere valent. Optimè tamen *Higmore* annotasse judicamus, eum si eximatur & infletur, multò majorem esse quàm in Corpore esse possit. Variat tamen & hæc Ventriculi interior capacitas ratione Sexus, Viris enim ordinariè major est quam foeminis, ne aut imbecillior earum calor ciborum copiâ gravetur, aut denegetur locus utero foeto. Vidi cum Medico summo *Joh. Waleo* virum quendam, cujus Ventriculus cum tota intestinali fistula adeò distendebantur, ut situs eorundem & compressio

mediocris : multiplex in animantibus , quibus cibi duriores conficiendi erant.

Distinguitur in *Fundum* , seu cavitatem , & *Orificia* duo : quorum quod læviorum , superiusque deprehenditur , propriè *stomachum* nuncupant majores , & fibris in orbem remeantibus , nervisque plurimis pertextum est. Crassitie item , & magnitudine conspectius , appetitus naturalis cibi sedes habetur. Quod

C O M M E N T A R I U S .

pressio exactè videri potuerit , maximè siquidem , licet summo conamine fieret , cochlear unum alicujus liquoris deglutiret , cujus rei causam nil nisi flatus judicabat , ex fermentatione in Ventriculo à copia nimia humoris acidi excitata.

Multiplex in animantibus] In animalibus quæ in utraque maxilla dentes habent incisivos unicustantum est ventriculus ; In pennatis nonnullis duo sunt , in nonnullis tres , unus membranæus , *Ingluvies* Latinis dictus , recipiens tantum alimenta ut inde leviter cocta seu macerata pullis exhibeantur. Alter & carnosus valde est & calidior , intus habens membranam duram , quâ recipitur alimentum durum. Tertius ubi adest , pariter carnosus est. In Ruminantibus Cornigeris & altera maxilla dentatis quatuor sunt ; Venter primus , Reticulum , Omasus , & Abomasus. Venter & pars ejus Reticulum crudo cibo custodiendo dicantur , Omasus ab Ore immediato tractu pabulum suscipit , si tenue sit , si crassius prius ruminatum , ab hoc brevi mora in Abomasum labitur. In Cetaceis piscibus triplicem notavit Cl. Barthol. ut in Tursione aliisque , sed ita coherentem , ut loculi potius sint , foraminulis invicem pervii.

Fundum] Fundus est totum corpus Ventriculi , receptioni adsumptorum conveniens , quò globosius & capacius in sinistris , sensim dextrorsum se in modicam longitudinem & angustiam diffundit , quo egredientem chylum perpetuo amplexu comitetur , & caveat ne quid non benè confectum excidat. Videtur exemplo Regiomontani cultrivori probari posse dextram partem hujus fundi facilius ubi fanciata consolidari posse sinistram , at meo judicio incerta ea probatio , cum id tantum speciale sit.

Superiusve] Ex Orificiis aliud superius dicitur , aliud inferius , non quod non utrumque

sit in parte Ventriculi supremâ & eadem diametro , ut quidem antiqui crediderunt , sed quod per illud Cibus in fundum inferatur , per hoc Chylus ex eodem efferatur.

Stomachus] Stomachi vox ambigua omnino est , denotat enim quandoque integrum Ventriculum , ut cum *Celsus* inquit : *Imbecilles Stomacho , quales maxima pars literatorum sunt*. Quandoque superius tantummodo Ventriculi orificium , quia ut putant viri docti in illud Stomachus seu gula definit.

Fibris in orbem remeantibus] Videtur natura carnosis Fibris circularibus orificium hoc ita donasse , quo fortior & arctior contractio & occlusio ejus fieret , adeoque sic inhiberetur non solum alimenti regurgitatio in gulam , sed & vaporum atque fuliginum ex Ventriculo ad Cerebrum & Os adscensus , qui aliàs conferret plurimum ad Chylificationem promovendam ; imò promoveatur Chyli ad pylorum motus , qui aliàs æque facile per orificium sinistrum ejusdem cum pyloro altitudinis , exiret , uti observamus fieri cum oleosa & pinguis adhibita sunt , & hinc liquor aliquis adsumitur , hic enim compressus à Ventriculo facile per laxatum ab iis orificium superius exit , vomituque rejicitur. Et hic etiam factum videtur quod Nervis adeò orificium hoc munitur , quorum opus constrictioni partis inservire.

Magnitudine conspectius] Quo alimenta quandoque majori quam par est magnitudine deglutita viam invenirent. Vicinius est undecimæ vertebræ thoracis quam cartilagini ensiformi , ut adeò in ejus affectibus Topica posteriori regioni potius quam anteriori applicare velint multi , quibus non accedo.

Appetitus naturalis cibi sedes] Appetitus hujus , hoc est vellicationis illius quâ excitamur ad quærenda sumendaque alimenta Causa efficiens quamquam videatur admitti debere alio loco traditur.

Quod dextrorsum vergit, inferius orificium *Pylorum* veteres, five *janitorem* vocarunt, cum per hoc digestus jam cibus, veluti portam, & intestina proxima deferatur.

Frigidum siccumque ventriculi **TEMPERAMENTUM** circumfistentium viscerum calore mitescit. **FIGURÆ** similitudine utricularem musicorum tibiam exprimit. **COLLOCATUS** est à provido architecto, parte sui ampliore magisque sinuata, in hypochondrio sinistro, sub diaphragmate, parteque dextra jecori, sinistra verò lieni committitur.

COMMENTARIUS.

Pylorum s. *Janitorem*] Cl. *Mœbius* pag. 146. censet pylori genuinum officium magis esse chylum attrahere, eumque ad intestina amandare, quam claudere Ventriculum cibumque ceu in carcere custodire, ex eo maximè quod ejusdem sit cum priore altitudinis, sic ut non necesse videatur pessulum ostiolo isti ad eludendam hospitii recepti fugam objicere.

Pylorus] Scirrhum omninò pylorum reperit in quodam *Phil. Salmuth. Cent. I. Observ. 20.* qui continuis vomitibus afflictus fuerit, & cibos assumptos ob transitum chylo interclusum rejicere statim coactus.

Inferius orificium] Orificio huic præter fibras transversas, quas in tunica media possidet, sphincter quasi aliquis datus est, qui ab *Hichmoro* pro valvula crassa & densa habetur. Valdè dilatari potest, quemadmodum & superius, hinc varia exempla testantur sæpè deglutita fuisse & per vomitum aut secessum reddita quæ oppido magna fuere, ut Annuli, Nuclei, Lapilli, Ferramenta, Ranæ, Lacertæ, Serpentes, Anguillæ, Nummi, &c. de quibus inter alios *Barthol. in observ.*

Ad intestina proximè deferatur] Hæc Chyli ex Ventriculo in Intestina deductio per pylorum quàm maximè ratione peragatur videretur commodè explicari posse, si dicamus, sensim sese Ventriculum pro ratione Cibi qui exit constringere, ut semper cibo sit proximus eumque amplectetur, quo ergò plus exit cibi, eò plus constringi Ventriculum, dum autem Ventriculus constringitur, cibusque liquidus est, quàm data viâ exire, hæc per pylorum est, non enim aperit se pylorus, sed semper potest cedere cibo transeunti, imò nunquam totaliter clausus est, quod facilè quis explorare potest, si faciat foramen in vicinia, & digitum sensim immittat, absque tamen vi,

sentiet manifestam apertionem, quæ est instar cavitatis straminis, ut adeo facile sit ipsi Chylo, non modo formâ halitus, sed & liquoris, per pylorum exire; Nec opus est ut crassiora, necdum cocta dimittat, ut objicit *Riolanus*, quum angustam viam penetrare nequeant.

Frigidum siccumque &c.] Non probatur ista scriptura de Ventriculo *Riolano anim. in Vesling.* eò quòd Ventriculus potius carnosus, quam membranofus sit, adeoque ejus temperamentum nativum non mitescat calore viscerum circumstantium, sed foveatur, & augeatur ad coctionis officium. Cui reponimus, Ventriculum minimè carnosum dicendum esse, licet fibris variis præditus, quantitas enim tunicarum quantum in eo excedat quantitatem fibrarum quis non videt? Imò *Vesling.* dum frigiditatem ejus mitescere docet circumstantiarum partium calore, annon calorem ejus foveri & augeri probat? Nec tantum temperies illa frigida mutatur à carneis fibris, verum & ab omnibus iis quæ calorem ipsi adferre possunt.

Exprimit] Præcipuè si Oesophagus & portio aliqua intestinalis fistulæ eidem conjuncta relinquatur.

Collocatus est] Præter naturam est, cum in thorace, cujus rei exempla habet varia *Barthol. obs. anat. cent. 6. hist. 55.*

Sub Diaphragmate] Adeò ut ipsum Diaphragma tangat, nimisve repletus impediendo Diaphragmatis motum Asthma causet.

Parteque dextrâ Jecori] Jecori committitur triplici maximè ratione. 1. Arcetissima vicinia, quoniam jecoris sinistra pars immediatè eum tangit. 2. Vasorum communione. 3. Eàm connexionione ligamenti cujusdam tenuis seu fibrillarum membranofarum ope, licet hoc ligamentum sæpè deesse observetur.

Sinistra Lien] Id similiter tribus modis fit.

1. Lien

mittitur. Inferiùs annato sibi omento fovetur : posteriùs pancreate veluti pulvillo subnixus.

Orificio superiore circa duodecimam, imò ipsam undecimam thoracis vertebram gulæ; dextro autem, sive inferiore, duodeno intestino CONTINUATUR. Atque hoc quidem medio hypochondriorum spatio, quo loco introrsum nonnihil sinuata mucronata pectoris cartilago cavum pectori anteriùs subjicit, quod *foveam cordis* vulgus nuncupat.

Hic frequentes ventriculi *dolores* occurrunt, quos superiori ejus orificio sive stomacho frustra imputamus. Oriuntur illi ab acribus, corruptisque vel cibis, vel excrementis, circa pylori angustias obhærentibus, aut è cysti fellea huc projectis. Quibus non exiguam molestiarum partem addunt pancreatis propiùs pyloro conjuncti variæ affectiones, nec non mucronatæ sterni cartilaginis vitia, sive introrsum mucronem detorqueat, sive extrorsum eundem protollat,

Jam GULA, quam & OESOPHAGUM appellant, quamvis aptissimè cum aspera arteria, pulmonibusque demonstretur; attamen

COMMENTARIUS.

1. Lien sinistræ parti Ventriculi accumbit.
2. Vasa habet cum Ventriculo communia, &
3. Concava pars lienis sæpe per ligamentum membranosum connectitur cum parte sinistrâ Ventriculi.

Inferius Omento fovetur] Imò & intestino Colo, cui alligatur, Omenti beneficio.

Posterior pancreate veluti pulvillo subnixus] Anterior etiam Abdominis partes sunt, quæ non parum ad caloris conservationem in eo conferunt, at cum eæ haud adeò crassæ sint, à frigore eâ parte quam facillimè læditur, ut adeò sanitati suæ pessime consulant, qui Ventriculi regionem externis non satis muniunt, ab omento enim non multum imò nihil sperare licet, utpote fundo saltem adnatum. Anterior aliquando caloris non parum adfert Vena umbilicalis pinguedine multa sæpe scatens.

Circa duodecimam Sc. vertebram] Vertebrae hæc ultimis dorsi, imò primæ lumborum cohæret etiam sæpe Ventriculus mediante ligamento membranoso, quod cum peritonæo continuatum est, licet non in omnibus hominibus reperiatur.

Foveam cordis] Sub cordis foveâ dicta exactè situm esse volunt orificium Ventriculi superius, propter tenerrimum consensum

cum corde *καρδία* priscis, hodieque Cor vulgo nostro dictum, quod verum in omnibus esse experientia manifeste negat, quæ docet fere altius id adscendere, & aliquantum lateraliter.

E Cysti felleâ huc projectis] Quas per vias hoc fieri queat necdum mihi constat.

Gulæ] Latinis Gula invenit Græcam appellationem ait Scalig. com. in lib. I. histor. anim. cap. 18. text. 168. Quippe à *curvitate* & *cavitate*, ut *γύαλος* quod poculi genus apud Megarenses fuisse annotavit Athenæus, de *cavitate* nota res est, de *curvitate* ex situ noscenda, ut Lindanius *Physiol.* p. 42. habet. A Gulâ gulosi vocantur nimium voraces. Belgis *eene Geul* appellatur, quasi diceret Gulam. *Cælius Aurelianus* viam Stomachi & Ventris appellat, *Lactantius* fistulam cibariam; addimus nos & bibariam dici posse, hinc nostris *de Biersnaer* vocitatur, & quidem *eene Snaer*/quoniam ex Oesophago seu Gulâ similiter ac intestinis fides instrumentis musicis conficiuntur, qui Belgis *Snaeren* dicuntur; *eene Biersnaer* autem, quia cerevisia non minus ac cibus per eam ad ventriculum demittitur.

Oesophagum] *οἶσος φάγω* nomen compositum ex Græco verbo inusitato *οἶσος* fero & *φάγω* edere, quasi Oesophagus ferens edere seu

men ne verbis separemus, quæ re ipsa natura conjunxit, ejus brevem hic descriptionem dabimus. Est autem ductus seu canalis, per quem cibus, ac potus ad ventriculum descendit: totidem quot ventriculus membranis COMPOSITUS.

MOVETUR circa principium suum tribus *Musculorum* paribus, & sphinctere sive constringente particulari, ut deglutitionis actio perficiatur. Primum par, quod *Cephalopharyngæum* dicitur, à capitis cervicisque confinio demissum, in tunicam œsophagi latius expanditur. Par alterum, cui *Sphenopharyngæi* nomen impositum, originem habet in sinu alæ internæ ossis cuneiformis, atque obliquè deorsum inclinans, œsophagi in latera extenditur. Tertium par *Stylopharyngæum* appellatur, initiumque ducit ab appendice styloformi, hinc carnosio teretique corpore descendens, in gulæ pariter latera exporrigitur. Ex his musculis par primum ad elevandum, reliqua duo ad dilatandum œsophagum magis comparata sunt. *Sphincter* gulæ, qui & *œsophagæus* vocatur, ab utroque scutiformis cartilaginis latere natus, & per gulæ partem posteriorem transversim expansus, adstricto œsophago cibum inhærentem deorsum compellit.

VENAS, ARTERIASQUE superius adipiscitur à Jugularibus Venis, & Arteriis Carotidibus internis: NERVOS à paris Sexti externis ramis. In Thorace, Venas à Ramo sine pari, Arterias ab Intercoastalibus, Nervos à modo propositis habet. • Circa Ventriculum denique communia superiori ejus orificio vasa consequitur.

Glandulas habet gula varias, necessariam membranis ejus humiditatem ad deglutitionem facilem administrantes. E quibus superiores ad linguæ, laryngisque latera positæ, tum inferiores in thorace, non duo, sed plures, asperæ arteriæ ramis accumbunt.

EXOR-

COMMENTARIUS.

seu cibum ventriculo, qui etiam loquendi modus Latinis non infrequens est, dum dare edere vel bibere, ferre edere vel bibere dicunt.

Totidem quot *Ventriculus* membranis compositus] Diversitas tamen hic aliqua est in tunicâ interiori, quæ hæc fibras nullas habet, sed tantum fibrosa videtur per accidens, dum extenditur in longum, similiter ac videmus linteum extensum complicari in plicas longas.

Circa principium suum] Principium Gulæ *pharinx* propriè dicitur, unde & Musculi hi,

non gulæ, sed pharyngis dicendi, uti bene monet *Riolanus* anim. in *Vesling*. De Pharyngis significationibus variis eleganter *Cl. Sneiderus lib. I. de Catharris cap. 6.*

Sphenopharyngæum] Potius massa carnea videtur quam par musculorum, divisio enim ope cultri peragitur ut bene notat *Cl. Marchette*.

Ut deglutitionis actio perficiatur] De hac alio loco.

Stylopharyngæum par] reliquis longius est, iisque profundius se dimittit.

F

Dextror-

EXORTUM ducit ab extremo faucium œsophagus, ubi laryngi conjunctus, in thoracem rectâ primùm, hinc dextrorsum, tandemque lævorsum descendens, diaphragma penetrat, & circa undecimam dorsi vertebram orificio superiori unitur.

Cæterum ut stomacho gula, sic pyloro INTESTINA continuata sunt, partes infimi ventris, ad onus ventriculi suscipiendum, excrementaque colligenda, atque eliminanda comparatæ.

SUBSTANTIÆ membranosa constitutione ventriculo paria sunt. *Tunicam* enim possident *communem*, pinguedine mesenterii, ad caloris conservationem, largiter perfusam: propriam deinde duplicem, variis fibris pertextam, quibus ut roboris firmitudinem, sic motus quoque facilitatem imputare par est: E *propriis* tunicis, quæ situ *media*, carnosior est, nervosior *intima*, *rugis*que ad complexus promptitudinem inæqualis, mucido quodam lentore, tutelæ insuper gratiâ, lubricatur.

VENIS

COMMENTARIUS.

Dextrorsum] Ad quintam Thoracis vertebram, ut cedat Arteriæ Aortæ velut hospes inquilino.

Tandemque lævorsum] Jam liberatus vertebris, quibus in suo descensu affirmatus erat, super arteriam magnam ingressus, sinistrorsum rursus deflectit.

Diaphragma penetrat] Per proprium & peculiare foramen, eorum trium quæ pro transitu Venæ cavæ, Arteriæ magnæ cum adjunctâ venâ sine pari, ipsiusque OEsophagi cum concomitantibus Nervis ventriculū petentibus, in eo condita sunt maximum.

Intestina] Intestinus, a, um, adjectivum est, & notat idem quod interius. Græcis *ἔντερος*, quod intus habeantur, sicut Lumbrici *ἔντερος* vocantur, quod in terra sint; sic bellum intestinum, quod in patria geritur. Vocantur autem ita *κατ' ἐξοχὴν*, cum & reliqua viscera intus sint, eo quod hæc omnium maxima sint & maximum locum in interioribus occupent. De variâ vocis Intestini acceptione legi etiam possunt quæ in *Coll. anat. Cl. Lauremb.* adducit.

Ad omnes Ventriculi suscipiendum] Adde & perficiendum, ut postea videbimus.

Pinguedine perfusam] Pinguedo Intestinis foris circumponitur, copiosior crassius, parcius tenuius, nequiquam verò intus ea suffarcit. sic quidem creditum est à *Laurentio lib. 6. c. 12. § 14.* aliisque variis, qui scripserunt pingue-

dinis hujus particulam abradi in dysenteria, unaque cum fœcibus ejici. *Picol hominibus* etiam usum ejus ut excogitaret laboravit anxie, quem invenit tandem esse ut lubricitate suâ excrementa promoveret. Error hic est insignis. Nullus internè in intestinis adeps, sed exterius omnis. At laniones dum interanea eximunt ex mactato animali, excussis fœcibus invertunt intestina, & ita coquo tractanda relinquunt, decepti ergò sunt viri isti, naturæque adscripserunt, quod à manibus artificum provenit. Usus autem *Picol.* excogitatum supplet mucus quo intus illita sunt intestina. Usus autem pinguedinis hujus exterius intestinis adhærentis videtur esse ut calore suo exsangvia ea corpora foveat, sicque actiones ab iis exercendas promoveat.

Proprium duplicem] Molliorem & tenuiorem Ventriculi tunicis.

Rugisque inæqualis] Nunc frequentioribus, nunc rarioribus, quo & mediæ tunicæ æquetur, & remora aliquatenus fiat Chylo per planum citius quam oportet defluxuro.

Mucido quodam lentore lubricatur] Mucus hic hunc generationis modum habere videtur. Quando intestina premunt materiam ex Ventriculo acceptam, quod tenue est exprimitur in Venas lacteas, quod crassum, ita ut lactes ingredi nequeat, retinetur in iis & fæces alvi constituit. Quod vero lentum in eâ est, & glut-

VENIS intestina gaudent numerosis, à Mesenterico Venæ Portæ ramo dextro, sinistroque susceptis. **ARTERIAS** nanciscuntur à Mesenterica superiore, atque inferiore: tum **NERVOS** à Sexti paris mesenterico plexu derivatos. Accedunt his ad chyli distributionem tenues, & numerosi *meatus*, hoc primùm seculo Asellii auspicio publicæ notitiæ divulgati: de quibus in pancreatis contemplatione plura.

LONGITUDINE intestina proprii corporis mensuram aliquoties superant, plurimisque gyris circumducta sunt, ut accepta diutius remorari, atque asservare queant.

TEMPE-

COMMENTARIUS.

glutinosum nimis limosumque ac propterea lactes intrare commodè nequit, retinetur quoque in iis, non quidem ut excernatur cum fecibus, verum intestinis adhærescit, & mucum illum constituit; non aliâ ratione, quam in omni segregatione, ubi materiam aliquam per setaceum aut linteamen exprimimus, tria dicta exinde provenire videmus, succum scil. qui linteum transit, crassum quod instas fecum remanet, & lentum quod linteo adhæret & quasi affixum est. Nec tamen solus Chylus in intestinis contentus materiam præbet huic mucò, cum observemus omnes fere alias membranas mucò quodam obduci, licet haud ita copioso, sed & ex Arteriis similiter ut omnes aliæ membranæ materiam commodam ex nutritione residuam accipiunt. Mucosa hæc substantia ex frigidis, viscidisque cibis, imprimis in senectute, concurrente coctionis debilitate nimis augetur, ut intestina repleat, chyli distributionem impediat, anorexiamque inducat. Imo adeò sæpe indurescit & incrassatur ex variorum sententia, ut evacuatâ Intestini tunicam æmulari videatur, cuius rei exempla habet *Fernelius*. Hoc tamen magis locum habere censeo in crusta carnea tunica arcte adeò agglutinata, ut instrumeto acuto auferri debeat, distincta à mucò dicto, libere huic crustæ adhærente sic ut etiam linteò auferri queat.

Tutela insuper gratia] Ne à transeuntis bilis chilivè sæpius pravè constituti acrimoniâ lædantur intestina, & sic Dysenteria oriatur.

Arterias] Tantam autem Venarum atque Arteriarum copiam in Mesenterio adesse credidit *Cl. Walens*, quo copiosior sanguis hepatis

possit adferri; addo, calor copiosius intestinis communicari. *Cl. Mæbius* existimat naturam primariò Arterias in tanta copiâ intestinis dedisse, ut in embryone excrementa sanguinis materni, quibus nutritur eo tempore, ad intestina deponerentur. Venas verò ut sanguinem ab excrementis liberatum reciperent, & ad Cor reducerent. Secundario autem, ut sanguinem ab excrementis per has vias liber et.

Aliquoties] Sexies ut plurimum, plus minus. Plerumque longitudinem 36 pedum Rhinlandicorum habent, uti non semel in Theatro publice demonstravit nobis *Adr. Falcoburgius*. *Mensuram in proprio corpore noluit definire* inquit *Riolanus* in animadv. suis, *confidenter poterat asseverare septimam mensuram æquare, vel superare*. Confidenter quid non *Riolanus* proponit, laudo *Veslingii* prudentiam, quod confidenter mensuram definire noluerit, assertio enim fallibilis omninò fuisset, ut Autopsia in variis subjectis docet, quicquid sit, tanta sane intestinis longitudo, ut cum explicata expansaque sunt, nemo non traducatur in admirationem.

Plurimisque gyris circumducta sunt] Exceptis principio & fine, ne ingressus & exitus impedirentur.

Ut accepta diutius &c.] Et hoc maximè in hunc usum 1. Quo omnis quantum possibile nutrititia materia ex Chylo commodius elici queat. 2. Ne si illico elaboretur Chylus, aliud alimentum absumere cogeremur, & ita ob voracitatem à negotiis impediremur. Hinc animalia quò rectiores ductus habent à Ventrículo ad anum, eo gulosiora sunt, quo convolutiores, eo continentiora, quod *Cabrolus*

TEMPERAMENTUM eorum frigidum & siccum sanguinis, & caloris per arterias affusi copia, tum incumbens à pinguedine fomentum demulcet.

Rotundus omnium AMBITUS, quò rectius admittant vel chylum, vel excrementa accedentia, præterlabentia verò facilius aliò transmittant.

FULCIUNTUR nonnihil subjectis ossibus, visceribus abdominis laxè connexa. Potissimum verò membranosis mesenterii vinculis firmata varios per *anfractus* undique colliguntur.

DIVIDUNTUR, ab habitudine tunicarum, in tenuia, & crassa. *Tenuium intestinorum* primum, à duodena digitorum mensura, DUODENUM Herophilo, veteribusque dictum, porum admittit felleum, ut acri transfuso liquore facultas intestinorum expultrix excitetur. Laxitate interdum, & amplitudine insigni præditum est, ut majori ventriculo minorem alterum addat, felleo meatu longius nunc protracto.

Nec tamen, si ratio nominis placet, ad primum anfractuum à pyloro occursum, sed integra digitorum duodecim latitudine determinandum

COMMENTARIUS.

in admodum voraci observavit, cui unum tantum intestinum erat. 3. Ne & crebrius dejectare alvum necesse sit, ut in animalibus voracibus contingit, quandoquidem in anfractibus illis diu delitescere excrementa possunt.

Dividuntur ab habitudine tunicarum &c.] Forſan etiam amplitudine, maximè ſi in ſætu conſiderentur.

Duodenum] Situm eſt in dextro latere ſub hepate, connexum cum pancreate. Subſtantia cæteris tenuibus craſſius eſt, ſed anguſtior cavitate, ne aut crudior Chylus, aut conſectior per ipſum tranſeat & diſſuat. Anguſtia autem hæc magis in parte ejus ſuperiore eſt ad pylorum, minus in inferiore quàm reſpicit jejunum, & ubi ductus inſeritur Cholidochus, atque Pancreaticus, ibi enim latius & amplius eſt quàm inteſtina tenuia alia. Venam habet propriam Duodenam à Venâ portæ, Arteriam ejusdem nominis à dextro Cæliaco Ramo, Nervos à Stomachicis.

Porum admittit felleum] Hic ſimiliter ac Ureteres intra membranas Veſicæ Urinariæ, inter duas hujus inteſtini membranas paulo de-

orſum excurret antequam foramine deſinat, adeo ut valvulæ loco tunica interior ſit, ut in *Tab. 3. figur. 2. f. d.* apud *Higlmorum* videre eſt. Juxta hujus pori foramen alterum ductus novi Pancreatici *Wirſungiani* obſervatur, quæ tamen interdum in unum coaluiſſe unico oſculo juncta cum aliis vidimus.

Amplitudine inſigni præditum] Largius vidit Patavii *Barthol.* & ſimile depingit *Aquapendens* ſine flatu turgidum, quale illud fuit, quod plures lapides Nucis Muſcatæ magnitudine plumbeo colore continebat apud *Trafelmannum*.

Ut majori ventriculo minorem alterum addat] Habet & hic *Riolanus* quod ſibi tribuat, duplicis ſcil. ventriculi repertionem, reprehenditque *Veſlingium*, quod omiſerit duplicem pylorum aſſe, nempe priorem ventriculum conſtringi vel in anguſtiam deſinere. Quæ ſanè ſupervacaneum eſt omnino notare, qua ratione etenim majori ventriculo hoc loco minor addi poteſt, ſine majoris ad pylorum conſtriptione, hoc ſi eſſet, non duo ſed unicuſtantum daretur ventriculus,

dum est : ne quis aut ventriculi cum janitore suo partem huic intestino largiri cogatur, aut in opinionem veniat, humanæ staturæ, partiumque corporis magnitudini, à multis retro actis seculis, plurimum decessisse. Vanam enim hanc esse, abundè convincunt antiquissima Regum in Palæstina, Vatumque sepulchra : tum in Ægypto pyramidum viæ, ac portæ : Corpora item ipsa defunctorum, à mille aliquot annis medicamentis asservata, quæ Mumias cum Arabibus hodiè nuncupamus, communem Europæ incolis staturam haud superantia.

Alterum tenuium intestinorum JEJUNUM ob vacuitatem appellatum, quam celerior in eo liquidioris adhuc chyli descensus efficit.

Ubi minor jam intestini laxitas, ILEUM incipit, tertium tenuium, à circumvolutione, ac gyrorum quibus præditum multitudine sic nuncupatum. Longitudine reliquis productius est, tum Venarum, Arteriarumque multitudine conspectus; sed & angustius, unde ruptis internis tunicis lethali vulvulo ansam præbet.

ACTIO

COMMENTARIUS.

Aut ventriculi cum janitore partem Sc.] Ut inter alios cum *Riolano* facit *Lindanius*.

Aut in opinionem veniat Sc.] Prout inter plurimos alios est *Arch. Piccolhom. lib. I. cap. 11.*

Plurimum decessisse] Dictis tamen hisce *Veslingius* noster illa quæ de Gigantum corporibus omni tempore prodita sunt, minimè destruere dicendus est, cum sermo ipsi tantummodo sit de statura corporum ordinariâ. De Gigantibus eleganter *Barthol. Observ. 98. Cent. I.*

Mumias] De Mumia vide *Barthol. observ. 62. Cent. I.*

Ob vacuitatem] Non planè, ac prorsus, ac si Chylus statim dicto ac facto delaberetur, sed respectivè, quoniam minor copia continetur in hoc, quam in Ileo, quod magis repletum est quam jejunum, aliàs enim falsissimum esset. Antiquis & maximè Poëtis *Hilla* vocatur, cujus vocis significationes varias habes in *Collectio Anatom. Lauremb.*

Quam celerior Sc.] Causa itaque hujus inactionis duplex est *Veslingio*; 1. Ipsius Chyli liquiditas. 2. Declivior descensus hujus intestini quam Ilei, quod sursum magis torquetur. Addimus nos duas alias, quarum 1. Vasorum lacteorum copia atque amplitudo. 2. Ipsorum intestinorum recentis bilis accessione lu-

bricitas. Addunt quidam, inter quos & argutus *Riolanus* ex *Galeno* viciniam hepatis, sed præter rationem, ut benè observavit *A. sellius de Lactibus cap. 19.* Deficere in foeminis falso asserit *Riolanus*, deceptus ab illis qui vel vitio oculorum non viderunt, vel repletum pro jejunio non habuerunt. Initium non habet à prima intestinorum circumvolutione, uti *Lindanius* aliique volunt, sed ab ea parte ubi mensura duodeni definit. Situm habet sub umbilicali maxime regione.

Ubi minor intestini laxitas] Quis sit finis Intestini jejuni, dici à nullo potest, imò non necessarium censemus tria Tenuia intestina accurate adeo distinguere. Locum suum maxime ad posteriora ventris habet sub Ileo.

Ileum] Barbare hoc intestinum sic vocari docet in *Coll. suo Anat. Lauremb.* latinus *Ile* dici tradens, cujus vocis acceptiones diversas exhibet.

Longitudine reliquis productius] Viginti hoc est palmorum præter propter. Incipere volunt Anatomici ubi vacuitate cessante turgidulum fit cum rubedine, definire qua valvula Coli est, finis quam certus, tam incertum principium. Situm totum subter umbilicum ad Ilia utrinque & coxas.

Ruptis internis tunicis Sc.] Observavit & *Riola.*

ACTIO tenuium intestinorum est, chylum fuscipere, atque ut perfectius distribuatur conservare.

Crassorum primum COECUM dicitur, quum exitum altero extremorum non habeat. Hoc pusillum admodum in adultis, & ad initium Coli, Ileique finem, processus instar vermiformis, propendet. Ab intestinorum tamen numero excludendum non est, quoniam in foetu excrementis semper plenum, commune crassis intestinis officium sustinet.

COLON

COMMENTARIUS.

Riolanus Phlegmonem & Gangrænosin in parte aliquâ Ilei produxisse volvulum. Imò censet *Cl. Guido Patinus* Inflammatoriam dispositionem Ilei intestini semper hunc producere morbum, adeoque plurimos evadere per venæsectionem, fatus tepidos, semicupium ex aqua tepida, & enemata emollientia. Idem ante annos 30 in auriga cujusdam Archiepiscopi, ex Volvulo demortuo, totum hoc intestinum corruptum, nigrum & gangrænâ conspersum vidisse, litteris mihi indicavit. Interdum revolvitur intestinum instar digiti chyrotecæ reduplicati, quod omnimodo obstruit viam intestini, inde vomitus excrementorum per partes superiores. Reduplicationem hanc omnino fictitiam dicit nominatus *Patinus*, quam nunquam videre potuit. At bis terrevē eam in cadaveribus dissecisti cum *Clarif. Præceptore* meo *J. Walæo* observavi. Etiam sæpissimè in scrotum decidit aut inguina unde Hernia.

Ut perfectius distribuatur] Imò & elaboretur. Intestina enim hæc tenuia non tantum distributioni Chyli, sed & licet secundariò, concoctioni ejus ulteriori, inservire, varia nobis demonstrare queunt. 1. Substantiæ cum ventriculo similitudo, 2. Vasorum copia, adeoque & Caloris atque Spirituum sufficientia. 3. Crudorum ciborum ex Ventriculo in intestina expulsio, ut sæpè in iis accidere videmus, qui exactè aded non vivunt, quæ sanè cruditās in Intestinis debet emendari, 4. Assumptorum in iis permanens sæpè constitutio, quod vulnera abdominis & intestinorum, in helluonibus maximè, abundè demonstrant.

Exitum altero extremorum non habet] *Knoblochius* quidem duplex dicit habere orificium septo membraneo discretum, ut per unum ab Ileo excipiat, & per alterum in Co-

lon traducat. Sed necdum hoc in homineprehendimus, in quo unum orificium & remittit & excipit, ut benè disserit *Bartholinus* in *Anatome*.

Pusillum admodum &c.] Longitudo est quatuor digitorum, latitudo pollicis, sed angustissima capacitas. *Riolanus* amplissimum invenisse scribit *Antropograph. suæ lib. 2. c. 14.* & ipsi ventriculo æquale *Bartholino* quoque visum. Non rarò etiam observavi cæcum hoc intestinum pugni magnitudine & amplius, cui vermiformis appendicula longitudine 2. digitorum transversorum, crassitie digiti minimi, cavitateque quantà est calami scriptorii continuata erat. Ut adeò cæcum intestinum & vermiformis appendicula in ejusmodi subjectis omninò diversa fuerint.

In foetu excrementis semper plenum] Hoc cum neget *Riolanus*, & habeat pro se rationem, ut ne temere *Veslingium* damnes, veni in rem præsentem, & crede quod vides. Ad me quod attinet, testari possum me abortum non unum dissecasse, sed rarò minus in eo excrementi observavi quam in adultis. Cæcum, inquit *Marchette*, terè semper majus est in pueris, quam in adultis, in quo fæces stabulantur: attamen non tam semper in pueris magnum est, quin & in ipsis exiguissimum observavi.

Commune crassis intestinis officium sustinet] Usum huic Intestino Varii varium tribuerunt, & adhuc tribuunt, supra Valvulam, inquit *Cl. Highmorus* *disq. anatom. pag. 28.* ad Coli initium immediate annectitur Cæcum; cujus orificium quàm proximè ad Valvulam in hunc finem apponi judicamus. Si fortè Colon flatibus aut fœcibus exsiccatis, à diuturnâ alvi adstrictione (quæ sæpius eveniunt) prematur, ne nimio illarum impetu retrocedentium violentur

COLON intestinum crassorum secundum est, amplius cæteris, & latius. *Valvulam* obtinet, restagnantium excrementorum flatuumque obstaculum, & *cellulis* collectum plurimis, moram aliquam descendentibus fæcibus necit. Assurgit circa os Ilium dextrum, proximo ibidem reni sese jungens; hinc factosub jecore flexu, interveniente Omento, Ventriculi fundo, Lieni, Renique porro sinistro connectitur. Tandem circa os Ilium sinistrum facto flexu, recti intestini principium orditur.

Vincu-

COMMENTARIUS.

letur Valvula, ac flatuum refluxu deorsum in Ileum violenter prementium, disrumpatur: adest quasi diverticulum quoddam, quò recedant flatus isti, & valvula illorum liberetur violentia. At sibi ipsi contradicere videtur, Valvulam inter Colon & Cæcum mediam statuendo, & tamen hoc flatuum Coli receptaculum ne hoc lædatur, dicendo. Cl. *Mœbius* putat genuinum hujus intestini usum esse ut si forsan ab excrementis Colon obstructum, flatus & fæces per Ileum descendentes, in cæco diverforium habeant usque dum via libera detur.

Colon] Mihi dicitur tanquam Κοίλον cavum, per excellentiam, reliqua enim licet etiam cava sint, hoc tamen omnium maximè, sive simplicem totius cavitatem confideres, sive etiam cavitatum seu cellularum reliquis denegatarum in eo copiam. Alii dictum volunt à Κωλύω retardo, quod ratione Cellularum quibus varîe extumescit, fæces transeuntes remoretur. Alii δὲ τὴν ἡγλότεραν à torquendo, quod sævissimi dolores in eo excitentur.

Valvulam obtinet Sc.] Prima hujus valvulæ inventio cui debeat, non convenit inter Anatomicos. Cl. *Bartholinus* cum variis aliis debere censet *Sal. Alberti Anatomico Wittenb.* ut liquet Appendice ad tres orationes à se editas circa finem, & ex *observ. Schenckii lib. 2. tit. de Ileo.* Sunt qui *Eaubinum* inventorem dicunt. *Riolanus Varolio* qui arte Anatomica innotuit in Academia Patavina anno 1572. potius debere primam inventionem quam *Eaubino* arbitratur. Quicquid sit de auctore, Circulus fitan. Valvula, controversiam inter Anatomicos movit. Cl. *Falcobergius* non valvulam veram, sed circulum tantum annularem, laxum admodum, ex fibrillis constantem, voluit.

Huic contrarii plurimi sunt. Utrumque esse & circulum & valvulam egregiè primus in *Theatro Anatomico Amstelodamensi* demonstravit Magnus ille *Tulpius*, cujus descriptionem in additamentis habes, ubi & figura rem illustrans addita.

Obstaculum] Aded etiam ut si aqua infundatur intestino Ileo, facile transeat ad Colon, si verò Colo, ne gutta quidem ad Ileon. Eandem penè rationem inquit *Highmor. l. 1. pag. 3. cap. 3.* in structura habet cum nassis ex viminibus textis, quæ facile ingressuros pisces admittant, nullos verò egredi permittant. Verum licet naturaliter omnem refluxum ad Ileum prohibeat, sæpè aded laxatur, ut aer Inflat in Ileum pertranseat, imò fæces, Clysteres, & glandes.

Cellulis collectum plurimis] Cellulæ revera ab antecedentium intestinorum plicis non differunt nisi laxitate. Eas autem accepit ut diutius in eo contineri possit, adeoque melius excoqui etiam duriusculum aliquod non benè prius coctum.

Facto sub jecore flexu] Ubi folliculo fellis sæpius adnectitur, ejusque tactu luteo colore tingitur. Imò & ipsam bilem hîc non tantum cavitatem ejus, sed & ipsam substantiam, ingredi vult. *Mundinus Anatomic. cap. de intest.* quam rem veram nondum invenire licuit.

Renis sinistro connectitur] Hîc fit ut sæpè dolor Colicus cum Nephritico confundatur.

Facto flexu sinistrorsum] Illinc quasi ad umbilicum adscendit, tunc ad ossis sacri initium terminatur, ita ut hæc pars suis gyris S. Romanum referat, qui anfractus non parvam remoram clysteribus injiciunt. Etiam hoc in loco à flatibus subito restrictis dolores colici sunt gravissimi.

Vincu-

Vinculum habet proprium, quo cellularum ordo continetur: *Ligamentum* item singulare, quo superis, inferisque partibus conjungitur.

Tertium crassorum intestinorum ab extensionis modo *RECTUM* vocatur. Id propria, mediaque tunica, totum quidem carnosius reliquis existit, & fibris rectis distinctum; postremum tamen ejus particularibus, robustisque *Musculis* movendum fuit, Sphinctere scilicet, & duobus Levatoribus. A quorum illo undique adstringitur; horum autem opera sursum retrahitur. *Sphincter* infimis ossis sacri partibus junctus, ano carneis, transversisque fibris latè circumfunditur. A quo neque officio, neque corpore sejunctus est tenuis musculus, in extrema podicis ora, digiti latitudine, cuti veluti impactus. *Levatores* musculi ab ossium coxendicis, sacrique ligamentis, distincta portione ad sphincterem descendunt, & in viro quidem penis radici, in foemina verò uteri vaginæ sese jungunt.

Sparguntur ad intestinum rectum *Vena hemorrhoidales*. Harum quæ *Interna* dicitur, variante subinde exortu, frequentius à ramo mesenterico

COMMENTARIUS.

Vinculum] Medii digiti latitudine, secundum ejus longitudinem, per mediam & superiorem partem excurrans.

Ab extensionis modo] Recto ductu extendi hoc intestinum respectivè tantum dicendum est, quod minus intorqueatur, quam præcedentia, & parte suâ extrema ubi podicem adit rectum omnino situm habeat. Alias enim, si simpliciter Rectum dicatur, falsum est, anteriori enim regioni ossis sacri incumbit, quod eum in finem, uti & os coccygis planum atque æquale à naturâ factum est, at hæc ossa ductum non rectum habent sed incurvum. Si tamen absolute recto ductu descendere dicere velimus, nec in dextrum nec in sinistrum inclinare latus dicendum.

Carnosior reliquis] Hinc vulneratum consolidatur præter cæterorum naturam.

Undique adstringitur] Ne nobis invitis feces excidant, sed solum voluntaria compressione exprimantur; ideo resolutus per paralyin aut hujusmodi vitia feces involuntarie excidere facit, similiter ut læso vesicæ Sphinctere lotium involuntarie effluere videmus.

Sursum retrahitur] Post excretionem; quin & sic securitatem præstant contra fœdum

molestumque prolapsum, ad quem ex se proclivis est, cum sua naturâ laxus sit. Usus horum in iis cessat, quibus clauditur anus. Talem videre *Fernelius*, *Dodoneus*, *Barthol. Rodenhuyssen* alique. Et ejusmodi homines excrementa alvina, vel per os ejicere, vel per vias extraordinarias evacuare observantur.

Ano] Anus seu podex extremum est Recti intestini.

In viro quidem &c.] Hinc maxima est illarum partium Sympathia: sic stranguria ex inflammatione Recti Intestini sæpius oritur, & exulcerato eo sæpè per pudendum excrementum rejicitur.

Vena hemorrhoidales] Ab his creditum diu profundi eum sanguinem qui magno valetudinis commodo aliis, aliis incommodo per anum exit. Alii à cognominis potius arteriis extrudi volunt. Sed sanè circulationi sanguinis prior opinio minimè contrariatur. Non enim ex venis his sanguis effluit, ad eas à superioribus partibus recta delatus, sed per arterias ad anum deductus, ubi regredi per venas tenetur, stagnat in his maximè gravitate melancholica cumulatus, hinc tandem ruptura; & excretio.

terico Portæ sinistro, nonnumquam & dextro, protenditur. Interdum à ramo portæ splenico, eoque nunc extra lienem adhuc procedente, nunc intra lienem recepto, à splene ipso, ad recti intestini tunicas vena descendente. Hæmorrhoidalis *Externa*, à venæ Cavæ ramo hypogastrico proficiscitur, & ad musculos potissimum ani motores spargitur.

Comitantur venas Arteriæ, partim à ramo Mesenterico inferiore, partim ab arteria Hypogastrica huc propagatæ. His Nervuli sese jungunt ab extremo spinalis medullæ derivati.

Quemadmodum autem Intestinatorum Crafforum commune officium est, excrementa colligere, atque ad exitum promovere, ita recti intestini proprium, eadem validè continere, donec irritata facultate expellenda sint.

COMMENTARIUS.

Interdum à ramo splenico] Vidit hoc Bartolæus, vidit & Veslingius.

Nervuli] Hinc illud tam sensile experimur, maximè in tenesmo.

Nunc intra lienem recepto] Rarissimum hoc est, & ex centenis vix semel observatur. Et licet ex Liene procederet Vena hæc, non tamen ideò sequitur per eam à Liene ad anum deduci humorem melancholicum evacuandum.

Ad musculos ani motores] Per hos non tantum intelligi volumus cum aliis Levatores ani musculos, sed & sphincterem.

Excrementa colligere] Alvina intellige, sive simpliciter ex Ventriculo eo delata ea consti-

tuant, sive simul considerentur ordinaria aut extraordinaria ad intestina delata, ut sunt humor Biliosus & Pancreaticus varique generis impuriore ex corpore toto eo defluentes.

Validè continere] Fit hoc solo Sphincteris ope, qui si propter causam externam aut internam humectetur, ulceretur, vulneretur, involuntariè fæces effluunt.

Irritatâ facultate] qualis ea sit, & quâ ratione agat nondum detectum, acrimonia fæcum irritando ad constrictionem intestinum hoc disponens, aut copia earum idem & maximè musculum sphincterem distendens, multum hic valent.



TABULÆ CAP. III. Explicatio.

Tabula Tertia Omentum, & Mesenterium Figura I. Gulam cum musculis Figura II. & III. Ventriculum & subiecta Intestina Figura IV. Tunicas intestinorum Figura V. & VI. Musculos intestini recti Figura VII. & Nervum sexti paris Figura VIII. repræsentat.

FIG. I.

- AAAA Mesenterium cum adjunctis intestinis explicatum.
 aaaa Glandula mesenterii.
 BBB Vasa mesenterii ad intestina diffusa.
 CC Coli intestini pars protracta.
 DD Omenti pars sursum latiusculè diducta.

FIG. II.

- AA Primum par Musculorum gula, seu Cephalopharyngæum.
 BB Par secundum Musculorum gula, seu Sphenopharyngæum, cum præcedente iusto profundius divisum.
 CC Par tertium Stylopharyngæum.
 DD Sphincter gula.
 EEEE Gula facies posterior.
 F Nervus sexti paris externus sinister.
 G Nervus sexti paris externus dexter.
 H Orificium Ventriculi superius.
 III Ventriculi fundus.
 K Orificium Ventriculi inferius cum annexa portione Duodeni.

FIG. III.

- AA Musculi Cephalopharyngæi antèrius conspicui.
 BE Musculi Sphenopharyngæi.
 CC Musculi Stylopharyngæi.
 DD Sphincter Gula distractus.
 E Gula interna facies.
 F Gula pars descendens.

FIG. IV.

- A Orificium Ventriculi superius filo constrictum.
 B Orificium Ventriculi inferius, seu pylorus.
 CC Tunica communis Ventriculi separata.
 D Tunica Ventriculi propria prima, quæ media.
 E Tunica propria secunda, quæ intima.
 F Duodeni Intestini portio.
 GG Intestinum Jejunum.
 HHH Intestinum Ileum per anfractus digestum.
 I Intestinum Cœcum.
 KKK Intestinum Colon.
 L Valvula in principio Coli aperta.
 M Intestini recti principium filo constrictum.

FIG. V.

- PP Tunica Intestinorum communis separata.
 Q Tunica media, prima propriarum.

FIG. VI.









- R Tunica intima Intestinorum, secunda propriarum, rugosa.

FIG. VII.

- M Intestinum Rectum abscissum.
 NN Musculi duo Levatores ani.
 O Sphincter ani.

FIG. VIII.

- N Nervus sexti paris in latere dextro. In quo
 AA Ramus externus, & major.
 a Ramus ejus qui fertur ad Cervicem.
 b Ramus à septimo pari, huic sexto parti conjuncto, qui ad cervicem fertur.
 c Nervus Septimi paris, sexto sub cranio conjunctus.
 d Ramus à septimo ad Linguam.
 e Ramus à septimo ad Musculos Ossis hyoidis.
 f Nervus à Sexti paris externo ramo, qui fertur ad internos laryngis musculos.
 gg Nervus Recurrens dexter.
 hh Nervuli plures ad Pulmonem, & Afferam arter. distributi.
 ii Rami Stomachici dextri distracti.
 B.B.B Ramus Internus sive Costalis, gangliis denudatus.
 Δ Plexus mesenterii Nervæus, Callosus aliquot corporibus stipatus.
 ll Ramus ad Omentum, Duodenum, & Fecur.
 m m Ramus qui fertur ad Renem dextrum.
 nnn Rami in Mesenterium, & Intestina diffusi.
 o Ramus qui Os sacrum adit.
 pp Extremum interni rami dextri, quod Utero, & Vesica distribuitur.
 qr Rami ab Interno dextro plexum eo latere constituentes.
 ♀ Nervus sexti paris in latere sinistro: in quo eadem literarum significatio occurrit præterquam quod
 G Est Nervus, qui à recurrente sinistro ad Pericardium spargitur, & Cor ipsum.
 ** Nervus qui à Stomachico externo sinistro fertur ad Fecur.
 ll Nervus qui ad Lienem, & intestinum Colon.
 m m Nervus reni sinistro dicatus: Reliqua litera eadem quæ in dextro latere habentur denotant.



De Mesenterio, Pancreate, Iecore & Liene.

Intestinatorum multiplices gyri ne cum discrimine bonæ valetudinis confunderentur, MESENTERII interventu cavere debuit conditor humani corporis sapientissimus.

Estque MEMBRANA duplex, peritonæo continua, glandulis, & pinguedine undique effarcta, non minus fovendis, quam in officio, situ, atque ordine continendis intestinis aptissima.

Disper-

COMMENTARIUS.

Mesenterium] *Q. μέσον τῶν εὐτεγῶν*, non quod medium intestinum sit, adeoque pars Intestini; quod *Ciceronem* voluisse falsissimum est, quicquid etiam dicat in *Coll. Anat. Lauremb.* nam dum *Cicero* dixit esse medium intestinum, non est nominativi Casus, aut accusativi, sed genitivi pluralis, & scribitur cum accentu acuto & gravi, sic ut idem significet, quod intestinorum. Sic *Virgilius*: Exoritur clamorque virum clangorque tubarum. Revera enim hæc pars non est intestinum, sed alia pars, quæ tamen medium locum habet inter omnia intestina. Et licet quis hic obijcere queat intestina suspensa teneri Mesenterio, adeoque hoc medium inter intestina situm non habere, dicimus tamen hæc ea quæ diximus minime tollere, non enim in nobis viventibus situm habet inter intestina medium, sed tum temporis maximè, ubi in dissectione Anatomicâ partium Imi ventris Anatomicus intestina manibus undique abducit. Et quid si diceremus, cum intestinus a, um, idem sit quod internus, a, um, mesenterium esse medium internarum partium. An etiam, & qua ratione *μεσάραιον* & *μεσέγαλον* appellari possit, videre licet in *Coll. Anat. Lauremb.* ubi fusè satis hac de re agit.

Membrana duplex] Ex duabus sibi immediate accumbentibus membranis contextum est, duos maximè in usus. 1. Ut eò firmius intestina supremis vertebrais, & ossi sacro annecterentur, adeoque periculum ruptionis aut lationis inhiheretur, maximè in laboribus magnis, alvi excretionem, aut partu diffi-

liori, sic ut vel omninò in ventris fundum prolaberentur, vel lori instar reduplicarentur intestina. 2. Ut spatio inter easdem medio Vasa Mesenterii innumera atque exigua tuto continerentur, ne in validis motibus rumperentur, aut ab interioribus premerentur. *Glandulis undique effarcta*] Hæc multitudine & magnitudine respondent divaricationibus vasorum, nam ubi vasa Mesenterii in majores scinduntur divaricationes, ibi etiam majores habentur glandulæ, ubi autem in minores, sic & ubi pauca vasa sunt, paucæ etiam sunt glandulæ, ubi copiosa illa, & hæc copiosiores. Notabilis omnium est ingentis amplitudinis glandula in medio Mesenterii collocata, quam *Pancreas Asellius* vocat, ab altero *Pancreate* sub ventriculo & duodeno intestino situm habente longe diversum. Ex hæc venarum lactearum originem idem deducit, eò quod ibi in unum omnes coeant, indeque tum sursum ad hepar porrigantur, sed quam falsus sit in hoc *Asellius*, ex sequentibus patebit. Usus harum glandularum, 1. Ut fissiones varias Vasorum Mesenterii fulciant, hoc est ut molliter vasa defendant & sustineant, ne in magnis motibus rumpantur, aut etiam ab incubatu intestinorum premantur. Et hæc si quandoque scirrhum patiantur, totius corporis miacies exoritur, eò quod premant divaricationes dictorum vasorum, adeoque alimentum liberum ad partes transitum prohibeant. 2. Ut suo madore intestina proluant, atque humectent; ne exsiccari atque arefcere queant, humores enim superfluos & excrementitios

Dispergitur per mesenterium *VENARUM* à Portæ jecoris vena dextra diffusarum, numerus insignis, mutuis osculis frequenter sese jungentes, antequam designato flexu tenuioribus ramulis ad intestina propagantur. Haud impar series *ARTERiarum* est, à Ramo superiore Arteriæ magnæ mesenterico, atque inferiore profectarum. *Nervos* plures ab interiorum nervorum Sexti paris enarrato superioris plexu, lumborumque medulla productos obtinet.

Quibus accensendi sunt meatus illi chylum deferentes, quos ab ejus albicante colore tinctos, *venas lacteas* appellat princeps eorum observator. Sed hi, quemadmodum à sumpto cibo, aperto animantium abdo-

COMMENTARIUS.

Imi ventris recipiunt & imbibunt, eosdemque in intestina per Arterias Mesaraicas eructant, ut adeo veluti in balneo intestina semper versentur. Sîd ut mirum non sit, frequentissime in his abscessus, steatomata, similesque oriri affectus, ut exempla notatu dignissima testantur, quæ inter alia Celebrimus Medicus *Nicol. Tulpius Observ.* 32, 53. & 34. lib. 2. nobis communicavit.

Numerus insignis] Adeo ut si quis numerare Venas hæc atque Arterias in Mesenterio velit, non centenas sed plures deprehenderit, quæ ubi ad intestinorum tunicas perveniunt, in multo adhuc copiosiores ramulos dividuntur. Quis autem usus sit tantæ hîc copiæ vasorum, antea; ubi de Omento egimus, ostendimus, eadem enim utrobique ratio nobis locum habere videtur. Egregia sunt quæ de hac Vasorum Mesaraicorum numero & distributione ad Intestinâ habet *Cl. Henricus Paulin Anat. Bilspanæ* quæ in fine his addentur.

Venarum & Arteriarum &c] De usu horum vasorum eleganter differit *Higmore lib. 1. p. 2. cap. 6.* Dicimus per Arterias sanguinem Intestinis pro nutritione commoda adferri, per Venas autem redundantem ad hepar; adeoque minus placet sententia eorum qui cum *Harvejo* Chyli deductioni ad hepar eas interfervire contendunt, cum hujus rei nulla necessitas observetur, ut variis, elegantissimis sane, documentis ostendit *Bartholinus de Lact. Thorac. cap. 3.* & Epistolâ ad *Ioh. Dan. Horstium*, observationibus hujus Anatomici additâ, sub littera C.

Nervos plures] Hos Mesenterium percurrere putamus, non ipsius Mesenterii, sed potius Intestinorum gratia; In Mesenterio enim nec motum nec sensum adeo manifestum notamus, ut illis opus habeat, quod morbi ipsius, obstructio scil. inflammatio, scyrrhus &c. testantur. Intestina contra utroque, eoque valido satis & acutissimo, gaudent; ut hæc de re eleganter differunt *Fern. lib. 6. Path. cap. 7.* & *Galen. lib. 5. de usu part. cap. 10.* & lib. 16. c. 13.

Lumborumque medulla productos] Et hos inter primam & secundam lumborum vertebram erumpere volunt; sed certè Nervis hæc Mesenterium raro admodum gaudet, frequentissimè & ferè tantum iis, qui ex sexta conjugatione proveniunt. Hæc vide de re *Piccol. lib. 2. cap. 14.* & *Cl. Willis in Anatome Cerebri & Nervorum.*

Chylum deferentes] Non ad Pancreas, Hepar, Venam cavam, aut alium vulgò creditum locum, sed ad Receptaculum Chyli noviter inventum, exindè per ductus lacteos ulterius distribuendum. Hæc de re consule primum ejus, hæc in oris, Inventorem in Canibus *Joh. van Horne* Anatomicum Leidensem exercitissimum, eruditissimo tractatu, cui Titulus est: *Novus ductus Chyliferus.* Consule & Inventorem ejusdem primum in homine, Virum Magnnm *Thomam Bartholinum* Professore Regium Hafniensem historiâ Anatomicâ de *Lacteis Thoracis* accuratissimâ. In Appendice nostrâ ad *Veslingium* ejus descriptionem delineationemque ex citatis auctoribus dabimus,

abdomine, evidenter in conspectum veniunt, transparente per tennes tunicas nivei candoris succo; ita iisdem vita defunctis, chylique distributione cessante, subtilium nervulorum, membranarumque specie sensum oculorum fugiunt.

Nec raro tamen evenire solet, ut per intemperantiam hominum, affluente per tot vasa omnium humorum copiâ, impletis supra modum glandulis, porisque chylum deferentibus obstructis, aut compressis, publica coctio detrimenta plurima patiatur: aut colluvie corruptorum, putrescentiumque succorum factâ, lentarum febrium, & contumacium affectuum aliorum, in mesenterio stabulum deprehendatur.

AMPLITUDO ejus in obesitas ingens; adacta largiter pinguedinis mole, quæ frigidum siccumque membranarum TEMPERAMENTUM, caloris uberius, ac humidi accessione lenit.

HÆRET circa supremam lumborum, tertiamque vertebra, nexu admodum firmo. Extremis verò suis intestinorum volumina colligit, atque undique sibi devincit.

PANCREAS est pars abdominis glandulosa, chylo ulteriùs atte-

COMMENTARIUS.

Evidenter in conspectum veniunt] Ut adeò merito cum aliis mirer, ab iis negari, qui oculis suis sæpius inspexerunt, cui credendum, si sensibus fides derogetur.

Hæret circa supremam Sc.] Non solum hisce vertebra Mesenterium connectitur, sed & aliis partibus, illa enim ejus pars quæ committitur Intestinis tenuibus, æque secundæ ac primæ aut tertiæ lumborum vertebra adhæret, quæ verò Intestino Recto, connectitur cum ossæ sacro. Imo nec totum Mesenterium his partibus alligatum est, sed ex parte tantum, multum enim ejus cum Intestino colo commissum, omnibus à regionibus Peritonæi Principium suum sumit, secundum quas colon extenditur, neutiquam à vertebra ipsis.

Extremis verò suis Sc.] Hæc in multas plicæ circumacta, eodem modo ut Intestina ipsa, idque eum in finem, ut crebris istis & flexuosis plicis intestinorum melius undique adhærescere queat. Atque hinc parvum licet corpusculum sit, exiguaque, & rotunda particula, tamen circumferentia connectitur omnibus omnino intestinis, quæ 36 pedum longitudinem ferè habent, quæ res adeo mirabilis est, ut vix verbis, minus artificis industria, exprimi possit.

Undique sibi devincit] Non tantum devincit intestina, sed & in ambitum vertit & circumagitur, ita ut reverà quasi in vagina quâdam duæ Mesenterii membranæ illa contineant, quod ad firmitatem eorum plurimum facit.

Pancreas] Voce composita, πᾶν omne & κρέας caro, ac si diceret corpus aliquod quantum quantum est totum Caro; ita tamen ut non excludas nervos, arterias, venas, membranasque, quæ tamen appellatio conveniens minimè est, cum non sit corpus verè carneum, sed magis glandulosum. Vocatur & Calicreas ac si diceret carnem pulchram, venustam, quia utcumque in nonnullis color ejus accedit ad lactis colorem, undè & Lactes quibusdam appellatur, rubicundior tamen colore in sanguineis præditum est, ita ut arrideat Anatomico. Lactium vox quam variis corporibus tribuatur, egregiè declarat in *Coll. Anatom. Lauremb.* ubi quatuor maxime Lactes appellari scribit, 1. piscium feminalem humorem coagulato lacti haud absimilem, in masculorum ventribus, quo ova piscium fœminarum perfusa aut acta fœcunda redduntur. 2. Loca sub umbilico pubetenus adeo delicata ut plagam ferre non possit. 3. Lactæ Venæ ab *A-*
sellio

attenuando, & depurgando, adeoque jecori, lienique præparando utilissima, antequam is nobiliore sanguinis veluti purpura imbuatur. Quemadmodum enim sanguinem ipsum, qui sætui alimento futurus, aut pro generatione ejusdem in semen transmutandus est, per varios quasi gradus, ad perfectionem sibi debitam Natura deducit: ita quem in sanguinem convertere conatur succum, non in ore tantum alterat, in ventriculo concoquit, fæcum admistarum onere sublevat; sed in hoc viscerum calidiorum vestibulo exactius quoque digerit, & ab acribus, falsisque sordibus vindicat. Itaque chylo dum is spirante adhuc animali distribuitur, copiosè perfusum est pancreas; eundemque cuspidè cultri sauciatum largiter effundit.

Suscipit chylum, susceptumque jecori subministrat, non per venas ullas, à porta descendentes, aut arterias; sed singulares ductus, quos ob similitudinem aliquam, tum conformationis, tum distributionis, *Venas Asellius* nuncupavit, easque *Lacteas*, ut superius memini, quòd candidum liquoris admissi colorem exprimant. *Longa* autem sunt, & *teretia vascula*, ex membrana tenui producta, à pancreate sursum, circa descendentis venæ portæ truncum ad jecur; deorsum verò ad intestina, minutissimis propa-

COMMENTARIUS.

sellio in Mesenterio detectæ, & 4. Intestina tenuia, ut fusus apud ipsum videre est.

Est pars Abdominis] Improperia locutio, ut jam sæpius indigitavimus, pars enim ventris imi est.

Pars Abdominis glandulosa] *Fernelius* plurimis illud scatere glandulis dicit; sed certè si accurate consideres, non judicabis quam unum continuatum corpus glandulosum, minime autem distinctas glandulas. Unde bene mihi facere censetur illi Anatomi, qui in singulari numero corpus glandulosum appellant, sine ulla partium distinctione, nisi minores globulos ex quibus coagmentatum intelligere velimus, sic enim ex glandulis plurimis constare dici potest. Et hinc etiam est quod Recentioribus è numero glandularum conglomeratarum habeatur.

Chylo ulterius attenuando &c.] A veritate abhorrentia toto hoc Paragrapho de Pancreate prolata esse, ex iis quæ de Lymphaticis Lacteisque vasis nuperrimè à *Bartholino*, *van Horne*, atque *Pequetto*, imò & ipso *Rudbeckio* tradita sunt, sufficenter constat.

Suscipit Chylum, susceptumque Jecori subministrat &c.] Et hæc Autopsiæ contrariantur, quæ nec Chylum ad Pancreas venire, multo minus ab eo Jecori subministrari docet.

Venas lacteas] Venas quidem à substantiâ; Lacteas verò à colore lacteo quem Chylo turgidæ ostendant. Harum historiam isti temporis convenientem legere potes apud *Asellium*, aliosque.

Longa autem sunt &c.] Hæc quidem hætenus pro vasis lacteis habita fuere, sed nunc Lymphæ ductuum nomine donata, revera enim lacteum non continent humorem, sed omnino limpidum, atque minus illo, qui in venis lacteis Mesenterii continetur, albicantem.

A Pancreate sursum &c. *ad jecur*] Vasa, uti dixi, hæc sunt Lympham ducentia, quæ tamen etiam non à Pancreate sursum disperguntur ad jecur, sed contra à Jecore deorsum ad Pancreas, & receptaculum Chyli.

Deorsum ad intestina] Fictitium hoc esse sensus docent, vasa enim hæc ad Receptaculum chyli feruntur.

Valru-

propagininibus dispersa. *Valvulis* prædita sunt suscepti liquoris ad intestina regressum impredientibus. Ad lienem eadem pertingere, nexus potius pancreatis cum illo suadere potuit; quam perspecta hætenus meatuum manifestorum communio: quos & delitescere necesse est, cum aqueam chyli portionem, adeoque non coloratam lieni suppeditent.

ORIGO venarum lactearum haud aliunde rectius, quam à pancreate ducitur. Arterias enim, venasque rubentes, quibus illæ compositione officioque cognatæ sunt, non à furculis, sed ampliore truncorum fundamento Natura protendit. Idem in lacteis fieri vero similis est, quarum fundamentum, & amplitudo omnis circa pancreas; ramuli verò extremi in jecore, atque intestinis.

Colligere easdem in communem aliquem Truncum, ob latitudinem pancreatis insignem, divino conditori non placuit; qui satis habuit, quemadmodum fit in nervis ad sensuum organa perducendis, illas à communi quidem scaturigine, sed distinctis intervallis emittere.

Permeant pancreas, ramus VENÆ Portæ Splenicus, & ARTERIA Coeliaca Sinistra, tum NERVULI duodeno intestino, jecori, lienique distribuendi, cum poro biliario. Venam tamen consequitur propriam è trunco venæ portæ, arterias à coeliaca sinistra, tenuique membrana, quæ mesenterio continua videtur, exterius succinctum.

Observabilis porrò in pancreate CANALIS singularis, nuperum *Virungi* nostri inventum, qui venæ structura, & specie, curiosis oculis ante imposuit. *Oritur* ab intestino duodeno, nunc in pori biliarii extremo protensus, commune obtinens orificium amplum, valvulæque extrorsum

COMMENTARIUS.

Valvulis prædita sunt] Veris vasis lacteis Mesenterii valvulæ conveniunt sursum spectantes, Lymphaticis autem ab hepate deorsum. Prorsus mihi persuadeo cum Cl. *Henrico Pauli in Anatome Anatomie Bilisanæ* lacteas venas extra intestina, seu in ipsis ramulis primum suas accipere valvulas; cum nulla fuerit necessitas ut lacteæ intus in cavitate Intestinarum valvulis insignirentur, quandoquidem chylus non debeat hîc intercludi, sed egredi, cujus regressum rugosa tunica per se prohibet. Valvulas autem has in Lacteis hærentes in cadavere demonstrare velle impossibile censeo.

Ad Lienem eadem pertingere &c.] De Vasis Lacteis Afellii minimè hæc intelligi possunt.

Origo Venarum Lactearum non aliunde rectius quam à Pancreate ducitur] Minimè sanè, sed à Receptaculo ejus.

Quarum fundamentum &c.] Dato uno absurdo dantur infinita.

Colligere easdem &c.] Eadem quæ in præcedentibus aberratio. Et certè hæc omnia de Venis lacteis à *Veslingio* tradita, in totum absona censenda non veniunt, si reputentur ad doctrinam eorum, quæ ante inventionem Vasorum Lymphaticorum accepta Anatomicis præcipuis fuit.

trorsum spectante præditum : nunc juxta porum biliarium distincto loco productus. *Porrigitur* tranversim in pancreas, brevibus quidem, sed numerosis ramulis quaquaversum diffusis. Amplior circa exortum, hinc paulatim gracilescens oblitteratur, antequam extremum alterum pancreatis contingat. Duplex interdum in homine occurrit, impari longitudine, digitique latitudine distanti intervallo juxta porum biliarium emergit.

Usus hujus canalis obscurus non est. Nam cum acrem quandam fellicque non dissimilem succum exhibeat, palam est, excrementum tale per coctionem ulteriorem à chylo separatum, allici intra hunc, atque in duodenum intestinum expurgari. Obstructo eo, atque ipso adeò pancreate retentis excrementis intumescente, tot pariter vasis compressis, & jecur, & lien gravibus damnis afficiuntur.

Cæterum

C O M M E N T A R I U S.

Nunc juxta porum biliarium distincto loco] Vidit & hoc inter alios *Marchet*.

Duplex interdum &c.] Exemplum habet *Joan. Rhodius Mamissæ Anat.* observationibus *Bartholini* addita.

Usus hujus canalis] Usus quod attinet, tam Pancreatis, quam ipsius Ductus, censem cum *Lindano* hic expurgari ordinariâ quidem lege sanguinis purgamenta crassiora, & ineptiora, quam ut domari à liene potuerint: extraordinariâ vero etiam omnem atram bilem, quam vel intemperantior victus, vel morbus peperit. *Marchet* ductum hunc Venarum lactearum principium dicendum autumat, variosque canales ab eodem exporrectos ad hepar se annotasse tradit; at erroneum est; nequiquam tale quid observare licet; videtur lymphæ ductus per transfennam vidisse. Imò quæ Pancreati *Afelli*ano competunt, vero pancreati malè tribuit. *Mœbius* haud sine fundamento putat, excrementum hocce pancreaticum, cum chylo simul cum bile misceatur in duodeno intestino, fermentationem ulterius promovere, si enim (putat) purum putum excrementum ac nullius usus esset, natura canalem istum ad intestina inferiora in quibus inutilia scybala hospitantur, non ad superiora ubi chylus in Ventriculo inchoatus expoliri debet, derivasset.

Fellicque non dissimilem succum] Bile plenum

hoc vas in Diarrhœâ biliosâ *Venetiis* vidit *Joh. van Horne*.

Per coctionem ulteriorem à Chylo separatum] Falsum hoc esse evidenter inter alios ostendit *Bartholinus in Anatom.*

Retentis excrementis intumescente] Ex eâ intumescencia non rarò etiam omnimoda ejus suppuratio & consumptio sequitur, cujus exempla vide apud *Tulpium, Bartholin.* in histor. *Joh. Dan. Horstium in observation. Anatomic. Salmuth, &c.*

Et jecur & lien gravibus damnis afficiuntur] Exemplum inter alia *Clar. Tulpus lib. 4. Observat. 32.* recenset. Et licet sæpius contingat Hepatis Lienisvè affectiones pravas malam Pancreatis constitutionem insequi, non rarò tamen contrarium evenire experientia docet. Hoc in nobili foemina nuperrime *Highmorus* observasse se in *Disquisit. Anatomicis* scribit, quæ annos retro plures Convulsionibus, Epilepsia, & Passione Hysterica laborabat, & tandem post dolores & cruciatus exquisitos obiit, aperto corpore, solum Pancreas malè affectum & ulceratum inveniebatur. Imò in cadavere profratris mei *Nicol. ab Ottinga, 14.* annorum pueri, lentâ morte extincti, à *Cl. D^{no}. Barbette*, (præsentibus *D^{no}. Matthæo Slado, D^{no}. Gerardo à Midlum, & D^{no}. Joanne Gualthero. Practicis hujus Reipubl. celeberrimis, aperti, Hepatis Lie-*

Cæterum GRANDIUS in obesis pancreas est, atque iis qui integro nutritionis officio mortem oppetiverunt, albicante COLORE nitidum, unde lactium ipsi nomen jamdudum inditum fuit. Circa jecur magis diductum observatur, à quo oblonga FIGURA transversim ad lienem sub ventriculo porrigitur.

Mirus ejusdem cum jecore NEXUS est, mediantibus vasis, meatibusque propriis, cum membrana ambiente, portam visceris circumdantibus. Hæret item arctè cum Intestino duodeno, tanquam ex eo magnam chyli portionem eliciat. Languidior cum Liene copula est, & præter OFFICIUM propositum, vasis in se receptis fulciendis, ventriculoque molliter fovendo, idoneum sese præbet.

Succedit JECUR five HEPAR, eximium infimi ventris viscus, sanguinis, spiritusque naturalis officina. SUBSTANTIAM obtinet sui

COMMENTARIUS.

nlsvè constitutio naturalis omninò observatur, cum tamen Pancreas hoc verum, non minus quam illud *Afellii* in Mesenterio, Scirrhum omninò, maximæque molis fuerit, accedente, & præter alia plurima, Intestinarum hinc inde coalitu, nec-non Gangrænâ verâ.

Transversim] Corpus est transversim situm, longitudinis unius manus longæ, sic ut extendatur à jecoris parte concavâ sinistrorsum usque ad Lienis partem concavam, si naturaliter conformationem servet. Latitudinem habet trium circiter digitorum transversorum, Crassitiem denique, quanta est circiter pollicis. *Piccolh. in Prælekt.* dicit crassitiem habere trium aut 4. digitorum transversorum, quam nunquam vidimus, nec credo ab alio visum.

Tanquam ex eo &c.] Benè tanquam dicit, revera enim nihil tale quid facit.

Vasis in se receptis fulciendis] Hæc præter dicta, etiam sunt Lymphæ ductuum Bartholinianorum plurima.

Ventriculoque molliter fovendo] Hinc lapidescens in vetulâ illâ Romanâ, primò ad quotidianum vomitum, mox atrophiam & mortem compulit, teste *Dom. Panarol.*

Jecur] Dictum sic Latinis quasi juxta cor, & quidem duplici ratione & nomine, partim à vicinâ, quod cordi vicinissimum, cum unicum & solum Diaphragmatis centrum inter

mucronem cordis & hepar intercedat, partim à nobilitate, quod æquè ac Cor nobile viscus proximè ad Cor accedat.

Hepar] ἀπὸ τῆς ἡπαρίας & ἀπὸ τῆς ἡπαρί, quod indigeat copiosissimo sanguine quo universum corpus nutrire debeat, ex antiquitus creditâ sententiâ, appellationis rationes plures vide apud *Mœbium.*

Eximium infimi Ventris viscus] Imò inter partes Principes recensitum omni tempore fuit, meritoque habetur; Quod enim *Thom. Barthol.* veteranum viscus hoc eo honore privavit, ultimasque ipsi exsequias fecit, *Tractatu de Cordis Triumpho*, & illo qui de *Vasis Lymphaticis*, tantum non est, ut ideò quia Cor magis princeps, hoc minus tale haberi non debeat.

Sanguinis officina] Si non elaboratoria, perfectoria nihilominus dici meretur. Quam autem sanguini hepar perfectionem tribuat, facile est naturam scrutanti colligere. Incrassatio est debita, Sanguis ut sit nutritivus, debuit habere debitam crassitiem & consistentiam, alias esset ineptus prorsus, talem autem crassitiem nulla pars est quæ ei magis tribuat quam hepar. Et hoc revera in hepate fieri, mala etiam ejus constitutio indicat, ubi enim calor hepatis diminutus aut abolitus est, sanguis tenuis manet, & nutriendo corpori ineptus: idem & in obstructione ejus evenire observamus quotidie; quod si ergo, ubi frustata

sui generis carnosam, sanguini recenter affuso, concretoque similem, unde Parenchymatis vox ab Erasistrato deducta fuit. In embryo tamen, juxta cum aliis partibus è spermate productis, albicat primum, sanguine tantum intra venas suas purpurascens: deinde flavescent diutius conspicitur, donec tandem similem sanguini colorem imbibat. Quamvis animantia sint, quorum jecur, ut cunque rubicundus in venis sanguis occurrat, perpetuo album, flavum, & viride conspiciatur.

Obvelatur MEMBRANA simplici, satisque parenchymati adherente.

VENAS continet ordine duplices, *Superiores*, quæ venæ Cavæ propagines, & sanguinem in amplum illius truncum, tanquam viam regiam

COMMENTARIUS.

strata est hepatis actio, sanguis tenuis manet, utique hinc sequitur, veram ejus actionem esse, sanguinem reddere crassiores. Hæc autem crassities ipsi in hepate adfertur maxime, eorum quæ tenuitatem ipsi tribuebant segregatione, quæ sunt Bilis & Aqua. Bilis segregata partim ad Vesiculam fellis amandatur, partim etiam ad ipsum intestinum. Aqua autem quâ ratione per vasa Lymphatica distribuat ad Chyli receptaculum, ex historiâ eorundem valorum petere licet. Plura de usu Hepatis vide apud *Mœbiu loco cit.* ubi varias sententias authorum, tam veterum, quam recentiorum congestit; inter alia quoque ipsum Ventriculi coctionem juvare, suavi amplexu vasa ipso contenta fulcire, motuque suo chyli è ventriculo egressum juvare statuens.

Spiritus Naturalis] Spiritum Naturalem à Vitali nullum distinctum dari jam ut ab omnibus acceptum libens præterire volumus, alio loco de eo agitur.

Substantiam obtinet carnosam] Densam quidem, attamen mollem, ut bacillo dequassari possit, & separari à vasis intertextis, sive cruda sive cocta. In piscibus nonnullis pinguedo videtur concreta, ex quâ Oleum excoquitur ad lucernas.

Concretoque] *Fernelius* speciem habere dicit sanguinis ardore tosti, exhaustoque vapore aridi & concreti, quæ sane verba nisi benigne interpretemur, falsissima omnino sunt, non enim sanguinis adusti atque aridi speciem

habet Parenchyma hepatis, sed ejus qui calore blando, humido mediocrique concrevit. Jecur varii coloris vidit in dissecto cadavere *Jac. Bontius Observ. 7. de Medic. Indorum.*

Membranâ simplici] Ortâ ab alterâ venarum membranâ, quæ cum Peritonæo eadem est. In hac Vesiculæ attolluntur Aqueæ, à quibus hydrops, teste *Platero*. Easdem in *Caprâ Barthol.* vidit albicantes numero multas, quæ dissectæ intra folliculum seu tunicam singularem ferum cum pituitâ ceu mucilagine recondebant, aliamque flavam substantiam, sive vitio naturæ, sive quod cicuratum esset animal. Vermium item intortos funiculos in aliis membranis hepatis non semel invenit.

Flavum] In Orbe pisce demonstravit idem.

Viride] In lampetra viride idem vidit.

Parenchymati adherente] In hujus membranæ parte decliviori invenisse se lapillos congestos figurâ & colore diversos, sacculo quodam ex tunica gravitate lapillorum formato longitudine palmæ, latitudine verò duodecim digitorum, contentos scribit *Anton. Benivenius lib. de abditis Morb. causis cap. 3.* *D. Math. Sladus* aciculam quandoque in anatē dissectâ invenit.

Venæ cavæ propagines] Antequam hæc in truncum unum coeant, apponuntur hinc inde in iis circuli quidam membranosi valvulis simillimi, modo crassiores, modo telarum aranearum instar rariores, quorum indicium fecerunt *Stephanus* & postea *Conringius* in hepate bubulo, quos & cum *Barthol.* invenimus

giam deducunt. *Inferiores*, eæque numero plures, venæ Portæ radices sunt; ab ejus trunco in latitudinem jecoris distracto productæ, à quo & Umbilicalis in foetu Vena confurgit, & extra jecur ampli rami Venæ Splenicæ, & Mesentericæ proficiscuntur, ad Lienem, Omentum, Ventriculum, Intestinaque omnia distribuendis venis originem præbentes. Harum inter se, tum per oscula, tum per latera frequens conspicitur *conjunctio*, quam perfectio sanguinis, faciliorque dispensatio exigebat. Venas intra jecur paucae comitantur ARTERIÆ, à Coeliaco ramo dextro Arteriæ magnæ suppeditatae: tum NERVULI duo, in ambitum visceris, & parenchyma dispersi, à Sexti paris interno dextro, externoque sinistro ramo stomachico prodeuntes,

MAGNITUDO jecoris in homine vasta, FIGURAQUE promodum rotunda.

DIVIDITUR in partem *convexam*, & *concaavam*. Illa recurvata, lævitate diaphragmati sese aptat: hæc inferior est, & magis inæqualis. Nam

COMMENTARIUS.

ad latiorum truncum spectantes, qui regressum sanguinis non tam impuri & fœculenti, quam puri, semel ad cor egressi impediunt.

Frequens conspicitur conjunctio] De Anastomosi Venarum Portæ & Cavæ varii variè, quidam sunt qui eas manifestissimas profitentur, & quidem alii in solis vasis minoribus, alii etiam in majoribus. Videatur *Harvejus*, *Vesalius*, *Laurentius*, *Bauhinus*, &, qui figurâ singularem eas expressit, *Highmorus*. Quidam obscuras dicunt ut *Bartholinus*, *Riolanus*, *Responsione ad Highmorianaceph.* dari tamen censent. Quidam dari eas revera tradunt, ut *Mœbius*, esse autem ex lusu naturæ interdum in quibusdam individuis manifestas, in quibusdam autem obscuras, poris insensibiliter ferè similes & in cadavere facile evanescentes. Quidam denique omninò eas adesse negant. Quid de rei veritate sit, inquirant mecum doctiores, probabile valde mihi videtur aliquas adesse, licet non ita manifestè se exhibeant.

Paucae comitantur arteriæ] Ut quidem primâ fronte apparet, sed si accuratius, ex observatione *Joh. Walæi*, innumeræ; Hepaticas ego dicerem. Videntur in membranâ investiente subsistere potius, quam penetrare in substantiam. Aliter tamen *Galen*, lib. 4. de

usu part. & arteriam ait unâ cum venis dividi manifeste per totum viscus. Vide *Hofman* in *com. ad num.* 224. § lib. II. var. lect. cap. 20. Rem dubiam in suspenso relinquo, usque dum magis demonstrata fuerit.

Suppeditatae] Partim ut nutrant hepar, & calore cordis perfundant, partim ut pulsu & recurrenti necessitate juvent urgeantque sanguinis ex hepate egressum ex conjecturâ *Slegelii com. de sang. motu*.

Prodeuntes] Hæc præter vasa, & (ut jam sæpius indigitavimus) Lymphæ ductus quidam à *Bartholino* nuperrimè inventa circa hepar notantur, quorum etiam historiam elegantissimo scripto Orbi litterario communicavit, ex hoc quæ ad rei intellectum facere videbuntur transferemus in *Commentaria nostra* sub finem huic operi addenda.

Magnitudo in homine vasta] Eleganter hæc de re *Glossonius Anatom. hepatis cap. 7.* In cadavere cujusdam mulieris *Tulpius* invenit Jecur aridum, atrum, exsuccum, & instar corrugati corii ita in se contractum, ut vix æquaret geminum pugnum. Vide *Observ.* 36. lib. 2. *Salrnuth* in *Observ.* in foeminâ *Lipliensis* vidit Hepar tam magnum ut non tantum dextrum sed & sinistrum occuparet hypochondrium, liene è contra vix pollicem majorem.

Nam & in *Lobulum* extuberat, & *Sinu* excavatur gemino, quorum altero bilis conceptaculum recondit, altero subjectam ventriculi partem complectitur. Quamvis hic amplior quandoque sit, totique ventriculo superius internatur, dum tenuiore veluti lobo ad lienem usque jecur porrigitur. *Fissurâ* denique singulari Venam Umbilicalem emittit, quæ adulto jam homine in ligamenti soliditatem addensatur.

TEMPERAMENTUM jecoris elaborato sanguini, caloris & humiditatis mediocritate respondet.

JUNGITUR superius Septo tranverso, Mucronatæque pectoris cartilagini per ligamentum membranofum quidem, sed validum; posterius lumborum Vertebra, peritonæi interventu; inferius Abdomini per ligamentum umbilicale cohæret. SE-

COMMENTARIUS.

jorem æquante. Videatur de magnitudine Hepatis excessiva *Hildanus cent. 2. obs. 45.*

In Lobulum extuberat] *Galenus, Fernelius*, alique multi humanum jecur in lobos distinctum esse volunt, hoc plurimi alii concoquere non possunt, & non solum *Fernelium*, aliosque ejus sectatores, sed & *Galenum* ipsum acriter reprehendunt. Et certò nisi benignè verba eorum interpretemur, falsissima sunt. Dicendum itaque judicamus. 1. *Galenum* non expresse dicere humanum hepar divisum esse in lobos, sed animalium, non enim tantum hominum, sed & brutorum animalium cadavera dissectabat, quæ maximam haberent analogiam cum homine, & propterea quoniam multa bruta sunt, ut simia, porcus, canis, &c. quorum jecur divisum est in lobos, ut vix cohæreat, de brutorum jecore hoc scripsit. Et 2. Concedamus *Galenum* hepar humanum intellexisse, similiter uti ejus faciunt patroni, error tamen nullus ab eo commissus, si enim accuratè hepar examinaverimus, reprehendemus manifestam ejus in lobos divisionem, primò namque dextra atque sinistra hepatis pars est manifestâ fessurâ divisa, deinde porta hepatis est, cui duæ prominulæ adstant partes. Et denique tertio posticâ parte protuberantem quandam partem ab hepate deorsum tendere observamus. Ut adèò revera etiam quinque in humano hepate reperire liceat lobos, quamvis in Animalium jecore manifestiores eos esse libens concesserim.

Ad lienem usque porrigitur] Sic *Fabr. Hil-*

damus Observ. 45. cent. 2. in paganâ quadam hepar tantæ magnitudinis invenit, ut lobus stomachum versus, sub costis sinistri lateris spurias transgrederetur.

Vena umbilicalis] De hac ubi de partibus foetus plenius agitur.

Sed validum] Suspensorium hoc dicitur & à quibusdam authoribus perpendiculum, ab anteriore & dextro latere recto ductu retrorsum se extendit, inhibens ne deorsum hepar concidat. Ligamentum hoc non extimæ hepatis membranæ affigitur, sed Parenchyma ipsum penetrat & communi vaginæ seu involucri Vena portæ, quæ Vena umbilicalis eidem continua est, validè annectitur. Enimvero si exteriori duntaxat membranæ adhæreret, periculum esset, ne levi aliquâ de causâ eadem à Parenchymate divelleretur, hepate præ pondere sui deorsum lato, ut *Glissonius cap. 2.* benè annotavit. Hoc laxato ultra nothas costas usque ad umbilicum interdum descendit, ut habet *Riol in Enchyrid.* Peculiariora hepatis ligamenta observavit *Rhodus*, ut tradit *Mantissâ suâ Anatomicâ.*

Lumborum vertebra] Seu potius posticæ parti Diaphragmatis circumferentiæ, prohibens quo minus in proclinatione corporis nimis antrorsum ruat.

Peritonæi interventu] Seu potius interventu ligamenti membranosi à Peritonæo producti.

Ligamentum Umbilicale] Vena est umbilicalis in foetu notabilis quidem, ast quæ in no-

SEDEM suam sub diaphragmate, costarumque cartilaginibus obtinet, & à latere abdominis dextro sinistrorsum porrectum suavi complexu ventriculum fovet.

Connectitur jecori VESICA FELLEA, redundantis in sanguine biliosi succi receptaculum.

COMPONITUR è *membranis* duabus, quarum *exterior* communis est, & peritonæo adscribitur: *interna* altera vesicæ propria, crassior deprehenditur, motus, roborisque gratiâ *omni fibrarum* genere pertexta, *mucosâ* quoque *crustâ* adversus contenti liquoris acrimoniam tuta.

VENAS fortitur à Vena Portæ, ARTERIAS exiles à Coeliaca dextra, NERVULUM à plexu Costalium singularem.

Meatus

COMMENTARIUS.

bis adultis, uti author antea dixit, in ligamentum degenerat, cujus usus eximius est in hepatis detentione, ne, dum corpus dorso incumbit, ad posteriora relabatur. Barbaris hoc notum, qui ut morti dent hominem, umbilicum articulatim secant, hinc rescant, ut sic hepar ad posteriora cedat. Hæc quidem ligamenta hepatis sunt perpetua & omnibus hominibus communia, sed præter ea dantur & quædam, quæ non perpetua sunt, sed pro diverso naturæ lusu modo adsunt, modo defunt. Tale est 1. Ligamentum membranofum, dextram hepatis partem cum dextri lateris costis spuriis seu parte Diaphragmatis dextri lateris connectens. 2. Simile in latere sinistro. 3. Jecur cum Ventriculo colligans. 4. Jecoris partem concavam cum posticâ parte Omenti conjungens.

Sedem suam sub Diaphragmate obtinet] Ab eo tamen aliquantulum distat, ne motum impediatur.

Costarumque Cartilaginibus] Dextrum hypochondrium circa costas nothas maximam partem occupat.

Sedem suam &c.] Cur hepar supremum in Abdomine locum occupet? Cur semper in dextro Hypochondrio situm sit? Et denique etiam utrum situs hepatis in dextro latere plus roboris, motuique expediendo promptitudinis huic lateri quam alteri conferat? egregiè explicat *Glosson. Anat. hepat. cap. 3, 4, 5, 6.*

Vesica fellea] Græcis κύστις χολάσις & χο-

λῆδς vocatur, quasi vesica bilem recipiens. Latinis folliculus fellis, quod similitudinem habeat cum folle.

Receptaculum] Semper enim bonam copiam fellis in se continet, & nunquam subiectum secavit, quin semper invenerit *Falloburgius*. Anno tamen 1652. *Petro de Marchettis* visa fuit vesica hæc bile destituta. Teste *Fernelio*, *Mæbio*, aliisque, quibusdam non alia mortis causa, quam quod folliculus bile exhaustus, non quod venenum bilis, ut videtur velle *Riolanus*, sed quod fermentatio Chyli non ritè sic peragi possit, adeoque Sanguinis generatio.

Exterior] Hæc parti Vesicæ ampliori extanti tantum obtenditur, pars altera enim & immersa jecori, non eget illius, inprimis si toto suo corpore ibi porosa est. Ut inter alios etiam *Riolanus* statuit *animad. ad cap. 13. lib. 8. Spigelii*.

Motus gratiâ] Ut pro bilis copiâ ampliari & corrugari queat.

Omni fibrarum genere pertexta] Affirmant & hoc Anatomici alii, etiam *Fallopium* in *inslit. Anat. cap. de hepate*. Cur ergo *Riolan. animad. ad cap. 20. lib. 6. Laurentii* dicit, explodi ab illo viro?

Mucosa quoque crustâ] Interius nempe.

Arterias exiles] Quoniam verò venis arteriisque donatur, indicio est eam sanguine, vitalique spiritu irrigari, non autem bile nutrirî, quemadmodum *Iouberto*, *Archangelo* aliisque visum fuit.

Meatus

Meatus in jecur educit peculiare, inter venæ portæ, cavæque radices diffusos, bilem prolicientes.

DIVIDITUR in *Fundum*, qua parte humilior, ampliorque; tum *Cervicem*, qua strictior est. Protenditur à cervice *Canalis* exilis, membranosis valvulis bilis recursum obstantibus præditus, qui in Porum biliarium desinit. Angustia ejus efficit, ut coercitum diutius in vesicula crassius excrementum sæpè numerosis calculis, quamvis non admodum duris, materiam præbeat, non angulosis tantum, sed etiam rotundis; nonnunquam mori fructum colore pariter, ac figura æmulantibus.

REPOSITA est vesica fellea in sinu jecoris dextro, cui superiore & media sui regione firmiter **CONJUNGITUR**.

At

COMMENTARIUS.

Meatus in jecur educit singulares, bilem prolicientes] Præter exiguos fibrillarum specie se exhibentes à vesica ad hepar transeuntes, considerabilis hic canalis singularis ex hepate ad vesicæ cervicem se extendens, in ovis similibusque aliis notabilis.

Humilior] Incumbens hæc pars Ventriculo atque Intestino colo, utraq; sæpè flavedine tingit.

Membranosis valvulis præditus] Accuratissimus hic *Glissonius* est, cap. 64. *Anat. Hepat. ubi vult* Ductum sive canalem cysticum progredi à cavitate vesicæ felleæ, biliq; indè evacuandæ (quoties vesicula eadem turgescit) abunde sufficere. Eodem tamen loco, ubi illi conjungitur, fibroso annulo donari; indeque fieri ut meatus hic valdè arctetur, adeo, ut bilis suâ sponte effluere nequeat, sed vel levi compressione facta, aut ob plenitudinem insignem. Fibrosum autem hunc anulum accenseri posse vel vesicæ biliaræ, cui præcipuè inservit; vel meatui cystico, cujus ductum angustiores reddit.

Videri itidem in eum duntaxat usum instructum, ut meatum jam dictum angustiores reddat, caveatque adeo, ne vesicula fellea quamlibet levem ob causam exinanatur. Credit exindè fibrosum hunc anulum Anatomicis multis pro valvula imposuisse. Facto enim sæpius periculo, expertum se dicit bilem, levi digitorum compressione, deorsum retrorsumque inter vesiculam & jam dictum vas fluctuasse, uti etiam inter vas hoc & ductum

communem. Quod sanè, si valvula aliqua interpõneretur, fieri nequaquam posse judicat; quippe alterutri huic motui obicem poneret.

Qui in porum biliarium desinit] Et in hunc ubi se exoneravit vesica, per meatus ejus hepatis insertos iterum repletur, sunt tamen qui repleri vesiculam censent à bile, quæ per porum biliarium descendere ad intestina nequit, à Chylo in intestino duodeno contento, impedita, sic ut ad vesiculam regurgitare cogatur.

Numerosis calculis] Leidæ in muliere dissecta ad sexaginta calculos subnigros ex vesica extraxit *Falco*. videantur *Fernelius*, *Langius*, *Cardanus*, *Hollerius*, *Fallopianus*, *Forestus*, *Barthol.* in obs. *Camenicenus* in epist. ad *Matthiol.* alique. Imo & nonnunquam vermes hic reperiuntur, teste *Galeno*, *Wierio* apud *Fabr. Hild. Observ. 60. cent. 1.*

Non admodum duris] Ita in Vesica fellis viri cujusdam generosi duos inventos lapides scribit *Fabr. Hildanus*, quorum unus zivss, alter zxiv. pendebat, *Cent. 4. obs. 44.* Similiter & calculum coloris atrii & magnitudine castaneæ aridæ in muliere nobili invenit *Antoni. Benivenius lib. de Abd. Morb. caus. cap. 94.* In Canibus quam sæpissime subflavos calculos reperi, asperos, & valdè spongiosos.

Superiore & mediâ sui regione] Quæ nempe cervicem constituit, reliqua ejus pars amplior, fundus appellata, libera præcipua sui parte extra jecoris substantiam deorsum propendet, licet illo loco ubi hepatis non connectitur undique cingatur & comprehendatur membrana-

At PORUS BILIARIUS ductus est, canale vesicæ paulo amplior, qui à jecore ad intestinum duodenum descendens bilem eò derivat. Fertur in duodenum flexu inter membranas obliquo. SIMPLEX ferè, aliquando circa finem geminus, .rarò in pylorum ipsum ventriculi protractus. Quemadmodum autem natura bilem statis temporibus per canalem vesicæ expellit, sic eandem paulatim, & quotidie, per ampliorem hunc porum, peractâ chyli distributione, cumque etiamnum peragitur, rectâ viâ secernit, ut vivorum animantium dissectio confirmat.

Bilem ipsam virus corporis pessimumque sanguinis purgamentum veteres arbitrabantur:quam & animantium non paucis deesse putabant, cùm vesiculam ejus jecori subnexam haud observabant. At verò porum biliarium animantia omnia habent sanguinea fusamque per intestina bilem. Quod si justâ naturæ lege dispositum corpus est, calidus hic atque acris humor, & chylum à putredine tuetur, & facilem excrementorum expulsionem roboratis intestinis promovet; ex quo tum firmitior valetudo, tum vita longior consequitur.

Jeco-

COMMENTARIUS.

branula hepatis, ne unquam deorsum precipitari posset, ac proinde per eam extimam membranam firmissimo etiam nexu carni hepatis connectitur; loco verò eo quo hepati conjungitur hac membrana destituitur, simplici que gaudet.

Firmiter conjungitur] Imò hæc Vesicæ superior & angustior pars in totum ferè intra sinum hepatis abscondita est.

In duodenum] Et hæc insertio naturalis est, sæpè & in Jejunum transiisse vidi in canibus.

Fluxu inter membranas obliquo] Postquam enim exteriorem tunicam penetravit inter eam & secundam, ad digiti minoris transversam distantiam, hinc ubi & hanc perforavit, inter secundam & intimam progreditur, tandemque hiatu rotundo in intestinum aperitur.

Simplex ferè] In Anate duos ductus bilarios ab hepate ad intestinum excurrentes, digiti minimi distantia à se invicem distantes, præsertim D. Shado vidimus.

Rarò in pylorum Ventriculi protractus] Hoc præter naturam & morbosum est, tales enim homines infelicitè vitam trahunt, eò quod continuo acriter infestetur Ventriculus, con-

coctioque lædatur, imò bilem sæpè cogantur evomere, qua de re videatur *Galenus* variis locis. Et hanc in Ventriculum insertionem rarum esse observavit in Canibus *Johan. Walæus*.

Ut Vivorum animalium dissectio confirmat] Videatur hac de re *Glossonius*, omnia quæ quidem de Hepate, Vesicula felle, partibusque ipsis connexis dici possunt, prolixè & eleganter aperiens. Videatur & *Mœbius fund. Med. cap. 15.*

Et Chylum à putredine tuetur, &c.] Plurimas de usu Bilis sententias ex veterum recentiorumque Schola desumptas vide apud *Mœbium cap. 15.* ubi non inutile excrementum eam esse dicit, eò quod sic non ad intestina tenuia à natura esset ablegata, ubi Chylus ultimam accipit perfectionem, sed potius ad crassiora quæ scybala sicciora continent, & stimulo pro excretionem præ primis opus habebant. Adeoque ejus usum existimat esse 1. coctionem Chyli in intestinis juvare, 2. cœu Balsamicum quoddam condimentum Chylum à putredine præservare, 3. Secretionem ejus à fecibus alvinis promovere, 4. vim expultri-

cum

Jecoris ex adverso conspicitur LIEN, five SPLEN, infimi ventris organica pars, quæ chyli partem aquosio rem quidem, sed admissâ portione terreâ lutulentam, in sanguinem commutandam suscipit.

SUBSTANTIA ejus carnosâ quidem est, jecoris tamen parenchymate omninò laxior, & spongiæ instar copiosis humoribus sorbendis apta: quibus frequentes ejusdem obstructions, tumoresque ingentes accepti feruntur

TUNICA induitur simplici, quam peritonæo auctores adsignant.

VENAS complectitur à ramo Venæ Portæ Splenico, quæ minutis in eo furculis distractæ, capillorum tenuitatem æquant. Plures tamen, & magis

COMMENTARIUS.

cem intestinorum stimulare. 5. ex opinione aliorum toti corpori calorem largiri, sanguinis, omniumque humorum motum juvare, eosdemque à putredine præservare. Quæ omnia fusius ibi declarata habes.

Lien five Splen] Unde hæc nomina dicta sint, admodum incertum est, quæcunque enim eorum notationes adferuntur, meræ sunt conjecturæ. Sic dicitur Lien esse quasi Liber, à liberando, quoniam, dicunt, dum homo sanus est, liberat eum ab omnibus affectibus Melancholicis. Vel quasi Ligen, à ligando, eo quod validè alligatus sit partibus vicinis. Vel quasi λείον à λείω lubricus, lævis, quod exterius politus sit & lævis. Splen vero conjicitur dici quasi spine, λῆν τῷ σπινὶ à macula, forde, quoniam quasi maculis sordidum est. Vel ἀπὸ τῆς σπινῆς, quod trahere dicatur Melancholiam Plura vide apud *Mœbium*.

Numero plerumque unus est, raro duo, ut notavit *Aristoteles* 4. de generat. animal. 4. *Posthius* Monipellii; & Romæ *Panarolus*. Rarius tres sibi invicem superimpositi, non tamen æque magni, ut observavit *Fallopius*, rarissime penitus deficit, ut loco dicto meminit etiam *Aristoteles*, item *Laurentius*, & *Schenkius* de Matthia Ortelio & *Hollerius* de puella, vidit & duos *Cabrolus obs.* 15. Nec deficere potest naturaliter, siquidem natura non abundat in superfluis, nec deficit in necessariis. Habet hæc *Barthol. Anat. refor.* p. 91.

Quæ chyli partem aquosio rem quidem sed admissâ portione terreâ lutulentam in sanguinem commutandam suscipit] Hac de re quid sen-

tiendum sit, in proximè sequentibus, ubi de usu lienis, declarabitur. Ubi demonstrare conabimur officium sanguificationis Lienis minime tribui posse, cum nec viæ eò tendant eam materiam adherentes, modo nempè quo id fieri Author noster tradit, nec ratio explicari queat, quâ ea mutatio materiæ aquosæ fœculentæ in sanguinem, in Liene celebrari possit; Quin potius segregationi alicujus excrementi in massa sanguineâ contenti, five utilitatem illud in corpore habeat quod probabile videtur, five non, Lienem inservire credendum ducimus.

Tunicâ induitur] Partim, similiter ac in hepate, ut membrana illa humida fragilem lienis substantiam defendat, partim ut vasorum per eam discurrentium orificia claudat.

Tunica simplici &c.] Crassissimam eam reperit corio bubulo similem *Bartholin. Obs.* 8. cent. 1. ut levi operâ manu à Parenchymate separari potuerit & exficari. Exsiccatam autem eam, quam in Musæo suo asservat, gluten siccum præ se ferrescribit. Crassam esse existimat *Mœbius* ut vim sanguinis arteriosi melius perferre possit. *Highmorus* aliam addit ab omento ortam.

Capillorum tenuitatem æquant] Quæ hætenus pro capillaribus venis habitæ fuerunt in Liene, fibræ *Highmoro lib.* 1. *Disquisit. corpor. human. particul.* 3. cap. 3. habentur, an verè judicent doctiores, mihi saltem non sit verosimile, Verba *Highmori* ob rei novitatem hîc merentur inseri. Nullo modo inquit tam variis anfractibus venæ cum arteriis impli-

magis insignes obtinet ARTERIAS, quibus maximus calor vitalis vigor debetur, easque à ramo Coeliaco sinistro profectas. NERVULIS fruitur ab interioris, sive rami Costalis Sexti paris sinistra propagine, à plexu mesenterii nerveo per exteriora tantum visceris dispersis.

MAGNITUDO lienis in melancholicis hominibus conspectior est. TEMPERAMENTUM, ob arteriosi sanguinis copiam, calidius & siccus.

COLOR

COMMENTARIUS.

cantur; nec ut in hepate venæ portæ & cavæ propagines disseminantur, & inoculantur; sed plexus illi, & inoculationes quæ in liene conspiciuntur, à fibris invicem contextis oriuntur. Fibræ hæ ab Anatomicis pro venis habitæ, quasi rami splenici essent propagines, sunt vera filamenta tenuia, valida, nullam cavitatem habentia, nec à ramo splenico, sive arteriâ originem ducentia, sed variè inter se complicatæ fibræ, quasi retia multa complicata, & connexa fuerint; utrinque tunicæ lateribus firmiter adnectuntur; ex quâ principium ducere videntur, circa quas fibras Parenchyma lienis, carnosa quædam substantia, leviter undique circumvoluta, adhæret, interjectis ubivis foraminibus plurimis, quæ Cancellos, seu vacua illa spatia, quæ retium chordis interjacent, referunt, seu foraminula illa inania in spongia, aut pumice exprimunt: & fibræ Parenchymate vestitæ, filis retium, seu partibus continuis pumicis, aut spongiæ appositis fatis adsimilantur. Mirificè inter se contextuntur, adeo ut hac in parte Natura artem suam maxime ostentare videatur; & opus tam mirandum ex industriâ confecit, ut fabulosas illorum opiniones convellat, qui membrum esse otiosum, & nullius usus affirmant.

Arterias] Hæ licet in homine paulo altius una cum Venæ furculis in substantiam Lienis penetrent, quam in brutis, haud tamen ita ut in hepate per Parenchyma ejus dispergi vult Highmorus, quod vix admiserim. Arteriam Cl. Mœbius Lieni peculiarem convenire, à cœliacâ separatam, cum Arantio, Rolfinkio, Spigelioque attribuit, sed nec in Spigelii iconibustale quid reperire possum, nec autopsiâ ipsâ

Plures obtinet arterias] Galemus passim in-

culcat hanc artieriarum multitudinem, & amplitudinem, causam ejus rei licet haud congruam adferat, uti & alibi. Antequam autem ad Lienem pervenit arteria, insignis (sic tradente Highmoro) anastomosis rami ejus superioris cum ramo venæ reperitur, ut pars aliqua sanguinis antequam Lienem ingreditur, venæ exhibeatur, ne Lien nimia ejus copia oppressus obruiatur & ab officio impediatur.

Profectus] Venis ad Lienem tendentibus valvulas inesse autopsia docet in animalibus variis, ut egregiè Cl. Highmorus demonstrat, delineationibus curiorissimis rem maxime illustrans; in homine tamen ut benè idem indicat, difficilius exhibere eas licet, cum ob membranarum tenuitatem, & in corporibus demortuis omnium decidentiam, & conniventiam, illas à venæ tunicis discernere haud possumus.

Per exteriora tantum visceris dispersis] Ita tamen ut per exteriora hîc non intelligamus tunicam parenchyma tegentem, sed & ipsum parenchyma. Etiam ad interiora penetrare oculis observare non licet. Cl. Glissonus lib. de Anat. hepatis de Nervorum in Lienem insertionem, & usu sententiam singularem exhibet, quæ examine digna.

Magnitudo Lienis in Melancholicis conspectior] Sæpius tamen etiam in aliis, licet humor melancholicus non peccat, præter naturam augetur, quale exemplum habet Vesalius, & ex eo Mœbius. Salmuth. cent. 1. observ. 21. Mœbio pag. 376. referente scæminam Lipsiensis in partu extinctam secuit, quæ licet aliàs optimâ sanitate in vitâ frueretur, hepar tamen habuit maximum, & Lienem tam parvum, ut vix pollicem majorem adæquaret. Riglanus lib. 2. Anthropogr. cap. 16. Jacobus Augusti

COLOR ex atro purpureus, atque etiam, ubi provectior ætas, plumbeus; quem chacanthino sali, in attracto liquore dominanti, non imperita conjectura tribuit.

Interiore facie *sinuosus* lien est, exteriore *gibbosus*, linguamque bubulam haud inconcinna similitudine **FIGURAT**. Quamvis neque hæc perpetua sint, cum interdum nativa magnitudine vastior; habitu firmior, lobis aliquot distinctus, sanguine recenter densato concolor, jecur alterum nou officio minus, quàm externo schemate repræsentet.

LOCUM habet lien in hypochondrio sinistro, situque paulo humilior jecore.

NECTI-

COMMENTARIUS.

Augusti Thuani celeberrimi istius viri Lienem vix unciam pondere æquasse dicit. Plura vide apud cit. *Mæbium* loco dicto.

Color ex atro purpureus] *Rubrum* in adultioribus sæpe vidimus, viderunt & ante nos *Vesalius*, *Spigelius*, *Rhodius*, album Lienem vidisse *Trafelmannum* refert *Schenkius*.

Sinuosus est] *Leviter* & paucillum tantum, partim quò commodius gibbositati Ventriculi sese accommodet, partim etiam, ut eà regione commodius vasa in se recipiat, similiter ac *Renes* habere cavitatem notamus, ubi vasa recipiunt.

Exteriore gibbosus] In circumferentia Diaphragmatis, seu ad costas spurias.

Haud inconcinna similitudine] Imò inconcinna satis, linguam humanam potius refert, lingua enim bubula nimis longa & angusta est, sed si in eodem homine linguam cum *Liene* compares, videbis similitudinem haud inconcinnam. *Riolanus* comparat vestigio seu plantæ pedis, & quidem commodissime. *Rotundæ figuræ* lienem vidit *Rhodium* Aº. 1651. Nullum est viscus quod magis suam mutat figuram.

Nativâ magnitudine vastior] Testatus sæpè *Falcob.* dissectos à se varios quorum Lien hepar magnitudine plurimum superaret. Talis fuit Lien viri illius Anno 1651. à *Bartholino* dissecti, longitudine duarum spiramarum, supra renem sinistrum ad os usque *Ichii*, ejusque cavitatem extensus, pondere 4. librarum civilium, de quo *Observ.* 50. cent. I. Talis ille cuius meminit *Vesalius* lib. I. cap. 9. Librarum 23. pondere Lienem observavit *Schenkius* l. 36. *Columbus* 20. librarum pondere Lienem vidit

lib. 15. *Anatom.* quem *Cartilago* exterius involvebat. Et refert *Collado* in adv. ad *Laurent.* c. II. de quadam *Elizabethâ*, quæ Lienem aded ingentem habuit, ut universum Abdominis spatium occuparet, quo tamen non obstante plures filios peperit rectè & exactè formatos, non sine omnium admiratione. Consule *Marcellum Donatum* de *histor. mirab.* lib. 6. cap. 8. Vidit Lienem pilæ magnitudine *Bontius* *Observ.* 7. Manus magnitudine in quodam tabe extincto vidit *O. Heurnius*. Vidimus & nos hîc Mense Januar. 1659. quatuor, & 1661. trium librarum pondere.

Habitu firmior] Adeo ut etiam in totum indurari observetur. *Dodonæus* annot. ad *Benivenium* nonnullorum qui ab *Istero* in *Afcitem* delapsi erant jecinora vidisse aded dura & lapillis undequaque plana, ut novaculâ percindi non potuerint, refert. Simile narrat & *Andreas Vesalius* in *Epistola de China ad Joachimum Roelands* de quodam viro *Senensi* cuius jecur prorsus candicans superficie constabat non lævi sed admodum inæquali, & lævibus tuberculis exasperata, anterior verò ejus pars & universa sinistra ad modum lapidis indurata. *Forestus* Lienem planè lapidosum se vidisse testatur lib. 2. de incerto *Urinæ* judicio.

Lobis aliquot distinctus] Tres vidit *Barthol.* vidit & *Joh. Daniel Horstius*. Lobos quoque observavit in sceminâ *Highmorus*.

Jecur alterum &c.] Non probat hoc *Riolanus* in *Anim.* ad *Vesling.* dissimile cum prorsus officium utriusque, diversa substantia, diversa constitutio naturalis & contra naturam, quæ differentiam utriusque visceris declarat.

In Hypochondrio sinistro] Et quidem in sola

NECTITUR parte convexa Diaphragmati, Costisque cartilagineosis, & Reni sinistro. Concava autem, sive fima, tum Omento, tum præcipue Ventriculo, & Pancreati, mediantibus vasis, communibusque membranis conjunctus est.

ACTIONEM Lienis, ex majore doctorum consensu, constituo confectionem sanguinis, aquosiore chyli portione, admistisque partibus terreis sordida. Quibus autem viis ad officinam illam feratur hæc materia, caliginosa veluti nocte natura premit. Nam Lacteos ad lienem ductus nulla hactenus observatio detexit. Per Venam etiam splenicam,

COMMENTARIUS.

parte sinistrâ Hypochondrii, adeo ut nullam sui partem extendat in dextrum latus, secus ac jecur facit. In dextro Hypochondrio Lienem, Jecur contrâ in sinistro locum, ut & singula vasa ipsorum viscerum substantiam concomitantia, in quodam *Parisiis* 1650. dissecto habuisse literis refert *Guido Patinus*.

Diaphragmati] Quod negat *Fernelius*, qui excusari non potest, nisi eum Centrum Diaphragmatis intellexisse dicamus.

Reni sinistro] Interdum tantum hoc fieri scribit *Vidus Vidius Anatom. lib. 5.* Tam firmiter ei adnatum vidit. *Joh. Dan. Horstius Observ. Anat. 10.* ut sine sectione digitis avelli non potuerit.

Actio Lienis &c.] De usu & actione Lienis cum tot inter Anatomicos omni tempore agitatae sint controversiæ, quis suam facile mentem aperire audeat? Authoris nostri sententiam, cui placet, defendendam relinquo. Placeat magis sententia *Bartholini*, aliorumque, *Walaum* celeberrimum Anatomicum qui sequuntur; humorem nempe mercurialem à massa Sanguinea hîc segregari, qui dein, eidem suo modo iterum commixtus, beneficio venæ splenicæ, portæ, & cavæ cordi redditus, ex eo ad Ventriculum, aliasque partes cum sanguine per arterias deducitur, ut fermenti naturam habens coctionibus, segregationibus, alterationibus humorum variis in partibus celebrandis interserviat. Accipere autem Lienem suam materiam à corde per arteriam splenicam; nihil omninò ipsi accedere per ejusdem nominis Venam, eò quod contrarium humorum motum, à Lienè nempe ad

Hepar, per hanc fieri notemus. Nec Venæ brevis hîc aliquam utilitatem esse, utpote quæ Lienem non attingit, sed sanguinem à Ventriculo ad splenicam venam reducit, quo sic cordi restituitur. Varias de usu Lienis sententias vide apud *Kyperum in Antropol. Lindan. in Physiol. Moebium in fund. Medicis.*

Lienem frustra conditum esse, voluisse perhibentur varii, *Erasistrati* eam fuisse opinionem vix à me impetro ut statuam. Fundamentum hujus opinionis hoc inferunt, quod Lien è corpore eximi possit, & tamen homo benè valere: quâ de re fufe satis egit *Zacutus Lusitanus de Medicorum princip. hist. lib. 2. Dubio 63.* ubi hujus opinionis sectatores varios producit, inter alios *Francisc. Rousetum sect. 4. de partu Cæsar. cap. 5. Aretæum lib. 3. de causis & signis acut. morb. c. 14. Plinium lib. II. c. 37. Plautum in mercatore, Georgium Bertinum Campanum lib. 18. Medic. cap. 1, &c.* Præter hos & alii ab aliis adducuntur, maxime *Leonardus Fioravanti* Eques & Medicus Bononiensis à *Bartholino cent. 4. hist. Anat.* Neutiquam verò absque vitæ periculo excindi posse, ob ejus cum partibus præcipuis connexionem, inter alios apertissimè demonstrant *Cælius Aurelianus lib. 7. c. 4. Vesalius, Tobias Knoblochius lib. Instit. Anat. Disput. 7. de Liene. Levinus Lemnius lib. 2. de complex. cap. ultim. præcipue omnium Joh. van der Linden Physiol. cap. 5. artic. II. Conringius lib. de Gen. & motu Sanguinis, Hichmor. Disquis. Anat. Bartholin. cent. 4. hist. 51. in Canibus tamen id fieri posse ipse vidi. Inustionis exempla varia recenset *Moebius cap. 16.* inter quæ præci-*

cam, & ab ea productos ramos nihil ad lienem deferri, abundè vivorum animantium dissectio, atque in iis instituta valorum ligatura patetecit. Arterias pariter non materiam ex qua sanguis fieri debet; sed eundem optimè confectum, spirituque vitali jam perfusum partibus corporis sumministrare.

Consentaneum tamen rationi est, Lienem per poros lacteis similes ex ipso pancreate attrahere, atque allicere aqueum chylum, quamvis ob coloris tenuitatem meatus suos haud manifestantem. Allicere eundem succum etiam ex accumbente sibi ventriculo, potulentorum, cibi-que solidioris communi receptaculo. Quibus substantiæ modus, sanguinis arteriosi ubertas, adeoque caloris vigor, nexus, situsque commoditas, & morbi quos frequenter lien patitur, fidem præbent.

COMMENTARIUS.

præcipuum, quod ipse vidit in cursore quodam, cui unà cum aliis quinque juvenibus ab archyatro Tylliano præmissa potione narcotica, & aperta prius sectione ea abdominis parte, ferro leviter candente Lien ustus fuit.

Ut abundè vivorum animantium dissectio &c.] Miratur hic *Riolanus in anim. suis*, quomodo Author noster ausus fuerit scribere contra doctrinam omnium Anatomicorum Veterum & Recentiorum, per venam spleni-

cam & ab ea productos ramos nihil ad Lienem deferri. Ego contra miror quomodo *Riolanus* talia scribere ausus fuerit, vel enim *Waleum*, *Harvejumque* Anatomici titulo indignos judicabit, vel falsa se protulisse concedet, quicquid fecerit, errorem vix excusabit. Hi enim recentiores sunt; & idem cum Authore nostro statuunt. Et quid mihi cum veteribus & recentioribus omnibus, ubi errasse eos reprchendo experientia.



T A B U L Æ C A P. IV. *Explicatio.*

Tabula Quarta Pancreatis, cum adjuncto sibi Jecore, & Liene, situm proponit: tum eorundem cum vena Portæ singularem delineationem.

FIG. I.

- A* Jecoris pars concava.
B Jecoris pars convexa.
a Umbilicalis Vena sursum retracta.
C Vesica fellea in suo situ.
D Lien in naturali situ.
EE Pancreas in situ suo relictum.
FF Vena portæ sub jecore per pancreas descendens.
G Arteria Mesenterica superior.
a a a a Rami vena portæ per mesenterium diffusi.
b b b b Rami arteria per mesenterium distributi.
HH Mesenterium ipsum membranâ superiore denudatum.
II Vasa Splenica inciso pancreate detecta.

FIG. II.

- AA* Pancreatis glandulosum corpus naturali schemate eleganter exprimit.

FIG. III.

Pancreatis posteriorem faciem, cum Liene deorsum converso ostendit.

- AAA* Substantia pancreatis membrana denudata.
BBB Canalis pancreatis noviter inventus.
C Porus biliaris canali invento conjunctus.
DDD Portio Intestini Duodeni, & Jecum abscissa.
E Orificium commune, quo porus biliaris, & canalis pancreatis in duodenum sese aperiant.
FFF Lienis inversæ facies interna.
GGG Vena, & arteria ad lienem propagata.

FIG. IV.

- AA* Jecoris pars convexa.
B Membrana jecoris ab eo separata.
CC Ligamentum jecoris septale dictum.
DD Vena cava rami ampli in jecur protensa.

FIG. V.

- AA* Jecoris pars concava sursum conversa.
B Lobus jecoris, cui se omentum jungit.
C Fissura jecoris, è qua vena umbilicalis descendit.
E Vena Umbilicalis sursum reflexa,

- F* Vesica Fellea sub jecore sita.
G Canalis cysticus.
HH Porus biliaris cum canali extrorsum protractus, cui subiecta duodeni particula, *M* notata.
I Truncus vena portæ descendens è jecore.
K Arteria Coeliaca dextra.
L Nervus à plexu nervorum costalium ortus.

FIG. VI.

Vena Portæ integra, ut publicè medicinae studiosis ostendi potuit, suos in ramos distincta.








- AAA* Truncus Vena portæ, cujus portio superior *AA* dextrorsum, & sinistrorsum per jecur deducta, Venis numerosissimis scaturiginem prabet.
A Portio inferior è Jecore descendens.
B Ramus splenicus, in majores propagines, & tandem minutas veluti fibras intra lienem sparsus.
C Ramus Mesentericus dexter.
D Ramus Mesentericus sinister.
a a Vena Umbilicalis.
b Vena Cystica.
c Vena in Pancreas porrecta.
d d Vena Gastrica dextra dicta.
e e e Vena Gastrica coronaria, sive sinistra major.
f g Vena Gastrica sinistra minores.
h Vena qua Vas breve dicitur.
i i Gastroeiploica Vena sinistra.
K K Gastroeiploica dextra.
ll Vena Hemorrhoidalis, hic à dextro mesenterico vena portæ ramo producta.
m Vena Duodeni.

FIG. VII.

- A* Lienem exhibet parte convexa spectabilem.
BB Membrana Lienis separata.
CC Parenchyma lienis nigricans.

FIG. VIII.

- AAA* Lienis pars concava vasa excipiens.
B Vena Splenica tribus ramis digesta.
C Arteria Splenica similiter divisa, antequam lienem ingreditur.



CAPUT V.

De Renibus, Ureteribus, & Vesica.

R Edundantem à sanguinis productione tenuem humiditatem providus humani corporis conditor ad RENES, Ureterumque ductus, derivandam censuit.

Constant Renes SUBSTANTIA carnosa, & densa, ne accessione copiosioris humidi assidua laxiores debilioresque reddantur.

Hos qui scrutari volet, MEMBRANAS summoveat necessum est, quibus obducuntur. Re enim vera duas obtinent. *Internam* unam, alteram *Externam*, reliquis visceribus ab extenso peritonæo communem. Hæc *adipe* perfunditur copiosa, quæ huc porrectæ Venæ, atque Arteriæ nomen fecit.

Incum-

COMMENTARIUS.

Renes] Latinis ita dicti à Græco verbo *ρέω* fluo, quoniam indefinenter serosum excrementum per renes fluit; Græcis *νέφερι* appellantur, à *νεφέν*, quoniam serosum excrementum per se traducunt, rigant, & nubibus deorsum per Ureteres depluunt.

Redundantem &c.] Seri hæc in renibus à sanguine segregatio quomodo fiat, an nempe solâ transcolatione, nullâ concurrente coctione renum, an verò mediante aliquâ coctione, non convenit inter Medicos. Sententias varias hæc de re congeffit *Mæbius cap. 17*. Ubi etiam rationes diversas adducit, quas adferunt illi, qui ad feminis præparationem aliquid conferre contendunt.

Carnosa] Et densa, ita tamen, ut vel digitis facile conteri & in pulpam sanguinolentam conteri possit, quare etiam à calculis, præsertim asperioribus, conteruntur aliquando, ut planè consumantur renes. Imò etiam à Vermibus non raro absumitur. Sic in cane ejus magnitudinis vermem vidit *Bartholin*. in Rene dextro cochleæ instar latentem, ut præter externam Renis tunicam nihil superesset ex carne. Simile omnino haud ita pridem mihi canis dissectus exhibuit, quam tunicam, vermes continentem, exsiccatam in Musæo meo reservo. Aliàs vermes canum renes sæpissimè

exhibent. *Cl. Bellini* (ut ex appendice nostrâ ad *Veslingium* hunc videre potest lector) exercit. *Anat. de usu & structurâ Renum* plurimis probare conatur substantiam Renum fibras fistulosas esse, verum transitus Seri ad Ureteres instrumentum.

Internam unam] Tenuior hæc, validissime carni connata est, ortum ducens à tertia vasorum renes petentium tunicâ, quæ, cum vasa renum substantiam sunt ingressâ, ab illis ad portas abscedens in renis tunicam dilatatur.

Externâ] Hæc externa Renum membrana quâ undique cinguntur, *fascia Renum* appellatur, & est satis crassa atque densa, laxè admodum reni adhærens, sic ut absque novaculâ solis manibus facile ab iis separari possit.

Adipe perfunditur copiosâ] Haud ita ad calorem renum augendum, ut inter alios *Mæbius* vult, quam quidem ad humectationem eorum adeoque caloris mitigationem, ad quem proni valde sunt propter arteriarum copiam, substantiæ densitatem, seri falsuginem, denique labores musculorum quibus incumbunt.

Nomen facit] Sic ut Adiposæ venæ atque arteriæ dicantur. Arteriam dextram in muliere 1649. dissecta abfuisse *Rhodius in Mantissa* habet.

Glan-

Incumbit eidem utrinque glandulosum corpus, quod GLANDULAM RENALEM, *Renem Succenturiatum*, & *Capsulam atræ bilis* appellare libuit.

TUNICA succingitur tenui, Vasorumque omni genere instructum est. Dextra glandularum sæpius ex trunco ipso Venæ Cavæ productam VENAM habet, brevem quidem, sed amplam, & orificio pariter patulo sinum illius subeuntem: nonnunquam cum glandula sinistra ex proximis Venis Emulgentibus eandem consequitur. ARTERIÆ ab emulgentibus prodeunt: tum NERVULI ab iisdem qui renibus communicantur.

MAGNITUDO utriusque dispar est, nucem tamen vomicam grandiusculam frequenter adæquant, si corpus ætate provectius sit.

FIGURA sæpè renibus similes, quippe oblongæ præssulæque rotunditatis: nonnunquam tamen in angulos superius coactæ.

Levi intus *Cavitate* sinuosæ sunt, quam nigra sæculentaque materia semper oblinuit.

COLOR earum nunc rubicundior existit, nunc adipi circumfusæ similior.

SITÆ

COMMENTARIUS.

Glandulam Renalem] Ita primus appellavit *Barth. Eustach.* & post eum *Piccolh.* & *Baibimus.*

Renem succenturiatum] Non ita quod Renibus officio respondeat, quam quod iis, nondum exactè formatis, adstet, & cum ipsis exactè communicet, ut *cap. 8. Veslingius* docet. Ita eum primus nominavit *Jul. Casserius*, quem varii secuti, ipse etiam *Riolanus*.

Capsulam atræ bilis] Ita nominare placuit *Bartholino*, ab usu quem tribuit.

Utrinque] Quatuor *Bartholino* aliquando visæ, quarum duæ majores, figurâ quadratâ, supra, totidemque minores figurâ rotundâ, sed inæquali & aspera, infra Emulgentes erant sitæ.

Glandulosum corpus] In foetu substantia non est abfimilis substantiæ Renum, nisi quod nonnihil laxior sit, in adultis adipi indurato respondet.

Sæpius ex Trunco ipso &c.] Errare itaque dicendi omnes, qui ab emulgentibus tam dextram, quam sinistram oriri volunt. Anno 1649. qui annus *Veslingio* fuit extremus, foemina furculus ex venâ cavâ Reni succenturiato dextro innectebatur, sic referente *Rhodio in Mantissâ Anat.*

Arteriæ ab emulgentibus] Has propter exiguitatem *Riolanus* vel flocci fecisse, vel non vidisse dicit *Marchettus in Anatomiâ*.

Magnitudo utriusque dispar est &c.] Longi sunt hi Renes digitos duos, lati unum, & mediocriter crassi. Interim ut hæc magnitudo variat pro magnitudine verorum renum, quibus incumbunt, ita nec æqualis semper utriusque est, sed nunc dextro, nunc sinistro alter est major; Imò nec idem sibi similis manet decursu annorum. In foetu enim mirabili sunt magnitudine & ferè æquales reni, progressu ætatis decrescere mutareque figuram scribunt, adeò ut, si corpus ætate provectius sit, non nisi grandiusculam nucem vomicam adæquet.

Cavitate &c.] Negat hoc *Riolanus*, utrique ex vero; verum in foetu, secus in adultis, *Lindanus* inquit; imò verum esse, etiam in adultis quivis accuratè Capsulas hæc examinans reprehendet, & nos non semel etiam in hominibus observavimus.

Fæculenta materia oblinuit] Non oblinuit solum, sed & ipsâ cavitate colligitur nigricans ea materia.

SITÆ verò sunt renales glandulæ sub diaphragmate, supra membranam adiposam: sic tamen ut earum dextra venæ cavæ conjungatur, sinistra verò ventriculo nonnihil subdita conspiciatur.

Quis illarum sit **U s u s**, humanæ mentis conjectura nondum satis cepit. Nam & tractum serosæ humiditatis adjuvare creduntur, atræque bilis particulam recondere, quæ coaguli instar feri à sanguine separationem promoveat. Vicinas item partes, qua fulcire, qua fovere perhibentur; quamvis plures, minoresque glandulas, venis & arteriis suis instructas, renalium æmulas, circa renum vasa quandoque Natura disponat.

Cæterum *interna*, propriaque renum **MEMBRANA**, proximè ipsorum parenchyma atque arcto complexu sibi devincit.

Accedunt renes *Vasa ampla*, *vena* scilicet, atque *arteria Emulgens*. **VENA Emulgens** dispari nonnihil situ ex Venæ Cavæ trunco producta, geminata prius hinc variè iterum divisis ramis dispergitur. **ARTERIA Emulgens**, venæ magnitudine ferè par est, quæ ab Arteriæ Aortæ descendente trunco exorta, simili ramorum propaginumque distributione renes ingreditur. Non rarè tamen Emulgentium vasorum & dispar numerus est, & progressus ad renes inæqualis, utcunque **Natu-**

ra

COMMENTARIUS.

Supra membranam adiposam] Cui adeò firmiter adhærent ut non rarè, nisi quis animum diligenter advertat, evulsis renibus, ipsas septo transverso strenuè adherentes, quasi nullæ sint, prætereant. Maxime conspicuæ sunt in fœtibus & nuperrimè natis; in pueris sensim exarescunt; in adultis succrescente adipe renali penitus involvuntur & absconduntur, unde & investiganti admodum difficiles aspectu redduntur.

Quis illarum sit usus, humanæ mentis conjectura nondum satis cepit] Cautè satis; quis enim hic aliquid definiret. *Bartholinus* atræ Bili recipiendæ inservire voluit, at, ut benè *Highmorus* aliique annotarunt, minus rectè, atra enim bilis humor est omnimodo præter naturam, nec in corpore benè disposito invenitur, & si essent atræ bilis capsulæ addit *Marchet*, de necessitate in adultâ majores quam in tenellâ ætate observarentur, in adultis nempe humor melancholicus præcipuè scatet. Cæterum hoc verissimum est, quod in pueris majores sunt, quam in adultis. *Spigelius* eas factas

ad implendum vacuum inter Renes & Diaphragma spatium, esse censuit, quod valdè à vero videtur abscedere, exiguæ enim particulæ sunt, & natura nunquam ad solam repletionem vacui respicit in corpore humano, sed omnium partium suus est usus. Cl. *Highmorus* ad humiditates absumentas extra vasa illa majora, quibus per venas & arterias junguntur, exudantes, inservire censet.

Arteria atque Vena] De horum vasorum distributione per Renes legatur Caput de Renibus apud *Highmorus* p. 79.

Vena emulgens] Rectius diceretur *Vena Renalis*, *Referens*, aut *Reductoria*, cum constet eam non emulgere serum (licet & hoc improprie de arteriâ dici usus renum ostendit,) sed sanguinem superfluum reducit ad Venam Cavam.

Hinc] Ubi scilicet Renem ingressa est.

Est dispar numerus &c.] A^o. 1624. *Spigelio* juveniculum 13. annorum discanti gemina occurrit arteria emulgens dextra, teste *Rodio in mantissa*. Sic in subjecto mense Martio

ra scopum suum provide obtinente. His NERVULI addendi sunt, quos rami Sexti paris interni à plexu suo inter renes submitunt: ad quem ramus quoque stomachicus sinister excurrit,

Carunculas obtinent renes, à formæ similitudine *capillares* vocatas. Hæ pisi magnitudinem referunt, numero frequenter denæ, atque intra gibbam renum partem certis intervallis dispositæ sunt, ut per minutos earum poros serum sanguinis in tubulos ureterum colet.

Porro GEMINUM efformavit renem almus opifex, ob humidi secernendi multitudinem, & necessarium in alterutrius noxa subsidium, quamvis debile, & in magno officii consensu parum durabile.

EFFIGIE phaeolum exprimunt, recurvi exterius, interius in finem

COMMENTARIUS.

1656. à *Johanne van Horne* publicè dissecto, Arteria hæc dextri lateris duplex reperiatur, diversis locis ex Aortâ orta, & diversis etiam locis ad distantiam duorum digitorum Reni inserta. Videatur & *cent. 2. Observ. 77. Barthol.* In sinistrâ parte arteriæ emulgentis quatuor ramos A^o. 1638. invenit *Veslingius*. Tres arterias in subiecto à *Falcob.* 1647. dissecto vidimus. In vasis Renum, Ureteribus, & vasis Spermaticis admodum ludere naturam autopsiâ edoctus confirmat *Cl. Patinus*.

Inter Renes submituntur] An Nervi hi ramos suos in parenchyma ipsorum renum distribuunt controvertitur, quidam ajunt, quidam negant, illud certum, si qui per illud distribuuntur, pauci momenti sunt, cum Renes per se parum sentire constet, ex eo argumento, quod sine dolore diu aliquando calculi ab ægris circumferantur. Ac proinde quicunque dolor acutus pungitivus in interiori Parenchymate fieri censetur, non in ipso Parenchymate est, sed in cavitate quam ureteres faciunt.

Ramus stomachicus sinister] Ob hanc communionem nervorum, tantus est Renum & Ventriculi consensus, ut in Renum calculo sæpe nausea, vomitusque contingant.

Carunculas] Carunculæ hæc nihil aliud sunt quam Renum caro interior, quæ crassior & durior existit, quam superior illorum & exterior substantia, estque quasi fibrosa.

Per minutos earum poros &c.] Videatur hæc de re *Higlmorus cap. de Renibus*, ubi ostende-

re conatur quam malè hæctenus creditum fuerit per capillares caruncularum ductus serum in pelvim transire, quam verò facillima transcolationis ratio sit per ipsum Renum Parenchyma. Hic legi & examinari merentur quæ habet *Cl. Bellini in tractatu de Renum structurâ & usu*, & à nobis in additamentis adjungentur.

Geminum subsidium] *Cl. Beverovicus* & post eum *Loeselius* uno Rene affecto alterum quoque urinam non expurgare volunt; At autopsia eos erroris manifestè accusat. Certum est interdum uno Rene affecto statim alterum trahi in consensum, sed illud non est perpetuum, multos enim vidi, vidit & inter alios Celeberrimus *Patinus*, qui ad ultimam usque vitæ periodum facile & copiose minxerunt, & tamen unicum habebant Renem sanum, alterum marcidum, putrem, ulceratum, exesum, &c. Videatur hæc de re *Riolanus Antropogr. pag. 144.* & annon idem in aliis partibus contingit; uno oculo læso alter videt, consumpto omni pulmonis lobo in unâ parte, alter respirationem promovet, nisi fortè utraque pars à communi causa afficiatur. Multa de hæc quæstionè: cur natura duos Renes fabricari voluerit, habet in *Coll. Anat. Lauremb.* quem lector consulere hic poterit.

Phaeolum exprimunt] Hoc est fabam Turcicam. *Helmontius* sinistrum Renem triangularem vidit, ubi dexter ne avellanam æquabat. Magnitudo quoad longitudinem quatuor vel quinque digitos transversos æquat: quoad crassitiem est duorum digitorum; quoad lati-

num inæqualiter collecti. Monstrosus est, quotiescunque in unum uterque colligitur, aut parte inferiore incurvatus commune corpus mutua cohæsiōne constituit: aut alteruter, vel uterque parenchyma suum duplicat. Sæpius tamen compactis veluti glandulis inæqualis superficie, quam in foetu exhibent, in adultis quoque retinent.

Calidum Renum siccumque TEMPERAMENTUM affluentis feri copia mitigat.

LOCUM sortiti sunt, dexter sub hepate sub liene sinister, lumborum

COMMENTARIUS.

tudinem ferme trium digitorum. Vidit tamen in suspenso Renem vix castaneæ æqualem *Fabr. Bartholetus*, sic notante *Rhodio in mantissa*. Color ruber est obscure, raro intense, in male affectis variè colorantur, sic Ren dexter albus fuit deprehensus. *Schenkius lib. 3.* Renem sinistrum ex livido albicantem vidit *Fabricius Hildanus lib. 4. Obs. 5.* Renes subnigros observavit *Eustachius de Renibus*.

Recurvi exterius, interius in sinum collecti] Sinus hic *Porta Fallopio* dicitur, quod per eam ingrediantur vasa & egrediantur meatus urinarii.

In sinum inæqualiter collecti] Hic *Fallopio Obs. pag. 416.* appellatur *Porta*, quod per eam ingrediantur vasa & egrediantur urinarii meatus. *Joan. Veslingius*, *Rhodio* referente, præter alia præternaturalia in foeminâ Anno 1637. invenit dextrum cui adnatus alter exilis vasa *Spermatica* fermè attingens, quam etiam arteriæ emulgentis ramus accedebat. Renes quatuor totidemque Ureteres bis observavit *Cl. Marchet.* observasse se etiam scribit *Laurentius*.

In unum uterque colligitur] Talem viderunt *Piccolb. Vesalius. Barthol. Laurentius Plazanus, Silvaticus, Spigelius, Garcias, Ronsæus, Stephanus*, alique, vide *Joan. Rhodii mantissam Anatomicam* observationibus *Bartholinianis* additam. Unum adesse Renem, rarum valde, multi tamen sunt Authores qui exempla adferunt, quos citare necesse non judicamus. Figuras quasdam videre potest lector in appendice ad exercitationem *Anatom. Bellini de Renum usu & structurâ*.

Commune corpus constituit] In cadavere *Mulierum Patavii 1643.* dissecto Renes in unum

concretos, supra divisionem vasorum in *Ramos Iliacos*, vidisse se scribit *Barth. Obs. 2, 77.* Vidit & *Leon. Doldius* Medicus *Noribergensis* anno 1602. in juvene XVI. annorum, cujus Iconem exhibet *Baubinns*.

Sapius &c.] Quamvis multa cadavera dissectuerit, nunquam tamen in adultis hoc vidit *Riolanus*, ut in *Notis ad Vesling.* indicat. Bis tervè Renes velut è Glandulis compactos cum suâ inscriptione patenti, in adultis se observasse & in Theatro Patavino coram multis palam fecisse testatur *Marchettus*.

Quam in foetu exhibentur] Nam in foetu non tantum, sed & in pueris quasi ex multis renulis Renes sunt compositi, talem esse ipsorum faciem *Riolanus* se primum notasse *lib. 2. Antrop. c. 26.* scribit, Confer. animad. ad *Baub. §. Renes*; ad *Barthol. §. Figura Renum*; ad *Vesling. §. de superf. Renum*.

Retinent] Uti ferè semper fit in bove & urso, in vitulo etiam & omnium elegantissime in tursione, ubi instar racemi avarum quadratis triangularibusque tessellis compacti artificiose; ut *Barthol. in Anatome* notat.

Lumborum musculis incumbentes] Sub his cum nervi maximi recondantur, stupor in femore ejusdem lateris, cujus Ren calculo distenditur, sæpe perferuntur. Rarum est quod observavit *Cabrolinus* spinæ ipsi lumborum incumbere.

Locum sortiti sunt &c.] Mirum sanè videtur, cur *Deus Opt. Max.* eo loco & non alio collocarit Renes, cum præsertim propè ipsam Vescicam commodissimus iis videatur locus, ut ita Urinam Vescicæ illico tradant, idque multò magis, cum observemus ex Ramis Iliacis ramulos vescicam nutriendos oriri. Sed certè ejus rei

rum musculis, Psoas dictis, hinc inde incumbentes. Dexter ob magnitudinem jecoris humilior : sinister situ altior.

Uterque mediante membrana externa diaphragmati lumbisque COMMITTUNTUR.

Attractum à renibus serum ad vesicam deducunt URETERES, canales

COMMENTARIUS.

rei magna alia est ratio, & necessitas summa. Ut segregatio seri bona fieret, debuit impulsus quidam humorum fieri. Renes autem quia proximiores sunt ipsi cordi, undè sanguis suum habet inipetum, hinc facillimè ibi segregatio potest fieri. Sed si propter majorem motum sanguinis, cordisvè pullum, id factum est, cur non proximiores ipsi cordi sunt? Ne Serum quamprimum è corde venit absumerent, & sic materia reliqua humoralis redderetur crassior & inutilior debito, ad distributionem inepta.

Atqui verò quare Deus ejusmodi colatorium constituit inferiori corporis loco tantum, cum serum debeat à sanguine separari, is autem non totus deorsum feratur? Resp. Una illa segregatio quæ fit inferiori à corde loco sufficit ipsi sanguini, dum enim in inferiori loco fit segregatio seri, utique ea etiam facit imminutionem ejus in partibus superioribus, is enim sanguis qui modo erat in partibus superioribus, mox est in inferioribus & contra. Imò etiam in superiori loco talis segregatio seri instituitur, quod in Salivâ observamus, ut ita sanguis à sero segregetur, tam in parte supra quam infra Cor. Eadem ferè ratio Lachrymarum est; Imò cum fuliginibus, pituitâ, aliisque excrementis plurimum ejus exit.

Ob magnitudinem jecoris humilior] Autores varii sunt, qui dextrum lævo altiores esse scribunt, *Andr. Vesalius lib. 5. de corp. fabric. cap. 10.* dicit naturam hæc in re ludere pro diversitate jecoris & lienis, sic ut quibus jecur magnum, lien verò parvus, iis ren dexter sinistro humilior sit, & contra; quam verè judicent doctiores, mihi hæcenus alium Renum situm in homine notare non obtigit quam quem describit Author. Causa Situs hujus ea est quam dat Author ipse, patet hoc in canibus, in quibus lien est major & longior,

undè etiam Renem dextrum habent sinistro superiorem, contra ac fit in homine.

Committuntur] Et sigillatim dexter cæco intestino, quandoque & licet rarius jecori, sinister verò lien & intestino colo; indè fit, ut dolores nephritici, ex flatuum & excrementorum copiâ in colo, exacerbentur, & contra dolor colicus à nephritico sæpè non distinguatur.

Attractum à Renibus serum] Imò potius impulsus ad Renes, & per eos ad ipsos Uretes, ut modo declaravimus. Videatur & hæc de re *Antropol. Kyperi, & Barthol. Anatom. pag. 119.* cum Sero etiam sæpè alia transeunt, ut Arenulæ, Calculi, Pus, Sanguis, Vermes, & alia præter naturalia.

Deducunt] Aquæ ductus sunt, inquit *Lindanus*, ad aquas à totâ domo defluentes colligendum ac demittendum in vesicam, velut in cisternam. Non uniformiter declaratur, quomodo per Uretes serum propagetur, an solo transfluxu, an præterea virtute etiam quadam propellente Ureterum? Posterius accipi, *Kyper. in Antropol.* eò quod interior illorum tunica fibris diversis donata, & ejusdem naturæ cum vesica urinariâ, cui talis virtus competit. Et id experientiam comprobare putat, quandoquidem in calculi per illos canales transitu, illâ virtute opus: quia autem natura ob accidentales eventus nihil tribuit, existimandum esse etiam in naturali feri propagatione eam exerceri, licet libens largiamur non magno nisu eam virtutem suum finem assequi ob feri facilem promptumque descensum. Adderem ego motum sero à corde impressum.

Uretes] Voce composita ex *ὕρῃ* urina & *τῆρῃ* servo, in me contineo. Nonnulli, ut *Celsus lib. 4. de Re Medicâ cap. 1.* Uretes Venas albas appellant, quoniam magnam similitudinem habent cum venis, 1. quod simi-

canales teretes, è duplici MEMBRANA compositi. Harum *exteriorem* peritonæo continuam roboris causâ adsciscunt: alteram *interiorem* habent propriam, validam pariter, nervosam, tum *fibris* nonnullis obliquis rectisque donatam.

VENAS admittunt exiles, & ARTERIOLAS, à vasis è propinquo descendantibus, tum NERVOS minutos, à plexu nervorum sexti paris costalium, quemadmodum & à lumbis.

EXILES sunt in homine sano ureteres, in calculoso violenter magnoque pariter cruciatu dilatati ampli evadunt.

NUMERO ferè bini, quandoque plures, & à sinistro rene prope secundum tertius descendit, intestinuli magnitudine: cujus sinus quinque digitorum latitudinem æquavit; orificium, quo in vesicam hiat, digiti crassitiem admisit.

Princi-

COMMENTARIUS.

liter ac illæ teretes, membranosæ & concavæ sint. 2. quod sicut humor per venas ita urina per ureteres vehatur. Venæ autem videntur rubræ propter transparentem sanguinis colorem, ureteres contra albæ sunt ab urinâ.

Nervos] Atque his debetur sensus ille exquisitissimus, quo ureteres præditos esse constet. Ad quid autem tanto sensu indigent? Si quid divinare possum, inquit *van der Linden*, ut pituitosa & viscida, quæ hæc frequenter eunt, promptè percipiendo propellendoque caveant, quo minus ista inhæreant & infarctu intercipient tam necessariam evacuationem, at non putem ad præternaturalia naturam respexisse.

Aplexu & à lumbis] Nervos habent duplices ait *Mœbius*, singulari naturæ providentia, quum enim simul cum urinâ rebus variis per eos transeundum sit, facile obstructio urinæ cum præsentis vitæ periculo fieri posset. Inde natura plures iis nervos concessit ut eo citius & promptius ad expulsionem irritarentur.

Exiles sunt] Longi plus minus spicamam, ampli quasi calami scriptorium minorem.

Ampli evadunt] Hoc enim beneficii habent à naturâ, ut transmissio calculi nunquam postea contrahantur ad priorem angustiam; contra ac fit in Utero, Vesicâ, Ventriculo & similibus, unde fit ut illo qui viam aperuit transmissio, minores alii magno numero sæpè

illabantur in Vesicam sine dolore, nisi quando angulosi & aculeati sunt. Cavitas ista ait *Riolanus in Enchyr. Anatom.* ita dilatatur à calculis ut digiti crassitiem æquare visa fuerit, post obitum, in dissectis cadaveribus. *Bartholinus* in dissectis calculosis sæpius vidit cavitatem eorum duos digitos admittere, imò æqualem intestinis fieri. Pene incredibile inquit *Linden. pag. 135.* quod vidi in *Alb. Bertrring. Celeb. IC. Ev. Bronchorstii* genero, mercatore Amstelod. calculum nempe, nuce myristicâ majorem, istâ viâ pervasisse in vesicam, & hinc per urethram exiisse, itinere, si recte memini, viginti septem septimanarum. Non scio quid certitudinis *Lindanus* habeat calculum dictum figuram & magnitudinem eandem in Rene habuisse, qualem cum exierit. In viro nobili lapillum Dactyli nucleum æquantem per eundem angustum septem mensium spatio transeuntem conspexit *Mœbius*, sequentibus, licet satis essent magni, cum minori molestia exeuntibus.

Plures] In cadavere Anno 1656, Mense Martio à *Joh. van Horne* dissecto in sinistro latere duò erant ureteres ampli satis, quorum unus à parte renis sinuosa superiori, alter ab inferiori oriebatur, qui circa pubem conjungebantur. * Ureteres quatuor, cum quatuor infundibulis vidit *Dom. Panarol. obs. 4.*

Tertius] Monstruosus omninò fuit.

Prin-

Principium ducunt à laxiore, & membranoso suo sinu, quem *Infundibulum* aliàs *renum* auctores appellant. Ab eo exporrigunt intra renes *Tubulos* angustos, dilatatis extremis carunculas papillares expicientes, quibus numero ferè pares sunt. Parte alterâ sinus, paulatim contractiores facti ureteres, sinû renum regione descendunt, supraque musculos *Psoas* femur flectentes progressi, canalem dictum efformant, qui obliquo intra membranas ductu vesicæ cervici *INSE-
RITUR.*

VESICA

COMMENTARIUS.

Principium ducunt &c.] Solius distributionis & œconomiae respectu, aliàs si substantiam, naturam & conditionem eorum respicias, potius à Vesica urinaria sursum adscendunt. Quod jam dudum Anatomicos varios innuisse video.

À laxiore & membranoso suo sinu] Ex substantia Ureteris dilatata formato.

Infundibulum renum] Imò & pelvis renum dicitur. Ejus fornix seu pars superior concamerata, ex qua tanquam tecto serum in pelvim defluere dicitur, speciali nomine Incerniculum aut Cribrum renum appellatur, quod minimè exstare *Bellini Ex. Anatom. de Usu & Struct. renum* tradit. Infundibulum hoc locus fere est Calculorum, qui varii generis ibi colliguntur, tam in colore, quam figura, magnitudine, & substantia. Imò non raro etiam in ipsa substantia renum colliguntur, qualis fuit is in rene insignis, dispergens se quadruplici ramo instar crucis per universum renem, ita ut non potuerit inde eximi, nisi totum ipsius Parenchyma frustulatim discerperent, de quo Magnus Anatomicus *Nic. Tulpius lib. 2. Obs. 44.* Nectantur Calculi in Renum cavitate colliguntur, verum & Vermium patriam hîc quoque exstructam comperimus. Exemplum habent *Riverius, Tulpius, Hollerius, Dodonæus, Bartholinus.* Imo & alia præternaturam hîc collecta auctores varii annotarunt. Quæritur hoc loco non inutiliter, cum sæpè his locis Calculi adeò magni generentur, ut ad vesicam descendere nequeant, annon *Nephrotomia* institui possit; admittit eam *Rousserus*, dubiè de eâ loquitur *Riolan. in Enchyr. Anat. Tulpius Obs. 27. lib. 4.* eam ceu operationem summè periculosam plane rejicit, quod etiam

confirmat historia ab eodem adducta, ubi calculus sponte suppuratione per lumbos exiit, ulcus autem & vulnus relictum nullo modo sanari iterum potuit; assensum huic præbet *Forestus.*

Ab eo exporrigunt tubulos] Non ab uretore dilatato tubulos hos oriri, sed verò ab ipsis vasculis emulgentibus demonstrare laborat *Highm. cap. de Renibus.* Videatur & hîc *Bellini tractatus de Renibus.*

Carunculas] Vulgo serum absorbere dicuntur, quod falsum. Inservire Arteriarum divisioni seu divaricationi videntur, ne ab impetu sanguinis rumperentur, aut nimis dilatarentur membranæ, quale etiam per totum corpus fieri observamus; quandoquidem enim magnus erat impetus sanguinis sustinendus, necessarium erat vasa firmari.

Supra musculos psoas progressi] Inde ratio quoque petitur stuporis, quem patitur cras, super cujus musculum descendit per ureterem calculus, & comprimit eidem inclusos nervos, pedibus destinatos.

Obliquo ductu inseritur] Ureteres non transverso ductu pertundunt ipsas tunicas vesicæ, sed ad aliquod spatium intra membranas duas decurrunt, antequam in ipsam vesicam aperiantur. Atque hoc modo interior tunica valvulæ partes agit, ne in compressione Vesicæ quicquàm in ureteres regurgitet, ad eundem modum, quo interior Intestini tunica per ductum cholydochum descendenti biliarum viam præcludit. Præter hanc obliquam Ureterum insertionem, ad meliorem urinæ retentionem, cum aliquibus membranulas transversas ad introitum ureterum statuere valvularum instar, non æstimamus necessarium.

Vesica

VESICA igitur **URINARIA** est pars infimi ventris organica, quæ susceptum à renibus serum asservat, & tandem vel onere vel acrimonia molestum expellit.

MEMBRANARUM triplici complexu constat. Equibus *externam* peritonæum largitur: *mediam*, *intimamque* propriam agnoscit. Harum *illa* crassior est, carnosisque referta fibris, singularem ad urinæ expulsionem operam affert. *Altera* propriarum, quæque intima, tenuior, sensuque vegetior, inducta mucosa veluti crusta, à contenti liquoris mordacitate vindicanda fuit.

Acce-

COMMENTARIUS.

Vesica] In cadavere nobilis Patavini nullam deprehendit *Petrus de Marchettis*, sed ejus loco cavernulas seu alveolos.

Susceptum Sc.] Quari hoc loco, nec sine causa, potest: An urina ad vesicam deducatur solâ vi excretrice renum, an etiam vi tractrice vesicæ? Primum magis arridet, idque has maxime ob rationes. 1. quod in vesicæ membranis ea vis non videatur residere, utpote nullam peculiarem ab aliis naturam habentibus. 2. quod nulla necessitas sit, iis virtutem eam tribuere, cum satisfacere queant purgando sero Renes; imò 3. nulla utilitas inde exurget, quin potius noxa, eò quod sic crudum serum ex renibus raperent, aut actionem secreticem renum inturbarent.

Serum asservat] Item Calculos & Arenulas, de quibus varii, maxime *Tulpius*, *Bartholinus*, *Hildanus*, *Schenkiius*, *Salmuth*, *Thonerus*, *Benivenius*. Interdum & alia asservat, atque excernit; ut Pilos, Vermes, imò sæpius ejusmodi, ut merito de rei veritate dubitarem, si non de scriptorum ea referentium fide constaret.

Membranarum triplici complexu] Inter has tunicas *Tulpius* in decrepito calculi cruciatus mortuo invenisse se scribit *Obs.* 30. *cent.* 4. calculos tres insignes.

Externam Peritonæum largitur] Et ab hoc duplicato Peritonæo vesica inclusa suspensa tenetur, ne deorsum ruat pondere incumbentium intestinorum compressa.

Carnosisque referta fibris Sc.] Musculus habetur *Bartholino*, ambiens totam vesicam quia fibras habet perspicuè carnosas ad vesicæ initium insertas: Sicut, quemadmodum Mus-

culus circularis ille sphincter dictus, vesicam constringit, ne involuntarie nobis urina effluat, ita hic Musculus ad excretionem urinæ faciat, dum se contrahendo vesicam constringit. Atque hanc quidem *Aquapendentis* esse sententiam dicit, cujus veritatem ita comprobare solere *Waleum* docet in vivis canibus, resectis omnibus Abdominis Musculis, exile penetrans vulnus vesicæ quod infligeret, è quo vulnere non minus in distans urina, quam in sanis per penem ejiciebatur: non detrectat tamen iis accedere, qui Musculos Abdominis quoque ad excretionem conferre volunt, nec obitare, quod Ventriculus, Intestina, & Uterus habeant similem membranam carnosam, illâ enim viscera illa indigere quoque ut distendi facilius & constringi possint, hinc etsi carnosior Vesicæ sit membrana, laxo tamen significato etiam istorum membranam dici posse Musculosam; ad *Walei* experimentum *Riolanus* quod respondeat, eadem ratione & sanguinem secta brachii Vena ad distans fluere sine expellente Musculo, nihil ipsum movet, eo quod diversam spirituosius sanguinis cum impetu exeuntis, & urinæ segnis conditio; præterea in Venis sanguis ab alio sanguine pellatur succedente, ex legibus circuli & insita facultate. Ego tamen potius membranam carnosam quam Musculum dicerem, cum nihil rationis habeamus, cur hanc magis musculum, quam illam quæ in Ventriculo est, appellemus. Huic debetur quod etiam extra cervicem cæsa consolidetur. Quod notare debere vult *Riolanus animad. in Veslingium* hodiè, qui quoties majorem reperiunt calculum quam ut per perinæum extrahi queat,

Accedunt vesicam VENA & ARTERIA ab Hypogastricis : NERVI ab infimis Sexti paris internis ramis plexum mesenterii non attingentibus , tum à propaginibus ossis Sacri.

AMPLITUDINEM ejus non ætas solum , sed crebra quoque violentiorque distensio variat.

SIMPLEX in homine est , raro veluti sepimento , adjunctisque sacculis distincta.

DIVIDITUR in *Fundum*, & *Cervicem*. Fundus superior, & latior vesicæ pars est à quo sursum ad umbilicum porrigitur *Urachus*, tubulus membranofus, circa fundum amplior, versus umbilicum verò paulatim exilior. Is adultâ jam ætate, juxta cum propinquis arteriis umbilicalibus, validum vesicæ ligamentum evadit, cujus beneficio fundus illius, ab incumbentibus intestinis alioquin facile deprimendus, suspensus detinetur: quod vide in Tabula Capitis secundi Figura decima. Contingit tamen aliquando fortuitorum violento occurſu, ut laxatus Urachus, etiam in senescentibus, urinæ, calculisque, insuetam per umbilicum viam præbuerit.

Cervix est vesicæ portio inferior, angustior, & carnosior. Hæc diffusis potissimum in orbem *fibris* sphincterem illum constituit, cujus auxilio, ne urina involuntariè excernatur, ostium adstringitur.

Pervia

COMMENTARIUS.

queat, pro desperato habent. Sed fieri aditum per imum ventrem ibi posse tradit, ubi nunc satis feliciter administrari Cystotomiam testis est. Membranæ hæ & fibræ si diutius à copiâ urinæ extendantur vim se contrahendi amittunt, urina subsistit, dolor, inflammatio, aliæque Symptomata excitantur, imò, (quod de *Tychone Brahe*, aliisque referunt) mors ipsa caufatur.

Vena ab hypogastricis] Quas variè distributas per vesicam, sibi mutuo Arteriisque conjungi, mutuisque foraminibus pervias nonnulli tradunt, ut faciliè ex uno in alium ramum sanguis deferatur, ad nutrientis sanguinis per Arterias delati refluxum, purum enim excrementum Vesica accipit, quâ non alitur, inquirant Anatomi.

Simplex in homine est, raro veluti sepimento adjunctisque sacculis distincta] Vidi hîc diebus in ædibus Chirurgi expertissimi *Haro*

Sloomer Vesicam vitulinam cui satis magnæ continuatione quadam, acsi constricta fuisset, alia priori ferè æqualis addita, intus manifestò eoque magno satis foramine urinam ex unâ in aliam transmittente. Talem & in puellâ 35. annorum invenisse *Volcherum Coiterum* & *Caspar. Baubinum*, nec dissimilem in cadavere magni *Casauboni* repertam nobis descripsisse *Raphaelem Thorium* & *Brovardum* refert in *Anatomia* suâ *Bartholinus*.

Contingit aliquando &c.] Non video, quomodo id fieri possit, cum ex *Veslingii* opinione in foetu sit tantum porosus, vixque permeabilis, & edito in lucem foetu in ligamenti soliditatem, compingatur, inquit *Riolanus anim. suis*. Sed miror *Riolanum* præternaturalia, qualia plurima in corpore observantur, à naturalibus non distinguere.

Ne urina involuntariè excernatur] Juvenem se novisse scribit *Mœbius*, qui ad risum nimium exci-

Pervia est vesica tribus *meatibus*, obscurioribus duobus, ac veluti conniventibus, per quos ab ureteribus serum promanat, & majore uno, per quem urina exitum invenit.

FIGURÆ similitudine pyrum adumbrat, atque in ventris infimi pelvi COLLOCATA, Fundo suo per urachum umbilico, ut tradidi, JUNGITUR. Cervice verò, in Viris intestino recto, glandulisque prostaticis, in Fœminis vaginæ uteri anterieus, & ossibus pubis alligatur.

Inter Vesicam & Renes, publico dissectionum ordine sic ferente, observatione digni sunt, Venæ Cavæ, atque Arteriæ Magnæ descendentes trunci; quamvis ut per extrema, ita hic, rarò in ramis, eorumque numero, magnitudine, & situ, rationem eandem Natura servet.

VENA CAVA post emissam sub diaphragmate *Emulgentem*, *Adiposam*, *Spermaticamque* venam, deorsum pergens, venas producit tres quatuorve *Lumbares*, ad Medullam vertebrae lumborum inclusam distribuendas; quarum superiores, sursum commeantes, descendentes venæ jugularis internæ ramis per anastomosis copulantur. Circa sacrum tandem os truncus Venæ cavæ, junctim descendenti Arteriæ magnæ suppositus, dirimitur in *ramos* duos amplos, *Iliacos* dictos, Internum scilicet, & Externum; è quibus ferè tum *Muscula vena superior*

COMMENTARIUS.

excitatus urinam continere non poterat. Alius quoties tussiebat, toties mejere cogebatur, teste *Salmuth*.

Laxatus urachus &c.] Exemplaria videantur lib. de abditis. morb. causis *Benivenius*.

Angustior] In viris collum hoc magis oblongum, angustum & aliquomodo contortum. In fœminis verò patentius & brevius est, recto ductu deorsum vergens, non, ut plurimi Anatomicorum scribunt & delineationibus exhibent, ubi uteri collo superius unitur, sed circa pudendum extremum finitur.

Majore uno &c.] Urinarium meatum duplicatum vidit *Guilj. Fabricius cent. I. Obs. 76.* in puero 12. annorum.

Per quem urina exitum invenit] Naturaliter, præternaturam enim est, cum per alia foramina urina exit, cujus rei exempla habent *Benivenius*, *Dodonæus*, *Schenkius*, *Fallopianus*, *Galenus*, *Platerus*, & ex his *Mœbius*, p. 455.

Pyrum adumbrat] *Fernelius* alique globosam eam esse scribunt, quæ globositas restringenda est ad fundam, & primarium Vesi-

cæ corpus, collo enim ejus minimè convenit.

Petri] Quæ efficitur ab ossibus Innominatis & osse Sacro, cum Coccyge sibi invicem junctis.

Intestino recto] Et hinc patet ratio quare Cystothomi ad explorandum calculum sinistrae manus priores digitos immittant in anum ut dextræ pone pubis os impressæ habeant occurrentem calculum, eo adactum, si quis sit.

Emulgentem, Adiposam] Ordine Adiposa prior est Emulgente, nisi ex ipsa Emulgente originem sumat Adiposa, quod sæpiissimè contingere notamus.

Ad Medullam vertebrae inclusam distribuendas] Ipsi quoque membranis Medullam hanc investientibus communicantur.

Venæ jugularis internæ ramis per Anastomosis copulantur] Vide hæc de materia Nervorum descriptionem quam nuperrimè divulgavit *Thomas Willis*.

Arteriæ magnæ suppositus] Contrarium non tantum in Infimo reliquo ventre, sed & in Thorace obtinet.

Post-

rior prodit, tum etiam *Sacra*. Ab Iliacorum *interno* ramo, qui minor est, oritur *Muscula glutea*, nec non *Hypogastrica* vena insignis, quæ *Utero* juxta vaginæ longitudinem, tum *Vesicæ*, rectique *Intestini* musculis propagines largitur, & *Os* quoque *Sacrum* ramulis aliquot emissis donat. Ab *Externo* Iliaco ramo, quique major existit, post *Iliacam internam*, *Epigastrica vena*, quæ duplex in mulieribus, & ad *uteri* quoque *vaginam* protensa, tum *Pudenda* prodeunt. Reliquum ejus, superato abdomine, ramum *Cruralem* constituit: de quo in ultimis dicendum erit.

Haud dissimilis *Arteria magna* progressus. Etenim postquam *Mesentericam arteriam superiorem*, post *Celiacam* produxit, mox *Emulgentem*, *Spermaticam*, *Mesentericam inferiorem*, *Lumbares* item, & *Sacram* emisit, juxta *sacrum os* finditur in *Ramos Iliacos*, quorum *interior* promit arteriam *Musculam*, & *Hypogastricam*, pari cum vena passu incedentem: exterior *Epigastricam*, & *Pudendam*. Quod superest, ad *crura* descendens, ramum porro arteriæ *Cruralem* propagat.

De his verò tam venis, quam arteriis, consule *Tabulam Capitis decimi secundam*, atque ultimam hujus operis.

COMMENTARIUS.

Postquam arteriam *Mesentericam superiorem*, post *celiacam* produxit] Varii admodum *Anatomici* sunt in harum arteriarum descriptione. Sunt qui *Mesentericam superiorem* dicunt esse ramum *Celiacæ*, quod falsissimum, sunt enim duæ hæ arteriæ omnimodo distinctæ, diversis locis ex arteria magna ori-

ginem sumentes, quæ tamen non nisi ad latitudinem digiti transversæ distant. Sunt, inter quos & ipse *Veslingius*, qui *Mesentericam* priori loco oriri volunt, *Coeliacam* inferiori, quod etiam *Autopsiæ* adversatur, quæ contrarium ostendit.



T A B U L Æ C A P. V. *Explicatio.*

Tabula præfens Renes proponit, cum Glandulis, Vasis emulgentibus, Vesica, & Ureteribus. In quorum præparatione, vasorum quoque Spermaticorum ortus, & progressus patescit. Itaque in

FIG. I.

- AA* Glandula renales, seu capsula atra bilis.
B Ren dexter membranâ detectus.
C Ren sinister.
D Vena Cava truncus descendens.
E Arteria magna truncus descendens.
FF Ureter dexter.
GG Ureter sinister.
HH Vasa semen præparantia dextra.
II Vasa semen præparantia sinistra.
K Vesica Urinaria portio, juxta quam Vasa semen deferentia in Abdomen reflectuntur.
L Intestini Recti pars abscissa.

FIG. II.

- AA* Membrana Renum communis adipe perfusa, separata.
BB Capsula, seu Renes succenturiati.
C Ren dexter.
D Ren sinister.
E Membrana propria Renum partium separata.
F Truncus Vena cava descendens.
G Truncus Arteria magna descendens.
H Vena Emulgens sinistra.
II Vena Emulgentes dextra.
aa Arteria Emulgentes dextra.
bb Arteria Emulgentes sinistra.
c Arteria Spermatica sinistra.
d Vena Spermatica sinistra.
e Vena Spermatica dextra.
f Arteria Spermatica dextra.
g Vena Adiposa ex emulgente hinc orta.
h Arteria Adiposa.
KKKK Ureteres utriusque lateris.
LLL Vasa semen præparantia.
MM Scrotum cum inclusis Testibus.

- NN* Vasa semen deferentia.
O Vesica Urinaria externâ tunicâ denudata.

FIG. III.

- A* Capsula sive glandula renalis dextra.
B Vena è Trunco Cava in Capsulam porrecta.

FIG. IV.

- A* Capsula dissecta.
BB Sinus Capsule nonnihil diductus.

FIG. V.






- AA* Renis dissecti facies interna.
BB Vena Emulgens Ramis suis in Renem diffusa.
C Arteria Emulgens similiter sparsa.

FIG. VI.

- AA* Ren dissectus.
B Sinus Ureteris circa Renes.
C Ureteris è Renibus descendens forma teres.
DD Tubuli Ureteris.
EEE Caruncula Papillares dicta.

FIG. VII.

- AA* Tunica Vesicae communis retrorsum ducta.
BBB Tunica media Vesicae, ejusdemque Fundus.
C Tunica intima Vesicae dissecta patefscens.
D Orificium Vesicae per quod Urina excernitur.
EE Cervix Vesicae, adjunctis Glandulis prostatitis tumida.
FF Ureterum pars Vesicam accedens.



CAPUT VI.

De Partibus Generationis in Viro.

HOc organorum apparatu nutrimentum elaborandum fuit, quod fluidum lapsurumque hominis corpus sustentaret. Ut idem ætate deciduus generis perennitatem consequeretur, generandi instrumentis indiguit.

Horum igitur in Viro, quædam ad Seminis productionem comparata sunt, quædam ad Seminis producti effusionem in sinum arvumque naturæ. Prioris conditionis existunt *vasa preparantia*, *pampiniformia*, *epididymides*, *testes*, *parastata variciformes*, *vasa deferentia* item, & *asservantia*. Posterioris ordinis habentur, *vasa semen ejaculantia*, & *virile pudendum*.

PRÆPARANTIA VASA sunt Venæ duæ, totidemque Arteriæ. *Venarum dextra* sæpius ex venæ Cavæ trunco, simplici, duplicive furculo nascitur; sinistra autem ex Emulgente plerumque vena

COMMENTARIUS.

AD seminis productionem &c.] Materiam seminis censemus duplicem, crassam & spirituofam, cum constet duas ejus partes esse, crassam & spirituofam. Spirituosa partis materia est Spiritus Vitalis. Crassæ Sanguis, & maxime portio ejus lenta, & pinguis, unde qui plurimum seminis colligunt atque emittunt, minus aliis pinguescunt. Cl. *Everardi in hominis brutique exortu*, pag. 16. & seq. Succum Chylosum beneficio rami Chyliferi, à ductu Chylifero Pecquetiano, una cum vasis spermaticis in testium substantiam sese insinuantis eodè delatum pro materia adsumit.

Preparantia vasa] Communiter materiam feminealem preparari in his vasis docetur, sed certe hoc non videtur esse. Nam quomodo vasa immutare materiam possunt, an ureteres immutant etiamsi per eas delabatur longa via ipsum serum? non sane. *Ant. Everardi, loco dicto*, vasa Chylosa materiam feminealem testibus adferre tradit, Nervosque sextæ conjugationis.

Venæ duæ; totidemque arteriæ] Arteriæ quem usum habeant, authores dissentiant, *Glissonius* putat per eas calorem tantum pro

refocillatione testium, non autem pro seminis productione adduci. *Lindanius* nihil per eas substantiæ testium adferri censet, sed omne quod adducunt, Venas transvehere. Verùm cum præcipuis Anatomicis, eos in impuberibus sanguinem spiritu vitali perfusum testibus adferre pro eorundem nutritione & auctione, at in puberibus simul pro semine conficiendo; Venas autem sanguinis superflui ad Cor reductioni inservire, judicamus, ita tamen ut in puberibus simul sursum feratur seminalis quædam aura corpori robor allatura.

Venarum dextra sæpius ex Venæ Cavæ trunco &c.] Etiam ex ipsa emulgente dextra ortam vidimus, bistervè observavit *Marchette* tres venas spermaticas oriri à trunco Venæ cavæ in dextro latere, quæ postea in medio itinere unitæ unicam efformabant, & in testem descendeabant. *Dom. Panarol. obs. 35. lib. 2.* ex utraque venâ & arteriâ emulgente vasa hæc orta vidit. Videatur & *Mantissa Rodii in observ. Barthol.*

Sinistra autem &c.] Hanc varietatem & dissimilitudinem originis in his vasis natura effecit quod arteria magna eo loci venæ cavæ non subster-

vena sinistra : aded in earum exortu varius naturæ scopus dicam an-
 lusus observatur. *Arteria* frequentius ex *Arteriæ Magnæ* trunco pro-
 ficiscuntur, cumque venis conjugibus deorsum euntes, & commistæ,
 peritonæi processum ingrediuntur, in quo multiplici plexu impeditæ,
 CORPORA efformant PYRAMIDALIA dicta, quoniam
 ex angusto principio in latiore veluti basin sese explicant. *Pampini-*
formia item *vasa* nuncupantur, quia flagellorum instar vitis crispata
 deorsum hinc inde contendunt; quamvis & super Epididymidem Te-
 stemque sparfæ cum arteriis venæ similes in cincinnos flectantur.

Finem fortiuntur circa EPIDIDYMIDES, corpora nimirum
 GLANDULOSA, exigua, albicantia, duriuscula, communique va-
 sis spermaticis TUNICA obvoluta.

OBLON-

COMMENTARIUS.

substernitur, sed sensim assurgens eidem su-
 perponitur. Quocirca si ut dextra vena semi-
 naria derivatur à dextro latere venæ cavæ, ita
 sinistra à sinistro fuisset deducta, necesse fuisset
 sinistram arteriæ magnæ superponi. Unde
 ab hujus perennibus pulsationibus illius actio
 impedita fuisset.

Arteriæ] Hisce Arteriis peculiare esse dicit
Lindanus, quod suis conjugibus venis semper
 ampliores sint, cum tamen alias contrarium in
 toto corpore contingat, verum licet hoc in li-
 bidinosis quandoque fieri possit, tamen in aliis
 semper quoque evenire neutiquam credimus.

Frequentius] Dextram ex emulgente ortam
 invenimus.

Ex Arteriæ magnæ trunco] Duorum trans-
 versorum digitorum intervallo sub emulgen-
 tibus.

Deorsum euntes] Per lumborum regionem,
 supra psoas musculos, superque ureteres.

Peritonæi processum] Processus hic, ut supra
 indicatum, non habetur productio duplicis
 membranæ Peritonæi, sic ut duæ membranæ
 extra corpus ferantur, sed vasa hæc dicuntur
 conjungi exteriori tantum tunicæ, & cum ea
 obliquo ductu, non recto factò foramine,
 similiter ac ureteres ingrediuntur vesicam,
 tendines musculorum Abdominis transire, in-
 teriorem autem exteriori conjunctam esse us-
 que dum ad os pubis pervenit, ibi ab eâ sepa-
 rari, & ossi pubis adjungi, ne ruptio tam faci-
 lis esset, quod vix admittere possum.

Plexu multiplici] Usus hujus plexus insignis
 est, ut circulatione continua sanguis reddatur
 purior, diutiusque in testibus moram trahat,
 quo sic ab iis idoneæ partes ex eo elici que-
 ant, eo quod inutile est per venas ad cor re-
 deunte.

Impeditæ] Imo variis Anastomosis cum
 venis conjunctæ. Crebriores Anastomoses
 venarum cum arteriis in hoc plexu ante in-
 gressum in testes peculiarem habere usum in
 pueris impuberibus, & puberibus in cœliba-
 tu viventibus, egregiè declarat, & satis pro-
 lixè *Mœbius cap. de usu partium genital. in vi-*
ris pag. 502. qui legi potest.

Pampiniformia &c.] Possunt quidem vasa
 feminalem materiam adducentia, simul im-
 plexa reticulari forma & membrana obvo-
 luta, pyramidalia corpora vocari, sive pam-
 piniformia, at melius comparet isthæc in-
 textura revulsâ membranâ.

Nuncupantur] Corpora item Varicosa, &
 Plexus pampiniformis.

Epididymidas] Quia testibus imponuntur
 sive incumbunt. Defecisse has observavit *Rhe-*
dus in Mantif.

Finem fortiuntur circa Epididymides] De va-
 sis hisce Spermaticis eleganter *Nath. High-*
morus Disquisit. Anat. lib. 1. part. 4. cap. 1.

Corpora glandulosa] Ex plurimis quasi
 glandulis invicem per membranas connexas
 constant.

Circæ

OBLONGA sunt, & quâ parte testibus committuntur sinuosa, **MAGNITUDE** interdum tantâ, ut vel uno, vel utroque in latere, testem geminum repræsentarint.

INCUMBUNT subjectis sibi testibus, quorum propriæ membranæ quam plurimis fibris meatibusque conjunguntur. Deprehenditur hic nexus circa utrumque testium extremum, intermedio enim spacio incumbere potiùs illis, quam inhærere, conspiciuntur.

OFFICIUM eorum est, sanguini in vasis præparantibus, & pyramidalium capreolis nonnihil immutato seminis rudimentum præbere, testibusque ad perfectionem ulteriorem transmittere.

TESTES epididymidibus conjuncti, sic appellati, quia roboris, & virilitatis indices habentur, **SUBSTANTIAM** adepti sunt glandulosam, albam, mollem.

VENAS, ARTERIASQUE exiles à spermaticis, eleganti, minutoque flexu dispersas, **NERVULOS** partim è paris Sexti interno ramo

COMMENTARIUS.

Circa utrumque extremum] Maximè circa corporis varicosi implantationem. A testium enim superiore parte, externe, ad corporis varicosi, insertionem, lato quodam principio oriuntur, & posterius obliquè ad inferiora versus fundum Testium prorepunt.

Officium eorum Sc.] Officium hoc ipsis minime competere Autopsia abunde demonstrat, quæ docet Vasa præparantia dicta non Epididymidibus, sed ipsis Testibus inferi, adeoque contrarium omninò hîc materiæ motum esse quam quidem vulgo creditus fuit, uti optimè declararat *Highmor. lib. I. part. 4. cap. 2. inquit* : Si parastatas consideremus, illas solum ad ulteriorem elaborationem & seminis à testibus selectionem & collectionem inferuire, ut felicius vasis deferentibus communicetur, putamus, vasa enim materiam adducentia in testes, non in illas implantantur, & vasculum illud insigne à testibus ad illas protenditur, non è contrâ : Per testis enim substantiam pro seminis collectione ducitur, parastatarum solummodo capiti conceditur. In parastatis ulteriorem elaborationem, qualis apud Chymicos circulatione illâ, seu pellicanatione celebratur, fieri, gratis concedimus. Atque indè per vasa deferentia seu ejaculatoria ad Prostatas glandulas, ubi ad tempus coitus reservatur, emandatur.

Testes] A testando, de quâ re videatur *Arch. Picchol. præl. Anat. cap. 2. lib. 3.*

Substantiam adepti sunt glandulosam] Substantia qualis ipsis conveniat, non convenit inter Anatomicos, quidam enim glandulas eos dicunt, alii glandulis similes esse volunt. Quidam pultaceam eorum substantiam pronunciant, ut *Cl. Lindanus*, sui que generis parenchyma pronunciant. Non video cur è numero glandularum haberi non possit.

Albam] Et hanc esse causam putant, quare Semen etiam album sit, non tantum in hominibus, sed & in omnibus animalibus. Sed certè ejus rei alia mihi fuisse videtur ratio, Spirituum nempe in eo copiâ, motusque, quæ enim agitantur candida sæpè fiunt & spumosa. Spiritu deficiente in eo, livescit magis, hinc & in foeminis color ejus subflavus est, quia in iis tantus non est spirituum proventus, tantaque copia, quam in viris.

Venas Arteriasque exiles Sc.] De his quid sentiendum, jam satis patet. Præter hæc vasa Ductum aliquem singularem in medio testium invenit *Highmorus* de quo in additamentis nostris. Et hunc ductum etiam quam dudum nobis monstravit *Cl. Wakeus*, nec est, quod ejus inventionem sibi arroget *Highmorus*, licet divulgationem ejusdem libens ipsi con-

ramo, à plexu mesenterii declinante sortiuntur, partim à Spinali medulla; ut non minus vitæ, adeoque nutrimenti, quàm sensus communione fruerentur. Cinguntur MEMBRANA propriâ, validâ; & densa, quam ob coloris speciem *albugineam* vocant.

BINOS efformavit divinus opifex, ut in muneris quod obeunt necessitate alter in alterius languentis aut deficientis suppetias veniret.

QUALITATUM manifestarum harmonia, calidi & humidi sunt; quamvis dexter testium sinistro calidior perhibeatur. Non idcirco tamen influentis cujusdam calidi fontes habendi: cum mutationes, quæ perditis illis contingunt, circa vocem, totiusque corporis temperamentum, ac robur, non tam infiti caloris, aut influentis à testibus defectum, quàm ejusdem à copiosa materia, quæ faceßere in semen debebat, oppressiorem arguant.

FIGURA propemodum ovales sunt, tum securitatis gratia, tum etiam capacitatis, propendentque viris extra abdomen, ut moderatior homi-

COMMENTARIUS.

concedamus. Cl. *Glissonius* etiam vasa *Lymphatica* in animalibus se vidisse testatur.

Quam sensus communione fruerentur] Usus horum nervorum *Glissonius* putat esse, ut materiam pro semine conficiendo adducant, quam sententiam fufius explicat & propugnat *Charleton in Exerc. Phys.* At verò videntur potius spiritum animale testibus & vasis vicinis adducere, non solum pro sensu, qui summus in testibus, quod dolor ostendit, aut etiam motu, qui manifestus hîc dum ad corpus adducuntur, in bene sanis, in morbofis verò flaccidi cum scroto pendent, sed & ut sanguini arterioso & spiritibus vitalibus misceatur, quo sic ex iis junctis semen elaboretur spirituolum, ut dissierit *Mœbius pag. 472.*

Propria] A vasorum Spermaticorum tunica, circa illos expansâ, enata.

Albugineam vocant] Albuminea rectius diceretur.

Binos] Numero bini sunt. Rarò unus tantum & magnus: & tales etiam ad procreandum aptos esse experientia docet. Rarius, tres, ut in *Agathocle* Siciliæ Tyranno, & familiis nonnullis Italiæ & Germaniæ proprium, rarissimè quatuor. Novisse se, mihi per litteras indicavit *Patinus*, Flandrum quendam, qui unicum habebat testem, in medio

scroto positum, sed ebriosum & libidinosum; imò alium, qui tres habebat totâ vitâ salacissimum & libidinosissimum.

Sinistro calidior perhibetur] Rectè ~~perhibetur~~ inquit, revera enim res sic se non habet, communis quidem & antiqua opinio est, sceminas provenire à sinistris, mares à dextris; & hoc idèd, quod cum *Hipp.* statuunt, sanguinem & spiritum puriorem calidioremque ab Arteriâ Aortâ ferri ad testem dextrum, serosiores verò & frigidiores ex Emulgente ad sinistrum. Verum sceminas perpetuo à sinistro teste generari, illumque frigidius semen accipere, falsum omninò censemus, nam 1. viragines sæpè mares robore & corporis & animi superant. 2. ex arteriâ magnâ æque sinistro testi atque dextro sanguis communicatur. & 3. sæpius in dextris deficit Arteria Spermatica quam sinistris. Sexus generatio non tam pendet à conditione unius testiculi respectu temperiei, quam utriusque, imò totius corporis, materiam seminis subministrantis.

Non idcirco tamen] Videantur quæ habet *Barthol. Anat. pag. 140. & Mœbius cap. 19.*

Oppressiorem arguant] Vide hâc de re variorum sententias apud *Mœbius p. 486.*

Figurâ ovaes sunt &c.] Magnitudo testis ferè est instar exigui ovi gallinacei, sic tamen

homini in Venerem impetus sit, longioreque vasorum ductu feminalis materia rectius perficiatur, cui vim testes, & foecunditatem adspirant.

Error enim est, illos vel ponderis subnexi vicem sustinere, vel ad rectiorem seminis magisque stabilem expulsionem conducere. Quoniam ab eiaculantibus vasis longius remoti tantum feminalem in se materiam foecundandam suscipiunt: neque actionem pudendi virilis propriam, vel appliciti corpori, vel ab eo penduli mutant. Semen continent, sed tenue etiamnum, ac in cadavere, morbis, inediaque non exhausto, lacti aquoso simillimum, quod ex iis ad parastatas variciformes translatum in reliquis spermaticis vasis, praecipue capsulis seminalibus, & prostaticis, perfectionem ultimam consequitur.

Continui porro sunt epididymidibus PARASTATÆ VARI-
CIFORMES, ita nominata vasa, quod varicum instar flexuosa,
contor-

COMMENTARIUS.

ut sinister dextro semper major sit. In juvene quodam libram integram ponderans, durus maxime, ablatus fuit, ut habet *Tulpius lib. 4. Observ.*

Extra Abdomen] Testes intra cavum Abdominis ad pubertatem latuisse variis historiis probatur, quas *Paræus*, *Riolanus*, *Cabrolus* alique adducunt. Testiculum alterum à primâ nativitate Abdominis interiori cavo in puero inclusum vidit *Th. Bartholinus*. Testem in inguine latentem describit quoque *Platerus lib. 2. Observ.* De situ naturali testium adi *Arch. Piccolhom. lect. 2. lib. 3.*

Rectius perficiatur] Perfectionem aliquam feminali materię in vasis præparantibus vulgo dictis accedere, non est quod omni modo negamus; licet alium in usum longus eorum ductus à naturâ constitutus sit.

Cui vim testes atque foecunditatem adspirant] Hujus opinionis hæc maxime fundamenta dantur. 1. quod in iis apertis quandoque feminalis materia reperta satis copiose fuerit. 2. quod iis concussis ac contractis steriles sæpè evaserint homines. 3. quod testes animalium comesti mire roborent vim genitalium, & semen magis prolificum augeant. *Cl. Marchet* eidem omnimodo contrariatur, maxime ideò, quod nulla via detur, per quod semen jam confectum exire possit, imò nulla cavitas in qua confici possit in testibus reperiatur, nec unquam guttula seminis in substantia reperta.

Hujus sententiæ alias propter rationes & alii sunt, ut videre est apud *Mœbium*.

Ponderis subnexi vicem sustinere] Sunt qui judicant cum *Philosopho* testes solum tanquam pondera vasis Spermaticis & Parastatis appensa esse, ne conciderent, sicut telis textoriis pondera hujusmodi appensa esse notamus. Cæterum id veritati minus videtur congruere; nam quibus animalibus testes in Utero firmantur, iis his usus testium neutiquam convenit, & quibus testes in juventute contunduntur, in iis possunt ponderis vice defungi, & tamen illi steriles evadunt: atque præterea vasa illa satis firma sunt, ut non opus habeant tali distractione. Imò temperamentum testium, & tota constitutio illorum levis aliud suadere videtur, adde quod vasa non sint extensa sed mirè contorta.

Consequitur] Materiam quam conficiunt testes nobiliorem esse scribit *Everardus pag. 20.* & coloris magis lactei quam vesiculæ feminales, pallidiorem & serosiorum quam prostaticæ crassiorum ac viscidiorum. *Riolanus in Animad. ad Veslingium* carpit, asserendo Parastatas varicosos inter vasa præparantia, non autem deferentia esse connumerandos. *Spigelius*, *Lindanius*, alique cum iis continuum esse vas volunt. Imò *Wakeus*, licet non à præparantibus oriantur, iis tamen misceri vult & connecti, adeoque in ea aperiiri existimat. *Mœbius pag. 503.* eos vult à testibus per fibras albas

contortaque spectentur, ad operosiores seminis elaborationem. Præ ceteris vero nervosa, atque tangenti duriuscula deprehenduntur.

Ab his quicquid vasorum sursum iterum in abdomen fertur, & ad vesicam reflectitur, DEFERENTIUM nomen obtinuit.

Sed enim propendunt cum testibus vasa seminalia studiosa securitatis natura membranoso veluti sacculo abscondere voluit, quem SCROTUM appellant, in medio lineâ, tanquam sutura divisum.

Non simplex tamen hujus COMPOSITIO. Nam & cute constat, cui cuticula sua jungitur, & membranâ carnosa, quæ tenuior hîc quidem, sed cuti firmiter annexa, quod colligere se juxta cum illa, corrugarique facilius possit. Hanc Dartum vocant, quod excoriari haud difficulter queat. Accedit his Elytroides seu Vaginalis membrana, propius vasis, testibusque circumdata. Hæc peritonæi processus, & expansio quædam est, adeoque non secus atque illud gemina conspicitur.

Pars ejus externa Musculos suscipit exiles, quos ab officio Cremastres, suspensorios dicunt. Itaque à carnosa fibrarum intextu rubicunda membranam designat, quam Erythroidem auctores indignant. Pars interna

COMMENTARIUS.

albas innumeras, nullamque communionem vasi deferenti esse cum venis & arteriis testium.

Ad operosiores seminis elaborationem] Usus hunc parastatarum probat Mœbius pag. 504. contra Lindanum & Spigelium.

Deferentium nomen obtinuit] Licet totum illud vas à testibus usque ad prostates glandulos deferentis nomine insigniri possit, vocatur & Ejaculatorium. Cavitationem Bartholini judicio habent obscuram, Highmorus tamen in tunicis majoribus eam notabilem dicit, non semel evidentem eam in canibus observavi.

Scrotum] Quod quandam coriacei sacculi similitudinem referat, scrotea enim veteres appellabant, quæcunque ex alutâ aut pelle constabant.

Facilius possit] Mire multis Arteriis inquit Lindan. in Phys. & Venis refertæ, non citra notabilem Naturæ providentiam. Quia enim longiusculè abest Scrotum à fonte caloris quia extra est, neque in viciniâ partium à quibus possit foveri: fovere autem debeat inclusos testes, quis dubitet accepisse tot Arterias caloris gratia? Idcirco coitibus corrugatur &

stringitur circum testes arctius, ut & ipsos & in ipso semen confoveat amplius. Languidior Venus saccopendulis.

Vaginalis] Quia tanquam in vagina testes conservat. Valida ac densa est, plurimis abundans vasculis, interioris levis, exterius fibris crebris Darto connascitur.

Ab officio] Horum enim beneficio sursum retrahuntur, & suspenduntur testes, ne vasa spermatica, quibus testes cohærent, nimium extenderentur.

Pars ejus externa] Reprehenditur hîc à Riolo Veslingius, quod tres hic constituerit Tunicas, Elythroidem nempe, Erythroidem, & Nerveam. Ast miror maxime, qui non viderit Riolo Veslingium hîc non tres constituere tunicas, sic ut ipsi distinctæ sint membranæ, sed una eademque revera est, generali nomine Elytroides, speciali autem vel, quatenus à parte exteriori rubicundiora à musculis Cremasteribus colorem refert, Erythroides, vel quatenus à parte interiori substantiæ nervosæ similis, Nervea dicta.

Erythroidem] Fortassis à verbo Græco, quod est ἔρυθρος, rubesco, seu rubore suffundor.

terna tenuior, quæque testes immediatè contingit, distinctius cum Ruffo *Nervea* dicenda est. Hæc verò cum propria testium tunica, pinguedine aliquando respersa, foecunditati feminis detrimentum attulit. Oriuntur Musculi Cremasteres à ligamenti ossium pubis, sub transversis abdominis musculis testiumque pondus sublevantes, illos cum spermaticis vasis corpori adducunt, latius supra vaginalem tunicam expansi.

Jam Deferentia vasa, versus posteriora vesicæ reflexa, paulatim iterum in quasdam veluti CAPSULA dilatantur, VESICULIS racematim dispositis adscitas, intra quas confectum semen ubertim colligitur, asservatur, perficitur. Quapropter & loculos obtinent sperma colligentes, & meatu singulari ad urethræ principium perviæ sunt, in quod feminis partem dilutiorem propellunt.

Extremum spermaticorum obtinent *Ejulantia vasa*, quæ & PROSTATÆ GLANDULOSI nuncupantur. Nempe corpora duo CARNOSA, duriuscula, firmiter juncta, MEMBRANA-

QUE

COMMENTARIUS.

Nervea] Hanc eandem cum Albuginea, *Riolanus*, & *Lindanus* volunt, quod non admittimus.

Oriuntur à ligamenti ossium pubis] Nulla esse in osse pubis ligamenta, vult *Riolanus* in *animadversis*, sed jungi inter se per Symphysem, mediante Cartilagine, enascique istos musculos à spinâ ossis pubis, vel esse portiones musculi oblique ascendentis, carnosius, juxta os pubis. Sed certè verior mihi cum *Marchette* sententia *Veslingii*.

In quasdam] *Fr. Plazzonus lib. I. de part. gen. cap. 13.* idcirco plures esse censet, ut pluribus congressibus semen contineant, & in singulis singulæ evacuentur. At vero hoc falsum esse viri illi probant, qui, etiam strenui, postquam Veneris usum diu intermiserunt, non nisi semel aut ad summum bis, coire, reversioni conjugem posse observantur sæpius.

Vesiculis] Vesiculas has primus descripsit *Rondeletius*, & post eum *Fallopius*, ut testatur *Barthol. in Anat.* qui eas uvæ racemo quoque comparat, dicitque cavitates in iis mali punici cellulas ordine & figurâ eleganter æmulari. Non tamen magnitudine cum iis conveniunt.

Uberrimè colligitur] Quod semen contineatur in his Vesiculis, præter auctoritatem plu-

rimorum Anatomicorum, Autopsia exhibet, dum, si digitis premantur, illico semen ad meatum urinarium effluere notamus, sicuti lac ex mammâ, lotium ex vesicâ &c.

Asservatur] Negat *Riol.* in *anim. ad Vest.* Capsulas & Vesicas Vasa semen asservantia esse, sed vult semen in testibus asservari, donec per Urethram ejaculetur, quod præter alia vel ex eo falsum censet *Marchette* quod parastatæ varicosi, vasis deferentibus continui, impediunt præcipitem feminis descensum.

Et meatu singulari &c.] Hæc adhuc incerta maxime sunt, licet affirmet inter alios ipse *Spigelius*.

Partem dilutiorem] Reprehensio *Riolani* quam hic instituit, *Veslingium* nempe non exponere quale semen hic excernatur per meatum hunc in Urethram, inutilis omnino est, dum enim dilutiorem partem nominat *Veslingius*, quis non intelligit, quale illud semen sit.

Prostatæ] Quasi antestantes. *Columbo* dicuntur parastatæ, *Vesalio* glandosum corpus, *Fallopio* glandosum assistens, *Varolio* testes minores.

Corpora duo carnosæ] In anteriore parte Vesicæ ad radicem penis sita.

Aqui-

QUE valida succincta, juglandis ferè nucis MAGNITUDE, & habitu. Parte una capsulis semen asservantibus contermina sunt, à quibus semen accipiunt: altera vesicæ urinariæ collo JUNCTA, per multos, minutosque meatus, allaborantibus pariter vicinis musculis, semen jam copia, aut qualitate molestum in canalem virilis membri seu urethram EXPRIMUNT.

Productum itaque MEMBRUM VIRILE hunc potissimum in

COMMENTARIUS.

[A quibus semen accipiunt] Has glandulas non idèò datas esse, ut semen recipiant, sed ut vasis ipsis robur adferant *Waleus* putat, at plurimum & ad seminis perfectionem conferre cum *Warthone* in *Adenograph.* censemus.

[Vesicæ urinariæ collo juncta] Sitæ sunt ad penis radicem, *Mœbius* pag. 505. inquit, inter vesicæ cervicem & rectum intestinum. Ob sitûs hujus rationem proculdubio contingit, ut post clysterum acriorum injectionem, aut violentiorem purgationem affecto intestino recto semen quandoque emittatur, & appetitus venerei excitentur.

[Per multos minutosque meatus] Hi omnes tempore congressus, calore plurimum dilatati, transitum semini facilem in Urethram concedunt. In Gonorrhœa laborantibus eos dilatatos maxime vidit *Spigelius*; & *Vesalius* in quodam, ante suspendium simili morbo laborante, idem observavit. In canibus similibusque animalibus dissectis digitis exprimi quam facillimè per meatus hosce semen potest, simili omninò modo, ut mercurius exprimitur per corium.

[Semen jam copiâ aut qualitate molestum &c.] Excretio seminis quantitate aut qualitate molesti omninò præternaturalis est, ut in pollutione nocturnâ, & gonorrhœa à feminis dispositione pravâ, ortâ, quotidie observamus. Naturaliter non videtur aliter fieri, quàm quod, cum libidine incitatur, Musculi partium earum, maximè Coli, erigantur & tendantur primum. Hinc Arteriæ aliâs magis confidentes rigidæ fiant & tensæ, eò quod sanguis cum spiritu vitali copiose influat, undè omnia, præsertim colis fungosa substantia, distenduntur. Hoc dum fit ex calore & affricu materiam seminalem rarefieri & fluxilem magis fieri credibile.

[In Urethram exprimunt] *Galenus* putat contineri in ipsis humorem similem semini, sed longè tenuiorem, cujus usus sit Venere excitare, & in coitu delectare. *Laurentius* dicit, referente *Mœbio* pag. 505. eas & semen incrassare, & humorem tenuem pro titillatione in coitu excitandâ generare. *Regius* eas solas cum vesiculis semen generare credit. *Bartholinus* vult, eas neutiquam semen continere verum, sed humorem lubricum, pinguem, qui expressus, cum opus, ad urethram, eam illineat, & ab acrimonia seminis & urinæ defendat. *Veslingius* ubinam scripserit hasce glandulas ad seminis perfectionem aliquid facere, uti de ipso testatur *Mœbius* l. c. vellem declaretur. *Plazonus* de partibus generationis præterea præsidio esse vasis deferentibus vult contra vel disruptionem, cujus etiam sententiæ Clarissimum *Waleum* fuisse nobis certò constat, vel compressionem à Vesicâ aut Intestino recto, & probat hoc ex eo, quod simul seminis aliquid exprimitur in valido egerendi duratas fœces conatu.

[Membrum virile] Penis etiam dicitur, à pendendo, quia à corpore virili dependet, quanquam id toti non competit nomen, sed parti tantum ejus externæ, imò puerile id censet *Cl. Mœbius*, cui, si conjecturis ludendum, à penu derivare lubet, quod sit seminis, & per hoc posteritatis promptuarium. Dicitur & Virga, Colis, &c. Numero unicum est hoc membrum, rarissimum duplicem penem adesse, cujus rei *Bartholin.* in *Anat. & Schenkii* in observat. ferunt exempla.

[Hunc potissimum in usum &c.] Cum tam urinæ reddendæ serviat penis, quam semini, haud sine fundamento dubitant authores, uter sit principalis usus. Ego cum *Aristot. lib. 1. de gener. animal.* *Lindano Physiol.* p. 286. aliisque

in UsuM, ut genitale semen in finum uteri intimum certius projiceret.

CONSTAT communiter *cute*, & *membrana carnosâ*, nulla tamen interfusa pinguedine, ne motum ejus pro viribus imaginationis, instinctuque naturæ mirabilem, sensumque voluptatis singularem, aut mole inutili retardare, aut humidi ubertate obscurare queat.

Propriè vero constituitur è duobus *corporibus nervosis*; tum *urethra* seu ductu urinario, & opposita extremis *glande*. *Corpora nervosa* pudendi virilis oblonga sunt, & densa, substantiaque molli veluti medulla infarciuntur. Hæc verò minuto Venarum, atque Arteriarum plexu plurimum impedita est, ut calore spirituque copioso, nec prompte resolubili abundè corpora ipsa repleantur. *Musculis* moventur duobus, brevibus quidem illis, sed crassis, & robustis, à Coxendicis appendice nervoso principio deductis, quorum opera erigi præcipue subtendique possunt. Origo corporibus ab inferiore ossium coxendicis margine, fundamento satis stabili. Per initia quidem disjuncta sunt; mox tamen in progressu tenui intercedente sepimento conjuncta, simul ad glandem usque penis protenduntur.

His subjicitur *Urethra*, sive medius canalis, seminis pariter atque urinæ excretioni dicatus. *Membranis* componitur duabus: quarum interna tenuior, exquisitique sensus, non minus à voluptate illecebras, quam à dolore molestias exauget. Externa membranarum densior est,

COMMENTARIUS.

Seminis ejaculationi primario inservire existimo, non tam quod adsit in iis quæ urinam non habent, & absit in iis quæ Urinam habent, quam quod ad distans semen deferri debeat, & hinc etiam rigiditatem requirebat, quam & substantiæ fungositati, & hanc implenti spiritui cum sanguine debemus.

In uterum projiceret] Sine hoc scæminam concipere posse vanum.

È duobus corporibus nervosis] In cane, lupo, vulpe, balænâ, aliisque, radix horum corporum conditionem habet, at reliquum osseum est, ad extremum cartilagineum. Osseum penem *Dreslæ* in sceletto videri posse refert *Mœb.*

Corpora nervosa] Arundinibus Indicis similia sunt, exterius cortice dura, interius fungosa substantia atro ferè sanguine repleta gaudens.

Impedita] Id est, donata, copiosissima enim vasa per hanc substantiam sparguntur.

Repleantur] Adeoque penis erectio fiat, quâ

ratione *Highmorus* in *Disquisit.* & ex eo *Mœbius* pag. 513. declarant.

Deductis] Et in corpora ipsa implantatis.

Subtendique] Præter usum hunc etiam alium obtinere censet *Highmorus*, principia nempe corporum nervosorum constringere, instar ligamenti, ut Spiritus & sanguis, quibus distenduntur retineantur, adeoque sic penis turgidior magis diutiusque efficiatur. Prostatas insuper aliquo modo arctare & sic semen exprimere.

Sepimento] Recentiores sept. lucidum vocant.

Urethra] *Colem* impervium, sine urethrâ, observavit *Nic. Tulpinus* *Observ.* 38 *lib.* 4.

Canalis medius] Errat hic *Fernel* canalem seminis, & urinæ diversum esse negans. Ubi glans nervosis corporibus jungitur levem habet sinum, in quo humore erodente collecto fit ulcus & dolor intolerabilis. Valdè dilatat in calculosis.

Utrin-

est, fibrisque transversis, motus, roborisque gratia, respersa. *Musculis* urethra geminis prædita, longioribus quidem proxime allatis, sed gracilioribus. His origo est à recti intestini musculo sphinctere, à quo junctim ascendentes, circa medium canalisi terminantur, quem ad exitum seminis promptiorem utrinque dilatant.

In principio urethrae *Valvula* sese offert carnosæ, quæ meatuum à capsulis huc porrectorum orificia claudit. Ea vel à cathetere disrupta, cui in vesicam deducendo facile sese opponit, vel acrioris excrementi fluxu erosa, inemendabilem gonorrhœam accersit.

Cæterum *VASA* membro virili communicantur satis insignia. Venæ, & Arteriæ ab hypogastricis, & pudendis: quarum hæ per externam cutem, illæ per corpora ejus nervosa sparguntur. Addenda his Nervorum ab osse sacro propago duplex: quarum altera communia penis tegumenta, altera intima ejus pervadit.

Extremum pudendi *Glans* occupat, è substantia carnosæ, molli, spongiosæque producta. Velatur undique tenui membrana, quo blandior ab externis contactus, & sensus aded vigor evidentior sit.

Communium quoque tegumentorum ampliata portione vestitur, quam *Præputium* nominant, *Frenuloque* inferiore sui patte, quo detrahi glans queat, alligatur. Excrescit Ægyptiorum, Arabumque puerulis præpu-

COMMENTARIUS.

Utrunque dilatant] *Riolanus* in anim. ad *Vesling.* non dilatare vult musculos dictos Urethram, sed comprimere Vesicas feminales: Huic tamen cum *Marchette* accedere nequeo, quod si enim oriuntur à sphinctere ani, & ab osse Coxentice, ut ipse & alii afferunt, versus suum principium moveri debent; & si hoc fit dilatant urethram, nam deorsum tendunt. Imò confitetur *Marchette* cap. 6. *Anat.* se nunquam observasse istos musculos usque ad vesicas pervenire. Atque in his locus est ubi calculos extrahunt Chirurghi, & hic etiam locus forsan fuit, ex quo faber ille sibi ipsi calculum ovo gallinaceo majorem, ac uncias quatuor ponderantem, extraxit, de quo videatur *Tulpius* Obs. 30. lib. 4.

Arteriæ per corpora nervosa sparguntur] Arteriam hanc unicam semper observavit de *Marchette* in progressu divisam, cujus alter ramus per unam partem spongiosam, alter verò per alteram spargitur, ut sic spiritus in majori copia ad penem descenderent.

Glans occupat] Glans hæc extremitati penis imponitur, ut caput cervici, parte enim sui inferiore & quasi besii aliquantum penem suo ambitu excedit, in superiore vero leviter in mucronem obtusiorē definit. Glandem hanc imperforatam videre inter varios alios *Tulpius*, *Henr. ab Heer.* *Benivenius*, *Amatus Lusitanus*.

Sensus vigor evidentius sit] Quare igitur pressa non dolet? Censemus cum *Plazzono* de partibus generationis lib. 1. cap. 16. id singulare naturæ opus esse, ne si nimis doleret, in congressu, homo ab opere desisteret, sicque propagatio speciei impediretur.

Præputium] A putando, ab Hebræis enim & Turcis refecatur, unde *Apellæ* & recutiti dicuntur. Videatur *Etymolog. Vossii*.

Frenuloque Sc.] Convincit glandi præputium osculo tenus, & in hoc notam ponit *Lindanus* virginitatis masculæ, & causam doloris, quem illibati experiuntur in primo & omnium acerrimo congressu. Canis etiam ap-

pellari

præputium sæpius immodicè, plurimumque crescendo attenuatur, ut non minus ob periphymosis metum, quam ex religionis præscripto, partem ejus abscindere cogantur. Ab illius residua portione perforata, annulum gestant enormem, quotquot apud dictos populos serio castitatis voto puritatis æstimationem tuentur. Antiquitus imposita fibula cautum idem fuit.

COMMENTARIUS.

pellari solet, cujus denominationis causas vide apud Lindan. I. Physiol.

[Excrescit &c.] Carnosum & valdè magnum viderunt Hildanus, Schenckius.

TABULÆ CAP. VI. Explicatio.

Tabula hæc præter Vasa spermatica, Testes, Scroti membranas, & Virile pudendum, conjunctos tum Renes, tum Vesicam ostendit.

FIG. I.

A	Glandula Renalis dextra.
B	Glandula Renalis sinistra.
CC	Renes utriusque lateris.
D	Vena Emulgens sinistra.
E	Vena Emulgens dextra.
FF	Arteria Emulgens dextra, & sinistra.
G	Vena Spermatica dextra.
HH	Truncus Vena cava descendens.
I	Ramus Iliacus sinister vena cava.
K	Ramus Iliacus dexter vena cava.
L	Arteria Spermatica dextra.
MM	Truncus Arteria magna descendens.
N	Arterie magna Ramus Iliacus dexter.
O	Ejusdem Ramus Iliacus sinister.
P	Arteria Spermatica sinistra.
Q	Vena Spermatica sinistra.
RR	Ureter sinister. SS Ureter dexter.
TT	Vasa semen præparantia.
tt	Eadem Vasa quo loco Pampiniformia Vasa constituere incipiunt.
VV	Vasa deferentia semen retro vesicam euntia.
XX	Scrotum cum inclusis testibus.
Y	Vesica Urinaria. Z Cervix ejus.
aa	Musculi duo penem erigentes.
bb	Musculi duo urethram dilatantes.
c	Corpus penis. d Præputium.

FIG. II.

AA	Cutis Scroti separata.
BBB	Membrana Carnosa, hic Dartus appellata.
CC	Elytroidis Membrana pars externa, rubicunda.
DD	Musculus Cremaster, sub transversis musculis abdominis ortus.
EE	Elytroidis Membr. pars interna, seu nervea.
FF	Tunica propria testis Albuginea, separata.
f	Eadem Testi conjuncta.
C	Testis substantia Glandulosa.

H	Vas Pampiniforme, seu Pyramidale.
II	Epididymis. K Parastates Variciformis.

FIG. III.

æ	Vasorum præparantium portio.
AA	Vasa pyramidalia.
B B	Epididymis.
CCC	Parastates Variciformis.
D	Testis Membrana propria opertus.
E	Vasorum Deferentium portio.

FIG. IV.

AA	Vena & Arteria in Vasa Pyramid. explicita.
DD	Vasis Deferentis portio.

FIG. V.








A	Vesica externa tunica denudata.
BB	Ureterum portio.
CC	Vasorum semen deferentium portio.
DD	Capfula.
d d	Capfularum finis.
EE	Vesicula seminales.
FF	Glandula prostata. GG Urethra.
HH	Musculi Erectores.
II	Musculi Dilatatores urethra.
KK	Corpora duo Nervosa penis.
L	Præputium retractum.
M	Glandula cum Freno.

FIG. VI.

A	Vesica aperta Tunica intima.
BB	Ureterum pars.
CC	Orificia Ureterum in Vesica diducta.
DD	Capfularum initia.
EE	Vesica seminales.
CC	Glandula prostates divisa.
L	Foramen è capsulis in urethra principium tendens valvula præditum.

FIG. VII.

A	Corporis Nervosi penis Membrana separata.
B	Medulla ejusdem Corporis nigricans.
C	Glans nuda.



De Partibus Generationi in Muliere servientibus.

NON minor in muliebri corpore generationi famulantium organorum apparatus est. Ad sunt enim, quorum concursu seminalis materia producit, & producta, virilique spermati permista, ad frugem prolisque constitutionem promovetur. Proventum seminalis materiæ spectant Vasa præparantia, Testes, Vasa perficientia item, quibus continuata sunt Excernentia. Ad foetus vero conceptionem requiritur Uterus

VASA PRÆPARANTIA, non secus atque in virili corpore, venæ duæ arteriæque pares. *Venarum* dextra ex trunco Venæ cavæ, sinistra ex Emulgente prodit sinistra. *Arteriis* autem ortus est ab Arteria Magna: quamvis in harum initiis ducendis, non secus atque in virili corpore, varium sæpè naturæ opus observetur.

Jungunt se in progressu hæc vasa, intraque abdomen permanentia partim ad testes feruntur, partim ad Tubas uteri, tum ejusdem fundum, & cervicem, in qua sursum conversis hypogastricis vasis se per anastomoses conjungunt. Itaque tam foetui generando materiam, quam partibus nutriendis alimentum abundanter sumministrant.

TESTES muliebres glandulosæ **SUBSTANTIÆ** sunt, pubescentibus **AMPLIORES**, molliores, succique pleniores; provectis autem ætate minores, duriores, & magis exhausti. Sim-

COMMENTARIUS.

A *Rteriæ*] Arterias spermaticas præparantes in foeminâ quæ masculos pepererat, defuisse scribit *Barthol.*

Ad testes] Majori suo ramo, ligamento membraneo uteri suffulto.

Jungunt se] Non tamen ut in masculis tam variè per Anastomoses unitæ. Nec plexum ullum pampiniformem efficiunt, aut saltem non adeo notabilem.

Intra Abdomen permanentia] Unde haud difficile est colligere, quantum ipsis decedat de longitudine notatâ in viris, quibus testes extra corpus penduli.

Hypogastricis vasis se conjungunt] Rarum est, arterias spermaticas, uti depingit *Beslerus delin. fabric. human. mul. tab. I.* cum arteriâ emulgente habere Anastomofin.

Glandulosæ substantiæ sum] Neutiquam ex uno solido corpore, sed ex glandulis plurimis constructi.

Molliores] Duriores ego potius dicerem. Humidiores hinc etiam dicuntur, quod, si ad naturam, temperiem, & substantiam referas, falsum omnino est, sic enim ficiiores sunt, quam virorum, sed si ad humorem contentum, verum est, si enim secus virilem testem, non videbis humorem confertum, nisi rarissimè, sed dispersum per vasa minima, in foeminis autem *adegus* & confertum conspicitur.

Succique pleniores] Qui solet sæpè erumpere in faciem secantis, nisi caveat.

Minores] In genere testes in mulieribus non sunt tam lati, ampli, & magni, quam quidem in viris, cujus rei causam hanc esse credi-

Simplici reguntur MEMBRANAS ; sed valida , & latis uterii ligamentis annexi , circa fundum ejusdem obhærent.

DUCTUM porrigunt ad fundum uteri evidentem , utcumque brevem , tum ab eo exiliorem alterum , sæpiusque delitescentem , ad uteri cervicem.

EPIDIDYMIDES circa mulierum testes , PARASTATÆQUE *variciformes* nulli sunt , quotiescunque consueti artificii normam natura servat. Non enim opus hic erat , exquisitiore illa digestionem , quam virilis seminis elaboratio requirebat. Quia perfecta satis hujus succi , quem semen analogice dicimus , constituo est , aptam corpusculo foetus constituendo materiam præbet.

Neque ideo notæ , signive tantum gratia , producti foeminarum testes sunt.

COMMENTARIUS.

credimus , quod semen mulierum tantâ non indigeat incrassatione , quam quidem virorum , glandulæ autem vim constringendi ac incrassandi habent , ob constitutionem maximè frigidam. Vidit in foeminâ testem dextrum ovi gallinacei magnitudine D. Marchet.

Obhærent] In viris testes extra corpus debuerunt esse constituti , quo spiritus calorisque virilis copia refrigeraretur , is enim quia in corpore virili copiosior est , etiam refrigerium majus requirebatur , quod in corpore non potuit esse , cum sit maximè calidum respectu muliebri , talis autem spirituum copia quia non est in mulieribus , etiam non necessarium fuit tale refrigerium , sed parva ea quantitas spirituum in corpore satis frigido satis benè potuit refrigerari , quo sanguinis parti pinguiori uniatur , semenque constituat , & hæc etiam causa est , uti diximus , quare minores mulieres acceperint testes quam viri.

Ad fundum uteri evidentem] Evidentiorum ad uteri Tubas , de quibus mox . Hoc autem reverà ita fieri , & seminis materiam ex vasibus præparantibus ad testes , à testibus dehinc semen ad tubam uteri , & ex tubâ in fundum ejus excerni , res est ex anatome apertissima , in iis maximè , quæ semine turgent , pressis enim hisce consequenter partibus , videmus evidentissimè dictâ viâ semen ad uterum ferri.

Quem semen Analogicè dicimus] *Kyperus* in *Antropologia* , & *Ant. Everardi* in *hominis bru-*

tique exortu , pag. 21. negant verum semen hoc esse. Videatur & *Barth. pag. 155. Anatom.*

Neque ideo notæ gratiâ producti testes] Usus testium muliebrium qualis sit mirè inter Aucthores ambigitur ; quibusdam verum semen in iis elaborari affirmantibus , nonnullis contra negantibus , verba variarum collegit D. *Mæbius cap. 20. fund. med.* concludens ultimò , licet perfectum adeò non elaborent semen testes muliebres quam viriles , non tamen ideo vim omnem semen producendi iis auferri posse , imò plura esse in mulieribus imperfectiora ac in viris , quod vel in sanguine ipso verum esse censet , in his calidiore & fibroso magis ac in illis. *Anton. Everardi* in *Novo hominis* *byutique exortu* pag. 26. credere se firmiter dicit , foeminarum testes etiam semen conficere sed non adeò perfectum , minusque coctum aut elaboratum , interim tamen usum quam maximi , & summè necessarii , cuius rei argumenta hæc præcipuè adfert. 1. Quod beneficio seminis feminei , mediante sanguinis circulatione , ac spirituum hoc modo communiōe multæ alterationes mulieribus accendant , succrescat pubes , menstrua fluere incipiant , sororient mammillæ , ipseque uterus virtutis seminalis irroratione ad generationem disponatur. 2. In Sanarum mulierum testibus continuò reperiatur liquor aliquis albus , tennior quidem eo qui in virorum testibus apparet , attamen nomine seminis non ideo indignus. 3. In congressu , vel etiam sæpè antè cum

sunt. Materiam enim à præparantibus vasis susceptam in liquorem **CONVERTUNT** aquoso lacti persimilem, eumque vel ed copiosiore semper in iis dissectio reperit, quò florida magis ætas, viresque minus attritæ ante fuere, quàm morte mulier sublata.

FERTUR à testibus hic seminalis succus *partim* ad tubas, per tennes, Venisque lacteis similes meatus, ut perfectionem in iis ultimam consequatur, *partim* ad fundum, & vaginam, ut laxitatem, molliemque his necessariam seruet, atque, ut veteribus quoque placuit, adveniens appetitum aliquod incitamentum præbeat. Quamvis hoc in calidioribus tantum naturis, & quarum meatus angustiores sunt, potius obtineat. Frigidior enim, humidiorque sexus, nec sensum temperatoris excrementi, nec motum ejusdem laxioribus viis satis agnoscit.

Ad fundum autem uteri à testibus quæ pertingit spermatici humidi portio, concepto jam foetu longe nobiliorem usum præstat. Huic enim copiosius affuso, rude embryi corpusculum per initia conformationis innatat, adeoque non solum prohibet, ne quid uteri calor intensior, immitius, citiusque resoluat, sed foetum etiam ipsum in valida corporis materni concussione molliter sustentat, atque umbilicalia vasa, per id temporis capilli tenuitatem æquantia, à rupturæ periculo tuetur.

VASA SEMEN ASSERVANTIA, ET EXCERNENTIA sunt **TUBÆ**, corpora duo teretia, & ab uteri fundo utrinque protensa, quibus à flexu quem designant recurvo nomen inditum est.

COMPONUNTUR è membranis duabus, utero quoque communibus.

VENAS & ARTERIAS à spermaticis descendentibus adipiscuntur, in furculos minutos diremptas: **NERVOS** ab iisdem, qui fundum uteri perreptant: denique, ut supra propositum est, *tubulum nervosum* uteri fundo insertum, quamvis rarò ultra tubæ longitudinem mediam extensum.

Extremorum *uno* quod ab utero sejunctum est, in vegetis, celerique morte defunctis feminis, abundantius etiamnum collecto semine, capreo-

COMMENTARIUS.

eum semen ferè absque voluptate & insciis iis è partibus genitalibus copiose satis profluat.

Materiam à præparantibus, vasis susceptam &c.] Vide quæ supra de Testibus virilibus adduximus.

Venisque lacteis similes meatus] Pleniori in-

vestigationi inservire dubitationem suam censet *Deusignius tract. de Lacte*: an non hi meatus sint illud ipsum quod circa uterum quærimus, nempe vasa ipsa lactea lacteum seu chylolum succum pro nutrimento foetus in Utero advehentia?

preolorum instar contortæ conspiciuntur, & latiusculè diductæ, capsularum spermaticarum conformationem exhibent. Semen ipsum, quod hîc asservatur, concoctius, adeoque corpulentius est, & materiam foetui constituendo maximè idoneam præbet. *Altero* extremorum, quo fundo uteri superius continuatæ sunt, materiam contentam in cavitatem illius expellunt.

Frequentes sunt in tubis, haud secus atque in utero, obstructions, tumores, phlyctænæ amplæ, procul dubio abditæ sterilitatis contumacesque causæ.

PROSTATE GLANDULOSI circa uterum nulli sunt, quia non in distans, divisumque corpus, sed tubis conjunctum, feminale humidum excerni debuit, è quibus leni digitorum impulsu, propter cavitatis laxitatem, in uteri fundum perducì potest. Quæ causa item est, quod mulieres, si paucum est, si temperatius, quod è tubis promitur, in coitu cum viro quid conferant haud sentiunt.

Habent itaque feminæ, quæcunque foecundæ sunt, *spermaticam materiam* consistentia sive habitu duplicem, *aquosiore*, quæ partes uteri laxat, foetumque reficit, ac conservat; tum *corpulentam* in tubis, quæ ad foetus constitutionem ipsam requiritur, virilique semini primo permiscetur.

Ad fuscipiendum, conservandumque tum semen, tum foetum, **UTERUM** sive **MATRICEM** condidit, optimus ille, maximusque

COMMENTARIUS.

Materiam præbeat] Quæstionem hanc, an in feminarum pariter ac marium testibus semen prolificum generetur, & an utrumque semen concurret ad generationem, egregiè ventilat & decidit prædictus *Everardi pag. 21.* & sequentibus, nihil feminis foeminas ad generationem conferre, nihil conferre debere, imò nihil conferre posse, variis demonstrans.

Tumores] Novem circiter aquæ purisque libras in unâquaque invenit *Tulpius Obs. 43. lib. 4.*

Causæ] Interdum ita cavitas præter naturam dilatata fuit, ut molam contineret, quod *Marquard. in Emp. præct.* refert; aliquoties foetum, cujus exempla aliquot refert *Riolanus*, unum aut duo *Harvejus lib. de generatione.*

Uterum] Latinis uterus quod dicitur *Lindannus in Physiologiâ* ab utre formari, plane ridiculum æstimat, licet huc *Plinius* incli-

naverit *lib. II. cap. 37.* Et annon videri possit origine Græca esse, & vel ab ὤτρειος uterus dirivatus? vel ab Æolico ἄρεος, ut si quasi ὁ ἄρεος alter venter? quæ conjectura est accuratissimi *Scaligeri lib. 2. hist. anim. cap. 2. text. 22.* Etymologis examinandum offert.

Matricem] Matrix dicitur ferè duplici de causa. 1. quia quamdiu foetum in se continet, matris vices in alendo, conservandoque eo gerit. 2. quia matres facit, si enim illâ careant mulieres, nunquam fierent matres. Rusticarum rerum scriptoribus, *Columellæ, Varoni, Palladio*, tradente sic in *Coll. Anat. Laurembergio*, matrix universim eadem est quæ mater, sic boves nutrices, volatilia, matricem docet vocari. Græcis ὤτρειος appellatur, quasi ultima aut intima pars, eò quod inter partes imi ventris is infimum locum occupet,

musque plastes, partem infimi ventris, è membranis duabus **COMPACTAM**, ut ampliari concepto foetu, eodemque in lucem hanc edito, decenter iterum colligi posset.

Membranarum exterior peritonæo continuata, valida cum primis, nec rupturæ periculis facilè obnoxia. Interior, quæ propria uteri habetur, fibrosior est, magisque porosa.

Intercedit has membranas, quâ fundum uteri, proximamque cervicem ambiunt, *carnosus contextus*, qui post foetum conceptum affluentium humorum ubertate spongiæ in modum imbutus, sensimque laxatus, mirabilem in gravidis uteri crassitiem efficit, & cum maceratis pariter membranis distensionem admittit; quamvis in muliere non prægnante densus, valideque compactus, deprehendatur.

Non tamen infrequenter contingit, ut in angustiore utero, crescente amplo foetu, aut cum eo mola pariter succrescente, per ingentes in partu labores, tunc crassa quidem, sed & mollis uteri substantia, cum membranis suis, alicubi disrumpatur, foetu nunc caput, nunc pedes, manusve, qua data via est, in abdomen exferente; nunc toto corpore maternis intestinis incumbente, cui alius, præterquam abdominis dissectione, exitus haud patet.

VASIS

COMMENTARIUS.

infra vesicam sese extendens. Apud Latinos reperias & *Vulva*, sed hæc propriè uterus suillus. *Scalig. Exerc. 131. §. 4.* vocatur Favissa, eaque divina, in qua naturæ thesauri conditi ubi opus fuerit depronuntur.

Exterior] *Riolanus* aliquæ externam hanc geminam constituunt, majoris roboris gratiâ, quo admodum opus in dilatatione. Extimam earum peritonæo adscribunt & eadem operâ servire utero pro ligamento volunt, intimam verò extimam vasorum uteri dilatatam dicunt.

Carnosus contextus] Carnosæ substantiæ uterum dicere nil est, quod inhibet, quod si enim constitutionem ejus consideraverimus, non poterit in toto corpore exhiberi substantia quædam, ad quam melius reduci queat, quam ad carnem; est tamen caro sui generis, dura, & veluti plurimis nerveis membranis compacta, porosa admodum, variisque foraminulis, & quasi cavernulis donata, quæ tum temporis se maximè videre exhibent, cum superfluo sanguine implentur & dilatantur.

Mirabilem in gravidis uteri crassitiem efficit] In gravidis Anatomici multi putant, uterum, quo magis extenditur, eo magis attenuari. *Falcoburgius* tenuiorem revera fieri uteri substantiam censebat, sæpiusque id se observasse attestabatur, sed eam videri crassiorē, quod hepar uterinum illi arctissimè connascatur. Sed autopsia refragatur, ne authoritates diversorum adducamus, quia à primo conceptu usque ad partum, augetur secundum omnes dimensiones, & uti amplior, sic crassior paulatim redditur cum mollitie, ita ut ultimis mensibus duos ferè digitos crassa sit uteri substantia. Valdeque porosa ob affluxum sanguinis & spirituum pro foetu copiosum. Et certè videtur ita etiam debere esse, si causam reddere velimus lochiorum, unde enim illa deduceremus, si non ex fungosâ hæc Uteri substantiâ reliquias sanguinis impurioris, quam ut velit, aut copiosioris, quam ut possit, assumere foetus, recipiente.

Abdominis dissectione] De hac vide *Thom. Barth. Histor. 8. Cent. 2.* item *Franc. Rosetti,* &

VASTIS præditus est uterus numerosis : è quibus *Vena Arteriis* sociatæ , quæ superiorem ejus regionem irrigant , à vasis semen Præparantibus descendunt : quæ partes intermedias , atque inferiores accedunt , ab Hypogastricis suppeditantur , sursumq; repentes vasis enarratis oscula sua jungunt. His accensendi *Nervi* quorum illi superiora uteri qui attingunt , Sexti paris costalium nervorum extremæ propagines sunt : qui media , atque inferiora occupant , Sacri ossis ramulis accepti , referuntur.

Variat MAGITUDINEM uteri non ætas solum , sed & Veneris usus , & foetus gestatio.

Membranarum ejus nativam TEMPERIEM , utpote frigidi sicci-que participem , tam intertexta illis caro , quam sanguinis ubertas diluit , quæ tanta hic , ut ejus portio , vel in alimentum foetui cedere debuerit , vel salutari effluxu menstruus intervallis imminui.

SITUM adeptus est in humiliore abdominis regione , ubi ossis Sacri , Ilium , Coxendicis , Pubisque concursu , robusta veluti Pelvis efformatur : quæ vel ideo in mulieribus , quam viris amplior existit , latisque paulatim circa os sacrum , & pubis , utcunque validis ligamentis , instante partu , jamque urgente , cum coccyge diduci ulterius potest , ut ex angustius uterii materni in lucem foetus eluctetur.

CON-

COMMENTARIUS.

& Theophyl. Reynaudi *Traëctatum de partu casareo* , præcipuè verò omnium *Observ. Chirurgicæ* Herr. à Rodenhuyssen *Chirurgi Amstel.*

Mola] De Molâ varii , maximè huc facere videntur quæ adfert *Remb. Dodonæus Medic. Observ. cap. 49.*

Vasis præditus uterus numerosis &c.] Terminantur plures ad collum pauciores ad fundum uteri. Hinc crebris observationibus , ait *Lindanus* , constat , in non gravidis menstrua ordinariè à fundo uteri profluere , & hinc antè eruptionem crassiores quoque reddi. In gravidis vero si fluunt menses , eos per colli arterias eliminari verosimile.

Irigant] Plurimi Anatomici has per carnosam Uteri substantiam disseminari negant , sed tantum in externa superficie & membranâ absumi volunt , at falli hujus sententiæ patrones ipsa Autopsia demonstrat.

Ab hypogastricis] Imò & hæmorrhoidalibus.

Oscula sua jungunt] Anästomoses hæ magis apparent in menstruosis , & gravidis , & faciliè observari possunt , si in cadaveribus aliqua illa-

rum infletur , omnes enim flatu intumescunt. *Riolanus in Animad.* statuit Hypogastrica & Spermatica vasa circa uterum jungi , ex ipso depromptum esse , at quod ipse ex *Fallopio* idem desumpserit , de eo altum silentium , ut benè *Marchette* annotavit.

Accepti referuntur] Hæc præter triplicia vasa , & quartum genus ad Uterum derivari putat magnus ille Anatomicus *Bartholinus* , lactea nempe , ex glandulis novis lacteis in Abdomine repertis prodeuntia , ut videre est *cap. 10. de Lacteis Thorac.*

Magnitudinem variat &c.] De uteri magnitudine videatur inter alios *Piccolhom. prælect. Anat. pag. 189. Vesal. lib. 5. cap. 15.*

Laxatisque &c.] Quæstio est , an in partu naturali ossa luxentur ? alii negant , alii verò affirmant. Ego , quid censeam , in præcedentibus aperui.

Ut ex angustius uteri materni in lucem foetus eluctetur] Foetus duplex est , naturalis & monstrosus. Monstrosos foetus multorum experimenta confirmant. Videantur observationum libri,

CONJUNGITUR antèrius cum Vesica, & Ossibus pubis, admi-
niculante peritonæo : postèrius cum Intestino recto.

At superius **LIGAMENTA** requirebantur singularia, robusta quid-
dem sed laxa, ne uteri à foetu concepto tumentis incrementum impe-
diretur. Horum igitur *Primum*, quodque in lateribus conspicitur, pe-
ritonæi quædam expansio videtur. Estque aded *membranosum*, & *latum*,
ut tubis ac testibus, fundique protuberantiis attensum, matricem Ilium
ossibus alliget, figura vesperilionum alis adsimilatum. Hoc immodi-
cè laxato, antè per vim fortuitorum discripto, uteri fundus supra va-
ginam concidit, sæpeque excidit : vel in latera prolapsus, atque in-
guina, læso peritonæo herniarum fastidia accerset.

Alterum ligamentorum, *teres*, & *Nervosum*, à lateribus utrinque
fundi producitur, atqui antrorsum porrectum, peritonæo perforato,
ac tendinibus musculorum abdominis, supra pubis ossa Clitoridi jun-
ctum, in membranam dilatatur, fundumque uteri laxè partibus ante-
rioribus devincit.

Revera

COMMENTARIUS.

libri, imprimis *Salmuti*, *Schenkii*, *Aldrovandi*, *Bartholini*, *Zacuti*, *Liceti*, aliorumque, longà ferie hîc neutiquam advocandi.

Sæpeque excidit] Siquidem observationibus diverforum Medicorum habenda fides, plurimæ foeminae & diu satis & satis feliciter sine utero vixerunt, maximè quibus prolapsus putridusque resectus. Hæc autem resectio, quam *Fontanus in Analectis* ita commendat, quam difficilis sit & periculosa quis non novit, qui uteri cum aliis partibus connexionem firmam vasorumque ejus, substantiæ ac ligamentorum conditionem novit. Bis tervè accidit *D. Marchette* in Xenodochio patavino, quod uterus extra pudendum muliebre exierit, quem reposuit, & medicamentis adstringentibus curavit. Quod Uterus possit extra corpus prolabi, & sic vel reponi, vel auferri minime possibile, quicquid etiam multi scribant.

Postèrius cum intestino recto] Uteri collum tam arctè recto intestino nectitur, ut sine culto separari nequeat. Hinc læsa alterutra parte, utriusque excrementa libere inter se commean- t. Sæpe evenit, ut eroso vel abra- so utriusque pariete, præsertim in partu difficili, alvi fœces per naturalia mulierum expurgentur, quod nonnunquam etiam clauso ano na-

tivitatis culpa fit. Exempla habent, *Beniv. Obs. cap. 86.* *Dodon. in Schol. ad Ben. cap. 9.* *Lusitan. cent. 2.* *Obs. 10.* *Mercur. lib. 1. Morb. Puer. cap. 9.* *Barthol. obs. 63. cent. 2. cap. 9.* & *Sennertus*. Utrumque vidit *Cl. Sladus*, in officinâ Chirurgi experientissimi *D. Jacobi Cornelii* *F.* prius in muliere, alterum in infante puellulâ.

Clytoridi junctum] Ad ossa pubis ubi pervenit hoc ligamentum bipartitur; nam unâ portione Clytoridi devincitur, altera verò membranosa facta per musculos femoris dirigitur. Hinc evenire, haud sine ratione, credit *D. Marchette*, quod, quando mulieres præ dolore, in fundo abdominis excitato conquerruntur ipsum ferè semper per totum femur, & præcipuè inter articulationem Tibiæ & Femoris patiuntur.

Laxè devincit] An Uterus de loco in locum moveri queat dubium omni tempore movit. Sunt qui omnimodam utero quietem tribuunt, adeoque arctè ipsum partibus aliis alligatum esse per sua ligamenta volunt, ut nullo modo sursum aut deorsum, imò nec ad latera moveri queat. Sunt contra qui, cum mulierculis, motum, etiam inordinatum, ipsi adscribunt, eumque etiam non scio quorsum ad-

scen-

Revera tamen aliud, quam simplex ligamentum, rotundum hoc, & vermiforme corpus est. Componitur enim, si structuram ejus accuratius quis expendit, è duplici membrana, haud secus atque uterus ipse. Oritur, ut propositum est, ab uteri fundo, qua parte is ductum à testibus, & tubam admittit. Porosum intus, circaque finem evidentius concavum, & aquoso item, quod testes exhibent, semine in repentino fato sublatis mulieribus madidum. Itaque vero similis erit, per utrumque hoc vermiforme vas, cum testibus ad cervicem meatus defunt, clauso potissimum uteri osculo, feminalem materiam ex illius cavitate ad anteriora pudendi excerni, aliaque in utero præter naturam coacervata excrementa per eadem vascula ad utrumque inguen expelli.

OFFICIUM uteri proprium est, semina, generationis principia, in se recipere, tum recepta conservare, fovere, & tandem foetum lucis & liberioris

COMMENTARIUS.

scendere dicunt. Illi ut in defectu sic hi in excessu peccant. Observamus enim sæpissimè tactu in strangulatione ejus laborantibus, ipsum hinc inde evagari, & alicubi tumorem extrinsecus observabilem causare; imò etiam ipsorum ligamentorum talis est conditio, ut ob suam membranositatem facile extendi, & iterum contrahi queant, adeoque aliqualem utero concedere motum. Verum non idèò illico posterioris sententiæ fautoribus hinc accedendum, taliter enim eum moveri posse impossibile esse notum fatis illis, qui corporis interiora perlustrarunt.

Porosum intus] In puellis plena sanguine hæc ligamenta observavit *Marchette*.

Officium Uteri &c.] *Primarius* usus uteri est, semina recipere, adeoque sic generationi inservire, *Alter* evacuationi sanguinis menstrui, *Tertius* humorum excrementitiorum.

Recepta conservare] Præter naturam omnino est, lapidem in utero contineri, ut habet in *Analectis Fontanus*; *Elatus*, *Aquam*, aut alia monstrosa ut exempla apud *Dodonæum*, *Tulpium*, *Lustanum*, *Barthol. Salmuth*. alioque testantur.

Lucis & liberioris aure indigum extrudere &c.] Defectu alimenti puerum ab Utero sibi quærere exitum *Hipp.* jam voluisse *lib. de Naturâ pueri*, *Cl. Everardi loco sæpius citato* scribit; verba Hippocratica adducens. Propriè loquendo non quærît puer exitum,

ob id, quod ad se attrahat id quod in sanguine est dulcissimum, verum quod materia chylosa ultimis diebus feratur ad mammas in lactis generationem, quâ materiâ chylosâ si privetur uterus, contingit, chorion eadem similiter privari, & consequenter Amnion, *idem* addit. Qui etiam *libro eodem*, pag. 223. Partus naturalis causas prolixè & eruditè (variis variorum tam veterum, quam recentiorum causis adductis) examinat atque exponit. Foetus debitum incrementum nactus, in lucem ut emittatur, primario Uteri requiritur irritatio, quam putamus fieri à nimia sui distensione, varioque motu infantis. Qua ratione autem irritatus expellat, dicere difficultus est, probabile omnino, id fieri, quatenus constrictus à parte sua posticâ & circa fundum, id quod in se continet propellit, similiter ut aliqua à parte postica compressa foris eliduntur. Et quamquam exclusio hæc foetus utero præcipuè adscribatur, neutiquam tamen ea solitariè ab eo fit; sed adjuvant tum foetus ipse, quod maxime apparet defunctâ matre, tum aliæ partes, quales non solum Musculi sunt Abdominis dicti, sed præcipuè Arteriæ circa uterum existentes, Hypogastricæ, Iliacæ, &c. quæ idèò vehementer pulsant, & ad excernendum foetum sanguinem quoque multum ad uterum depellunt; quamvis nec venas hinc otiosas esse crediderim. Et in his vasis ob nimiam illorum à sanguine affluente distensionem

liberioris auræ indigum extrudere. Quæ omnia facultate propria, temperamenti blandicie singulari, motuque sibi naturali perficit, ac consummat. Horum autem evidentior constabit ratio, si partes Matricis conformatione diversas distinctius pervestigemus.

DIVIDITUR enim in Fundum, Cervicem, & Vaginam, cujus extremum est muliebre pudendum. *Fundus* appellatur uteri pars suprema, crassior in iis quæ gravidæ non sunt, & durior, flexuosis cornuum prominentiis nullis in humano sexu contorta. **MAGNITUDINEM** ejus facile manus complectitur: habituque externo cucurbitulæ speciem refert; compressæ potius, quam exactæ rotunditatis, si quidem mulier haud gestavit. *Cavitatem* intus exiguam obtinet, & simplicem, in qua tamen dextra à sinistris leviter prominulâ veluti lineâ distinguuntur. In hac tanquam secretiore quadam officina providus ille corporis humani conditor opificium totum, miramque tot partium constructionem, è seminis fœcundi paucis guttulis orditur, atque absolvit.

At quâ parte ex latiore ambitu sensim angustior evadit fundus *Cervicem* constituit, quam cum vagina passim auctores confundunt. In ea *Orificium* uteri est, *internum* dictum, perexiguum, latiusculum in virgini-

COMMENTARIUS.

nem & potentem contractionem dolores partûs consistere putamus.

Facultate propria &c.] Uterus an aliquid, & quid conferat ad fœtus productionem *Mœbius cap. 20.* prolixè declarat.

Minus complectitur] Dissecuisse se quasdam quarum uterus ne amygdalum capiebat, testatus non semel *Falcoburgius*.

Flexuosis cornuum prominentiis nullis in humano sexu contorta] In Mulieris Utero belluina cornua æmulari Tubas Uterialiquatenus flexuosas, auctores volunt, in quibus etiam humanum fœtum concipi, ut in cornubus belluinis, est mirabile atque certissimum multis experientis comprobatum.

Cucurbitula speciem refert] Appositè, aliàs haud inconueniens comparatio est cum matulâ vulgo dictâ urinali.

Leviter prominulâ veluti lineâ distinctus] Hanc lineolam vocat *Aristot.* Medianam, & eleganter describit *Vesal. lib. 5. cap. 15.*

Distinguuntur] Male adeoque faciunt illi qui cavitatem uteri in duas partes dividunt manifestas, quasi recto ductu duceretur protuberans quædam inæqualitas ab orificio sur-

sum, quæ uterum dividat in duos velut distinctos & à se invicem separatos sinus atque secessus. Inscitiæ in Anatomicis indicium non parvæ est, in utero muliebri cellulas quarere, majoris, hinc contendere, posse fœminam fœtus plurimos concipere, nihil enim tam rarum quam vera superfœtatio, quam cum *Cl. Patino* aliisque neque unquam vidi, neque possibilem judico, licet varii contrarium sustinere conentur.

In hac &c.] Generationis historiam hîc traderemus, nisi materiæ ubertas loci verò exiguitas prohiberent, imò functiones nullas ex professo hoc libro Anatomico explicare constitutum nobis esset; commodiori itaque loco reservabimus, ad eam quam nuperrimè orbi communicarunt *Cl. Harvejus & Anton. Everardi* humanissimum Lectorem interea ablegantes.

Per exiguum] Instar foraminis glandis penis, ne intret nocivum aliquod, nec facile exeat attractum semen. Si quando extra vulvam procidit (quod impossibile judicamus, ut ante dictum,) aut invertitur, ostinacè pilcis exactè referre dicitur.

virginibus, & feminis quæ prolem enixæ non fuerunt, in aliis rotundius. Hoc ad semen suscipiendum hiscere, eodemque jam concepto exactius claudi: rursus autem ad foetus exclusionem stupendum in modum paulatim ampliari diducique necessum est.

Fundo, ejusdemque cervici continuata est *Vagina*, quam & collum matricis nominant, canalis mollis, & laxior, atque in orbem comitantibus rugis inæqualis, ad congressus virilis commodum, exitumque foetus descendens faciliorem aptatus. Circa finem suum, antèrùs vesicæ urinariæ cervicem admittit; posterius recti intestini musculo constrictori validè conjungitur.

Reliqua PUDENDO muliebri terminantur. In eo LABIA duo externa, tum carnosæ mollesque productiones, quas NYMPHAS auctores, *alæque* nominant: quibus commissis, externæ ambientis iniuriæ, à sinu pudoris abarcentur.

Prominet inter alas superius glandiformi extremo CLITORIS, corpus

COMMENTARIUS.

Rotundius] Undè forte obstetrices Germanæ vocant de Roose, Rosam, Gallicæ verò coronam, le couronnement de la mère.

Exactius claudi] In gravidis adèd constringi putatur, ut ne stylum tenuem admittat.

Collum matricis] Frustra carnea ex collo uteri & vesicæ decidua in puerpera describit *Barth. Observ. Anat. cent. 2. hist. 6.* quæ legi meretur.

Rugis inæqualis] Anticâ parte prope vesicam maxime, minus versus intestinum rectum, cui incumbit. In juvenculis autem rugæ hæ arctiores sunt, cervixque angustior, obliquantur & latera callosa fiunt ac lævia in ventustis, in iis quæ longo fluxu laborarunt menstruali vel albo. Imò & quæ multum concubuerint aut pepererint, ex continuâ enim fricatione rugæ istæ relaxantur, & hinc evenire tradit D. *Marchette* quod ferè nunquam meretrices utero gerant, quia semen detineri nequit. De Usu harum Uteri rugarum, in *Observ. Chirurgicis* agens *Henr. ab Rodenhuyssen*, eas partum facilitare censet, protrudendo foetum egredi allaborantem.

Vesicæ urinariæ cervicem admittit] Error est gravissimus, non tantum in *Veslingio*, sed ferè omnibus Anatomicis meritò culpandus, quod Uterum & Vesicam in unam communem viam terminari velint, habet enim utraque

pars ibi specialem ad pudendum externum egressum.

Labia duo externa] Corpora sunt oblonga, mollia, substantiam habentia singularem, ex cute spongiosaque carne cui pinguedo subjacet duriuscula constata.

Nymphas] *Vel*, inquit *Lindanus in Physiol.* quod sponsum primò intromittant, *vel* quod aquis præsent & humoribus profilientibus: nam inter eas, tanquam parietes, urina cum sibilo effunditur in distans, vocant alii *Carunculas cuticulares*. In matronis velut bifores valvæ ante colli ostium ferè totum prætenduntur, in matribus multâ prole beatis ultra dimidium ejus non obumbrant. Figurâ & colore quodammodo referunt cristas, quas sub gutture galli habent pendulas. Nec dubium, quin inde crista fuerit à Poëta appellata.

A sinu pudoris] Sinus pudoris dicitur, quod pudeat mulierem ejus partis. Universum corpus humanum pudendum est, & pudere debet hominem ob peccatum, quo amisit perfectionem & integritatem, & tamen contingit non pudere hominem totius corporis sed partium genitalium, quoniam turpitudine in iis partibus magis quam aliis elucescit.

Clitoris] Hinc verbum, *κλειτορίς* lascivius tractare, quo notatur scelestus mulierum contactus, quo se invicem ad voluptatem & fe-

corpus exiguum, teres, è nervosis duabus, intusque spongiosis portionibus compositum, Principia ab ossium Coxendicis margine distincta ducit, musculis utrinque duobus, parvis quidem, sed origine, officioque tensoribus pudendi masculini cognatis, prædita. Vasorum omnis generis copia, vigore sensus, adeoque tentiginis impetu, membro virili proportionem respondet.

Illius enorme atque inutile incrementum, endemium Arabibus, Ægyptiisque malum est. Itaque vel in puellis, quicquid hujus immodestius prominulum conspicitur, abscindere protinus, & inurere coguntur.

Sub clitoride, versus interiora vaginæ, MEATUS occurrit URINARIUS, brevis in feminis & contra frigoris noxas circumposita carunculâ tutus.

Cæterum quibus à lascivo genitalium contactu aut Veneris usu, externisque aliis iniuriis illibatum corpus est, iis pudendum membrana obvelat, carnosis expansionibus, carunculisque stipata, quam HYMENEM veteres appellarunt. Rima circa medium finditur, per quam profluvio muliebri exitus datur, quamvis hujus forma defloratis, partuque defunctis feminis aboletur. Eam tamen, quemadmodum in nubili

COMMENTARIUS.

minis ejaculationem instigant, & tales Fricatrices appellantur. Exemplum vide apud *Tulpium* l. 3. *Observ. c. 35.* Vocatur & *Mentula*, *Virga*, vel *Penis Muliebris* à similitudine quam habet in situ, substantiâ atque figurâ cum virili. *Tentigo* itidem, fortè quod à sanguine spirituque influente sæpè rigeat & distendatur, aut quod in coitu à pene virili tentetur. *Nympha* quoque quod circa aquas, seu urinam versetur. *Oestrum* itidem *Veneris*, quod mulieres exagitet in venerem. *Columbus* appellat *amorem* & *dulcedinem amoris*, quod in coitu aut digitis confricata hæc particula mulieribus insignem voluptatem adferat. De hac particulâ *Vesalius* nihil scripsit, perinde ac si non extaret, aut ipsi planè ignota fuisset, cum tamen antecessorum varii ejus jam fecerint mentionem. De Clitoride *Riolani animadversio* rejicienda omnino, quod si enim exacta est & naturæ rei conveniens ejus quam tradit *Veslingius* descriptio, quî novit *Riolanus* quod eam ex scripto *alieno* descripserit? Vide quæ hæc de re tradit *Marchette*, ubi quam graviter *Riolani* erret in descriptione Clytoridis clarè ostendit.

Corpus exiguum] Sæpè propendit instar penis virilis, maxime in iis, quæ, sive ignoran-

tes parvulæ, sive lasciviores adultæ, frequenter eam contractant & fricant. Imò pr. nat. aliquando ad summam magnitudinem visa est excrescere, quale exemplum habet *Platerus*, nec absimile *Tulpius*. Ita productum & tensum vidit in meretrice *Dom. Panarol. l. 4. obs. 4.* ut pueri 12. annorum mentulam æmuleretur.

Principia distincta] Vocantur hæc Crura, ab aliis Ligamenta clitoridis.

Abscindere coguntur] Modum amputandi tradunt *Aëtius* & *Ægineta*, qui cum *Nympha* confundunt. De circumcisione fufius in *Antiquitatibus puerperii* egit *Barthol.*

Meatus occurrit urinarius] Perangustus hic *Fernelio* aliisque dicitur, respectu nempe colli uteri externi & vesicæ urinariæ, at verò quod si cum meatu urinario in viris comparatio instituat amplius valdè est, hinc est quod mulieribus sæpè calculi extrahantur per cervicem vesicæ, sine ullâ sectione.

Humanam] Cui otium est, hæc de membrana consulere poterit Anatomicos alios.

Eam tamen Sc.] Cogor hic ingenuè fateri, te vestibulum pudendi in virgine decenni & paulo ultra hanc æratem non exactè lustrasse, nam tria in hoc loco posita corpora non descri-

nubili virgine, & infantibus observatur, proxima tabula s. schemate quinto, & septimo, spectandam pudicis animis exhibemus.

In iis, quicquid ab inferiore pudendi angulo, per latera sursum, rimam dictam in se continet, revera *membranosa* ab interna vaginæ tunica *expansio* est, *venis, arteriisque* minutis conspersa: quæ blandè protracta, circulum carneum exprimens, præcipuè virginei pudoris flosculum constituit. Carnosior in quibusdam, & à latere veluti toris aucta, geminæ carunculæ speciem repræsentavit.

Rarum est eam concreto quasi genitali rima sua destitui: sæpius callosa duritie rigida inpetum arietantis illæsa sustinuit. Tenuis communiter, & ob humorum affluxum debilior, citra magnam vim expugnari potest.

Imminent huic membranæ PRODUCTIONS CARNOSÆ duæ, myrti folia amygdalivæ nucleum exprimentes, quæ & ipsæ parte superiore sinum angustant: quibus ulterius meatum urinarium cingens caruncula superaddita conspicitur.

His ita lege ordinariâ constitutis, natura de virginum tutela sollicita, tenuioris quasi cutis expansione membranam aliquando inducit aliam, quæ ab angulo quoque pudendi inferiore, & lateribus, tranversim instar zonæ porrecta, rimam obvelat, neq; aditum ad eam, nisi propè meatum urinarium blandè introrsum vergentibus, permittit, sub quo laxior, & à subjectis uteri partibus sejuncta est, quam dissectionum peritissimi viri pro hymene pariter descripsere; quamvis in paucis reperiatur, & præsens obstetricantium temeritate tanquam inutile operimentum plerumque disrumpatur. Formam ejus vide tabulæ sequentis figura sexta.

COMMENTARIUS.

describeres, &c. inquit *Riolanus in animadv.* Cogor ego hîc ingenuè fateri, mi *Riolane*, te verba *Veslingii* non exactè lustrasse, quæ enim primis de Hymene tradit, sequentibus illustrat, ut adeò unum idemque corpus sit.

Venis arteriisque minutis conspersa. Quibus in primo coitu ruptis, dolor & sanguinis profusio oritur. Tandem vero evanescit ex coitu, vel alias petulantia attritu, quemadmodum in viris frænum glandis, quando laceratur. Quæritur hîc, an primo coitu egredi debeat sanguis in omnibus virginibus, qui certa & indubitata sit virginitatis nota? Ad hanc quæstionem Respondet *Barthol. Anat. reform. lib. I. cap. 31.* fieri ut plurimum, & fieri debere. Variæque hanc rem declarantia sacra æque ac profana adducit. Impediri posse, & non fieri

concludens. 1. Si ex petulantia ruperint virgines digito vel alio instrumento. 2. Si tempus sit menstruorum, aut paulo ante præcesserit. 3. Si rima oblonga sit in hymene, sic ut dilatatio fiat, non ruptio. 4. Si collum uteri amplum, admodum & penis angustior. 5. Si dextre mas intrudat penem. 6. Si passa est virgo procidentiam uteri. 7. Si tardius virgines elocentur. 8. Si humorum acrium defluxu irrigetur hymen, vel erodatur.

Rimâ suâ destituti Exemplum vide *Obs. 31. Cent. 2. histor. Anat. Barthol. & Observationum Benivenii cap. 28. & 31.* de Clausuræ Uteri variis speciebus egregiè in *Observ. Chirurg. Belgicæ* *Henr. Rodenhuyssen.*

Productions carnosæ Carunculæ dicuntur myrtiformes.

TABULÆ CAP. VII. Explicatio.

Tabula hæc genitalia feminarum, primùm in situ naturali : deinde per partes singulas extra situm proponit : ultimò hymenem virginæ, ejusque zonam exhibet.

FIG. I.

- a Vasa Semen preparantia dextra.
 b Vasa Semen preparantia sinistra.
 c Intestini recti portio.
 d Uteri Fundus supra Vesicam eminens.
 e Vesica Urinaria.

FIG. II.

- A Glandula Renalis dextra.
 B Glandula sinistra.
 CC Ren utriusque lateris.
 DD Vena Emulgentes dextra.
 EEE Arteria Emulgentes dextra.
 FF Truncus Vena Carva in duos Ramos Iliacos dextrum & sinistrum distracta.
 G Vena Emulgens sinistra.
 HH Arteria Emulgentes sinistra.
 II Vena Spermatica dextra.
 K Arteria Spermatica dextra.
 L Arteria Spermatica sinistra.
 M Vena Spermatica sinistra.
 NN Arteria magna truncus in Ramum Iliacum dextrum & sinistrum divisus.
 OO Testes Muliebres.
 PP Ligamenti lati portio.
 QQQ Tuba uteri in utroque latere cum ligamento depressa, ut Testes appareant.
 R Uteri Fundus.
 SS Ligamenta Uteri Teretia abscissa inferius.
 T Cervix Uteri.
 V In latere dextro Vena Hypogastrica
 V In latere sinistro Arteria Hypogastrica
 X In latere dextro Arteria Hypogastrica
 X In latere sinistro Vena Hypogastrica
 Y Vagina uteri.
 Z Vesica Urinaria supra pudendum depressa.
 aa Uterum portio circa Vesicam abscissa.
 bb Uterum portio circa Renes descendens abscissa.

- cc Vasa preparantia semen circa Testes dilatata.
 dd Ductus Testium, seu Vas deferens.

FIG. III.

- AA Uteri Fundus transversim dissectus.
 BB Cavitas Fundi.
 C Cervix Uteri.
 D Osculum in Cervice uteri, Mulieris quæ foetum gestavit.
 EE Vagina uteri dissecta Rugosa facies.
 FF Ligamenta uteri Teretia subtus abscissa.

FIG. IV.

- A Testiculus dexter.
 BB Tuba dextra depressa.
 C Testiculus sinister.
 bb Ductus Testium ad uterum.
 DD Tuba uteri sinistra.
 E Fundus uteri.
 FF Ligamenta uteri Teretia inferius abscissa.
 G Vesica Urinaria vagina uteri inserta, sursumque porrecta.
 HH Ureterum portiones.
 II Clitoridis Crura duo Musculosa.
 K Clitoridis corpus ipsum.

FIG. V.







- A Clitoridis caput sub Cute prominens.
 BB Labia externa pudendi distracta.
 CC Ala seu Nympha pariter diducta.
 D Caruncula meatui Urinario (a) circumposita.
 EE Productiones due Carnosæ myrtiformes.
 FF Expansiones Membranosæ rimam continentes.

FIG. VI.

- A Membrana transversim pudendo inducta: pro Hymene habita.

FIG. VII.

Infantis Puella pudendum representat, in quo eadem partium significatio, quæ Figura quinta.



CAPUT VIII.

De Fœtu Humano.

Materno corpori Fœtus contemplationem subjungimus, quippe qui pars aliqua ejus, utcunque temporanea, quemadmodum non substantiæ solum, alimentique communio, arguit, sed Secundinarum etiam, Vasorumque umbilicalium cum utero nexus. Fructum adèò ventris consideramus genuinum, qui sicuti immitis adhuc, suavi matricis fomento servatur, ita vitalibus auris jam maturus abscedit, atque angustis genitricis erumpit.

EFFORMATUR embryi corpusculum ab insita virili semini virtute,

COMMENTARIUS.

Vitalibus auris jam maturus abscedit, atque angustis genitricis erumpit] De partus Causis jam ante citavimus *Ant. Everardi*, qui videri meretur. Ast quando maturus? pariendi tempus homo obtinet multiplex. Experientia docet & septimo, & octavo, & nono, decimo & undecimo vitales fœtus natos esse. Qua de re videri inter alios plurimos possunt *Plinius l. 7. c. 5. Amatus Lusitanus cent. I. curat. 27. Sennertus l. 4. praxeos. Bona Ventura de partu, Spigelius de format. fœtus*. Ast cur homini tam varium assignatum pariendi tempus? *Kyperus in Antropologia* diversas causas adducit, quarum 1. Regionum diversitas. 2. Tempestatum varietas. 3. Seminis complexio. 4. Uteri, mulieris, sanguinisque materni conditio, & 5. Victus ratio varia, de quibus locum citatum consulere poterit benevolus Lector.

Embryi corpusculum ab insita virili semini virtute, quam ab officio Plasticam nominant &c.] De formatione fœtus hic pròlixius agendi locus commodus esset, sed, ut jam dixi, ob materiæ amplitudinem, quæ arctis cancellis contineri nequit, & quod de actionibus agere institutum adèò nostrum haud sit, quam quidem de iis quæ Anatomix veræ subjiciuntur, particulari magis examini doctrinam hanc reservabo. Interea ad ea quæ hâc de re scripserunt Magni Viri, *Harvejus, Deusingius, Claudius de Coudre, Ent, Nymmannus, Velt-huyssen*, & qui ex iis varia collegit *Mœbius*

aliique varii, Lectorem benignum remitto, licet nullus omnium sit, qui mihi in omnibus satisfacere queat, forsan nec sibi ipsi *Antonius Everardi Tractatu sæpius allegato, pag. 31 & seq.* egregie & breviter hoc negotium de Caula efficiente generationis aperit. Hujus itaque verba hic adducere consultum. *Partes, inquit, seminis masculini crassiores nihil conferunt ad generationem, sed spiritus in semine contenti unica efformationis fœtus causa existunt. An non demonstratur hoc nobis in nonnullis animalibus, quibus non penis, sed membrum aliquod genitale concessum est, quo feminae pudenda contingant ac fricent saltem? Nihil autem movet me medicorum autoritas, & mulierum testimonium, volentium, conceptum fieri, si seminis masculini illa corpulentia detineatur in utero, alias irritum esse coitum & frustratæ spei. Magis confido oculis meis, in cuniculo enim, tertio à coitu die dissecto, imprægnatæque, nihil quicquam liquoris, succi, seminis, aut quod seminis habet similitudinem, in utero reperi. Observavit idem hoc Harvæus, lib. de generat. anim. Exerc. LXVIII. pag. 441. Semen ergò quò magis spiritibus turget & prægnans est, eò magis aptum natum est, quò sibi efformet tale corpus, à quo processit. Huic autem rei quamplurimùm conducit ipse actus venerens, quo partes genitales excandescentes semen spiritibus turgidum reddunt & intumescens, illudque in uterum tanquam arvum sæcundum & fertilem cum impetu projiciunt.*

Producit

tute, quam ab officio *plasticam* nominant, quæ ad summi Numinis præscriptum minima omnia maximaque disponens, ineffabilis sapientiæ, bonitatis, potentiæ, non obscura vestigia, sed argumenta designat clarissima. Huic *Calor* famulatur, partim congenitus spermati, partim à matre cum alimento suppeditandus.

Producit autem corporis totius rude quoddam & perexiguum compendium, formicæ majoris amplitudinem haud excedens, in quo tamen illa prius secernit, ac perficit, sine quibus vita servari nequit, Cor nimirum, & ab eo tanquam basi porrectas Venas, & Arterias, sanguinis vehicula: mox Jecur, aliaque deinceps, quorum celerior usus incidit.

Secerni, perficique primum cor, antequam aliud quicquam in corpufculo factum perfectumque oculi agnoscunt, embryorum vivorum in oviparis accuratior contemplatio abundè patefecit. Quamvis enim initio perexiguum cor sit, candidumque totum, ob contenti tamen in utroque ventriculo sanguinis transparentem rubedinem, à partibus reliquis facile distinguitur. Adjuvat, confirmatque oculorum sensum præcipue illius motus. Nam simulac in foetuli venis aliqua sanguinis indicia sese proferunt, cor & ipsum sanguine plenum, celeri quidem, sed ordinato pulsu, cum auriculis suis agitur. Sanguine, quotiescunque cor dilatatur, ventriculos ingrediente; egrediente vero, quotiescunque constringitur: quamvis hæc aucto jam nonnihil corde, adhuc tamen albicante, evidentius appareant. Absolvitur autem ejus conformatio citius ob calidi vim, copiamque singularem, qua præditum est, nulli partium reliquarum æquè concessam: postulabatque perfectio-

COMMENTARIUS.

Producit autem Sc.] Modum & ordinem, quo foetus in utero formatur, quamvis varii, etiam in re Anatomicâ exercitatissimi viri, exponere allaborarunt, non putarem tamen eos sibi ipsis in omnibus satisfacere potuisse, res est nobis abstrusa, soli hominis Creatori Deo cognita; ovarum examen licet quidem exhibeat indies alias atque alias partes aut saltem earundem augmentationem, veram tamen causam efficientem formationis hujus non video an & quomodo exhibere queat. Imò ab ovo ad hominem dari certam argumentationem facilè est dicere, difficile probare. Nolumus itaque nos rem adeò gravem judicio nostro exponere, quin potius, cui volupe est, authores eos legendos offerimus

qui ex professò de eâ scribere voluerunt, proximè præcedenti paginâ citatos.

Illa prius perficit Sc.] In primâ foetus formatione inquit Ant. Everardi spiritus genitales, vel potius natura, quæ illis spiritibus inest; habet sese ad modum pictoris, qui primò opus suum per omnes partes delineando, postea perficit ac manum addit ultimam; ita partes nostri corporis (nulla observata partium prioritate aut posterioritate) simul ac semel & unico quasi momento delineantur omnes, saltem spermaticæ vulgò dictæ, cum sanguis prius generari priusque distribui debeat, quam pars sanguinea possit constitui; quamvis interim nullæ partes sanguineæ tam simplices sint & homogeneæ, quin omnes aliquam adjunctam habeant ex spermaticis, quibus tan-

fectionem celeriore necessitas. Nam motu cordis calor spiritusque protinus suscitandus augendusque fuit, & elaboratus in corculo sanguis partibus corporis transmittendus ut coctionis munus obirent.

Materia ex qua formatrix primum corpusculi systema producit, Seminalis in materno corpore substantia est, ad fundum uteri è tubis transfusa, cui calidum suum spiritumque virile semen addit. Ad constitutionem, fundatique foetus augmentum, & sustentationem, Sanguis ulterius requiritur maternus. Hic enim primum illud è semine mistum haud protinus ingreditur, nec parenchymata in eodem ulla constituit: sed productis cum corde umbilicalibus vasis attrahitur, carnique viscerum, non nisi longiore temporis intervallo, juxta cum musculis ruborem suum inducit.

Partium hinc procreatarum, aliae *deciduae* sunt, aliae cum foetu dum vita superstes, *perennantes*. Deciduas appello Umbilicum, ejusque Vasa, tum Membranas, quæ foetum utero hærentem involvunt, & his impostam Placentam: hæc enim illo in lucem edito, cessante quem præstabant usu, spontè se junguntur.

UMBILICUS est membranofus ductus, per quem à foetu vena, & arteriæ, maternum ad uterum surgunt.

Nervis carere cum secundinis debuit, quorum usus in eo cum sensum abesse præstaret, nullus erat.

LONGITUDINE per initia quidem conformationis protinus insigni

COMMENTARIUS.

quam fundamentis superstruuntur, ad harum tutelam & operationem, siquidem à spermaticis dependet omnis actio.

Seminalis substantia &c.] Vide Cap. præcedens de Semine Muliebri. Quidam solum maris semen ad conceptionem sufficere censent, foeminamque nil seminis conferre, alii cum maris tum foeminæ semen in opere generationis admittunt, ita tamen ut illud activè, hoc solum passivè concurrat. Alii alias sententias fovènt, quas videre licet apud Cl. *Mæbium* cap. 20. ubi præcipuè *Harvei* opinionem adducit, quam *lib. de Gener. anim.* fovet, semini nempe virtutem nullam quoad foetus formationem inesse, semenque omne à coitu uterò iterum effluere, relinqui solum contagium spirituosum; probareque conatur 1. quod ab imprægnatione nullum semen in utero reperiatur. 2. quod & tali modo galli-

nas aliasque aves plures generari videamus, ex ovo nempè quod nec semen galli est, nec gallinæ; non galli, cum si aliquoties saltem affricetur exterius uterus gallinæ, foecundetur gallina, adeò ut deinde per annum integrum omnia ova prolifica gignat, licet semen ad uterum non perveniat, nec uspiam in gallinâ reservetur.

Attrahitur] Hæc de re quid sentiendum sit, modo vidimus, plenius mox habebimus, & egregiè satis demonstrarunt *Deusignius*, *Harvejus*, *Claudius*, de *Covre*, *Everardi*, &c.

A foetu &c.] A foetu an oriantur, mox constabit.

Nervis carere debuit] Egregiè de nervorum absentia contra varios Anaton. *Spigel* de form. fat. pag. 13. sedulo legendus.

Longitudine &c.] Longitudinem horum vatorum quod spectat, in animalibus, quæ plures

signi conspicitur; embryi compages, vix formicæ majoris, ut dictum, aut apiculæ magnitudinem superet. At foetu jam ad exitum maturo, spithamarum trium mensuram, crassitiem vero digiti æquat. Quorum hanc vasorum tutela; illam sanguinis in longiore itinere perfectio, tum foetus utero eluctantis commodum, faciliorque secundinarum protractio poscebat. Nodis quidem distinctus nullis est, tortuosus tamen, & inæqualis, ad mollem vasorum inclusorum flexum efformandus erat.

EXORTUS umbilici est à medio abdominis, ut thoracis, capitifque devexo pondere, versus ostium uteri, proclivior esset foetus inclinatio. Rudiore adhuc embryo, amnii liquori innatat, eodem vero perfectiore,

COMMENTARIUS.

res foetus simul utero suo gestant, ut sunt canes, feles, similiaque varia, brevissima omnino sunt; in iis vero, quæ unicum tantum ut homo, ovis, &c. insignem obtinent longitudinem. Cujus rei si exigas rationem, licet difficile admodum sit certi quid hic statuere, hanc tamen tibi ventilandam exhibemus. Quæ plures foetus concipiunt, in iis necessarium est, ut moles carnea utero non solum, sed & unicuique foetui vicina sit, quo sic locus sufficiens omnibus detur, & ideo vasa hæc brevissima natura construxit: in aliis contra, quæ singulari foetu gaudent, eadem moles utero adhæret, sicque à foetu ipso quam remotissime abest; hic ergo opus rursus fuit vasa longissima fieri, quo ab utero ad foetum producantur.

Sanguinis perfectio] Negat hoc Spigel. loco citato.

Foetus utero eluctantis commodum] Quod si enim Umbilicalis hic ductus brevior à natura homini concessus, ipso cum foetu uteri placenta foetumque involventes membranæ simul in partu exire debuissent, quod difficultatem ejus summam creasset, à qua modo multo liberior est mulier, dum ob ejusmodi productum umbilicum prius foetus totus extra Uterum progredi potest, antequam secundinæ secernantur. Nec tantum hoc commodi trahit foetus ex longitudine hujus ductus, quod secundinis non obruatur, alias simul exeuntibus; sed etiam quod periculum ipsi sic nullum immineat à copiosissime effluente sanguine, cujus fluxus summus & subitaneus

causatus fuisset, siquidem ob brevitatem hujus ductus placenta uteri vasorum ab oculis abstraheretur una cum foetu, ut hoc in extractione secundinarum, dilacerationem vasorum producente, sanguinis uberrimus effluxus dilucidè demonstrat.

Poscebat] Hæc si nonnunquam vel nimium protendatur, vel motu involvatur circa colulum, strangulationis imminet periculum & difficilior partus, quia ob funis brevitatem retrahitur foetus, nec vim imprudentis obstetricis sustinet. Exemplum vide apud *Fabr. Hildanum*.

Nodis quidem distinctus nullis est] Contrarium docet *Harvejus lib. de uteri membranis*. *Ejusdem inquit funiculi Venæ, variis locis nodos aliquot, sive varices, quasi vesiculas sanguine plenas obtinent: quâ arte à naturâ cautum est, ne sanguis in foetum confertim restuat. Ex horum varicum copiâ, superstitiosæ obstetrices de futura sobolis numero divinare solent; & si nulli ejusmodi nodi adfuerint, steriles in posterum fore pronunciant; ex eorundem quoque ad invicem distantia, de puerperiorum intervallo; & ex colorum varietate de sexus discrimine aniliter harrulantur.*

Tortuosus tamen & inæqualis] Hoc magis ipsis vasis in ductu umbilicali contentis convenit. Trunci enim Venarum atque Arteriarum umbilicalium, postquam ad trium quatuorvè digitorum spatium digressi sunt ab umbilico, non aliter ac funis aliquis major ex tribus minoribus contorqueri consuevit, undè & passim Medici umbilicum Funiculum appellant.

fectiore, supra pectus plerumque reflectitur, & sinistrorsum ab occipitio ad frontem productus, utero propinquo per contenta vasa membranisque expansas **C O N J U N G I T U R.**

V A S A Umbilico inclusa sunt *Vena* unica & *Arteria* duæ. Ex his *Vena* arteriis amplior existit, & intra jecur à venæ portæ fundamento principium ducit. Itaque per fissuram jecoris ad umbilicum descendit, arteriisque sese mediam exhibens, per umbilicum varicoso flexu ascendit, tandemque supra chorion membranam, ramis, furculisque quam plurimis dirempta, utero se jungit, sanguinem ad foetus nutritionem proleitura. *Arteria* umbilicales, ex arteriæ magnæ ramis Iliacis internis ortum trahunt, à quibus ad urachi latera sursum porrectæ umbilicum ingrediuntur, juxtaque cum vena progressæ, supra chorion & ipsæ multipliciter sparguntur, sanguinemque spiritu vitali perfusum partibus alioquin extra foetum defecturis communicant.

Alienum à vero est, ab utero materno membranisque circumfusus hæc vasa ad foetum protendi. Nam in volucrum tenellis pullis agnoscere licet, naturam ab incluso secundinis suis foetu venam arteriasque deducere, ac paulatim in propagines minores dirimere. Facit idem in vegetabilibus, quorum radices non è terra in plantas, sed è plantis in terram altricem porrigit. Idque abunde extra terram, bulbi, seminaque germinantia confirmant.

Non

C O M M E N T A R I U S.

Vena à venæ portæ fundamento principium sumit.] Vidit d'Marchette venam umbilicalem duo principia obtinere, unum scil. à venâ portæ, alterum verò à Venâ Cavâ, quod rarissimum.

Sanguinem ad foetus nutritionem proleitura] Usus Venæ umbilicalis esse nutrimentum foetui adducere, cum aliis *Mœbius* p. 564. docet, partim quidem sanguinem ex uteri & placentæ vasis, partim lacteum succum ex humore inchorio contento, quod palam fieri tradit exindè, 1. quia in dictum humorem per chorion multi ramuli venarum umbilicalium disseminantur, qui alimentum exindè ceu ex præsepi exsugunt & in foetum traducunt. 2. Quia in omni foetu humano vegeto & sano lac perfectum passim reperitur, eoque thymus, pancreas, mammae, aliæque glandulae abundant.

Arterias umbilicales &c.] Arteriæ initio

exiles admodum sunt, & vix conspicuæ.

Sanguinemque &c.] Usus harum arteriarum à variis variè explicatur, placet maximè sententia eorum, qui volunt sanguinis arteriosi partem à nutritione foetus superfluum per Iliacos duos ramos in placentam reduci, ut sic iterum venis matris restituatur. *Anton. Everardi* pag. 136. &c. communem illam sententiam, foetum in utero sanguine materno nutriri per vasa umbilicalia adducto, idque beneficio anastomoseon vasorum uterinorum cum vasis umbilicalibus, omni modo improbat, anastomoses illas fictitias pronuncians, veramque chylosin & hæmatosin in corpore foetus constituens, sic ut vitâ propriâ vivat foetus, nec spiritu matris vegetetur.

Alienum à vero est &c. Eruditissimè hanc sententiam explicatam habes apud *Harvejum* de gener. anim. contra *Fabr.* ab *Aquapend.* lib. de form. foetus.

Non

Non minus recedit à vero, arterias, venamque umbilicalem ante cor, & jecur produci. Neque enim utrumque viscus ex sanguine, sed, ut supra positum est, ex semine primum constituitur. Imò totius corpusculi systema prius componitur, quam ex eo vasa protendantur. Horum enim ante constituta viscera usus nullus est; ut conceptus animantium & stirpium semina clarissimè demonstrant.

Additur umbilicalibus vasis *Urachus*, corpusculum membranofum, teres, intusque porosum, à vesica veluti basi paulatim versus umbilicum attenuatum, per quod redundans in vesica serum in amnion tunicam transcolat. Dubium tamen hoc videatur iis, qui vasculi hujus soliditatem,

COMMENTARIUS.

Non minus recedit à vero &c.] Confer quæ sub initium hujus capituli dicta sunt. Totius corpusculi systema prius componitur quam ex eo vasa protendantur. Hæc inter quænam prius producantur, vena nempe, an arteriæ, valdè disputatur. Venas autem arteriis non esse priores generatione, sed simul eas produci, egregiè demonstrare laborat D. *Everardi loc. cit.*

Horum ante constituta viscera nullus usus] Nonne foret absurdum, inquit *Everardi p. 101.* Venam arteriasque umbilicales (quia primum in conspectum veniunt) statuere fundamentum totius corporis, iisque partes alias accrescere, cum, arterias umbilicales ab arteriis Iliacis, & Iliacàs à corde procedere, sit certissimum.

Corpusculum membranofum] Duabus partibus constat, ex *Riolani* animadversione, interiori nervosa ab interiori vesicæ tunica, exteriori magis membranosa ab exteriori.

Intusque porosum] Porosum Urachum esse negant quamplurimi. Quomodo ergo urinam, sanguinem, aut similem humorem per umbilicum fundere potuerunt illi de quibus *Fernel lib. 6. Path. cap. 13. Laurent lib. 8. histor. Anat. quæst. 17. Cabrolus Observ. Anat. 20. Hildanus cent. 1. Observ. 52. & 47. cent. 2. Observ. 58. cent. 3. Observ. 37. Highmorus lib. 1. Disquisit. Anat. part. 4. cap. 7. & alii. Vander Linden dictu haud absurdum esse censet non per Urachum factam illam excretionem esse, sed arteriarum aliquam; nos verò potius in hisce revera pervium Urachum fuisse puta-*

mus, præter naturæ ordinem & in casu extremæ necessitatis.

Per quod redundans in vesica serum in Amnion transcolatur] *Aquap. Spigel.* & alii voluere Urinam per Urachum egredi & colligi inter Amnion & Allantoidem, in hominèque ac in brutis. Verùm præterquam quod tunicam Allantoidem in homine non dari observationes Anatomicorum testentur, cum pervius non sit Urachus, ut jam vidimus, verum solidus, eam non admittet, percolari enim non potest, utpote crassior, sine manifesta via, & par in adultis ratio foret. *Varolius* voluit in vesica omnem urinam colligi, conservarique ad partum usque, quam etiam sententiam *Mœbius*, aliique amplectuntur, funiculi ac ligamenti tantum; vice eum esse æstimantes. Egregiè de hac re dissertit *Everardi pap. 186. & seq.* pluribus ostendens, nec per Urethram; nec per Urachum, in foetu exire, ante partum, eò quod Urachus solidus sit, impervius, vicem ligamenti suspensorii sustinens, Vesica quoque, quocunque etiam mense grandiusculus diffecatur, urinà semper plena ac distenta reperiatur. Hanc autem vesicam recipiendæ urinæ sufficere, cum in utero, ob nutrimenti puritatem, excrementa paucissima generentur. Imò puer genitus statim urinam & homerdam deponat. Quin & si per Urachum aut Urethram lotium excernere-tur, eum qui inter Chorion & Amnion continetur liquor Urinæ debere habere conditiones, quod non est. Ultimò pessimè consultum fuisse foetui si tanto temporis spatio in humo-

tem, exilitatem insignem pori, tum exitus per umbilicum obscuritatem propendunt. At cum in auras vitales prodiit infans, quicquid horum vasorum umbilico jam separato super est, usu pristino cessante, in ligamenti soliditatem compingitur.

MEMBRANARUM in utero foetum ambientium *duæ* sunt: quarum quæ proximè corpus illius includit, AMNIO S nuncupatur, *mollis admodum, levis, pellucida*, chorioque, qua parte placentam sustinet,

COMMENTARIUS.

re tam falso ac mordaci excoriationes in edito foetu causante debuisset detineri.

Umbilico jam separato &c.] Separatio hæc hoc maxime modo ab obstetrice peragitur. Infantem ex uteri ergastulis egressum ubi gremio suo excepit obstetrix, umbilicalem ductum apprehendit, eumque jam unà cum secundinis reliquis extra corpus matris contentum, ad paucorum digitorum transverso- rum longitudinem propè Abdomen infantis rescindit, factoque nodo ipsi Abdomini quam proximo, id quod extra eum est relinquit, donec exsiccatum sua sponte decidat, quod modo fit diebus paucissimis, modo longiori tempore: formatus sic umbilicus & consolidatus cute inducitur valida satis, quæ in immensum præter naturam dilatatur in Hernia umbilicali, ubi intestina ad eam laceratis aut dilata- tis interioribus accedunt, cujus exemplum depingit *Severinus*, & in grandævâ muliere vidit *Bartholinus*, nosque in muliere corpulenta ante paucos annos Dei gratia restitui- mus. Quod si accidat præter naturam umbilicum hunc ad Abdomen pervium esse, varia per eum è corpore excernuntur, ut Fæces, Vermes, Pus, Lapilli, Sanguis menstruus, Serum, &c. ex observatione *Tulpii*, *Sabnuth*, *Horstii*, *Moebii* aliorum- que.

In ligamenti soliditatem compingitur] Abrupta vel abscessa vasa umbilicalia, subito mortem inferre volunt auctores, contrarium tamen volunt *Riolanus* atque *Bartholinus*, dicuntque. Si mors sequatur, ex accidente evenire, læsis scilicet interioribus, & patulo ad rerum noxarum penetrationem ostio. Verosimile tamen cum *Cl. Moebio* judicamus, si ab horum ligamentorum læsione homo non sta-

tim pereat, cum incommodius & deterius vivere.

Membranas in Utero foetum ambientium] Originem earum quod attinet, vulgata opinio est, Amnion, ab initio statim constitui ante constitutionem ipsius foetus, Chorion vero tunc, cum, augescente foetu, opus videtur majore robore. Recens verò observatio *D. Harveji* contrarium docet, utramque membranam quidem constitui ante formationem foetus, primo tamen Chorion, postea Amnion apparere. Qua de re *idem lib. de Membris uteri, & Everardi hominis & bruti exortu*, pag. 197. &c. prolixè agunt.

Duæ sunt] Ad membranas Foetus quod attinet, *Harvejus de gener. anim.* & ex eo *Lindanus in Physiolog.* cum earum usus præcipuus continendis aquis inservire, atque istæ solum binæ appareant, certissimum censet, neque ipsas membranas (necessariò atque usitatè) numero plures reperiri. Qui autem tres tunicas numerant indè eos deceptos arbitratur quod à Veteribus eadem membrana modo Chorion à venarum copiâ, modò à figurâ, Allantoides nominetur. In veritatem inquirant doctiores, mihi saltem certum videtur in brutis.

Quæ proximè corpus includit] Et quia immediatè hæc foetum circumdat, facile fit ut in partu capiti, aut manui aliivè parti pars ejus obvoluta & propter tenuitatem abrupta, simul prodeat, diciturque hoc velamen, si capiti adhæreat in mare *Galea*, in foemina *Vitæ*; si manui *Chirotheca*; si corpori *Indusium* aut *Camisa*.

Amnios] Ita dicitur ob mollitiem & tenuitatem, aliis *Agnina*, *Charta virginea*, *Indusium*, *amiculum*, &c.

net, & reliquo insuper ambitu blanditer juncta. *Liquorem* continet, ab initio conformationis aquosum, tenella tunc innatantis sibi embryi vasa, in valido genetricis motu tuetur, & propinquo jam partu, ruptis membranis, utili proluvie maternos locos remollit, atque ad facilem foetus exitum laxat. Colligi eum inter amnion membranam & chorion in humano foetu nexus harum tunicarum prohibet, atque observatio fida refellit: nec detrimenti inde quicquam in prolem redundat, quam ab alluentis liquoris acrimonia, siquidem eam obtineret, inductus cuticulæ lentus humor facile tueretur.

Altera membrana **CHORION** vocatur, & ipsa foetum totum, sed intercedente amnio circumdat. Omnino præcedente *crassior* est, *inæqualis exterius, interna facie levior*, Venis, arteriisque umbilicalibus numerosis subjecta, quo loco succrescente foetu **UTERIPLACENTA** seu jecur innascitur. Sic enim ob figuræ quoddam rudimentum appellatur caro illa mollis & spongiosa, innumeris vasorum umbilicalium surculis, tum calore fovendis, tum substantiæ suæ adminiculo fulciendis, optime comparata.

Addunt his *Allantoidem*, seu *farciminalem* tunicam, urinæ præcipuè colli-

COMMENTARIUS.

Blanditer juncta] Imò blanditer satis toto ambitu, adeò ut manifestè à seinvicem hæ membranæ distent, ast quâ placenta est, annectitur eidem satis arctè, ut foetui ad umbilicum.

Liquorem continet &c.] Liquores hos intra membranas foëtus contentos non esse excrementa foëtus, sed genuinum ejus alimentum variis sunt ex recentioribus qui statuunt, *Harvejum* secuti. Cl. *Everardi* varias, cum & ex *Harvejo*, rationes adducit; quod nempè gratus sit gustui & odoratui, unde bruta eum illicò à partu absorbent, foetum adhuc madidum lambunt; Conceptui insint, antequam quicquam foëtus inveniatur, tenui membranâ inclusi; quo magis augetur foetus, eò magis imminuantur, quod non esset si ejus excrementa essent; Imò in quorumcumque animalium genere reperiatur, etiam in iis quæ toto vitæ tempore nec mingunt, nec sudant.

Placenta] In gemellis duplex placenta uterina, contra ac *Mæbius* docet, & cum ipso *Lyserius* in Collegio *Anatom.*

Quo loco succrescente foetu uteri placenta seu

jecur innascitur.] In muliere, *Harvejus* inquit, placenta parti membranæ Chorion superiori adnascitur. In ovibus vero, Carunculæ plurimæ variis ejus partibus annectuntur. In damis, & cervis, conceptus quinis solum locis utero conjungitur: idem autem, in equa, infinitis propemodum locis internæ uteri superficiei adhæret. At vero, nec in omnibus animalibus, neque omni tempore, ejusmodi carnosa substantia inest: sed in iis tantum, in quibus conceptus utero firmiter adhæret; & tum demum, postquam is alimenti gratia itidem annexus fuerit.

Calore fovendis] Imò *Julius Cæsar Arantius* de form. foetus cap. 6. amplius voluit, coquere sanguinem maternum crudiusculum, ut hepar genuinum, & hinc ei nomen esse. *Arantio* consentit *Harvejus* de Membran. uteri §. 36. placentiæ tale munus esse existimans, quale hepatis atque mammis vulgo tribuitur.

Fulciendis] Natura enim non solet vasa in sublimi detinere sine sustentaculo, & quasi pulvinari.

Allantoidem] De hac consule *Harvejum* de Membr. uteri. & *Everardum* pag. 197.

Quam

colligendæ dicatam : quam tamen in brutorum potius , quam humano partu , accuratior anatome deprehendit

Imò membranis hisce foetus **COTYLEDONES** quoque sive *acetabula* juncta esse , magno veterum consensu traditum est , quamvis in ipsa re non minore cum dissensu. Cum eorum *alii* cotyledones ora pronunciarint vasorum , sanguine tumentium , per internam uteri tunicam sparsorum : *alii* carnes existimarint , inter chorion membranam , uterumque locatas , foliorum cotyledonis herbæ similitudine , quæ vasa umbilicalia fulciant , tum sanguinem affluentem mammarum instar uberius in se recipiant , circa foetum ovillum , similiumque animantium matricem pulchre conspicuas.

His si quid in homine quærimus quod respondeat , non ad aliud , quam placentam uteri superius descriptam , respiciendum est. Quæ concava , qua parte chorio incumbit , convexa , qua utero necitur , folium adeo bulbiferi cotyledonis refert : cætera , substantiæ mollitiæ , vasorum multitudine , convenientia situs , tum officio , usuque ipso , carnibus dictis similis , sola magnitudine vastior est.

Atque hæ deciduæ fœtus partes sunt , quæ cum post editum prius infantem utero excludantur *secundinarum* nomen obtinuerunt.

Perseverantes in edito foetu partes sunt eadem illæ , quas vel in ventres natura distinxit , vel collocavit in extremis , ut initio mihi propositum fuit. Dissimilitudo tamen harum , dum partibus comparantur hominis qui vigorem ætatis attigit , paucis hic percipienda.

Nam **VENTRICULUS** foetus , quamvis contractior , nunquam vacuus , sed albicante semper , lentaque materia stipatus est , totusque jecore superius coopertus.

INTESTINA vel septies corpusculi totius longitudinem metiuntur : e quibus **Coecum** dictum intestinum amplius est , fecibusque refertum. *Excrementa* in tenuibus intestinis pituitosa , flava : in crassioribus

COMMENTARIUS.

Quam tamen in brutorum potius quam humano partu Anatome accuratior deprehendit. In cane , lepore , cuniculovē nunquam hanc juvenire potuit *Everardi tractatus* indicati pag. 197. *§* seg. eam diversam a Chorio nullā ratione æstimans.

Alii ora pronunciarint vasorum Videatur hæc de re inter alios *Joan. Lindan. Phys. cap. de Cotyledon.*

Carnes &c. Cotyledones *Harvejus* de gen.

anim. cap. 4. de acetab. putat esse cellulas plurimas exiguæ capacitatis , per carunculas , aut carnosam substantiam dispersas , atque albumine sive materiā mucilagineā refertas ; ut favus melle repleti solet.

Dissimilitudo harum Videatur hac de re *Antropographia Riolani.*

Fecibusque refertum Sine excremento fuit in nuper natā anno 1650. à *Barthol.* dissecta I. de qua *hisor. II.*

ribus duriuscula, & nigra, quæ *Meconium* seu *papaverculum* antiquitus nominata.

JECUR insigni mole diductum apparet, atque in sinistrum usque hypochondrium latè provectum. *Substantia* ejus antequam rubicunda fiat, *vena* tamen sanguine purpurascente plenæ sunt: tum sub eo CYSTIS FELLEA bile flava turgidula conspicitur.

PANCREAS item amplum, nitidumque ductuum chylum vehementium seriè evidentè exhibet; quamvis longe clarius, cum editus in lucem foetus lacteo alimento aliquantisper usus fuit. Horum lineamenta Tabula secunda hujus capitis, figura prima quantum simplici intuitu fieri potuit, repræsentantur.

RENUM GLANDULÆ, quas *Renes succenturiatos* vocant, magnitudine hic mirabiles sunt: non accumbentes renibus, ut fit in adultis, sed iisdem incumbentes, partemque superiorem lato veluti sinu complectentes.

RENES ipsi mole vastiores, plurium glandularum collectionem toto corpore ostendunt.

URETERES patuli, tum VESICA urinæ copia largiter distenta.

UTERUS in puellis fundum obtinet compressum, *Tubas* longius porrectas, & præcipue *Testes* amplitudine conspectiores: quæ omnia in Tabula dicta figura secunda sufficienter exprimuntur.

Ex his abdominis visceribus, ea quæ publicis coctionibus destinata, non sibi tantum privata digestionè vacare, dum in utero foetus est, sed communi pariter utilitati consulere, manifestissimum existit. Elaborare enim *Ventriculum* chylum materia in eo contenta fatis arguit, atque inde resultantia in gyris intestinorum varia excrementa: quamvis non satis humanus sensus ceperit, quibus viis materia in chylum convertenda ad ventriculum feratur: cum veterum de suctione foetus per os sententia magnis difficultatibus obnoxia sit. Rationi tamen consentaneum est,

COMMENTARIUS.

Meconium] Meconium ea dicuntur excrementa, quæ in ventriculo intestinoque foetus ex chylo separantur, accedentibus nonnuncquam & aliis corporis superfluitatibus, nomen hoc habent à similitudine, quam cum meconio, succo scil. ex papavere expresso, habent, quoad nigrorem.

Ductuum chylum vehementium secum exhibet] De his quid sit, ex antedictis de Pancreate constat.

Resultantia inde in gyris intestinorum varia excrementa] Stercus quod in Intestinis generatur ex materiâ minus sincerâ Chyli in Ventriculo subacti, cum Urinâ ipsâ, tamdiu in receptaculis propriis detinetur, quousque puer natus alvum vesicamque exoneret, quem in usum naturam Intestina longissima, & membranacea fecisse putat Everardi.

Cum veterum de suctione foetus per os sententia magnis difficultatibus obnoxia sit] Obnoxia licet

est, quemamodum extra uterum instituta coctione, jecur, & lien accipiunt à ventriculo, quicquid in sanguinem commutandum est, sic in utero dum alitur foetus, negata per stomachum, gulamque via, trahere ventriculum ex conjuncto sibi tum jecore, tum liene, quod digerere ipse, atque in chyli speciem redigere queat.

Jecur item in foetu sanguinem conficere palam est, ob biliosi pariter, ac serosi extremitati manifestam separationem. Nam utcunque purus sit, qui alendo embryo sumministratus à matre sanguis; attamen cum temperamento foetus haud dubiè dissimilis sit, supervacuorum separationem denuo, & mutationem in officina sanguinis sustinere debet.

Circa pectus **MAMMARUM** *Venæ* sanguine admodum plenæ. Sed notabile potissimum in *Corde*, è Vena cava, in Arteriam venosam *Ostium amplum*, sive *Anastomosis*, obtenta membrana tanquam valvula munita. *Canaliculus* item, ex Vena arteriosa in Arteriam magnam protensus, ut è dextro cordis sinu in sinistrum, arteriaque magna in venam arteriosam, promptius sanguis commearèt: quanquam utramque viam ætate

COMMENTARIUS.

licet sit; naturæ tamen minime dissentaneam, inter alios censent Viri Magni *Ant. Deusingius* dissert. de gener. foetus. *Thom. Bartholin.* de Lacteis Thorac. & *Epistolâ ad D. Horsium*, *Joh. Claudius* *Covre de nutrit. foetus*, *Georg. Seegerus*, dissertatione Anatomica de Hippocratis, & *Democriti doctrina de nutritione foetus humani in utero*. *Harvejus* de gener. animal. *Ant. Everardi* pag. 145. & seq.

Jecur & Lien accipiunt à Ventriculo &c.] Quam hæc falsa sint, nisi sano sensu intelligantur, ex superioribus constat.

Sic in Utero &c.] Negato uno negatur & alterum.

Sanguinem conficere palam est] Modo quem in historiâ hepatis tradidimus.

Utcunque purus sit qui alendo Embryo sumministratur à matre sanguis] Hæc ut intelligenda sint, superiora docebunt. *Cl. Everardi l. c. pag. 123. & seq.* sanguinem menstruum nutritioni foetus intervenire neutiquam posse probare contendit, argumentum maxime triplici; quorum *Primum* est quod plurimæ mulieres nunquam fluxus menstruales patiuntur, quæ interim vivunt incolumes, sanosque foetus & robustos pariunt. *Secundum*, quod experientiâ constat, mulieres non paucas,

quibus paucissimus est mensium fluxus ad uncias scil. quatuor aut tres, foetus nihilominus prægrandes & robustissimos in lucem edere, quod fieri neutiquam posset, si ex tantillâ sanguinis copiâ tam magna foetus moles spatio noni mestrî deberet constitui. *Tertium* quod si menstruo sanguine nutriretur embryo, quo foetus sit grandior, eò pauciora, menstrua reddi debeant, cum tamen contrarium verum sit.

In officinâ sanguinis sustinere debet] Hanc autem primariam jecur esse falso hæcenus creditum, ut inter alios *Deusingius* variis tractatibus ostendit.

Canaliculum] Non invenit eum in puellâ nuper natâ *Cl. Bartholin. histor. 14.*

Ut è dextro cordis sinu in sinistrum, arteriaque magnâ in venam arteriosam promptius sanguis commearèt.] Videtur hic errorem commisisse Author vel Typographus, non enim ex arteriâ magnâ in Venam arteriosam sanguis debuit traduci, sic enim ad pulmones transiret, quod fieri non debuit. Hac ratione censeo motum sanguinis hic perfici. Ex Venæ Cavæ ascendente trunco à superioribus descendens sanguis non ingreditur Ventriculum Cordis dextrum, sed transit per Anastomosis in Venam Pulmonalem, sicque in Ventriculum

ætate procedente, natura paulatim oblitteret, neque in adultis referet, nisi cum graves causæ, atque, ut sæpius fit, ventriculorum cordis à tenaci lentoque phlegmate obstructions, vias consuetas impederunt.

C O R ipsum magnitudine conspectius, auriculisque amplius est, tum vasa ejus, corpore thymio largiter exuperate fulta.

P U L M O N E S sanguinei conspiciuntur, nec dum parenchymatis sui raritatem, propter quietem, habent. Attamen ad partum maturo iam foetu, robustoque motu claustra quibus detinetur laxante, pulmones quoque leviores facti, blanda dilatatione aeris aliquid hauriunt: cui rei non animantium tantum, sed humani quoque foetus, sæpius in utero audita vox, indicium præbuit.

Pulsat in embryo Cor, simul atque sanguis maternus adfluit, quem susceptum intra ventriculos perficit, spirituque vitali, quo pollet, imbuunt, ut partium reliquarum insitas facultates conservet, atque excitet. *Distinctus tamen ratione temporis auricularum à partibus aliis cordis pulsus*

C O M M E N T A R I U S.

finistrum; & iterum ex dextro ventriculo Arteriam Pulmonalem ingressus, superiora petens, non pergit ad pulmones, sed à latere fecedit per canaliculum in Arteriam aortam, ulterius in corpus distribuendus.

Neque in adultis referet Sc.] Manet tamen in adultis aliquando pervium, quale inter varios observarunt in homine *Riolanus*, atque *Marchetti*. Botallus quoque in vitulis, suisque, canibus majoribus sæpissimè, undè semper & naturaliter patulum voluit, ut sanguis ex dextro ad finistrum Ventriculum hâc commearet. Cujus vestigia premens *Cæcilius Foliis* in omnibus hominibus secundum naturam eodem fine ut in foetu apertam credit, sed repugnante experientia. Apertum enim tantum est, cum alias vias occlusit natura, ut *Patavii* in eo sene *Bartholin.* animadvertit, cui venosa arteria phlegmate obturabatur, de quo mox dicitur.

Nisi cum graves causæ] In corde viri 28. annorum in Patavino Theatro à *Veslingio* dissecti 1642. observavit *Barthol.* (ut *Observ. Anat. cent. 2. hist. 46.* testatur,) ventriculum dextrum phlegmonoso corpore pingui repletum, quod imo cono firmiter annexum, ascendit ad patentem Venæ Arteriosæ ductum, illumque obturavit. In sinistro ventri-

culo ejusdem substantiæ minor portio aderat. Ut interceptam sanguini viam refarciret provida Natura, patuit Anastomosis illa amplo foramine inter venam cavam & arteriam venosam, qua sanguis, ut in foetu, in finistrum Ventriculum ferebatur, sive quod Natura coalescere orificium hoc non liverit, sive quod leviter coalitum urgente necessitate vi referarit.

Blandâ dilatatione aeris aliquid hauriunt] Quæritur an foetus in Utero respiret, nec ne? *Ant. Everardi* variorum vestigiis insistens affirmativam tuetur contra *Laurentium* aliosque, per umbilicum respirare foetum cum Hipocrate docens, imò & per os ipsum, respiratione tamen neutiquam propriè dictâ, quâ pulmo, Thoracisque partes aliæ moventur.

Audita vox] *Barthol. hist. I. cent. I.* plurima recenset lectori curioso haud inaccepta.

Simul atque sanguis maternus affluit Sc.] Pulsus cordis minimè à sanguine menstruo, aut à virtute ipsi insitâ provenire, sed ex sanguine jam ante punctum saliens ex colliquamento producto, prolixè demonstrat *Harvejus de gener. anim.*

Quo pollet] Non cor, sed sanguis antè ipsum generatus spiritu hoc vitali pollet, de quo *Harvejus*.

pulsus est. Illæ enim primum omnium incitata sanguinem præsentem intra cor compellunt : quo sese deinde constringente , sanguinemque in vasa diffundente, rursus auriculæ sanguinem hauriunt.

CAPUT, quo propinquior foetus ortui est, eo mole grandius ; bullisque aliquot amplis distinctum, spectantibus opinionem præbuit, trium totius corporis regionum , primo formatricis naturæ molimine fundatarum.

OCULORUM ingentes orbes prominent , & reliqua faciei figura inconcinnior.

CEREBRUM ipsum infantulis propemodum fluidum est , nervorumque mollities summa.

CRANII OSSA corticum tenellorum habitum præ se ferunt, nullifdum, si frontis basin excipias, meditullis distincta. *Vertex* diutius tenui tantum membrana inductus, manifesto ante palpitantium arteriarum indicio, quam ossa frontis, & sincipitis exquisitius committantur. *Meatus auditorius* cum propinquis ossibus Mammæ, Stylumque referentibus, tum os Cribrosum, & Hyoidis cornua cartilaginea observantur.

Quo mirabilior in nonimestri foetu *Officulorum auditus* durities : magnitudo item, qualis in perfecta hominis ætate, fere absoluta. Neque horum tantum, sed etiam *Cavitatis* quam *tympanum* vocant, cujus membrana annulo osseo comprehenditur, qui meatui auditorio fundamentum præbet, membranæque cum adhærente malleiformi officulo tue-
tur. Quin & *labyrinthus*, & *cochlea*, non magnitudine minus, quam figuræ symmetria, perfectioni suæ proxima sunt, ut auditus perfectionem citius homo consequeretur, omni disciplinarum genere excolendus.

Os

COMMENTARIUS.

Cerebrum ipsum &c.] In foetu abortivo non habentur ejusmodi cerebri anfractus, quos efformat tenuis meninx, ut in adultis, sed superficies ejus glabra est & lævis.

Corticum tenellorum habitum præ se ferunt] Ossâ Cranii post nativitatem tenuissima sunt nec in iis duplicitem tabulæ, præsentiamque Diploës observare licet, nisi anno uno aut altero elapso. Ipsa inter ossa diversitas quoque ratione consistentiæ est, quippe ossa occipitis omnia superant tenuitate, contra quam in adultis. Cæteris crassiora cernuntur ossa Frontis.

Non meditullis distincta] Non solum Diploë destituuntur ossa infantium, sed *Suturis*, sunt enim potius *Harmoniæ*, cum simplici lineâ discernantur magis quam mutuo dentium instar serræ duplicis commissorum ingressu.

Vertex diutius tenui tantum membrana inductus &c.] In infantibus humanis pars ea quæ ad concursum futuræ coronalis & sagittalis est, membranosa reperitur & mollis, & ultimo inter ossa capitis in os induratur, ossæ uno alteri sæpe super inducto. Hanc partem alius fontanella dictam, in adultis membranofam

ut

Os Cuneiforme quadripartitum est: *Frontis* etiam, & *Maxilla inferioris* manifeste divisum. *Dentes* intra maxillarum alveolos delitescere voluit divinus opifex, ne inclementi suctu infans nutricis papillas affligeret. Radices eorum molles primum, ac mucosæ, secundorum quoque dentium seminea fundamenta occultant.

Vertebra spinosis processibus nondum armatæ sunt, atque ex tribus distinctis ossibus portionibus constructæ: quarum anterior, quæque majorem partem confert, semini lupinorum similis. Reliquæ duæ posteriores, minores sunt, mutuoque concursu foramen illud efformant, descendentem spinalem medullam pervium. *Sternum* quatuor particulis, nonnunquam pluribus, productum est: quemadmodum *Ossis Ilium*, *Ischii*, *Pubisque* discrimen evidens habetur.

E partium extremarum ossibus, quæ *Carpum*, *Tarsumque* constituunt, cartilaginea sunt, neque additamenta reliquorum solidius concreta, quibus tandem omnibus ætas robur suum ac perfectionem accelerat.

COMMENTARIUS.

ut in Infantibus, necdum osseam factam semel tantum & quidem in viro 40. annorum observavit *Baitholin*. *Baubinus* in scemina 26. annorum adhuc invenit apertam. Sed de his plura in sequentibus.

Os cuneiforme quadripartitum est] Limites divisionis hujus ossis à variis variè ponuntur, *Fallopio* partes Duas constituunt Pterigoidei processus; Tertia Sella est glandulam pituitariam excipiens; Quarta pars visceris nervis destinata, quæ portiones non longe post natiuitatem coalescunt. *Riolanus* male *Fallopium* divisiones illas ossis Sphenoidis descripsisse statuit, vultque istertiam Sellam equinam & Apophysin visceris nervis destinatas comprehendere, quartam vero infra Sellam protendi ad coronas occipitis. Quis verius dixerit iudicent doctiores; res parvæ est considerationis.

Frontis etiam] *Os frontale* semper geminum existit sine ulla cavitate sinuosa.

Sternum] Infantium sternum primâ generatione totum est Cartilaginosum ac prorsus continuum, nullaque lineâ distinctum. Ubi autem indurescere incipit, celerius hoc fit in superioribus partibus, quam inferioribus, & mediis, secundum longitudinem citius quam in extremis. Undè fit, ut Cartilaginosorum quasi plurium nodorum speciem præ se ferant partes id constituentes. Quando autem foetus in lucem editus, inferiores sterni partes Cartilagineæ magis & divisionem nullam habent. Superiores magis osseæ, donec tandem omnes osseæ fiant, & numerus magnus ad minorem, tres scil. quatuorvè partes, transversâ lineâ separatas, reducatur.

Additamenta reliquorum] *Humeri* nempe, scapulae, femoris, tibiae, &c.

TABULÆ I. CAP. VIII. Declaratio.

Fœtus humanus & ipse salutaris scientiæ prædiciis sæpe sublevandus, non minus diligentem sui contemplationem exigit, quàm corpus hominis effœti. Partes igitur illius, juxta publicarum dissectionum adhibitam hæcenus methodum, duabus Tabulis representandas curavimus. Harum prior potissimum Umbilicalia vasa; fœtusque sceleton proponit: Altera viscera ejusdem delineata complectitur.

FIG. I.

Fœtum exhibet partui maturum, in situ ad exitum felici.

- AAAA Abdominis dissecti partes distractæ.
 BBBB Uteri corpus in quatuor partes diductum.
 CCCC Chorion membranæ, & amnios adhuc conjuncti, similiter in angulo sectione diremta.
 D Fœtus deorsum caput convertens, quo positu naturalis ex utero progressus datur.*

FIG. II.

Fœtum ostendit utero exempt. separatim circa exortum vasis umbilicalibus, & Membranis.

- A Vena umbilicalis è Fecore protensa.
 B Arteria duæ Umbilicales ad Umbilicum con-
 surgentes, quarum exortus Tabulâ se-
 cunda sequenti patet.
 C Vrachus Umbilico pariter connexus.
 DDD Umbilicus ad placenta usque productus.
 EE Amnios Membrana à Chorion separata, sub
 quo Umbilici portio transparet.
 FF Chorion Membrana crassior, in angulo
 quatuor sectione divisa.
 GGG Vena & Arteria umbilicales, per placen-
 tam uteri sparsa, qua supra Chorion quidem
 extensa, pulchre tamen sub eo sese manifestant.*

FIG. III.

Secundinas, quâ parte utero cohererent, proponit.

- AA Placenta sive Fecoris uterini pars convexa.
 BBBB Chorion placenta subjectum.*

FIG. IV.

Ossa representat ad Caput pertinebntia.

- AA Os Frontis futurâ distinctum.
 BB Ossa duo Sincipitis.
 C Vertex infantis propter Ossium distantiam
 adhuc membranosus.
 D Maxilla inferior duabus partibus distincta.*

FIG. V.

Annulum Osseum Infantium monstrat, cui Membrana tympani aurium annectitur.

FIG. VI.

Officula Aurium è situ naturali nonnihil dimota, è quibus.

- A Malleus. B Incus. C Stapes.
 D Officulum exiguum ligamento stapedis in-
 nexum. D. Sylvii inventum.*

FIG. VII.

Labyrinthum, & Cochleam aurium partibus omnibus integrum exacte representat.

- A Est Foramen ovale in Tympano, quod ad
 Labyrinthum spectat.
 B Foramen Rotundum in Tympano, inter La-
 b rinthum, & Cochleam medium.
 CCC Circuli tres Osses Labyrinthi.
 DD Cochlea aurium.*

FIG. VIII.

Cochleæ faciem internam ostendit cum Labyrintho.

- A Foramen ovale: B Foramen rotundum.
 CCC Circuli Labyrinthi tres, nonnihil aperti.
 DD Cochlea effracta, Gyrulum intimum poro-
 fum exhibens.*

FIG. IX.

Vertebra Infantis tribus partibus distincta.

- A Pars prima Vertebra, seu Posterior.
 B Pars secunda qua Posterior.
 C Pars tertia Anterior.*

FIG. X.

Colli Vertebrae, & Ossa Thoracis demonstrat, antèrius videnda.

- A Ossis sterni supremam tantum partem deno-
 tat, cui reliqua subjecta sunt.*

FIG. XI.

Dorsum ostendit, ejusque Vertebrae, Spinæ processibus suis adhuc destitutas.

FIG. XII.

Comprehendit Lumborum Vertebrae cum Ossibus Pelvim constituentibus.

- A Quinque lumborum Vertebrae complectitur,
 quarum processus adhuc cartilaginei.
 B Os Sacrum partibus sex compositum.
 CC Ossa Ilium. DD Ossa Pubis.
 EE Ossa Coxendicis.*

FIG. XIII.









Ossa totius Manus exprimit, in quâ

- a b d Appendices Ossium adhuc Cartilagineæ.
 c Ossa Carpi omnia Cartilaginea.*

FIG. XIV.

Ossa totius Pedis representat, in quâ

- a b d Appendices Ossium pariter cartilagineæ.
 c Ossa Tarsi aliquot cartilaginea.*



TABULÆ II. CAP. VIII. Declaratio.

Tabula hæc comprehendit Viscera omnia, quæ in Abdomine
fœtus, & Thorace reperiuntur.

FIG. I.

Singulariter Lacteas Venas exprimit, prout
simplici intuitu representari potuerunt.

- AAA** Fecoris pars concava.
B Vesica Biliaria.
CC Vena Umbilicalis, sursum flexa.
DD Ventriculus sursum conversus.
E Orificium ejus inferius, seu Pylorus filo
adstrictus.
F Intestini Jejuni propè Pylorum abscissi
portio.
GGG Pancreas magnitudine hic insigne.
HH Lien Fœtus.
II Ren dexter Membrana communi obductus.
K Ren sinister similiter occultatus.
LLL Mesenterium expansum.
MM &c. Intestina Mesenterio connexa.
aaaa Vena aliquot Lactea, à Pancreate ad
Fecur porrecta, quarum hic pauca, &
minores tantum expressa.
bbb &c. Vena aliquot Lactea, à Pancreate ad In-
testina diffusa, grandiusculè delineata.
cc &c. Rami Vena Porta meseraica.
dd &c. Rami Arteriarum mesentericarum.

FIG. II.

- A** Glandula Renalis dextra.
B Ren dexter Glandulosus.
C Glandula Renum sinistra.
D Ren sinister.
E Vena Cava descendens.
FF Illius rami Iliaci interni.
GG Rami Iliaci externi Vena Cava.
HHH Arteria magna cum ramis Iliacis externis.
II Arteria magna rami Iliaci interni.
KK &c. Arteria utraque Umbilicalis deorsum
flexa.
L Uteri fundus pressula rotunditatis.
M Cervix Uteri.
N Vesica Urinaria deorsum tracta.
O Urachus vesica.
P Umbilici abscissi nodulus.
a Vena Glandula Renalis dextra.

- b** Arteria Glandula Renalis dextra.
c Arteria Emulgens dextra.
d Vena Emulgens dextra.
e Vena SpermatICA dextra.
f Arteria SpermatICA dextra.
g Arteria Glandula Renalis sinistra.
h Vena Glandula Renalis sinistra.
i Vena Emulgens sinistra.
K Arteria Emulgens sinistra.
l Vena SpermatICA sinistra.
m Arteria SpermatICA sinistra.
nn Vasa Semen præparantia.
oo Testes hic magnitudine admodum specta-
biles.
pp Ligamenta Uteri lata.
qq &c. Tuba uteri deorsum flexa.
rr Ligamenta qua teretia dicuntur uteri,
inferius dissecta.
ss Ureterum abscissorum portiones.

FIG. III.





- AA** Pulmo utrinque diductus.
B Corculum integrum.
C Truncus Arteria magna è Corde emergens.
D Portio ejusdem Arteria deorsum vergens.
E Vena Arteriosa è Corde protensa.
aa Canalis inter Venam arteriosam, & ar-
teriam magnam.
b Principium arteria subclavia dextra.
c Initium arteria carotidis sinistra.
d Exortus arteria carotidis sinistra.

FIG. IV.

- AA** Pulmones diducti.
B Corculum versus dextrum Ventriculum
incisum.
C Vena Cava juxta Cor aperta.
D Anastomosis inter Venam Cavam, &
Arteriam venosam.
E Valvula in Anastomosi obuia.

FIG. V.

- C** Corpus Thyrium à vasis Cordis sepa-
ratum.



CAPUT IX.

De Partibus Thoracis externis.

Venter infimus, & quas in ipso aut circa ipsum natura partes disposuit, ita se habent. Sequitur proxime *Venter medius*, THORAX dictus, quem obtentæ undique pleuræ terminis circumscribi superius determinatum est.

Contemplanda pariter in eo Externa primum, deinde Vitalia ipsa.

E partibus Externis communiter ad Thoracem pertinent *Tegumenta corporis Universalia*, de quibus dictum. Aliorsum etiam referuntur *Pectoralis musculus*, tum *Serratus anticus major*, & *minor*, atque ex ossibus *Clavicula*, cum *Scapulis*.

PECTORALIS MUSCULUS, ita dictus, quia pectori late instratus, amplis thoris eleganter id exauget. Origo ipsi à Clavicula media, Sterno, Sextæ item, Septimæ, & Octavæ Costæ cartilaginibus, & brevi quidem, sed robusto tendine, inter Deltoiden, & Bicipitem musculum, ossi *humeri* inferitur, quod ipsum *valide pectori adducit*

SERRATUS ANTICUS MAJOR, à Costis octo, quinque scilicet veris tribusque spuriiis superioribus protensus, oblique ad *scapula basin ascendit, quam versus anteriora deorsum trahit*.

SERRA-

COMMENTARIUS.

Thorax dictus] Exactior mihi nominis huius explicatio videtur, si id non cavitati ipsi, sed omni, quod illam quasi murus quidam bene validus circumsepit ac munit, tribuatür. Vox autem Thoracis *πλῆθος* est; *Latius* enim aliquando sumitur, pro quolibet pectoris operculo, seu togatum fuerit, seu militare; *Strictius* pro toto illo quod est inter claviculas & pudenda, & *Latinis Trunci* nomine indigatur, exemplum huius denominationis est apud *Hippocr.* inter alia *lib. de Arte*, ubi *Jecur* in Thorace situm esse dicit; quod idem & facit *Arist.* *lib. de hist. Anim.* 1. *cap. 7.* per interpretem *Theodorum Gazam* ita loquens: *summe igitur partes, in quas primas totum dividitur corpus, hæ sunt: Caput, Collum, Thorax, Brachium duplex, Crus duplex.* Thoracem eam partem appello, quæ à collo ad pudenda usque *trunca* pertendit. Malim, inquit *Cl. Senguerdus* *Disputat. Physic. de Scelecto* sextà postiora

vertere usque ad truncum pudendorum. Græcè legitur *μέγας αἰδιδων χυτῶ*. Strictius verò magis ubi sumitur, eam solam designat partem, quæ inter jugulum & Diaphragma interjecta est. *Latinis Pectus* vocatur, quod nomen nonnulli dictum volunt, licet sine ratione, quoniam compactum est ex ossibus continuatim conjunctis, rite tamen à se invicem distantibus, sic ut pectinem antiquorum incurvatum referat, pars enim Spinæ pectinis mediæ parti comparatur, costæ dentibus ejus, intercostalia dentium interstitio, quæ de re *Real. Columbus lib. 1. cap. 14.* ubi etiam spinam navis parti infimæ comparat, de *Hist. Belgis* dicto, costas ab utroque latere exurgentes lignis incurvis navis sursum adscendentibus.

Versus anteriora, deorsum trahit] *Riolano* Thoracem attollit atque dilatat, qui cum *Bartholino* aliisque contrarium ortum, contrariamque insertionem statuit.

Mamma

SERRATUS ANTICUS MINOR, sub pectorali delitescit, & à secunda, tertia, quarta, & quinta costa superiore provectus, ad *scapula processum ancyroidem*, sive *rostriformem* porrigitur, quem oblique cum *scapula antrorsum* quoque movet.

De *Claviculis*, & *Scapula*, quia potissimum ad offis humeri articulum constituendum concurrunt, capite decimo septimo agetur.

At proprie ad thoracem reducuntur *Mamma*, *Ossa pectus componentia*, *intercostales Musculi*, tum *Pleura membrana*, cum *Mediastino Septoque transverso*.

MAMMÆ in muliebri corpore lac generando, officium pariter, atque usum obtinent clariorem.

COMPONUNTUR, si in foetis mulieribus, & lactantibus spectentur, ex *glandulosis corporibus* minutis quam plurimis, magnitudine diversis, ut non sanguinem tantum, è paucis parvisque vasis subministratum, sed largiter affusos à Pancreate, Ventriculoque vapores, ac lactescentem humiditatem, instinctu naturæ combibant. Colliguntur corpuscula

COMMENTARIUS.

Mamma] Apud Latinos *Mamma* usurpatur 1. pro nutrice quæ *Mammam* præbet, sive conductitia fuerit, sive genitrix ipsa, 2. pro lactis productricibus partibus glandulosis thoraci incumbentibus, de quibus hoc loco agitur.

In muliebri corpore lac generando officium pariter atque usum obtinent clariorem.] In muliebri nempe corpore prolis educationi inferviante. Testantur tamen & Authores, etiam mulieribus extra hoc tempus, Viris ipsis, imò omnis omnino ætatis sexusve hominibus Lac in Mammis generatum. *Bartholinus in Anat. & Schneiderus lib. 3. cap. 3.* eorum quæ exempla diversa tradunt varios colligere, qui videri possunt. Ita Viros Lac è Mammis effudisse annotarunt *Avicenna*, *Samorellus*, *Waleus*, *Alex. Bened. lib. 3. Anatom. cap. 4.* *Vesalius*, *Costæus*, *M. Donatus*, *Aquapend.* *Baricellus*, *Cardanus*, *Sahnuth*, *Schenckius*, *Hichmorus* &c. Virginum etiam lac præbentium historias videre licet apud *Alex. Bened. Thom. Barthol. Gorreum*, *Phil. Sahnuth*, *J. Schenckium*, *Amatum Lusitanum*, *Crist. à Vega*, *Joach. Cameraarium*, &c. Vetularum siccissimarum exemplum ex *Bodino* adducunt & *Henrico ab Heers*. Infantium, puellarumque puerorumque lactan-

tium exempla adferunt *Bartholinus*, *Cardanus*, *Deusingius*, *Harvejus*, alique.

Quamplurimis] Indè illud beneficii foemini est; quod cum aliquæ abscessu pereunt, non pereat tamen usus partis. Unicum corpus glandulosum, continuumque observavit *Riglanus*, non multiplex.

Magnitudine diversis] Earum una majuscula in cæterarum veluti centro sub ipsâ papillâ consistit, quam Belg. de *Schijbe* vocant.

Largiter affusos à Pancreate & Ventriculo vapores] Hoc quam impossibile sit, cuius obvium est, sed condonandum aliquid temporis, quod perspectum non habuit, ut ipse fatetur author, quibus viis materia in lac convertenda ad mammam feratur.

Lactescentem humiditatem] Hunc à Pancreate venire non posse, à Ventriculo autem quam optimè, doctrina de Venis Lacteis noviter inventa quam evidentissimè demonstrat, non sanguinem menstruum, aut aliquam sanguinis simplicis partem, sed solum Chylum Lactis materiam adequatam esse, firmissimis indiciiis probans, cui materia albuminea, serum sanguinis vulgo dicta coagulationi valde commoda misceri videtur. Ut scriptis eruditissimis declarant inter alios *Anton. Deusingius lib.*

puscula dicta intra *membranosum* contextum, *tubulis* variis, contentique lactis veluti locellis differctum, cujus fundamentum, absente lacte, oblitteratoque glanduloso ubere, per omnes ætatis gradus superstes manet. *Pinguedine* stipatæ sunt mammæ copiosa, non tam ut formæ femineæ venustas sua constaret, quam in opere illarum consummando vitalis calor vigor conservaretur.

VENAS recipiunt geminas, *Axillarem* unam, quæ per exteriora mammarum distribuitur, ab Axillari ramo deductam, alteram *Mammariam* dictam, quæ per interiora spargitur, à Subclavio Venæ Cavæ ramo descendente. His totidem accedunt **ARTERIE**, quæ similem in modum, à ramo Arteriæ Magnæ Subclavio, atque Axillari propagatæ, sanguinem vitali calore vegetiorem suppeditant. **NERVOS** mutantur à quarto Dorsalis Medullæ ramo, cujus insignior propago cum vasis internis ad papillas protenditur

Sunt autem **PAPILLÆ** in mammarum medio, teretia & rara corpuscula, tubulis lac suggerentibus, ab exporrecta glandulorum corporum membrana, prædita. Obvelantur tenui *tunica*. Perforatæ, exteriusque prominulæ, ut infantium osculo rectius excipi queant. In ambitu veluti halone circumfusæ videntur, cujus albicantem colorem pronus iam ætatis decursus paulatim obscuriorem efficit.

INCRE-

COMMENTARIUS.

lib. de Lacte, & Georg. Entius. Apolog. pro circulatione sanguinis, quibus *Martianus comm. in Hipp.* prævit. Quin & argumentis variis non Sanguinem, sed Chylum esse materiam Lactis ostendit *Schneiderus lib. 3. de Cathar. cap. 3. pag. 83, &c.*

Rara corpuscula] Hujus namquæ constitutionis præcipue penis substantiæ accedit, hoc est nervæ quodammodo cuti, spongiosa intus substantia repletæ, quæ corrugari ac vicissim laxari non minus quam penis valet.

Tubulis variis] *Spigelius* non malè tubulos hos vocat lactíferas venas *lib. 9. de human. corp. fabr. cap. II.* quâ de re videatur *Deusignius lib. de Lacte.*

Papillæ] Mediis mammis inquit *Laurembergius Pasicompeos cap. 23.* agnatæ sunt papillæ, purpurea & rosea prorsus carniū prominentium frustula, quæ nihil aliud sunt quam fistulæ & siphones, per quas lacteum nectar ex his fonticulis exstillat. Hic notetur Aphorismus: papillas intra ubera absconditas

aut scissuris interpolatas, aut nigredine inquinatas, aut etiam nimis grandes instar prægrandium mororum, turpes & deformes esse; pulchellulæ sunt, rosei coloris, fragis majusculis æquales, gratissimis incisuris, & tuberculis vix sensibilibus exornatæ.

Perforatæ] Vertex papillarum aliquam multis foraminulis pertusus est, quæ nihil aliud sunt quam oscula tubulorum lacteorum huc definentium, ad reddendum Lac.

Obvelantur tenui tunica] Exquisitissimum sensum obtinent, & tractatæ labiis papillæ delectationem suaviorem foeminis afferunt, ut invitent nutrices ad porrigendas sæpius infantibus, ne, si dolore afficerentur, detrectarent, aut si carerent omni prorsus voluptate, invitæ & rarius fugendas darent.

Ut infantium osculis rectius excipi queat] Usus enim papillarum est, ut inquit *Linæus in Physiol.* nutrici pro infundibulo, infanti pro epistomio esse, quo illa ingerat lac, hic promat.

Incre-

INCREMENTUM mammarum non anni tantum, munerisque proprii exsecutio, sed humorum etiam affluentium quantitas, climatumque diversitas, plurimum variat. Europæis mulieribus magis contractæ sunt, longiores Arabibus, Indisque, ut inhærenti humeris proli faciliè porrigi possint.

Efformatæ BINÆ communiter, ut idonei alimenti proventus vel geminæ soboli sufficeret.

TEMPER-

COMMENTARIUS.

Incrementum &c.] Magnitudo mammarum variat pro ætatis & status conditione. Nam in ætate tenerâ vix tument, postea paulatim crescunt, ita ut dum menstrua fluere incipiunt, notabiliter intumescant, donec in adultis virginibus eam ferè quantitatem attingant, ut à manibus ipsarum commodè regi queant. Prægnantibus autem magis crescunt, ita ut tum lac quibuscum fundant, atque tempore partus insigniter tument, & aliquibus lacte turgent, licet plurimis tertio demum à partu die aut tardius lac comparere soleat. Sic illis quoque mammæ valdè crescunt, quibus humores ad mammas concitantur. Sicut autem hoc modo mammæ crescunt, ita ætate rursum paulatim decrescunt, atque pariter à morbis, ut præter flaccidam cutem in vetulis ac febre consumptis nil adsit. Magnitudinis ista variatio ob usum mammarum est, undè eò tempore plurimum crescunt, ubi usus illarum erit, at ubi usui esse non possunt, rursum decrescunt. Mammæ si pulchritudinis habeatur ratio non sint nimis vegrandes, *Pascompsos cap. 18.* *Laurebergius* habet, undè benè optavit quidam sibi feminam quæ esset non annosa, non bibosa, non mammosa, non procax, bestiarum proprium, non hominum, pectus habere obvallatum amplissimis lagenis. Vid. *Martial. lib. 14.* & *Horat. Epod. 8.* Non sint nimis aridæ aut exsuccæ, aut rugosæ, aut pendulæ aut oblongæ. Non sint flavæ aut fuscæ nigræve cute obductæ: sed sint mediæ magnitudinis, exactissimè in orbem rotundatæ, alabastro aut candidissimis rosas candidiores, quasi poma duo è marmore elaborata, inter quæ vallis quædam amœnissima quasi è duobus montibus niveis composita, ex quibus vernalis quædam suaveolens aura exspiret.

Efformatæ binæ communiter] *Cabrolus* qua-

tuor easque omnes lac exhibentes vidit, *Obs. 7.* Nos in quadam muliere, quæ in nundinis *Falcburgensibus* se ostendebat, tres observavimus, sinistro latere duas, dextro unam.

Ut geminæ soboli sufficeret] Mammæ geminæ sunt, in uno quoque latere una, non tantum ob commoditatem, sed & ut usui sufficerent, & hoc præcipuè. Idè enim mammæ mulieri à natura datæ sunt, alimentum infanti ut exhibeatur, hoc autem sufficiens vix præbere potuit una, nisi ingens satis sit, convenientius erat, ut geminæ conderentur, quam ut sic una prægrandis mediam partem pectoris occuparet, aut in latere aliquo posita inæqualitatem corporis induceret. Nec solum ideo duplicem eam à naturâ mulieri datam arbitramur, ut bini quasi uterum fontes perpetua lactis scaturigine stillantes copiosius nutrimentum foetui præbeant; Sed ne si una adesset, eaque morbo aliquo affligeretur, illico infans omni suo privaretur alimento, ut hoc sæpissimè notamus, mammas scilicet innumeris malis obnoxias esse; aliàs enim sæpè mamma una, exigua etiam, alterâ malè se habente, copiose adeo Lac præbere observatur, ut non uni tantum sed quandoque pluribus infantibus sufficiat. Sunt qui dupliciter mammarum hanc causam esse persuadere nobis conantur, ut nempe sic alimentum etiam gemellis sufficeret. Sed sanè errorem gravissimum errare videntur. Nam naturalissimum est homines singulos foetus parere, licet quandoque eveniat contrarium. Quod si id respexit natura, cur non tres aut plures mammas fecit, cum sæpè non solum duos, sed plures foetus humanos ab una muliere editos observemus, summum potius & extremum quam intermedia natura respicere debuit. Nec ulla hic dari potest ratio, cur non ob eandem causam & uterum

TEMPERAMENTO calidæ, & humidiusculæ, atque in medio pectoris COLLOCATÆ, ut & fonti vitalis caloris propiores, & inter ulnas genitricis vagienti infantulo magis obviæ forent.

ACTIONEM earum propriam lactis generationem dixi; quamvis nondum perspectum satis sit, quibus viis materiam in lac convertendam admittant: quoniam in cadaveribus delitescunt aditus, haud secus ac chyli ductus in mesenterio, seminis à testibus ad parastatas, atque è prostaticis ad urethram, aliique similes meatus, per quos natura frequentes humorum metastases in viventibus molitur. Sed huic quoque rei lactantium animalium à pastu dissectio lucem aliquam foenerabitur.

Ossa pectus munientia sunt, *Sternum* anterius, tum per latera *Costarum* veluti crates, & posterius *dorsales Vertebrae*.

STERNI ossis SUBSTANTIA spongiosa est, & rubicunda, ex tribus ferè PARTIBUS compacta, quamvis ad senectam ætatem pro-

COMMENTARIUS.

uterum geminaverit. Quid enim pro gemellorum nutritione magis opus erat duplicare mammas, quam pro eorundem conceptione & generatione uterum.

In medio pectoris collocatæ] Illius situs causam *Lindanus Physiol. cap. 7.* agnoscit triplicem. Primo, Commoditatem loci. Sive enim sedeat mater aut nutrix, sive stet, facile gremio exceptum ulnisve amplexum alumnus suum admove ad lactandum potest. Secundo, Honestatem. Scilicet ne cum extremo pudore nutrices cogantur detegere partes, quas etiam in brutorum foeminis Natura tegit cauda veluti velo. Tertio, Venustatem pectoris. Quid *Galenus* ea de re disserat, vide ad ipsum lib. 7. de Usu part. cap. ult. & simul doctissimum ejus commentatorem *Hofmannum n. 508.*

In pectoris medio] Locum habent mammae in medio quidem pectoris, at non immediatè super ossibus, sed super musculo Pectorali humerum adducente, ejus rei hanc rationem esse dicitur, ne ossibus incubantes duritiè ipsorum læderentur, nec obessent commodæ insertioni musculi modo nominati, quem ob firmitatem majorem, super ossibus esse oportuit.

Actionem ejus propriam lactis generationem dixi] De generatione Lactis alio loco.

Quamvis nondum perspectum satis sit &c.]

Videtur res hæc perspecta aliquomodo ex iis quæ Authores de Chyli ductu & receptaculo nobis exhibuerunt, maxime *Bartholinus*, & *Deusignius*. Egregia etiam sunt quæ hac de materiâ habet *Ant. Everardi* Tractatu sæpius citato pag. maxime 282.

Sternum] Sternum ita vocatur plurimis, quod in medio costarum sternatur. Alii sic dictum volunt ὡς τὸ στερεόν à soliditate, vel quasi στερόν, aut στερρόν id est, solidum & firmum, quia munit aut solidum reddit pectus. Latini à situ, quia anteriorem pectoris partem occupat, *Os pectoris* vocant. In homine dicitur etiam à figurâ *Os ἑρποειδὲς*, hoc est, *Ensi-forme*, quod ensis seu gladii veteribus usitati figuram exprimere dicatur.

Ex tribus ferè ossibus constat] Rarissime ex pluribus. *Riolanus* Romæ vidit anno 1554. puellam annum circiter septimum agentem, cui in sex ossa divisum erat, quorum postrema quinque ab imò ad summum per ossis longitudinem secta conspiciebantur. Quod enim quidam volunt, evenire frequenter, ut ossa sterni, quæ in medio sunt, omnia, aut certè eorum aliqua, evidentissimâ lineâ secundum ossis longitudinem, modo rectâ, modo obliquâ, dividantur, sicque fieri ut sterni partes decem, novem, septem, aut octo frequenter numerentur, quam dictum est facile, tam probatu

properantibus annis paulatim in os unum coalescant. Illarum *prior*, atque amplior, capulæ nodum exprimit, cui reliquæ *duæ* cartilaginum interventu conjunctæ, subjiuntur,

APPENDICEM habet *cartilagineam*, quæ ob formæ aliquam convenientiam *mucronata* nominatur.

Diaphragmatis munimentum seu propugnaculum perhibetur, & Mammariæ interdum Venæ cum Arteria transitum præbet.

Hæc quoque in Senectute ossea tandem evadit: frequenter introrsum, extrorsumque recurvatur, non sine multiplici ventriculi damno. Nonnunquam digiti longitudine ad umbilicum usque producta, pariterque rigida, plurimum tam chyli distributioni, compresso pyloro, quam flexui corporis versus anteriora, obstitit.

COSTÆ thoracem obvallantes partim OSSEÆ sunt, qua per dorsum, & latera feruntur, partim CARTILAGINEÆ, qua versus anteriora porriguntur, & propius ut superiores sternum attingunt, Horum illud firmitudo roboris exigebat: hoc vero motus pectoris facilius, tutiorque rerum externarum occurfus.

N U M E -

C O M M E N T A R I U S.

batu difficile. Sceleton mihi est in quo sternum manifeste partibus quatuor constat.

Illarum *prior atque amplior* &c.] Primariò in sterno distingui solent tria ossa, quorum *Primum & Supremum* omnium est crassissimum & amplissimum, crassius etiam parte superiore, quam inferiore. *Secundum & Medium* latitudine atque crassitie priori plurimum cedit, at verò longitudine nullum illud superat, variis sinibus donatum, quibus implantantur cartilaginestertiæ, quartæ, quintæ & sextæ costarum. *Tertium & Infimum* præcedentibus multò adhuc minus est, sive longitudinem spectes, sive crassitiem, sive amplitudinem.

Mucronata vocatur] Variæ admodum hæc Cartilago figuræ est, triangularis, rotundæ, integra, bifida. Quæ diversitas etiam effecit apud *Vesalius* & *Spigelium*, quod in corpore humano eam imperitè ensiformem appellari scripserint, cum denominatio talis magis conveniens sit toti ossium pectoris compagini, quam quidem foli illi Cartilagini, de qua hoc loco agimus.

Transum præbet] Sternum in sui medio amplo satis foramine sæpè præditum est,

vasis transmittendis destinato. *Amatus Lusitanus Cent. 5. curat. 95.* Cartilaginem Xiphoidem perforatam esse credit ad perspirationem, ut stomachi vapor per istud foramen exspiret, ineptè satis, communiter enim notamus, quod nisi bifida fuerit in fine cartilago hæc, perforata eadem sit, ad transitum vasorum mammariarum, imò semper in mulieribus, si foramen in sterno desit, id reperitur in hac cartilagine, nisi natura à latere cartilaginis dictæ transitum iis præbeat.

Introrsum recurvatur &c.] Exemplum vide apud *Septalium*, *Zacutum*, *Bauhinum*.

Partim ossea partim cartilaginea sunt costæ] Et quidem ossea substantia quæ hic est, non ita solida est, neque alba, ut in multis aliis ossibus, sed fungosa, rubicunda, & plena cavernulis, molliorque, idque magis in spiriis, quam legitimis locum habet, in quibus ipsa quoque cartilago ita ferè dura est, ut in senescentibus facile degeneret in osseam substantiam, quod in mulieribus frequenter notatur pro majore firmitudine mammarum. Exemplum habet *Rhodius* in *Mantissa Anatom.* *Observat. Bartholini additâ.*

Spuria

NUMERO utrinque *duodecim* deprehenduntur: è quibus superiores septem, costæ *veræ*, inferiores reliquæ *spuriæ*, *mendosæque* dicuntur. Non tam quod ossea parte breviores sint, quam quod in sterno ipso productis cartilaginibus haud terminentur. Re enim vera nihil hic spurium, nihil mendosum occurrit, sed ex optimo conditoris nostri fine sic efformanda omnia fuere.

SINUM habent in parte inferiore, per quem venis, arteriis, nervisque intercostalibus tutius iter exhibetur. *Curvantur* costæ omnes in circulare segmentum, ut convenientem pectori amplitudinem præstent. Externa superficie nonnihil *inaequales*, interna, quaque pleuræ cohærent, magis lævigatæ.

SUSCIPIUNTUR à tergo vertebrarum sinibus, quædam simplici, nonnullæ gemino tuberculo præditæ, firmisque ligamentis revinctæ, antè, ut dictum, cartilaginibus productis, tum sterni latera accedunt, tum inter se cohærent. Non adèd tamen firmus nexus est, quin eum externæ injuriæ sæpe solverint, atque etiam in ascite hydrope suffusæ aquæ costarum inferiorum cartilagines sejunxerint.

Costis

COMMENTARIUS.

Spuriæ mendosæque vocantur] Duabus de causis, 1. quia costæ dicuntur a custodiendo partes vitales, at inferiores non custodiunt partes vitales, sed potius naturales, ventriculū nempe, lienem, jecur. 2. quoniam suis extremitatibus cartilagineis non pertingunt ad os pectoris, contra ac legitimæ, quæ & custodiunt partes vitales, & suis extremitatibus ad os pectoris accedunt, imo cum eo coarticulantur.

Numero utrinque duodecim deprehenduntur] Eruditissimè de numero costarum differenter hic audi *Arnoldum Senguerdium*, Philosophum incomparabilem, Disputationum Physicarum de Sceletō Sextâ, in Osteologiâ ejus contentâ. In quâ etiam quæstionem eam, quis numerus fuerit Costarum in primo omnium hominum parente Adamo prolixè examinat.

Costæ dicuntur Spuriæ quod in sterno ipso productis cartilaginibus haud terminentur] Quin potius in Cartilagines longiores desinunt, quæ sibi invicem cohærent, ut author mox addit, excipitur tamen omnium infima, quæ nulli adhæret, ut & sæpè infimæ proxima.

Ex optimo conditoris nostri fine sic efformanda

omnia fuere] Tales construxisse videtur natura inferiores costas, propter faciliorem dilationem imi ventris, à distensione partium diversarum eo contentarum, ut Ventriculi, Intestinatorum, Uteri, &c. dependentem, propter quam causam & à parte anteriore abdomen ex partibus constructum videtur mollioribus distentioni aptis.

Curvantur costæ in circulare segmentum &c.] Circularis hæc Figura magis est notabilis in costis superioribus, quam subsequentibus aliis. Præter naturale omninò est Costam bifurcatam esse, qualem se Hafniæ demonstrasse costam tertiam dextri lateris, sterno junctam duplicato crure, testatur *Bartholin. Anatom. lib. 4. cap. 17.* qualem etiam à Patre suo fuisse in dextro latere repertam scribit *Nicol. Fontanus in Vesalium.*

Quedam simplici, nonnullæ gemino tuberculo præditæ] Novem superiores costæ à parte postica duplex habent tuberculum instar duorum processuum, quorum uno processibus vertebrarum annectuntur altero ipsi corpori earum. In Decimâ costâ tuberculum illorum primum & extremum dubium est. In Undecima adhuc minus & sæpe vix conspicitur,

Costis totidem admoventur VERTEBRÆ, per foramina sua, quæ concursu mutuo efformant, è contenta dorsi medulla duodecim nervorum paria, cum ultimo cervicis transmittentes: quarum conformatio eadem est, quæ in vertebriis lumborum expensa sunt, nisi quod illæ spinas depreffiores obtineant.

MUSCULI pectoris motum perficientes, sunt *Subclavii*, *Triangulares*, tum *Intercostales*, & *Dorales*.

Musculorum SUBCLAVIORUM unicum tantum par est, principium ducens ab inferiore Claviculæ sede, unde in *primam costam*, partemque ejus superiorem excurrit, quam *sursum extrorsumque movet*.

TRIANGULARES ab interna Sterni parte producti, Costarum super-

COMMENTARIUS.

tur, Duodecima absque tuberculo soli corpori spinæ conjungitur.

Costis totidem admoventur vertebrae Sc.] Communiter vertebrae dorsi in homine duodecim sunt. Rarum est eum numerum augeri, sic ut inveniantur tredecim, rarius eundem imminui, sic ut undecim. Qua de re inter alios videri possunt *Fallop. expof. de offib. cap. 21.* *Vesalius l. 1. c. 16.* *Riolan. comm. de offib. c. 15.*

Quarum conformatio eadem est, quæ in vertebriis lumborum expensa fuit Sc.] Accuratissimè quæ de vertebriis dorsi in specie exhiberi possunt descripta habes in *Osteologiâ Arn. Senguerdii*; ubi inter alia in hunc modum loquitur: Vertebrae dorsi obliquarum processus, inferiores sive descendentes non multum protuberant. Superiores sive Ascendentes insinuant se in processus descendentes vertebrae superiorum: ut superiores sint quasi Capitula, quæ excipiantur à processibus inferioribus vertebrae proximè superiorum. Processus transversi, in tribus inferioribus vertebriis, Decimâ scilicet, Undecimâ & Duodecimâ sensim decrefcunt. Undecimâ & duodecimâ vertebrae processus transversi sunt aliquo modo in duas partes discreti. Pars ima in quam processus transversus duodecimæ vertebrae dividitur, manifestè adscendit. Spinæ etiam vertebrae dorsi non omnes eodem se habent modo. Decima, Undecima & Duodecima vertebra spinas habent obtusiores spinis reliquarum superiorum Thoracis.

Tum etiam spina Decimæ vertebrae magis recta retrorsum fertur, quam spinæ superiorum vertebrae. Undecimæ spina adhuc rectius extenditur; cujus rectitudinem superat spina duodecimæ. Articulationes vertebrae lumborum aliter se habent, quam vertebrae Thoracis. Thoracis scilicet vertebrae processibus suis adscendentibus rectâ feruntur in processus sive sinus vertebrae superiorum, ut modò dictum: Lumborum vero processus superiores à latere inarticulantur processibus inferioribus vertebrae superiorum; ut processus vertebrae superiorum, à parte posteriore descendant ex parte infra processus superiores vertebrae superiorum. Hinc duodecima duplicem illam Inarticulationem habet; ut ejus superiores processus à parte posticâ excipiantur à vertebra superiore; inferiores vero ejus processus, à lateribus excipiant processus vertebrae lumborum.

Ab inferiore clavicula sede] Propè Acromion.

Superiorem] Propè sternum.

Quam sursum extrorsumque movet] Et hic est primus musculus, qui Thoracem dilatat, seu distendit. Huic contrarium usum assignat *Spigelius*, claviculam nimirum eum deorsum trahere, quæ per se tamen immobilis est, quare & contrarium illi ortum, contrariamque insertionem adscribit.

Triangulares] Ab internâ & inferiori sterni parte

superiorum *cartilaginibus* inhærent, quas dum *contrahunt*, cordi quoque sese moventi contactum sterni molliorem præbent.

INTERCOSTALIUM musculorum per latus utrumque *viginti duo paria* observantur. Ex his undecim externa sunt, totidemque interna, obliquatis fibrarum ductibus se invicem distinguunt.

Externi musculi, à superioris costæ margine inferiore protensi, in costæ inferioris superiore parte terminantur: adedque sublatis, adductisque costis, *inspirationi potissimum famulantur*.

Interni intercostales musculi, ab inferioris costæ parte superiore prodeunt, in superiorem inferius desinunt, factaque costarum abductione, *expirationi operam navant*. Recipiunt *Venas* ab azygo, seu vena sine pari, & Intercostali superiore, *Arterias* ab Intercostali arteria tam superiore, quam inferiore, *Nervos* à dorsali medulla, utrinque paribus undecim productis, quibus à sexto pari interni rami sese jungunt.

DORSALES musculi, quamvis ad pectus seu thoracem & ipsi pertineant; rectius tamen in ventrem revoluti cadavere, per dissectionem cognoscuntur. De his igitur Capite undecimo sequenti mentio fiet.

Cæterum ad continentes thoracis partes referenda quoque *Pleura* est, cui *Mediastinum* sociamus, & *Diaphragma*.

PLEURA est **MEMBRANA** costis, earumque musculis subtenfa, pectoris interiora omnia cingens.

VENAS, ARTERIAS, & NERVOS ab Intercostalibus sortitur ramis, circa dorsales vertebrae manifeste **DUPLEX**.

VALIDA

COMMENTARIUS.

parte sursum adscendunt, non autem costam secundam transeunt. Parvi sunt & exiles, in macilentis vix conspicui ac carnosi. Hos musculos credit *D. Marchette* potius portiones esse musculorum intercostalium internorum: nam, *inquit*, licet figuram trianguli repræsentent, attamen cum prædictis continuati patent, & absque dilaceratione ab ipsis separari non possunt.

Inspirationi & expirationi famulantur] De usu dictorum Musculorum incerti Anatomici. Plurimi alium internis alium externis tribuunt. His nempè adscribunt tractionem costarum ab inferioribus sursum pro dilatione Thoracis, illis à superioribus deorsum pro constrictione Thoracis. Ego certi quid hic concludi posse vix inducor ut credam.

Pleura est membrana &c.] De substantiâ

quam convenit inter Anatomicos, esse nimirum membranam, albam, crassiorē, validioremque Peritonæo: tam non convenit, simplex ne sit, an duplex. Ego illorum opinioni accedo, qui compaginatam volunt ex multis tenuibus membranis, sibi invicem incumbentibus.

Nervos insignes] Insignes satis sunt, licet exiles eos dicat *Fernelius*, facit tamen hoc respectu tantum eorum qui sunt in Artubus.

Cingens] Hinc *Succingens* appellatur, *ὑποπνεῦμα*, nam aliàs plures in corpore habentur membranæ, quæ succingunt alia membra, quæ tamen alia nomina acceperunt. *Pleura* vocatur vel quasi *πνεῦμα, ἀπὸ τῆς πνεύσεως* respirando, quoniam facit, ut respiratio melius fiat, non quod proprium instrumentum respirationis sit, sed quod usum tantum præstet, firman-

VALIDA ubique est, & qua pulmones respicit **LÆVIS**, costis, ac præcipuè vertebris dorsi firmiter **CONNEXA**.

Frequens ejus ob copiam vasorum Inflammatio est. Pus inde collectum, nunc intra latera pleuræ subsistit, nunc in pulmones propius adhærentes transfunditur, interdum in cavitatem thoracis salvis etiamnum pulmonibus defluit.

MEDIASTINUS quamvis internis thoracis partibus accenseri queat; tamen cum pleuræ ipsius continuatio videatur, junctim optimè demonstratur. Est autem **MEMBRANA gemina**, quæ à vertebris thoracis ad sternum porrecta, pectus, adeoque & pulmones, in dextram sinistramque partem distinguit: cor ipsum, cum pericardio suo sustinens.

VENAM

COMMENTARIUS.

firmando nempè, roborandoque membra, ipsi dicata, vel *ἀπὸ τῆς πλῆξης*, à costis seu lateribus, quæ costæ inserviunt respirationi.

Lævis] Lævitem hanc ei à naturâ datam censent haud sine ratione Anatomici, ne Pulmonibus sua asperitate incommodet.

Inflammatio est] Quæ à Medicis pleuritidis nomen, ab affecta parte, accepit, licet nobis à latere potius id deductum videatur.

Mediastinum] Solet hoc vocabulum attribui 1. confuse & generatim omnibus rebus in medio consistentibus, qualis est paries mediastinus, intergerinus, 2. strictius aliquanto, ex *Budai*, *Prisciani*, *Ulpiani* sententiis, mancipio abjecto, quod fordidissima ministeria obire cogitur, & quod in medio constat, ad imperia & natus omnium. 3. Proprie & Anatomice maximè membranæ ei quæ Thoracem in dextrum & sinistrum separat, hinc non incommode appellari posse censet in *Colleg. Anatom. Laurenberg.* discretorium, aut discrimen, aut diribitorium, quas voces apud *Celsum* & *Aurelium* in morbis chronicis legi tradit.

In dextram sinistramque partem distinguit] Usus mediastini varius admodum. *Galenotriplex* habetur, quorum *Primus* dividere pectus in duas partes, adeoque efficere, ut læsâ unâ parte, altera tamen suo officio fungi queat; *Secundus* contentis in Thorace partibus exhibere tunicam investientem communem; *Tertius* denique, Nervos ex Cerebro deorsum vergentes, in itinere aliquin periclitaturos custodire. *Joh. vander Linden* his duos alios

addit, scil. 1. cordi esse pro omento, eò quod plerisque locis etiam valdè soleat pinguescere. Et 2. pro operimento eidem esse, ac veluti altero vallo contra hostilitates cruoris, purisvè aut feri, in alterutro pectore collecti. *Riolanus* adhuc alium omnibus his accenset, quem etiam præfert; nimirum suspensum in medio Thorace tenere Cor, ne situm suum debitum mutet, in posteriorem partem collabatur, aut omninò in contrarium, mutato situ subito hominem suffocet. *Vesalius l. 6. de human. corp. fabr. cap. 3.* alium adhuc adfert, quem *Hofman. lib. 3. de Thor. cap. 5.* pro præcipuo habendum censet: Suspendere cor & continere in suo situ, ne irrequietissimâ agitatione aliquid patiatur. Videtur mihi distinctio quædam facienda inter membranam illam subtilissimam à parte anteriore inter asperam arteriam iisque annexos pulmones & sterni medium locum habentem, quam mediastinum appellare possumus, cum à spinâ dorsi ad sternum procedens distinguat medio loco ventrem medium in dextrum & sinistrum, & illam quæ densior est multò & crassior, atque à pericardio utrinque ad diaphragma descendit, supra centrum illius magnam cavitatem constituens. Membranam unam ejusdem cum alterâ conditionis debere esse, imò usus, quid necessitatis?

Cor cum pericardio suo sustinens] Imò sustinet & Pulmonem, Diaphragmativè centrum, sumpto nomine tam pro illâ quæ anterior est, quam pro eâ quæ infra Cor. Pulmo sic detinetur suspensus eadem ratione quâ equites

VENAM possidet propriam, quæ *mediastina* dicitur, inferius à ramo Venæ Cavæ Subclavio ortam, minoresque alias à Mammariis, & Vena azygo. *Arterias* suscipit ab internis pariter Mammariis: *Nervulos* à Sexto pari, illiusque præcipue Recurrente ramo sinistro.

AMPLITUDO mediastini thoracis longitudinem, & profunditatem æquat, cujus duplicatio sub sterno, evidenti intervallo sejunctis parietibus, observabilis. Intra illam, & humorum vitiosorum confluxus, & flatuum collectio quandoque fit: profundiusque adacta vulnera, cum vitalia ipsa læsa non essent, facilem, felicemque curationem admiserunt.

Robore suo *firmus* satis est mediastinus, tactui qua pulmones respicit *mollior* atque *adipe* nonnunquam respersus.

Sequitur DIAPHRAGMA, five *Septum transversum*, inter abdomen

COMMENTARIUS.

vehuntur equis suis, ita ut cum asperâ arteriâ inequitare mediastino dicatur. Cor autem cum Pericardio & quatuor magnis vasis sustinetur duplici ratione. 1. Quia mediastini membrana Pericardium cum corde & quatuor magnis vasis extrinsecus velut duabus manibus comprehendit & cingit. 2. Quia eadem cum externâ membranâ Pericardii connascitur, ita ut difficulter separari possit, mediantibus fibrillis plurimis. Diaphragmatis denique centrum stabilitur & sustinetur, quia Mediastini membranæ, inferioris maximè, eadem sunt cum membranâ pleurâ, quæ totam superficiem Diaphragmatis, non tantum centrum, sed & circumferentiam, investit, quo coalitu firmissimo centrum suspenditur.

[*Cujus duplicatio &c.*] Falsum omninò est, membranas Mediastini (veri, seu antici) sub sterno evidenti intervallo reapse distare, adeoque cavitatem constituere, quam credunt plurimi tam latè patere, quam latum est ipsum sternum, arctissimè enim aded duæ hæ membranæ (si duæ admittendæ sint, quod vix videtur faciendum,) copulatæ sunt, ut nequidem arte, nisi violentia accedat, separabiles sint. Quod itaque in dissectione corporis ab Anatomico exhibeatur sub sterno cavitas, per accidens est, & fit, cum is sternum magnâ vi à membranis Mediastini divellit, quod perquam mirum est, observasse neminem, ante *Adrian. Falcoburgium*, præceptorem nostrum fidelissimum, quem non semel publicè eum

errorem spectatoribus inculcasse vidimus. Nec est quod cavitatem eam, quæ notabilis satis sub sterno, ubi mediastinum Diaphragmati unitur, sese exhibet, nobis obtrudant alii, ea enim sub parte aliquâ sterni tantum est, non verò sub eo toto, ut volunt authores.

[*Diaphragma*] Continens & contenta pars dici potest, continetur enim in corpore, continet partes vitales in ventre medio, continet & naturales in Infimo. Primus hanc partem ita *Plato* appellavit, à *Ἀποφύσις*, quod diffinit utrasque partes vitales & naturales à se invicem. Vulgaris quoque vox est *φένες* quæ tum mentem significat, tum hoc membrum; & quidem hoc, quod eodem insigniter læso, statim mens ita per consensum lædatur, perinde ac si per se mens esset læsa, ut eleganter testatur *Galenus* l. 5. de loc. affect. c. 7.

[*Septum transversum*] Ab usu & transverso ductu *Cornelius Celsus* ita appellat. *Plinius* lib. 10. c. 37. *Nat. histor.* & cum eo alii. Præcordia dicunt, quod stent præ corde tanquam murus validissimus. Sed *Præcordiorum* vox 1. notat omnes partes interiores cordi vicinas. 2. Partes laterales costis nothis subjectas, circa Hepar & Lienem; 3. Thoracem integrum. Et 4. hoc ut dixi Diaphragma. Videatur *Lauremb. Coll. Anat.* Dicitur & quibusdam Cingulum, quod cingat partes, unde *Belgis de Ommeleop.*

[*Inter Abdomen pectusque collocatum*] Sic ut à Xiphoidæ Cartilagine velut incipiat, & utrin-

domen pectusque collocatum, ut cavitatem utramque certo limite dirimeret, & ad inspirationem cum externis costarum musculis concurreret.

Constructum igitur est è SUBSTANTIA duplici, Nam & *carnem* obtinent *musculosam*, quæ per ambitum ejus diffunditur, & *membranam duplicem*; quarum *superior* expansæ Pleuræ accepta refertur, *inferior* Peritonæ, concursuque suo intermediam septi excarnem partem absolvunt.

VENAS consequitur diaphragma, & ARTERIAS, à conjunctis sibi Venæ cave, & Arteriæ magnæ truncis *Nervos* item insignes, superius è Plexu Nervorum Cervicis, à paris quinti ramo majore descendentes,

COMMENTARIUS.

utrinque obliquo versus inferiores dorsi vertebrae ductu circumtendatur. Unde magnitudo ipsius tanta est necessario, quantus ibi ambitus est utriusque ventris.

Ut cavitatem utramque certo limite dirimeret, & ad inspirationem cum externis costarum musculis concurreret. Egregiè utrumque hunc Diaphragmatis usum explicat *Highmorus l. 2. pag. 1. cap. 7. inquit*: Usus Diaphragmatis magnus est: præcipuum enim est respiratoris Organon. Dum autem fibræ ejus contrahuntur, maximè tenditur, & versus inferiora retrahitur; viscera infimi ventris deprimunt, venterque extenditur, & cavitas mediæ regionis multò amplior redditur, atque elevantur pulmones ob vacui fugam, aërque Insequitur, & fit inspiratio; ut in vivorum dissectione sæpiissime observavi. At dum fibræ laxantur, sursum rursus fertur, viscera infimi ventris adscendunt, mediæ regionis cavitas angustatur, pulmones decidunt, fitque sic Exspiratio; Juvantibus tamen nonnihil musculis Abdominis. Alter ejus usus est, ut naturalia à vitalibus separet, partesque nobiliores à vaporibus, à sentinâ corporis elatis, defendat. Magna itaque partis hujus cura adhibenda est, cum pars nobilis sit, ejusque morbi maximè sint periculosi; & plerumque ægros ad mortem deducant.

Carnem obtinet musculosam] Musculum dicendum Diaphragma esse in quantum conveniunt Anatomici, in tantum dissentiunt in eo, ubi loci sit vel caput ipsius, vel finis statuendus. *Galenus lib. 13. de usu part. cap. 5.* alique volunt medium ipsius esse caput, finem autem in circumferentiâ. Doctissimus *Nicol. Ste-*

nomis de Musculis & Glandulis observationum specimine, Musculum omnimodo Diaphragma dicendum tradit, non autem centrum versus confluerè fibras, nec in centro motus principium esse, sed fibrarum extremitatem alteram in Vertebrae esse, alteram in ambitu, quæ Costis sternique appendici jungitur, mediani verò membranam tendinum fibras constituturè, inter medias carnes, velut in digastrico musculo, interceptas, ductuque non recto sed vario quam elegantissimè circumductas. Quæ de re plura loco dicto legi possunt.

Per ambitum ejus diffunditur] Sic ut tenuiores initio, mox carnosiores magis magisque fibræ, undique à centro ad circumferentiam ejus, vel etiam ab anteriori laterali busque partibus ad Vertebrae ferantur.

Intermediam septi excarnem partem absol- vunt] Quæ inde centrum Diaphragmatis, aut circulus ejus nervæ appellatur. Vulnèra in hoc lethalia proclamantur.

Nervos] In Nervis his duo peculiaria obtinent. Alterum quod non cum visceribus utriusque ventris eos accipiat à sexto pari Cerebri: sed cum musculis à spinali medullâ. Alterum, quod non è fine dorsi, loco directè appposito, sed è colli. Prout enim fuerit longius collum aut brevius, ita ex quartâ vel quintâ educuntur. Hinc verò egressi inter Mediaſtini duplicaturam feruntur deorsum.

Descendentes] Hujus rei duplicem authores adferunt Causam quar. 1. ut longo hoc descensu nervi hi duriores & robustiores fiant, debuit enim moveri Diaphragma in respiratione, ad quod requirebatur robur ejus, illud enim verum censent, quo longius procedunt, eo robustio-

centes, consensus diaphragmatis cum capite, maxillæ item, labiorumque musculis præcipuos auctores.

PERVIUM est dextrorsum Venæ Cavæ, sinistrorsum Gulæ: circa vertebrae denique lumborum in duas protenditur carnosas primo, deinceps tendinosas portiones, per quas arteria magna descendit.

FORMA reliqua circularem propemodum ambitum designat, lumborum vertebrae, costisque spurii cognatum.

In medio, ubi centrum exhibet nervosum, pericardio firmiter *conjungitur*: nonnunquam & incumbentium pulmonum lobos nerveis sibi fibris connectit.

Nata supra diaphragma pugni magnitudine steatomata, ponderis molesti, difficilisque respirationis insuperabiles causas præbuerunt.

COMMENTARIUS.

bustiores fieri nervis. 2. ut commodè in ipsum centrum Diaphragmatis possint inseri, quod si natura à laterali parte produxisset, contorqueri ad centrum Diaphragmatis debuissent, jam autem faciliè ad id descendunt.







Labiorumque musculis] Hinc in percussione Diaphragmatis Ritus oritur, Sardonius dictus, quia unà faciei musculi convelluntur, & maxillis labiisque agitatæ risus apparet.

Per quas Arteria magna descendit] Non itaque penetrat, nec perforat Diaphragma,

ut plerique sunt opinati, sed Diaphragmati substernitur, vertebrae dorsi adhærens.

Supra Diaphragma] Humor quoque in Thoracis cavitate communiter reperitur, similis cruori aquæ permisto, quo Thoracis partes oblinuntur, ne nimium calefiant, & exsiccantur, aliquando adeo copiosus, ut instar crumenæ magnæ Diaphragmate depresso propendeat, & hunc ex latere Christi aperto profuxisse in dissertatione de Latere Christi docet Barth. cum quâ conferatur & hist. 7. cent. 2. obs.





TABULÆ CAP. IX, Declaratio.

Tabula hæc Musculis atque Ossibus Thoracis, tum ejusdem Membranis cum Diaphragmate repræsentandis, aptata est.

FIG. I.

- A* Musculus Pectoralis in suo situ.
B Idem Musculus extra situm.
C Serratus major anticus in situ ex parte conspicuus.
D Idem extra Situm nonnihil remotus.
E Serratus anticus minor in suo situ totus.
F Musculus Subclavius in situ.
f Clavicula sub pectoralem Musculum reflexa.
gg Platysma myodes in collo, fibris rectioribus expressum.
GG &c. Musculi Intercostales externi extra situm.
HH &c. Musculi Intercostales interni in situ.
II Diaphragmatis portio in suo situ.
K Arteria magna descendens pars.
L Foramen pro Gula Diaphragma transeunte.
M Foramen pro Vena Cava descendente.
NN Musculi lumborum Quadrati in situ, de quibus Capite XII.
OO Musculi Psoas dicti in situ suo spectabiles, de quibus Capite XIX.

FIG. II.

Ossa pectoris demonstrat antèrius conspicua.

- AA* Os Sternum dictum.
B Cartilago sterni mucronata.
CC &c. Costarum pars Cartilaginea.
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Costa Vera.
 8. 9. 10. 11. 12. Costa Spuria.

FIG. III.

Costas cum Vertebis earumque Spinosis processibus posterius conspiciendas præbet.

FIG. IV.

- Pectus apertum, in quo
AA Mediastinus ad latus protractus.
BB Tunica Mediastini sub sterno nonnihil ducta.
C Pulmonum lobus dexter ex parte conspicuus.

FIG. V.

- AA* Pleura pars costis avulsa, & ad latus conversa.
BB Costa Pleurâ denudata.
CC Costa adhuc Pleurâ vestita.

FIG. VI.

Cum sequente Diaphragma exhibet, à Costis, & Vertebis quibus hærebat separatum.

- AAA* Diaphragmatis pars Carnosa, Membranâ suâ adhuc operâ.
BB Arteria Phrenica.
CC Vena Phrenica.
D Foramen Vena Cava pervium.
E Foramen per quod Gula descendit.
FFF Pars diaphragmatis Membranoza.
G Sinus inter portiones Carnosas pro Arteria magna descendente.

FIG. VII.

- A* Nervus Diaphragmatis sinister.
B Nervus ejusdem dexter.
C Membrana Diaphragmatis superior aliquantum separata.
D Substantia Carnosa Diaphragmatis nuda.
E Foramen pro Gula descendente.
F Foramen pro Vena Cava transeunte.
GGG Pars Membranoza Diaphragmatis.
HHH Portiones Carnosæ ejusdem, inter quas Arteria magna descendit.

CAPUT X.

De Corde & Pulmonibus.

PEnetrabile pectoris Cor, & Pulmones occupant: quamvis & œsophago, & arteriæ tracheæ, vasisque communibus, suus quoque locus sit.

Verum cor antequam in conspectum detur, removendum est **PERICARDIUM**, involucrum ejus **MEMBRANOSUM**, quo intra sedem suam continetur, & ab externis pariter noxis tutelam qualemcunque consequitur. Non simplicis tamen tunicæ constitutionem obtinet, quum exterius mediastino, interius vasis à corde productis continuum observetur.

VENULAS suas à phrenicis mutuatur: **ARTERIAS** vix obtinet conspicuas: **NERVULOS** tum à dextro Sexti paris externo ramo, tum præcipue sinistro consequitur, eoque recurrente; quamvis & ex illis qui ad septum feruntur nervis, dexter ramus, per latus pericardii exterius descendat.

CONTIGUUM quidem est cordi, tantum tamen ab eo undique recedens, quantum agitationis, pulsusque commoditas exigebat.

Circa

COMMENTARIUS.

Pericardium] Appellatur ita Græcis ex *περί* circum & *καρδιά* cor, quasi membrana quædam circumjecta cordi, unde iisdem *περικαρδιον*, & *Hipp.* libello de Corde *μυώϊζ* quæ circumcingit cor, item *Vagina* & *Saccus* dicitur; Alii licet minus classici, *Domum*, *Arcam*, *Thecam* cordis nominant.

Involucrum ejus membranosum] Membrana est admodum crassa, dura, densa, solida, & compacta, adeo ut ad singulos cultri Anatomici ictus strepitum edat, firmitudo hæc contra præfens periculum est, in quod, si laxa hæc cordis capsula esset, cito inciderent, qui sublati ad coelum pedibus, vel capite diu frequenterque stare, vel manibus ambulare pro ludo habent, utrunque nostratibus pueris ad emendicandum stipem publicis in viis valde familiare; periculum autem hoc Mors est subita ex conversione cordis, vasorumque ejus contorsione interceptioneque influxus sanguinis in Cor & membra, docente sic *Lindano*

in *Physiol.* suis. Norunt & hanc firmitudinem Rustici plurimi, dum ex Pericardii animalium sibi crumenas faciunt, in quas argentum suum & aurum deponunt. Undique autem circumcingit Cor, ut licet dilatetur Thorax quam maxime, etiam costis fractis tamen non in conspectum veniat, nisi Pericardium hoc discindatur, ita ut imperitus Cor non adesse putaret, hinc est quod Scriptura Deum scrutatorem cordis dicat.

Arterias vix obtinet conspicuas] Habere tamen certum est.

Contiguum quidem est cordi] Hinc est quod *Piccolb.* Pyramidalem ipsi figuram adscribat, eandem enim cum corde figuram habet, hæc autem Pyramidis speciem refert. *Valverda* cum nuce pineâ, si tantum fingatur antierius & posterius esse compressum, comparari etiam optime posse scribit.

Contiguum est cordi] *Fernelius* Pericardium è capite cordis natum dicit, quod sano sensu

Circa basin Cordis, ubi mediastino conjunctum, continuumve cernitur, venis, arteriisque transitum præbet.

L I Q U O R E M continet tenuem, ex resolutis circa sese vaporibus collectum, quo siccitas cordis, & squalor repentinus prohibeatur.

COR

C O M M E N T A R I U S.

accipiendum, siue primam ejus originem consideres, siue ejus cum corde continuitatem; pericardium è corde nasci videtur, quatenus membranam habet, communem quatuor vasibus magnis, è corde enatis. Imò cum cordis basi vasibus magnis ita unitum est, ut inseparabile sit.

Tantum ab eo recedens &c. Ad sensum hoc manifestum est, si enim discindas Pericardium, & stylum vel digitum circumducas, inuenies à corde bono spatio distare.

Liquorem continet tenuem &c. De hoc multa occurrunt notatu dignissima, præcipua, breues esse coacti (maximè cum hæc doctrina alterius sit loci) explicabimus. Qualitatibus omnino cum urina convenire dicitur, sed diversitas magna adest. Liquor enim hic aquosus, insipidus est, non acris aut salus, limpidusque ac nullo colore infectus; Urina autem nec tenuis adeo, nec sine colore in sanis. Præter id quod viscosa ac pinguis Urina minimè sit, aqua autem illa plus satis. Hinc ex corpore exempta ope caloris externi in gelatinam dictam mutatur, undè & valdè probabile Lymphæ quosdam ductus esse, qui eum adferant. Quantitas in sano est Cochlear j aut s vel ʒj, aut ʒij. In morboſis copioſior longè est, sic ut etiam aliquot unciarum sæpè adesse reperiatur. *Bartholinus* cum *Bauhino*, *Claudino*, aliisque, in Hæctis exiguum quidem credit, *Lindanus* sæpè nullam, aſt *Autopsiæ* contradicunt boni hi authores. *Sneiderus* nonnunquam iij. iv. v. aut vj. uncias, aliquando libram humoris aquei in pericardio inuenisse se testatur *lib. 2. de Cathar.* Inter sanos etiam quicumque sicciores sunt, parum ejus habent, qui humidi plus; hinc & in fœtibus & pueris copioſior, quam in viris & adultis. Cum naturæ fluxilis sit, & materiam ex quâ semper proximam habeat, experientia etiam testetur regeneratam eam esse, posteaquam omnis perit effluxu, quis non auctorem hîc admittat, admittat imminutionem.

Patet id in iis quibus Pericardium læsum siue à causa externâ siue ab interna fuit, & iterum sanatum. Cujus rei exempla habet *Galenus lib. 7. aduyn. Anatom. cap. 13. Ant. Beniuernius de Abdit. cap. 42. Imò & Barthol. lib. 2. Instit. Anat. cap. 5.* Locus generationis hujus liquoris Pericardium est; In omnibus hominibus, cujuscunque sexus aut ætatis, in Mortuis æque ac viventibus. In mortuis quidem adesse sensus ipse probat. In Viventibus autem reperiri hæc maximè probare videntur. 1. Quod in brutorum animantium vivorum dissecto Pericardio inueniatur, qui tamen non magis necessarius in brutis videtur quam in hominibus, nec in his minus necessarius quam in illis. 2. Quod *Vesalius* aliquoties Pericardium hominum supplicio publico in partes quatuor dissectorum, statim, dictum ac factum, cum eor adhuc viveret, examinaverit, & semper eum humorem invenerit. *Andr. Laurentius* ut hoc probet, addit *Cap. de Pericardio* argumentum, desumptum à *Salvatore* nostro, ex cujus latere, ubi lanceâ aperiebatur, aqua & sanguis, teste Scripturâ sacrâ, effluxit. Sed à mortuo ad viventem non datur valens consequentia. Hanc autem aquam fuisse Pericardii plurimi volunt, putamus tamen nos, eam non fuisse aquam Pericardii; nam 1. illi hoc volunt ideo, ut eo probent cor Christi fuisse perfoſsum ac sic eum revera mortuum; sed illum revera mortuum fuisse jam constabat, ut docet *Euang. Joh. cap. 19. v. 30. ad 34.* ideo nec fregerunt ejus crura. 2. Etiamſi confoſsum fuisset Pericardium & Cor, an ideo aqua illa effluxisset per vulnus, & non in Thoracis cavitatem? 3. Sanguis qui effluxit necessario copioſus fuit, quia recenter erat mortuus, & magnum vulnus inflictum ut *cap. 20. v. 27.* patet, ubi *Thomas* inniſit manum in illud, quomodo verò potuit parva illa quantitas aquæ Pericardii discerni à copioſo sanguine? Quid ergo fuit? *Bartholinus* in *Tractatu de latere Christi aperto* liquorem hunc ex cavit

tate

COR ipsum viscerum omnium facile princeps, calidi vitalis ac spiritus scaturigo existit. Quo vigente naturales omnes functiones vigent, languent, deficiente vero penitus abolentur. Scaturiginem dixi, non primigenii calidi quod partibus è seminali substantia productis, quamvis dispari proportionem, statim ab ortu inest; sed calidi influentis, quod ex alimentis, attractivè sanguine fuscitandum est.

Parenchymate **CONSTITUITUR** denso, & compacto, ut calidum, spiritumque vitalem conceptum, non sibi tantum conservet; sed motu etiam assiduò validè concitatum, partibus corporis universis per arterias

COMMENTARIUS.

tate Thoracis effluxisse scribit, ut *cap. de Diaphragmate* vidimus, sed credimus nos potius copiosam eam aquam effluxisse, ut Christus impletet præfigurationem, atque testaretur se eum esse, qui figuratus erat per *Petràm*, ex qua multum aque effluxit, ut Israëlitarum magna turba inde sitim sedare posset. Fuit ergo Mysterium nobis incognitum, cujus generis & alia nobis S. S. exhibet, nisi dicere velimus immoderatam tristitiam sanguinem ferosiorum fecisse. Modus generationis variè traditur. *Veslingius* ex resolutis circa sese vaporibus collectum dicit. Et hanc sententiarum omnium probabilissimam judicamus. Ast undè vapores illi *Hofm. lib. I. de Thor. cap. II.* dicit cordis æstum exprimere & exsudare facere humorem per vasorum tunicas, non aliter, quam cum ex ligno viridi incenso exstillat aqua, putarem potius ipsam substantiam cordis transmitti hos vapores circa pericardium frigidum & densum colligendos, Arteriæ enim & Venæ non nisi cordi adstant. Usus ejus his verbis explicat Author: Quo siccitas cordis & squalor repentinus prohibeatur. Accuratus *Lindanus in Physiologia*: Usus est esse vesicæ cordis accensæ Medicinam, hoc est Pericardium humectare; qui videatur.

Cor] Græcis καρδιά dicitur, ut ex *Galen. lib. 7. de admin. Anat. cap. 4.* patet, aliisve locis, sed unde deducta ea vox sit, non convenit. Sunt qui à καρδία, fibro, concutio, quassio derivant, quoniam hoc viscus indefinenter se vibrat, & perpetuò mobile est, simile ferro, Belgis *de Onrust* / quod in Machinis Horologiorum habetur. Aliis dicitur *δύναμις* seu καρδία à robore, vel à καρτεία

seu καρτεία robustum imperium habeo, quoniam omnium validissimas actiones edit, adeoque verè Princeps partium est omnium. *Arch. Piccolh. suar. Lect. Anatom. lib. 4. Lect. 4.* scribit καρδιά fortè dictum esse Græcis ἀπὸ τῆς καρδίας h. e. arca panaria in qua panis pinsetur een *Back-troch* / quod ut massa in eà subigitur pro conciendo pane, ita & in corde sanguis crudior quasi pinsetur pro generatione sanguinis vitalis. *Hippocrates lib. de Corde* per Antonomasiā σπλάχνον Viscus appellat, undè & Sophocles hominem timidum σπλάχνον appellat. Latinis usitatissimè *Cor* vocatur, quod quidam à *Curâ* derivatum volunt, undè curam quasi *Cor* uram dictum volunt. *Piccolhom.* loco dicto à Curro putat *Cor* esse dictum, quod adeo moveatur, & quod continuo currere videatur, alii αὖ πὸ τοῦ καρδία à carne volunt deductum, quoniam robustissimâ carne præditum est. Sed proculdubio si quid conjecturari liceat dicitur quasi καρ, idem enim est quod *Cor*, quod olim idem ac καρ dictum fuit, quod adeo calidum sit, ut urere videatur ut bene *lib. 7. Antrop. cap. 12.* *Joh. Rivianus* observavit. *Cor* geminum à *Francisco Plazzono* inventum fuisse refert *Rhodius in Mantissa*.

Viscerum omnium facile Princeps] Videatur *Moëbius pag. 226.* & disputatio nostra de principatu Cordis Collegio medico *Kyper* inserta.

Quod ex alimentis, attractivè sanguine &c.] De *Usu Cordis* varias sententias collegit suamque proposuit prolixè atque nervose *Moëbius Capit. de Usu Cordis, pag. 250. & seq.*

arterias communicet. *Membrana* tegitur propria, tenui quidem, attamen abunde ad firmitudinem visceris robusta.

Sparguntur per exteriora parenchymatis *VENA*, & *ARTERIA coronaria* dicta. Quarum illa Venæ Cavæ soboles, lunata Valvula sanguinem refluentem moratur: hæc ab Aorta Arteria prodiens, læva parte cordis furculos suos magis exporrigit, *NERVI* à propinquis Sexti paris ramis, qui ad substantiam cordis carnosam feruntur, vix ulli observabiles. Qui ad tunicam ejus externam, seu pericardium accedant, dictum

COMMENTARIUS.

Robusta] *Ægrè à Parenchymate cordis separabilis.* Hanc nasci ab extremitatibus fibrarum dilatatis, & circum carnem obductis, verosimile mihi fecit, inquit, *Van der Linden Phys. pag. 196.* exemplum quod in malis aurantiis quilibet mecum videre potest, si non dedigneretur tantillum temporis observationi tam vulgari impendere. Cogitandum verò, annon ab hac cordis membranâ reliquæ omnes propagatione quâdam oriantur.

Coronaria dicta] Quod caput cordis coronæ instar cingant, adeoque extimis visceris ejus partibus nutriendis, fovendisque serviant. Arteriam coronariam non adesse credere *Plempium* quam sit falsum, Tractatu contra *Primerosium* cui Titulus est: *Impetus Primerosii in Plempium, retusus*, clarè demonstravi.

Refluentem moratur] Ei qui ex cavâ in eam influere posset viam præcludit.

Nervi vix ulli observabiles] Fallitur in hoc *Veslingius*, Nervos enim notabiles habet licet exiguos admodum, ab illo nervorum plexu, quem diligentissimus Anatomicus *Fallopium* primus omnium invenit suisvè auditoribus monstravit. Verba ejus sunt. Sub basi cordis ubi *vena Arterialis* incipit ad sinistrum latus flecti, atque ubi adest meatus ille insignis *Arterialis* in Embryone, qui conjungit venam dictam cum *Arteriâ Aortâ* est plexus quidam aut complicatio nervea, qualis etiam in *Mesenterio à me descripta* est, sed minor, robusta tamen ac solida, à quâ abundans copia nervosæ materiæ totam cordis basin amplexatur, perque ipsam plures propagines parvorum inde deductæ disperguntur per totam ipsius substantiam, quamvis illas minutim prosequi nequeam. Accuratius hos Nervos Cordis descripsit, additâ figurâ curiosâ,

Th. Willis in Descript. Nervorum quæ omnia in Commentario nostro, ad finem huic operi addendo, habebit Lector. Huic similia sunt quæ profert *Vidius Vidius*. Usus hîsc Regius, Laurembergius, & *Plempius* tribuunt, ut *Spiritus animales* pro motu cordis adducant. *Fallopium* pro corroboranda eadem sententia, ait, multam cohortem nervorum. Quasi reticularem plexum per cordis basin differgi: quod autem oculari inspectioni non respondet. *Carolus Piso* lib. 6. de Morbus ab Illuvie ferofa ortis, eandem fovere sententiam videtur: Cordis enim motum repente aboleri, & syncopen oriri ait, si nervuli isti rumpantur, aut obstruantur. *Higlmorus*, subscrit, & motum cordis non nisi à spiritibus istis animalibus provenire contendit. Hinc etiam quidam permori, ut cor, Hippocratis auctoritate freti, musciculum nominarent. Verum motum hunc cordis non à spiritibus per nervos adductis provenire, multæ rationes suadere videntur. Nam 1. motus tam fortis, & continuus si à spiritibus animalibus proveniret, cor non tam exilibus nervorum ramulis esset contentum; sed nervos majores eosque copiosiores, qui pro spiritibus indefinenter adducendis sufficerent, desideraret. Quemadmodum musculus, præ aliis omnibus, quod actionis animalis sint instrumenta, magnis nervis opus fuit; ita cordi nullam actionem animale habenti, paucis usque exiguis, teste *Galeno* l. 6. U. P. cap. 18. 4. In foetu ante pulsat, quàm aliqua facultas animalis, si ad id negotium esset necessaria, queat immitti: cerebrum enim tum nondum suis organis pro spiritibus elaborandis est perfectum. 3. In ovo, priusquam vel nervi, vel aliquid aliud formatum sit, punctum videmus saliens, motus principium non sine admiratione ostendens. 4. Motus, qui in aliis parti-

bus

dictum supra: quorum is, qui à recurrente sinistro procedit, ad basin ipsam cordis ramulum porrigit. Neque indigere istis ad motum cor potest, quoniam ante agitur, & pullat, quam animalis facultas ad movendi, sentiendique actus perducatur. Spermaticis tamen partibus, secundum sinuum recessus, plurimis præditum est, figura nervorum æmulis, quarum ampliores quisquis à recenti dissectione accurratius inspexerit, poro intus præditas deprehendet.

Obvelat partem ejus latiore *ADEPS*, oportunum adversus contabescentiam præsidium: idque interdum adeo copiose, ut deesse victimis cor olim haruspicibus quandoque visum fuerit.

Adhærent cordi circa basin ab utroque latere veluti appendices, quas ob figuræ quoddam rudimentum *AURICULAS* cordis nominant. *Substantia* utique similes ipsi sunt, sinistra paulo habitior, magisque solida. Utraque concava, fibrisque nervosis instructa, ut laxante se post systolen corde, valida constrictione affluentem receptumque sanguinem in sinus ejus penitus compellant.

MA-

COMMENTARIUS.

bus per spiritus animales nervis adductos, ut volunt auctores, perficitur, dependet à nostro arbitrio; cordis autem nequaquam. 5. Cerebrò in apoplexiâ forti affectò licet totius corporis motus cesset, pulsus tamen non cessat, qui tamen præ cæteris ladi debebat, si à spiritibus istis animalibus dependeret. Proinde motus iste cordis potius tribuendus videtur igni, seu spiritui vitali, quidèò ab Hippocrate non immeritò impulsor, salutatur. Bartholinus existimat lumen huic spiritui insitum inprimis quoque ad motum juvare. Sensum quoque cordi hi largiuntur nervuli, qui autem satis obscurus est. Harvejus lib. de generat. animal. hujus rei notabile habet exemplum: is enim cor adolescentis, (cui ex abscessu in thorace minus dextrè curato peramplus hiatus apertus in pectore manserat) manibus tractavit, quod autem adolescens, qui sanus & vegetus adhuc erat, neitquam sensit, nisi vel visu, vel cutis exterioris sensatione istud intellexisset.

Spermaticis tamen partibus &c. De carnis his particulis mox plura dicentur, & legi possunt quæ habet ex aliis Bartholin. Anat. pag. 263.

Adeo copiose ut &c. Pinguedinem in hominibus adeo copiosam Spigelius, Riolanus,

aliique observarunt, ut cor omninò ea occultatum fuerit. De cordis tamen ipsius absentia exemplum vide apud Schenckium, & Agellium. Quibus fidem habeat, cui placet.

Ab utroque latere] Ad orificia vasorum cordis, quæ in illud sanguinem invehunt, venæ nempe cavæ & pulmonalis.

Auriculas cordis] Et hinc auritum esse cor varii volunt. Auriculæ autem hæ particulæ ob similitudinem quandam appellantur, quæ non consistit in eo quod audiant, sed in his tribus. 1. quod quemadmodum capiti extrinsecus aures adstant, ita & hæ partes cordis basi. 2. ut illæ exterius gibbosæ interius concavæ sunt, ita & hæ. & 3. ut illæ aërem seu sonum recipiunt cerebro deferendum, ita & hæ sanguinem cordi.

Substantia utique similes cordi sunt] Videntur potius mixtum quid esse ex substantiâ cordis & vasorum.

Valida constrictione &c.] De Motu harum auricularum, & quæ eo spectant ex Harvejo & Highmore sub finem hujus operis in Commentario secundo cognoscet Lector. Illarum motus argute quidem & optime à doctissimo Harvæo describitur lib. de Motu cordis. Quarum (inquit) motus est à Ventriculorum motu diver-

MAGNITUDO cordis in homine singularis : quamvis pro ætatis, temperamentique dispari conditione varia.

DIVIDITUR in *Basin*, qua parte latius est, & *Apicem*, qua strictius, & in mucronem acuminatur.

Sinus obtinet, seu VENTRICULOS duos, dextrum unum, sinistrum.

COMMENTARIUS.

fus; simul enim ambæ moventes auriculæ, motum Ventriculorum, qui simul etiam movent, præcedunt. Ita ut quatuor motus loco distincti sint, duo tantum tempore. Hanc motus diversitatem sæpius ipse in dissectionibus vidorum me observasse dicere, si quid nostra observatio, post virum tam egregium, veritati addere possit. Motuum horum diversorum usum in sequentibus habebitis. Venarum orificiis, quæ sanguinem ad Ventriculos adducunt, auriculæ apponuntur, immediate ad ostia Ventriculorum pendentes. Intra quas introspectantes Valvulas K. K. K. in Ventriculo dextro: & H. H. in sinistro Figuris in fine hujus operis collocatis videatis. Et ob hanc rationem illis ibi fuisse positus statuendum esse animadvertimus. Ne sanguis scilicet copiose & violenter à Venis hisce in Ventriculos irruens, clausuram & conniventiam Valvularum, cum Ventriculi se constringunt, impediatur: Ideoque natura Auriculas hæc ad ostium apposuit, ut sint quasi diverticula, in quibus sanguis à Venis diffuens, moram aliquantulum faciat, donec rursus à motu quiescant Ventriculi, laxentur, & Valvule flaccescentes non amplius orificia claudant. Interim auriculæ sanguine à Venis distenduntur, ac finito motu Ventriculorum, cum illi ad recipiendum sint præparati, auriculæ jam multum distentæ, se undique constringunt, & in cordis Ventriculos jam laxatos sanguinem impellunt. Hisce absolutis statim rursus ad motum insurgunt Ventriculi, sese undique restringunt, Valvule orificia claudunt, sanguis ex illis in Arterias, Pulmonariam à dextro, Magnam à sinistro Ventriculo effunditur, & auriculæ rursus novo sanguine implentur. Ideoque auriculæ hic appositæ videmus, ne sanguis continuo & repentinò incurso, vel Valvulas violaret, vel illarum conniventiam impediret.

Magnitudo cordis in homine singularis] Ordinaria naturæ lege non nisi sex digitos transversos longitudo æquat, latitudo quatuor, al-

titudo totidem ut Piccolhom. bene observavit, sect. 4. lib. 4.

Quamvis pro ætatis temperamentivè conditione varia] Ætate magnitudinem ejus mutari res notissima est. Temperamentum quod spectat, frigidiores cor magnum habere, calidiores minus, certum est. Hic quæstio se offert, an magnum Cor timiditatem, parvum audaciam inferat? Existimo Cordi magno, at bene temperato majores inesse agendi vires quam parvo. At quia sæpè magnum Cor malè constitutum est, laxius nempe, mollius, & minus calidum, hinc ea opinio obtinuit, parvo corde præditos esse reliquis timidiores, D. Barbette & Sladus in homine audacissimo cor post mortem magnitudine ter bubulum æquans videre.

In mucronem acuminatus] Bifidi cordis quoad mucronem observationem histor. 67. Barthol. habet.

Sinus duo] Aristoteles, inquit Mæbius p. 235. lib. de Part. animal. tres statuit Cordis Ventriculos qui autem hæcenus à nemine visi. Jacobus Carpus Aristotelis defensionem suscepurus, ait, foveas septi cordis esse minimum illum & medium sinum. Conringio autem verosimilior est Nicolai Massæ opinio, hic enim in grandiore quodam humano corde testatur (ut fuscè habet Conringius lib. de Motu & gener. sanguinis) deprehensum sibi sinum aliquem in superiore parte septi cordis juxta basin ac simile quid fortè Aristoteli visum, eoque inductum illum, ut omnibus grandioribus animalibus eum adscriberet. Ne in balæna quidem tres inveniuntur, sed duo tantum, ut in dissecto balænæ foetu Falcob. & Walens observavere. Nec Galenus Romæ in Elephante invenit plures. Cor Polonicusdæ à Riolano dissecti sine Ventriculis, planè solidum erat, referente Barthol. cap. de Corde.

Ampli-

strum. *Dexter* tenuior est, amplitudine tamen, & latitudine conspectior, qui denuo tenui, carnosoque sepimento distinctus aliquando tertium in homine duobus ventriculis addit.

Originem è dextro sinu ducit *VENA CAVA* valido principio, vas scilicet membranofum, valvulisque in extremis præcipuè distinctum, ut sanguinem perfectionis indigum cordi subministret. *Vas* dixi, quia substantiam continet liquidam, partibus corporis omnibus rursus affundendam: & vas quidem *membranofum*, Tunica enim constat propria, simplici, ac molli, ut osculis diductis sanguinem facilius hauriat. Tutelæ tamen gratia, ubicunque in progressu detecta magis ac suspensa est, partium proximarum involucris induitur.

Valvulas addidit providus conditor; membranas nimirum admodum tenues, *Semilunari* figura præditas, quæ versus principium venarum spectantes, motum sanguinis præter naturalem, è majoris venis in minores moderantur. Hæ quamvis in Mesenterica, Splenica, Emulgenti, Azygo, Ingularique interna obviæ sint, frequentiores tamen in Artuum venis, quorum capite ultimo hujus tractatus meminerimus.

Ab his conformatione aliquantum discrepant, *Valvula* tres, circa ipsum Venæ cavæ ostium, in dextrum cordis ventriculum spectantes, quas à figuræ quadam convenientia *Tricuspidēs* appellant auctores. Hæ nervosis cordis filamentis annexæ, sanguinis in venam cavam regressui obsistunt.

Cæterum Vena Cava supra cor assurgens, producit Venam *azygon*, id est,

COMMENTARIUS.

Amplitudine & latitudine dexter sinistro conspectior] Sic ut potius additamentum Ventriculi sinistri videatur, quam verus Ventriculus, nostamen nondum ipsum nomine eo privabimus antequam plura nobis consent. Hunc cinerei coloris, exinanitum, crispatum contractumque ad crumenæ coriaceæ formam, imò in alio in lapidem induratum vidit Londini *Eduardus Maji* teste *Severino lib. de abscess.* Totus ferè ossis fuit deprehensus in *Polemarcho Schombergio*, qui ideo exercitum à Germaniâ in Galliam dum duceret, subito extinctus est, teste *Thuano in hist. suâ.*

Aliquando tertium in homine addit] Non nisi rarissime tamen. *Emil. Parisanus* semel observavit, *Veslingius* bis, referente *Barthol.*

Vena cava] Cava dicitur quod cavitas ejus amplior sit quam reliquarum venarum, alio-

quin enim omnes venæ cavæ sunt, etiam minores, secus enim sanguinem continere non possent.

Ut sanguinem perfectionis indigum cordi subministret] Præter sanguinem & Chylus ex ductu Chylifero ad dextrum Cordis Ventriculum ducitur, quæ de re in seq. ubi de Vasis Lacteis, ductuque hoc.

Vena cava supra Cor assurgens producit venam azygon] *Sylvius*, vir, ut eum vocat *Sneiderus*, naturæ contentiosus & stomachosior, *Galenum* dicentem venam azygon intra Cor oriri, contra ac docent recentiores, quo excusare posset, illam venam supra Cor hodie existere, at ætate *Galen*i sub corde originem traxisse suam, proferre ausus quo quid magis jejune proferri possit, non video:

Venam azygon, id est sine pari] Vena azy-

id est, *sine pari*, à qua costis ut plurimum inferioribus rami distribuuntur. Portio hujus inferior, juxta diaphragmatis carnosos processus in abdomen descendens, sinistrorsum Emulgenti, dextrorsum Venæ cavæ denuo, aut primæ Lumborum inseritur, variante hic subinde naturæ instituto: quæ interdum omissa azygo, ex utroque subclavio venæ cavæ ramo, prope mammarias, venam producit insignem, per thoracem totum, ad os usque sacrum porrectam, è qua tum intercostales venas omnes, tum etiam lumbares derivat.

Jugulum vero cum attingit vena cava, dividitur in ramos amplos *Subclavios* dictos, à quibus inferius *vena intercostalis superior*, *mammaria* item *interna*, *mediastinaque* proposita, tum *cervicalis*, & *muscula* vena *inferior* nascuntur: superius *vena jugularis interna*, atque *externa*, cum *muscula superiore* producuntur.

Egreditur præterea è dextro cordis ventriculo VENA, ob tunicæ duplicitatem veteribus ARTERIOSA nuncupata, quæ in dextram, sinistramque pulmonum partem magnis geminatisque ramis extensa, sanguinem iis largiter affundit.

Specabiles circa exortum illius *Valvula* tres membranosæ, *sigmoides* à figura nominatæ, forasque spectantes, ut restagnantem à compressu pulmonum sanguinem excludant. Sed revera vas hoc arteria est, non vena. Nam præterquam quod arteriæ substantiam obtinet, etiam pulsum edit arteriis reliquis communem, ut vivorum animantium dissectio docet, sanguinemque vehit, à corde attenuatum.

Sinister cordis ventriculus angustior est dextro; sed carnosior: adeoque tum per se, tum validiorem ob motum calidior, in sanguine recepto spiritum suscitatur, quem vitalem appellare par est.

Initium

COMMENTARIUS.

gos in muliere 1642. à Cl. *Veslingio* in solemini Anatomie Patavina dissecta prope exortum in duos ramos, satis magnos distincta, utrique lateri prospiciebat. Vidit non semel duplicem venam *αζυγο* pari passu, & distantia, inferiora perrepantem *Bartholin.* ut cent. 2. *hisor. Anatom.* 54. testatur. Exemplum simile vidisse se refert *Joan. Rhod. in Manissa Anat.* habet & exemplum *Dom. Panzrol. obs.* 19. l. 3.

Vena azygos emulgenti inseritur] Hinc mirum non esse scribit *Marchette* si ab autoribus describatur, per venam azygon materiam intra cavitatem collectam per Urinam expui-

gari posse, ut sæpius observavit. At mirum hujusmodi à viro illo proponi, cui motus humorum cognitus est, non enim per emulgentes venas aliquid Renibus exhibetur, sed omne quod eos accedit, arterias penetrat.

Valvula Sigmoides à C veterum quod postea sic s formantur] Dicuntur & Semilunares, seu Semicirculares.

Attenuatum] In Pulmones, adeoque optimo jure Pulmonalis Arteria dicitur.

In sanguine recepto] Ex dextro cordis ventriculo, per Pulmones.

Spiritum vitalem in sanguine suscitatur] Hoc quomodo

Initium ex illo sumit ARTERIA AORTA, five MAGNA, vas nimirum membranofum, pulſu, dum vita ſuperſtes, aſſiduo micans, ut ſanguinem modis omnibus in corde perfectum, in corpus univerſum diſtribuat Subſtantia illius quam venæ nervoſior, atque è tunica geminâ producta. Harum quæ interna eſt, denſior, & in extremo ſenio adeo interdum rigida evadit, ut circulum prope cor, aut in corde oſſeum re-præſentet: quæ externa, tenuis eſt, & rara, quibus propin quarum partium membranæ, roboris ſubinde aut tutelæ munere, accedunt.

Valvula ad ejus exortum tres conſpiciuntur, Lunares à figura dictæ, ſanguiniſque regurgitantis impetum ſuſtinent. Neque alias in progreſſu valvulas exhibet, tum quia propter internæ tunicæ robur non facile aneurifmatum damnis obnoxia, tum quia ſanguini in eam ſuſcepto mora

COMMENTARIUS.

quomodo fiat, alio loco, ubi de Humoribus & Spiritibus in ſpecie agitur, convenientius declaratur, ne Anatomicus hîc tractatus partium ſolidarum examini præcipuè deſtinatus aliorum inquiſitione præter modum increſcat.

Arteria Aorta] Arteria dicitur, quod aërem ferat, non autem aërem ſolum (ſi aliquem vehat, quod tamen adhuc litem mover) ſed & Spiritum cum ſanguine vehit. Magna dicitur quoniam omnium aliarum maxima & veluti mater eſt. Aorta denique vocatur ἀόρτη ἀορτήεν attollendo, idque dupliciter, 1. quoniam tunicæ ſuâ duritiæ etiam in demortuis ſemper elevata & ſublata ſunt, & nunquam concidunt, ſecus ac Venæ quæ ſtatim ac ſanguine evacuata ſubſident. 2. quia in Diaſtole Arteria hæc attollitur, in Syſtole autem deprimitur. Et licet hæc omni omnino Arteriæ convenient, huic tamen maximè.

Sanguinis generatio] Hæc tam in Ventriculo dextro quam ſiniſtro, in ſolâ Chyli attenuatione, rarefactione, diſſolutione, & exinde novâ aliquâ unionem conſiſtit, quæ actio in ſiniſtro ventriculo evidentior & majoris eſt conſiderationis quam in dextro. Ut hæc omnia latius demonſtrantur alibi.

Circulum prope cor aut in corde oſſeum] In majoris Arteriæ exortu quædam animantia, ut Cervi & Damæ, os tanquam radicem aut baſin gerunt: quod ſcribit Galenus in reliquis quoque animantibus omnibus inveniri, minoribus quidem velut membranam, mediocribus

velut cartilaginem, majoribus (ut Elephantis, Bobus & Hominibus) os cartilaginofum. Ita diſſerit Magnus ille Fernelius Phyiſiolog. cap. 7. in quibus graves cum contineantur errores, hîc corrigendi veniunt. 1. Enim Galenus non dicit os illud in corde omnium exiguorum animalium eſſe veluti membranam, ſed eſſe officulum ὀστέον ἐν τῇ καρδίᾳ, id eſt, talem particulam quæ nervaceæ & cartilaginofæ naturæ. 2. Idem in mediocribus non dicit officulum illud eſſe velut cartilaginem, quia exactè cartilaginem eſſe ſcribit. 3. Galenum etiam hominem nullibi illis majoribus animalibus annueraſſe conſtat, quæ verum os in corde habent; quod ſi feciſſet falſiſſima protuliſſet, in Corde enim humano cartilago quidem ad exortum Arteriæ magnæ deprehenditur lenticulæ paluſtris aut grani hordei magnitudine, verum autem os non niſi rariſſimè obſervatur adeſſe, ut adeo quæ de oſſe in corde aut juxta illius baſin in exortu Arteriæ magnæ reperto referunt inter alios Harvejus, Riola-mus, Bartholin. Anat. reform. lib. 2. cap. 7. & hiſtor. Anat. 50. cent. 1. hiſt. 45. cent. 2. Joh. Dan. Horſtius Obſerv. 8. &c. alique, inter raro contingentia merito referri debeant.

Lunares] Semilunares, Semicirculares, Sigmoides.

Aneurifmatum] Quibus à Cauſis dependeat, Aneurifma, Medicina mea tradit. Vidit tale infra Guttur ſupra os pectoris, circa Spinam in dorſo, in oſtio Ventriculi, Meſenterio, Brachio

mora nulla necessenda fuit. Is calidior, spirituque vegetior, colore item supra purpuram nitidior existit: cumque reciprocante pulsu assidua sit ejus distributio, necessum est, ut è vena cava assiduò cor hauriat, quod replendis denuo ventriculis sufficere queat. Ea res motum sanguinis perpetuum ad vitalem illam arcem efficit, pro usu cordis plus minusve concitatum. Quin eundem in finem comites arteriarum venas esse natura voluit, ac conjuges, ut prompte reciperent, quod exinaniendo cordi subministrare possent: quorum exactiorem notitiam hoc primum ævo *Guilielmi Harvei* industriæ debemus.

Truncus Arteriæ Magnæ descendens, quemadmodum *Intercostales Arterias inferiores, Phrenicas*, aliasque jam in recensione viscerum abdominis propositas dispergit; sic emergens extra cor dirimitur in ramos amplos *Subclavios*, à quibus antequam thorace egrediatur, oritur inferius *Intercostalis arteria superior*, tum paulo altius *Mammaria interna, Vertebralis, & Cervicalis*: reliquum deinceps arteriæ magnæ *Carotidem* utrinque producit, quæ interno, externoque ramo, ad caput deinceps assurgit.

Insertitur his vasis circa jugulum *THYMUS*, mollis, spongiosaque caro, tutelæ ac fulcimenti usum præbens.

E sinistro denique cordis ventriculo protenditur *ARTERIA*, quam antiqui ob membranæ simplicitatem *VENOSAM* appellant, & mox ab exortu duplicatis ramis eximiis in dextram sinistramque pulmonum regionem diffusa, exsuperantem in iis sanguinem, & haulto aëri permistum, in se rapere, ventriculoque cordis sinistro suggerere verè perhibetur.

Valvulas

COMMENTARIUS.

Brachio, observavit *Dodonæus* ut in *observ. 51.* habet.

Motum sanguinis perpetuum] Circularem communiter dicunt.

Quorum exactiorem notitiam hoc primum ævo Guilielmi Harvei industriæ debemus] Debemus & industriæ plurimorum Excellentissimorum Virorum, *Sylvii* imprimis, *Walei*, *Bartholini*, *Kyperii*, *Deusingii*, *Slegelii*, *Conringii*, *Baacks*, *Entii*, *Plempii*, *Liceti*, *Highmori* aliorumque, scriptis eruditissimis doctrinam hanc de circulari sanguinis motu probantium, quæ hoc loco evolvere habet Lector, ne commentarii limites nimium excedamus, cum materiæ dignitas atque amplitudo brevès esse prohibeat. Adjungi & his possunt

dissertationes eorum qui egregio huic invento vel in toto quales *Primerosius*, *Leichnerus*, &c. Vel ex parte uti *Riolanus*, sese opposuerunt.

Mammaria externa &c.] Ab hac vel ad hujus principium Mediastina, & quæ ad Thymum tendit.

Vertebralis & Cervicalis] *Cervicalis* est quæ in musculos Cervicis distribuitur; *Vertebralis* quæ per foramina processuum transversorum colli vertebrarum adscendens, ad latere spinalis medullæ cranium ingreditur.

Haulto aëri permistum] Usus hujus Venæ egregiè *Highmor. pag. 170.* explicat, ubi & de aëris ad Cor negato accessu eruditè philosophatur.

Valvulas reflexum sanguinis è corde remorantes geminas obtinet, introrsum spectantes, quas junctim acceptas episcopali Mitra auctores comparare solent. At neque hoc vas in arteriarum, sed venarum potius censu habendum est; quia substantiæ rationem eandem cum venis habet: venarum instar in foetu non pulsatur, sed quiescit, sanguinemque aeris inspiratu temperatum cordi subministrat.

Intercedit cordis ventriculos parenchymatis pars major, ac densior, SEPTUM alias CORDIS nuncupatum. Hoc latere sinistro concavum est, dextro vero gibbum, & cavernulis quamplurimis elaboratum conspicitur. Pertingunt ad septum *meatus* singulares, magnitudine varii, è Vena cava, & Arteria venosa, qua basin ventriculorum vestiunt producti, sanguinem ipsi necessarium subministrantes.

Cor FIGURA metæ simile. TEMPERAMENTO haud dubie visceribus omnibus calidius.

In

COMMENTARIUS.

Episcopali mitra comparant] Adeoque *Mitrales* dicuntur, imò & *Tricuspides*.

Cordi subministrat] Ex pulmonibus venientem, unde *Vena pulmonalis* dicenda est.

Densior] Nullis foraminibus manifestis pro transitu sanguinis ex dextro cordis Ventriculo in sinistrum, qualem varii volunt, prædita, uti egregiè demonstrarunt varii, præcipuè omnium *Lauremb. in Coll. Anat.* ubi rationes varias sententiæ negantis proponit. Vidit semel *Marchette* duo foramina in septi superiori parte, at præterquam quod hoc rarissimum, etiam accedebat, quod valvulas in sinistro Ventriculo obtinerent, ne sanguis in dextrum regrederetur; imò addit viam ad pulmones in hoc subiecto obstructam fuisse. Consule hæc de re inter alios *Mœbium pag. 12.*

Cavernulis quamplurimis elaboratum] Usus earum est, ne sanguis & spiritus priusquam perfectionem adepti sunt indè excidant; forsitan & ex reliquiis sanguinis in iis elaboretur fermentum aliquod.

Figura metæ simile] Alii *Pyramidalis* figuræ dicunt, sed rudiore Minervæ, Mathematicæ enim non parum differt à Pyramide. Sic *Conoides* quoque dicitur, quod Conum referrat. Ita & *Turbinata* quod Turbini quem pueri agitant simillimum. Cor sit, quæ tamen comparatio quadrat non nisi dilatato: nam

in constrictione Cor fit penè Sphæricum. Omnium tamen maximè accedit ad figuram Nucis pineæ nec tamen *inæquis*, mucro enim paulo est acutior. *Bartholinus cent. I. histor. Anat. 67.* refert latronem quendam in Norwegiâ cor habuisse singularis figuræ, mucrone non acuto, sed bifido, ut distincti Ventriculi manifestius externâ facie apparuerint, interjecto hiatu. In totum globosum & in latitudinem magis, quam longitudinem ductum, ob sinistrum Ventriculum sanguine nimis repletum observasse *Eduardum Maji, Londini pag. 234.* scribit *Mœbius*, ubi & de piloso Corde varia exempla proponit.

Temperamento visceribus omnibus calidius] Benignus tamen calor est, non ardens, si constitutionem naturalem habeat Cor, habeat sanguis. Variè enim calorem hunc mutare possunt externa, non solum in Sanguine sed & in Corde ipso, adeo quidem ut reciproca quædam hîc alteratio locum habeat, Sanguinis scilicet respectu Cordis, & Cordis respectu Sanguinis. Vana opinio eorum, Cor qui esse frigidum volunt ob partes frigidas, quas continet, Vasa & Valvulas, quæ comparatione ad partes alias ex quibus Cor constat, minoris quantitatis sunt. In passivis Cor humidum est. Rarissimum id ita solidum esse, densum & compactum, ut concremari non possit, quale

In medio pectoris basi sua FUNDATUM : sic tamen, ut apex sinistrorsum, dum movetur, inclinatur.

JUNGITUR per vasa sua partibus proximis : pericardii item opera mediastino, diaphragmatique connexum est.

ACTIONEM vero propriam ut rectius perficeret, calorem in sanguine, & spiritum vitalem excitando, motu cieri debuit qui *pulsus* dicitur. Hunc in *systolen* distinguunt, qua ad expulsionem suscepti sanguinis cor se colligit, & stringit : tum in *diastolen*, qua ad ejusdem susceptionem sese relaxat.

Solum Cor inter viscera morbis diuturnis haud macerari, læsumque vitæ supplicia non trahere, ab antiquis traditum est : idque vulnera præcipue in sinus ejus, ac vasa incidentia satis confirmant. Sæpe tamen contingit, ut per intemperiem calidam lentè contabescat : sæpè ventriculus ejus, nunc carnem glandularum referens substantia angustet, nunc

COMMENTARIUS.

Germanici Drusi filii fuit; aut Cartilagineum, quale in scelesto quodam observavit *Riolanus* referente sic *Barthol. in Anatome*.

In medio pectoris basi sua fundatum] De Situ Cordis plurima eaque sæpe mala satis ab Anatomicis adferuntur. In medio pectoris basi suâ constitutum esse communissima est opinio. Sed quicquid hîc statuatur, neutiquam situs exactus & Mathematicus designari potest, sed cum aliquali excessu & quidem secundum omnem differentiam. Quod si enim consideres illam quæ est secundum anteriora & posteriora ut bene annotarunt varii Celeberrimi Viri, basis vergit ad dorsum, mucro ad sternum. Quod si eam quæ est secundum dextrum & sinistrum, basis æque ac mucro nonnihil versus sinistra inclinatur, licet paulò magis mucro. Quod si verò illam quæ est secundum superiora & inferiora, omninò declinat basis ipsa ad inferiora. Ut hæc omnia ad oculum observari possunt, instrumentisque idoneis explorari.

Diaphragmatique connexum] In omnibus etiã quod sciam quadrupedibus, excepto bove.

Pulsus dicitur] De Pulsu, quæque eò spectant, alibi agitur, & videri possunt quæ habet *Higbmorus* pag. 145. & *Mœbius* pag. 270.

Solum cor &c.] Vix datur morbi species, quam non Cor infestare notamus, ne de Intemperiei morbis quid dicam, siue simplices fuerint, siue maligni, & Ulcera, & Tumores, & Vulnera fræquentissimè ipsi obveniunt, exhibente id praxi quotidianâ. Nec tamen omnes æque in omnibus periculosi sunt, licet quam gravissimi videantur, fidem faciunt exempla à *Benîvenio*, *Hollerio*, *Paræo*, *Sennerto*, *Tulpio*, *Glandorpio*, *Wormio*, *Wegâ*, aliisque annotata. Adeoque digna sunt notatu quæ in Anatome notat *Bartholinus lib. 2. cap. 6.* nimirum 1. Cor morbos pati, sed quia à remediis longius distat, perferre æque non posse. 2. Monente *Galeno* si ad ventrem pervenerint vulnera, mori necessario, si vero in substantia consistent, posse diem & noctem supervivere, sed oborta inflammatione interire. 3. Dextrum Ventriculum tamen facilius sustinere, quia ex sinistro vita totius dependet. 4. Utrumque posse brevi tempore, si vasa sint illæsa, quibus motus sanguinis continuatur. *Barthol. Anat. lib. 2. cap. 6.*

Sæpè ventriculos ejus &c. angustet] Præternaturam plurima in cordis Ventriculis reperiuntur. *Barthol. in Anat. cap. 7. lib. 2.* refert, quod *Baubin* invenit frustula Adiposa, *Wormius*, & *Bartholinus* Carunculas, *Erasmus* concretionem Pituitosam flavescens instar medullæ,

nunc lenta admodum copiosaque pituita infarciat, ægris non nisi lento pede fato cedentibus.

Adstunt utrinque cordi PULMONES, partes medii ventris dissimilares, hausto aere frigido, fuliginibusque cum vapore redditis vitalem calorem ventilantes.

Igitur ut repleti undique distendique possint, parenchymate COM-PONUNTUR molli, & raro, subtilique insuper ac porosa membrana velati sunt.

VASA recipiunt inprimis ampla: *Venam arteriosam* è dextro, tum *Arteriam venosam* è sinistro cordis ventriculo, *Arteriam* item *asperam*; de

COMMENTARIUS.

medullæ, quæ in boum coctis ossibus reperi-tur, talem etiam nuper in cadavere virili bis reperi, *Vesalius* glandulosæ nigricantisque Carnis libras duas, *Benivenius* frustulum Carnis instar mespili, *Vermes Salius*, *Vermem* alatum *Joh. Dan. Horsius*, Anguem bifidum flagellosum *Majus*, nec absimilem *M. A. Ser-verinus*, Calculos cum abscessu, *Hollerius*, & pisorum quantitate *Wierus*, *Smetius* nigrum crassum coagulatum & thrombosum Sanguinem, qui authores videri possunt ut de veritate rei, & allegationis constat.

Pulmones] Pulmones aliquando abfuisse variis exemplis ex *Fontano*, & *Zacuto Lusitano* probat *Mœbius* pag. 288.

Pulmones vitalem calorem ventilantes] Hoc quæ ratione fiat, alibi, ubi de sanguinis in Corde generatione agitur, prolixè satis docetur.

Molli] In astmatico tamen durum & lapidescens observavit *Helmontius*, ibique generatos lapillos in Orthopnceâ annotat *Salmoth*. De calculis quoque fidem faciunt *Galenus*, *Trallianus*, *Ægineta*, *Dodonæus*.

Corpore raro] Adeoque & levissimi, adeò ut omnium partium totius corporis levissimi sint pulmones, quod vel exinde apparet, quod omnes ferè reliquæ partes in aquam connectæ submergantur, pulmones autem nullo modo, sed contra eidem innatent instar spongiæ. Norunt hoc optimè pyratæ, qui, ut latrocinia eorum lateant, excindere occisis pulmones solent, antequam eos in aquam præcipitent, ut corpus nunquam emergat, secus ac alii homines, qui postquam pulmo

flatulentiam concepit, tres ferè post dies rursus ex aquis emergere solent. Et hanc naturam pulmonibus dedisse videtur levitatem, ut facilius moverentur. In tantâ tamen pulmonum mollietate, lævitate & raritate, robur etiam satis validum acceperunt, adeò ut manibus vix disrumpi queant, ne nimirum in motibus suis solutionem continui incurrerent, quandoquidem ulcera eorum insanabilia ferè sunt, tum quod indefinenter aërem frigidum humidumque attrahant, ulceribus inimicum, utpotè exsiccationem desiderantibus. Tum quod indefinenter moveantur & sic ulcus semper refricetur, cum nihil magis vulnere curationi obstat quam motus. Sed de verâ Pulmonum substantiâ in commentario nostro huic subjungendo ex sententiâ *Malpighii* plura dicentur.

Porosâ membranâ] Membrana hæc pulmonum hoc præ aliis aliorum viscerum membranis singulariter habet, quod multis iisque manifestissimis poris prædita sit, quorum beneficio contingit, humores, qui præter naturam copiosius in Thoracis capacitate colliguntur, per Arteriam Asperam expurgari, aëremque in cavitationem eandem, quo melius pulmones refrigeret, penetrare posse. Notare aëris hunc per membranam transitum etiam quam manifestissimè possumus, si enim in recenti cadavere vento distendantur pulmones manu aërem penetrantem observabimus. Porositatem membranæ pulmonum confirmant observationes *Tulpii*, *Walei*, *Harvei*.

Venam arteriosam] Arteriam pulmonalem.

Arteriam venosam] Venam pulmonalem.

de qua capite sequenti membratim, *Nervulos* pariter ab externis Sexti paris descendentibus ramis; sed ad sensus mediocritatem per tunicam ambientem, & posteriora visceris dispersos, ubi ramis arteriæ asperæ conjuncti in valida pulmonum concussione, non solum tutiores sunt, sed sensu exquisitiore minus molesti.

Inspiratu aeris diducti pulmones, thoracem replent universum, & mediastino interposito in dextram sinistramque partem divisi: Quarum utraque sæpe majoris tutelæ gratia, rursus in lobum superiorem & inferiorem dissepiscitur.

Ungulam FIGURA bubulam referunt; gibbi exterius, interius in cavum sinuati, cor vitalis auræ promptuarium molli complexu ambiunt: adeoque & vitia sua propinquo visceri facile communicant. Licet, cum altius in gibba parte, & quidem cysti inclusa materia putrida esset, absque corporis evidenti marcure, & febrili incendio, tum cordis robur, tum naturalium functionum vigor, diu infractus perstiterit.

TEMPERAMENTI conditione calidi pulmones judicantur, & sicci,

COMMENTARIUS.

Posteriora visceris] Nervis plurimis pulmones scaterere, contra *Hofmannum* late demonstrat *Barthol. Vindic. Anatom. contra Hofman. pag. 85. &c.* sed maxime hæc vera esse quoad tunicam eorum censeo.

Thoracem replent universam] Quod cognoscimus quam maxime. Vivi animalis apertione, ubi enim festinanter vivi animalis Thorax aperitur, ad sensum apparet pulmones totam Thoracis replere cavitatem: Nec tamen pulmo exacte replet universam Thoracis capacitatem, sic ut nullus omnino aer in ea contineri queat, contrarium enim verum esse patet exinde, quod si pertundatur Thorax subito, candela admota ex maximo impetu extrorsum ruente aëre ex Thoracis capacitate extinguatur. Accedit & hoc magnitudinis hujus pulmonum indicium, quod rarissime Thorax gladiis, hastâ, aliove instrumento perfundatur, quin simul pulmones trajiciantur & vulnerentur, & licet exempla quædam adferantur in quibus pulmones integri permanserunt, rarissima tamen ea sunt. Quin & in animali jam demortuo flatu distendi potest pulmo, ut thorax totus repleatur. Hoc præterea habet hæc Pulmonum magnitudo, quod

licet superficies eorum superficiei pectoris, Pericardio, Mediastino, & Diaphragmati mediantibus fibrillis annectatur & adnascatur, motus tamen eorum minimè impediatur, quia idem motus est pulmonum, qui Thoracis, & testari possum me interfuisse dissectioni cadaverum, ubi pulmo omnibus omnino pectoris partibus adnatus fuit, & tamen antè obitum nihil quærimoniæ hac de parte observatum.

In dextram sinistramque partem divisi] Ut unâ læsâ altera adhuc suo officio fungi possit. Vide *Hildan. Obs. 33. c. 2.*

In lobum superiorem & inferiorem dissepiscitur] Sæpius tamen *Piccolhom. Riolano, & Bartholino, Falcoburgio* tres observati fuerunt. *Cl. Sladus* cum *D. Midlum* in hydropicâ quadam tres in uno latere, duos in altero reprehendit.

Ungulam bubulam] Non tantum ungulam bubulam, sed cujuscvis animalis bisulci, hoc est, quod divisos pedes in duas partes habet, & quare? 1. quemadmodum ungula est divisa in dextram & sinistram, ita pulmo mediante mediastino divisus est in duas partes. 2. ut ungula superius & exterius gibbosa est, interius concava, ita & pulmo.

Rare-

ficci, ob spirituum copiam, nutrimentique tenuitatem singularem: tametsi utramque qualitatem, non tantum delabentes jugiter humiditates, sed etiam frigidioris aeris accessus frequentior obscuret.

DENSIORES sunt à teneris: at procedente deinceps ætate magis rarescunt, intensiusque COLORANTUR: quemadmodum in senectute flaccidi, collapsi, atque albidii tandem observantur.

JUNCTI sunt Collo per Asperam arteriam, Sterno Dorsoque per Mediastinum: Pleuræ quoque, & Diaphragmati, nunc toto ambitu, nunc parte ejus aliqua fibrosis nexibus non infrequenter alligantur.

ACTIO pulmonum est Respiratio, ad quam impelluntur à sanguine præcalido copiose per venam arteriosam iis infuso. Perficitur eadem à musculis pectus & cum eo pulmones dilatantibus, ac contrahentibus.


COMMENTARIUS.

Rarescunt] Ideò non mirum materiam, quæ intra Thoracis capacitatem residet, pulmones ingredientem per os ejici. Vidit *Marchette* in quodam vulnerato, intra cavitatem Thoracis per vulnus vinum injici, quod statim per os cum tussi exibat.

Non infrequenter] Præter naturam omnino, ut latè videre est apud *Highmorum*, sæpius tamen, imò ferè, absque ullâ spirandi

difficultate. Putat *Nobil. Tulpus l. 2. obs. 17.* Pulmonem paucis corporibus esse omnino liberum, sed plerumque agglutinari vel huic vel illi costæ. Videantur exempla in historiis Anatomicis *Bartholini*, *Horstii*, *Bontii libro de Medic. Indorum*, *Mantissâ Anat. Rhodii*.

Respiratio] De hac videatur *Piccolhom. Regius, Carthesius, Hogeland, &c.*



TABULÆ I. CAP. X. Declaratio.

Hac Tabula Cor potissimum, ejusque Membranæ, Vasa, Ventriculi, Valvulæque repræsentantur: deinde Pulmo, & Aspera Arteria à pulmonis parenchymate separata.

FIG. I.

A	Pericardium adhuc Cor involvens.
BB	Pulmones Cor in Situ naturali complexi.
C	Vena Cava supra Cor ascendens.
D	Vena Azygos principium.
E	Vena Subclavia dextra.
F	Vena Jugularis dextra.
G	Vena Jugularis sinistra.
H	Vena Subclavia sinistra.
II	Arteria Carotis dextra & sinistra.
KK	Arteria Subclavia dextra & sinistra.
LL	Nervi Sexti paris ad Pulmones descendentes.
M	Arteria magna descendens principium.
N	Arteria Aspera sub larynge abscissa.

FIG. II.

Ostendit particulariter Vasa è Corde in Pulmones protensa: quæ tabulæ sequentis figurâ tertiâ, & sextâ separata exhibentur.

A	Pericardium à Corde detractum.
B	Cor Venis, & Arteriis coronariis respersum.
C	Truncus Arteria magna è Corde emergens.
D	Portio ejus descendens sursum conversa.
EE	Vena Arteriosa sinistrorsum ad Pulmonem distributa.
F	Canalis inter Venam arteriosam, & Arteriam magnam.
G	Vena Arteriosa ramus dexter.
HH	Arteria Venosa ramus dexter & sinister.
I	Auricula Cordis.
KK	Pulmones Cordi adstantes.
L	Tunica Pulmonum propria separata.

FIG. 24.

Cor infantis integrum proponit, in quo

A	Membrana Cordis propria separata.
B	Parenchyma Cordis nudum.
CC	Auricula Cordis dextra, & sinistra.
D	Arteria Magna è Corde prominens.
E	Vena Cava portio extra Cor proflans.

FIG. 25.

A	Cordis transversim incisi pars.
B	Ventriculus sinister.
CC	Ventriculus dexter ex parte cum priore conspicuus.
DD	Septum Cordis.

FIG. III.

Venam Cavam cum dextro Ventriculo dissectam monstrat, in quo

A	Orificium Vena coronaria.
B	Anastomosis inter venam cavam, & Arteriam venosam.
CCC	Valvula tricuspides.
DDD	Ventriculus dexter Cordis apertus.
aa	Meatus intra Membranas in septum desinentes.

FIG. IV.

A	Vena Arteriosa in dextro Ventric. dissecta.
BBB	Valvula Sigmoides in Vena arteriosa.
CCC	Dexter Cordis Ventriculus apertus.

FIG. V.

A	Arteria magna dissecta juxta Cor.
BBB	Valvula Arteriae magna Semilunares.
CC	Sinister Cordis ventriculus.
D	Pars sinistri Ventriculi reflexa.

FIG. VI.

A	Arteria venosa dissecta.
B	Anastomosis inter Arteriam venosam & Venam Cavam vestigium.
bb	Meatus intra Membranas in septum.
CC	Valvula duæ Mitrales.
DD	Ventriculus Cordis sinister apertus.











FIG. VII.

Pulmonis, & asperæ Arteriæ faciem posteriorem exprimit, adhuc Cordi junctam.

A	Nervus sexti paris dexter, qui ad Pulmones vergit.
B	Nervus idem sinister.
C	Ramus inter utrumque Nervum medius.
D	Propago qua fertur ad Pericardium.
EE	Arteria aspera rami duo majores, posterius Membranosi.
FF	Pulmonum pars postica
G	Membrana pulmonum propria.
HH	Pericardii portio relicta.
I	Cor in situ relictum suo.

FIG. VIII.

A	Aspera arteria sub Larynge abscissa.
B	Ramus dexter, bifariam primò divisus.
C	Ramus sinister, variè pariter divisus,
add &c.	Extrema ramorum in Membranosos canaliculos desinentia.



TABULÆ II. CAP. X. Declaratio.

In hac Tabula emergentes à Corde Vena Cava, & Arteria magna trunci representantur cum præcipuis ramis ad artus usque perductis, prout annis singulis ostendi poterunt.

FIG. I.

Venam Cavam exhibet, in qua

- A** Initium ejus amplo orificio supra cor assurgens.
BB Ortus ramorum Subclavioium.
C Initium trunci Descendentis.
DD Rami Iliaci, dexter scilicet, & sinister.
aaa &c. Vena Azygos, ejusque rami ad costas sparsi.
bb Vena Intercostalis superior.
cc Vena Mammaria interna.
***** Vena Mediastina. **dd** Vena Vertebralis.
ee Vena Jugularis interna sub Cranio abscissa.
ff Jugularis externa, à qua ramus inferior seu profundior ad organa vocis, tum subcutaneus per faciem, tempora, & retrò aures distincta sobole consurgit.
gg Vena Cervicalis.
hh Ramorum Subclavioium progressus.
ii Vena Scapularis interna.
KK Scapulares externa.
3.3. Vena que ad deltoiden muscolum fertur.
ll Thoracica superior.
mm Vena Cephalica abscissa.
nn Vena Basilica abscissa. **oo** Thoracica inferior.
p q Vena Phrenica sinistra, & dextra.
rr Ramus qui in fecoris convexa pro tenditur.
ss tt &c. Propagines ab eodem dextrorsum & sinisterum sparsæ.
uu Vena muscula Lumbares superiores.
yy Vena Glandularum Renalium.
xx Emulgens dextra & sinistra.
zz Vena Spermatica dextra & sinistra.
aa Exortus venarum Lumbalium.
cc Vena muscula Lumbalis inferior.
yy Vena Sacra. **ΔΔ** Ramus Iliacus externus.
EE Vena Epigastrica.
dd Ramus Iliacus internus. **es** Vena Glutæa.
zz Vena Hypogastrica. **nn** Vena pudendi.
θθ Vena Inguinalis.
xx &c. Ramus Vena cruralis.
iii Vena Saphena. **λλ** Vena Ischia.

FIG. II.

Venam Coronarium Cordis designat.

FIG. III.

Venam Cordis Arteriosam ostendit, in qua

- A** Principium, quo è dextro Ventriculo prodit.
BB Ramique in dextrum Pulmonem feruntur.
CC Rami ejusdem, qui in sinistrum.

FIG. IV.

Arteriam magnam delineat, in qua

- A** Principium illius è Corde assurgens.

BB Ramorum Subclavioium. initium, & progressus.

C Truncus descendens Arteria magna.

DD Rami Iliaci, dexter & sinister.

aa Arteria Carotis.

bb Ejus Ramus externus qui ad fauces, faciem, & retro aures varie distribuitur.

cc Carotis interna sub Cranio abscissa.

dd Arteria Vertebralis itidem abscissa.

dd Arteria Muscula cervicalis.

ee Arteria Mammaria interna.

ff Rami arteria Intercostalis superioris.

gg Arteria Scapularis interna.

hh Arteria Scapularis externa.

ii Arteria Thoracica superior.

kk Arteria Thoracica inferior.

lm Arteria ad Muscul. humero adjacentes astrib.

nn Arteria Intercostales inferiores.

oo Arteria Phrenica.

p Arteria insignis Coeliaca dicta.

q Ejus Ramus dexter trinâ sobole sparsus: quarum superior, & inferior ad Fecur, medius ad cystin fellis excurrit.

r Ramus arteria coeliace sinister.

s Gastrica arteria dextra.

t Arteria Splenica, minutissimis Ramulis per Lienem dispersa.

u Arteria Epiploica. **uv** Gastroepiploica.

x Arteria que ad Renem Glandulam fertur.

yyy &c. Arteria Mesenterica superior, in Ramos insigniores digesta.

zz Arteria Emulgentes.

aaa &c. Arteriarum Lumbalium exortus.

cc Arteria Spermatica.

zz Art. Mesenter. inferior in varios Ramos sparsa.

Δ Arteria Sacra. **ΔΔ** Iliaca externa.

dd Arteria Iliaca interna. **nn** Glutæa.

zz Arteria Hypogastrica, qua ad Intestinum rectum & pudenda fertur.

♀♀ Hypogastrica, qua ad uterum porrigitur.

ee Arteria Umbilicalis. **EE** Epigastrica.

θθ Arteria Pudenda. **ii** Arteria Ischias.

kk Arteria Muscula inferior.

λλ Arter. qua ad Muscul. Iliacum internum abit.

FIG. V.

Profert Arteriam Coronariam Cordis.

FIG. VI.





Arter. Venosa, è sinistro Cordis Ventric. orta.

A Orificium ejus.

BB Rami in partem dextram Pulmonis distributi.

CC Rami qui protenduntur in sinistram.

CA-



CAPUT XI.

De Organis Vocis & Sermoris.

AD pulmonum officium consummandum præcipuè conducit **ARTERIA TRACHEA** five **ASPERA**, canalis per quem inspiratu aërem haurimus, expiratu cum fuliginibus reddimus, ad caloris vitalis ventilationem, sonorum item, vocisque productionem.

COMPONITUR ex substantia partim *cartilaginea*, ut instrumenti ficcitate vocum intensio faciliior esset: partim *membranosa*, ubi cum œsophago committitur, cujus dilatatio corporis durioris incubatu impedienda non erat. Cartilaginosa portio, non continua; sed ex plurimis veluti *annulis* compacta est. Annulorum superiores, majores quidem, attamen, quia gulæ conjuncti inferiore circumferentiæ parte destituti sunt,

COMMENTARIUS.

T*Trachea*] Ab asperitate sic dicta, quoniam ex annulis Cartilagineis constat, inter quos membranulæ sunt, quæ eos revinciunt. Veteres, *Hippocrates*, *Plato*, aliique simpliciter Arteriam appellabant, sed posteaquam id nominis tribui etiam cœpit iis vasibus, quæ perindè ac cor pulsant, evitandæ æquivocationis gratiâ recentiores asperam illam cognominarunt. Propriissime autem Arteria simpliciter vocatur, quoniam nihil quam aërem vehit. *Aristot.* etiam *Ronchum* appellat, hinc dicuntur *Ronchen*/ quando dormientes Spiritum ducunt. Idem & *αὐλὴ* vocat, q. fistulam; revera enim Thorax nihil aliud est, quam instrumentum musicum, adeò ut instrumenta ea ab Artificibus ad exempla Thoracis, Pulmonis, & Asperæ Arteriæ adinventæ esse videantur, quo respectu etiam *Hippocrati* Cithara, Testudo, Cheliis dicitur.

Ex substantiâ partim Cartilagineâ, partim Membranosa constat] Ne si ex Cartilaginosa sola constaret, vox clangosa nimis, si verò ex membranosa sola, rauca fieret, quod contingere videmus hyeme cum defluxionibus membranæ ejus humectantur. Imò Cartilaginosa tota si facta fuisset, degluttoni, si non semper, saltem ubi magna frusta devorantur, impedimento fuisset; si verò membranosa,

respiratio liberè exerceri non potuisset, flaccida enim concideret semper, adeoque viam aëri denegaret. Osseam fieri quandoque Arteriam asperam notavit *Cardanus de varietate lib. 14. cap. 76.* exemplo hominis bis suspensi & servati.

Gulæ conjuncti] Cur Trachea antè, Oesophagus autem postè magis situm habeat *Mundinus in Anatome* haud ineptè causam fuisse triplicem putat; quarum *prima* ipsi est, quod cum Trachea sit magis dura, Cartilaginosa, & Gula pelliculosa, potest magis tueri Trachea ab extrinsecis alterantibus quam Gula, quod magis fuit posita exterius. *Secunda* quod per Tracheam attrahitur aër, cujus continuus debet esse ingressus, & ideo debuit habere situm directum ad hoc, & sic habet quod ponitur antè sicut os. *Tertia* quod si Gula fuisset posita antè, potuisset fieri, vel quod post finem Trachæ Gula obliquasset versùs dorsum, vel quod à fine Trachæ usque ad principium oris stomachi fuisset vacuitas, sed utrunque est inconveniens, nam secundum est impossibile, primum autem pareret nocuum & impedimentum in actu degluttoni.

Inferiore circumferentiæ parte destituti sum] Undè etiam quod Græcorum Sigma seu *Vetus*

sunt, reliqui pulmonum parenchyma ingredientes integri permanent. Omnes autem per *carnosa ligamenta* curiose connectuntur; tandemque in membranosos canaliculos arteriis similes terminantur.

Obducitur arteria aspera *membrana* duplici. *Externa* una quam pleuræ acceptam referunt, quæ tenuis, firmiterque cartilaginum ligamentis devincta. *Interna* altera crassior est, palatoque communis; sensu tamen exquisito ad molestorum expulsiōem prona. Oblinitur *humore pingui*, ut lenior sonus evadat: quo vel catarrhis diluto, vox rauca; vel calore nimium exiccato clangosa percipitur.

Nanciscitur VENAS à Jugularibus externis: à Carotidibus ARTERIAS: NERVOS à Sexti paris externis ramis, iisque Recurrentibus dictis.

MAGNITUDINEM asperæ arteriæ, sexus, & temperamenti conditio variat.

FIGURA arbusculam effingit, recurvatis hinc inde ramis distractam: nec pulmonibus tantum, sed oesophago pariter, atque ossi hyoidi capite suo conjungitur.

DIVIDITUR in *bronchum*, & *laryngem*. Ex his *Bronchus* est pars ejusdem inferior, longior, multiplicibus ramis in utramque pulmonis regionem diducta. *Larynx* vero pars superior, & velut caput est, ad
forman-

COMMENTARIUS.

Vetus C exprimat, *Sigmoides Annuli* vocantur.

Integri permanent] Negat hoc *Galen. lib. 7. de usu part. cap. 3.* sed fallitur.

Oblinitur humore pingui] Si nimium abundet, planè obmutescimus, & voce privamur, teste raucedine, à Catharro inductâ. Quæ rursus redit humiditate hâc absumptâ; quod fieri potuit in *Cresii filio* muto, de quo *Herodotus*, & *Ægle Samio Athleta*, cujus *Valerius Maximus* meminit, & *Zachariâ Orphano* fato, de quo *Nicol. Fontanus in observationibus*.

Nanciscitur] Quamdiu adhuc in collo est, & indivisa, *Bronchia* enim ipsa nutriuntur ab adjacente Arteriâ pulmonariâ, seu Venâ Arteriosâ vulgo dictâ.

Nervos à sexti paris externis ramis] Nullum adesse nervum in asperâ Arteriâ vult *Lindanus Physiol pag. 257.* An vera dicat, judicent accuratiores, mihi saltem quoties dissectioni cadaverum humanorum interesset licuit, nun-

quam nervus deesse visus est, Consule hoc de Nervo tractatum *Thome Willis de Nervis*.

Bronchus] Vox hæc quam varias significationes habeat, eleganter ostendit *Sneiderus, lib. 1. de Cathar. cap. 6.*

Larynx] Multa in gravissimis affectionibus, sæpe ob mortis evitandum periculum, vel etiam temere experiuntur Medici. Hac ratione in suffocante Angina, quam strangulatoriam quidam appellarunt, omnibus methodo legitimâ frustra tentatis, *Laryngotomiam* s. *Sectionem asperæ arteriæ* sub Larynge instituunt. Hac de operatione digna lectu est observatio quam *quest. 3. cap. 3.* proponit *Nicol. Fontanus*. Cl. *Patinus* ter vidit eam celebratam in urbe *Parisiensi*, & semper successit, 1. in Monacho, 2. in Aulico, præsentibus & in consilium ab eodem adhibitis diligentissimis D. D. *Nic. Pietréo*, & *Mich. de la Vigne* Doctoribus Medicis *Parisi*. eruditissimis. 3. In quodam Mercatore *Burdegalensi*.

Larynx] Hujus nominis interpretationem
reddere

formandam, exprimendamque vocem, cartilaginibus, & musculis diversis constructa.

CARTILAGINUM quinque sese offerunt, earumque prima THYROIDES à figura, sive *Scutiformis* nuncupatur, intus cava, gibbo forinsecus projecta, virorumque potissimum in collo prominula.

Proces-

COMMENTARIUS.

reddere conantur *Anatomici*, dicentes compositum esse ex particulâ $\lambda\alpha$ quæ per se sola nihil, sed in compositione magnum quid significat, & ex uno horum quatuor. 1. ex $\lambda\alpha$ & $\theta\acute{\rho}\upsilon\omega$ haurio, quoniam per Laryngem aërem indefinenter haurimus. 2. ex $\lambda\alpha$ & $\alpha\acute{\iota}\rho\epsilon\sigma\sigma\upsilon$ quod est attolli, quia inter deglutendum Larynx & Oesophagus attolluntur; nam cum Oesophagus attollitur, Larynx deprimitur & contra. 3. ex $\lambda\alpha$ & $\rho\acute{\upsilon}\chi\theta$ rostrum, quod Cartilago Laryngis portione anteriore gutturnium referat, & avium rostrum. 4. ex $\lambda\alpha$ & $\rho\acute{\upsilon}\epsilon\sigma\sigma\upsilon$ tueri, quod diligenter asperæ arteriæ viam rueatur, ne quidquam in eam confertim incidat. An verè & rectè doctiores iudicabunt. Legi hac de re potest *Hieron. fabric. ab Aquapend. lib. de Voce*. Varias admodum Vocis Laryngis significaciones adfert *Sneiderus lib. 1. de Cathar. cap. 6*. Videri itidem possunt quæ habet *Ful. Cass. Placentinus lib. 1. de Vocis organ. cap. 2*.

Cartilaginibus & musculis diversis constructa Non quod non etiam ex aliis præterea particulis construatur, nam ligamentis & multiplicibus membranis etiam constat, deinde accepit & Vasa omnis generis, pinguedinem, glandulasque, sed quod ex Cartilaginibus & Musculis ut partibus principalibus constituitur. Cartilagines Laryngis ossæ observasse se refert *Fallopins Observat. Anatom. Tom. 1. Tractat. 2. & Riolan. Antropograph. lib. 4. cap. 11. Realdus Columbus* ossæ naturæ Laryngem iudicat *cap. 13. lib. 1. rei Anat.* adeoque inter ossa de ea agit, ast benè reprehenditur à *Placemino lib. 1. de Vocis organ. cap. 9*. tum quod functio Laryngis contrarietur, tum etiam quod Cartilaginis definitio atque natura. Ubi etiam simul addit, debuisse necessario Laryngem, non ex ossibus, aut membranis constare, sed verò ex Cartilaginibus, materiâ ad sonum edendum aptissimâ.

Cartilaginum quinque se offerunt, Authores circa numerum hunc valde discrepant, ut inter alia videre est *lib. 1. cap. 10. de Organis Vocis Cass. Placentini*, qui etiam *lib. 3. egregie de Usu* cujusvis cartilaginis in specie differit.

Thyroides Non $\theta\upsilon\gamma\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$, inquit *Lindanus*, ut malè nostri homines & scribunt & pronuntiant, sed $\theta\upsilon\pi\epsilon\sigma\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$, ut benè est apud *Galen. 7. de usu part. cap. 11*. Est enim $\theta\upsilon\gamma\epsilon\iota\delta\varsigma$ scutum, unde nomen scutiformis.

Scutiformis Quod scuto similis sit, non quidem rotundo, quali nostri hodie utuntur, sed oblongo ac si januam aut fenestram videas, quali Turcæ hodiè utuntur in navibus. *Avicennæ* quoniam peltæ clypeique similitudinem exprimit, ventre concavo, & gibboso dorso, *Clypealem*, *Peltalem*, & *Scutalem*, *Hali abbat* modò *Umbonem*, modò ab anteriori ejus prominentiâ *Mahum granatum* vocari, tradit *Ful. Cass. Placentinus lib. 1. de Org. vocis, cap. 11*. Scutiformem hanc Cartilaginem in os degeneratam inter Musæi sui rariores reservavit *Wormius*; geminam inveniri subindè maximè in viris *Vesal. lib. 1. cap. 38*. scribit.

Gibbo forinsecus projecta Barbaris *Pomum* vocatur *Adami* ex notâ fabulâ, quod vulgus sibi persuasum habeat Adamum voce Dei perterritum fatale illud pomum totum deglutire non potuisse, & ejus in memoriam ad posteros ejus propagatum esse istius malefacti signum. Videatur *Casseri* *Placentinus lib. 1. de Organis vocis cap. 11*.

Virorumque potissimum in collo prominula Ut eleganter demonstrant inter alios *Andr. Vesalius lib. 1. de human. corp. fabric. cap. 38. & Columbus lib. 1. cap. 13. de re Anatom.* Et hoc duplici de causâ videtur esse 1. quod Larynx & aspera Arteria multo est latior, amplior & crassior in viris quam mulieribus, calidiores enim quoniam sunt ut ampliore Thorace

Processibus prædita quatuor : quorum duo , qui superiores , pariterque longiores , Ossis hyoidis lateribus inferius junguntur : reliqui duo inferiores , brevioresque , cum Cricoide , sive annuliformi cartilagine committuntur.

Movetur Scutiformis cartilago tribus *Musculorum* paribus. Ex his primum, quodque *deorsum trahit cartilaginem* , à superiore , atque interna sterni parte profectum , inferiori scutiformis cartilaginis lateri inferitur : adeoque *Sternothyroides* à veteribus dictum est.

Par alterum exiguum planè , similem in modum cartilaginem , sed nonnihil *oblique movet*. Originem ducit antè ab annulari cartilagine , inque scutiformis inferiore pariter latere terminum consequitur , unde *Cricothyroidis* nomen adeptum est : quamvis ad latera quandoque diffusum , in musculos geminos , anteriores , & laterales dividi queat. Utriusque hujus paris flexu *laryngis rimula nonnihil dilatatur*.

Sursum adducit scutiformem , adeoque *rimulam laryngis adstringere* tenetur par Tertium , quod ab ossis Hyoidis inferno latere deductum , circa inferiorem scutiformis cartilaginis oram desinit , *Hyothyroides* appellatum.

Secunda cartilago **CRICOIDES** vocatur , seu *annuliformis* , quod antè teres , ac rotunda , postè lato veluti dorso complanata , exacta satis figura sagittantium Turcarum annulos designet.

Tertia

COMMENTARIUS.

Thorace sic & aspera Arteria indigebant. 2. quod antè in mulieribus majori pinguedinis copia tecta sit quam in viris , unde non tantum exstat in illis quam in his. Hæc causa est , cur vir habitu muliebri incedens facilius dignoscatur quàm mulier habitu virili , siquidem enim collum insigniter protuberat , certissime concludere virum esse , non mulierem , contra verò si non protuberet sed tecta ea sit Cartilago mulierem non virum. Imò in viris quibusdam ita antrorsum prominet & extat , ut nodus aliquis aut gibbus esse videatur. Musculorum Laryngis numerus valde dubiose ab Anatomicis proponitur , ut inter alios elegantissimè ostendit *Jul. Cass. Placentinus lib. 1. de Vocis Organis cap. 4. § 7.*

Cricothyroides] Contrarius hic *Placentinus loc. cit. cap. 5.* rectius musculos hos *Thyrocricoideis* appellari censens , cum non , ut ille vult , à Cricoide cartilagine antè exorti in partem Thyroidis posticam s. Inferiorem inferantur , sed contra.

Circa inferiorem scutiformis Cartilaginis oram desinit] Errorem itaque hîc committit *Riol. Antrop. c. 17. l. 5.* dum in mediam superioremque partem externam hoc par inferi vult , semper enim ad ultimam partem inferiorem externam se extendit.

Secunda] Magnitudine , ast infima situ , utpotè ad sustinendas reliquas comparata.

Cricoides] Antiquis *Innominata* dicta est , teste *Placentino lib. de Org. vocis* , qui & varias hujus denominationis causas adfert *lib. dict. cap. 12.*

Lato veluti dorso complanata] Planam hanc esse Cartilaginem non omnimodo verum est , in medio enim aspera quædam linea est , per ipsius longitudinem procedens , quam *Spinam* Anatomici vocant.

Sagittantium Turcarum annulos] Annulos intellige quibus Turcæ jaculaturi muniunt dextrum pollicem cum Arcum intendunt. Sitæ est hæc cartilago infra scutiformem , vicina Oesophago , cui intrinsecus nulla pars arctius adhæ-

Tertia, quarta *cartilago*, dicuntur *ARYTÆNOIDES*, quoniam applicitæ invicem gutturnii labrum figurant, simulque rimulam laryngis quæ *Glottis* nominatur, repræsentant.

Utraque, ad modulatum vocis, quatuor *musculorum* paribus movetur. Horum primum *Thyroarytenoides* nuncupatum, oritur à thyroididis five scutiformis cartilaginis parte interiore media, carnosum, & sursum porrectum, antè in latera arytænoidis conscendit, tractaque arytænoidè ad scutiformem cartilaginem *laryngis rimulam adstringit*.

Secundum par *Arytenoides* dictum perexiguum est, carnosum tamen, & ab arytænoidè, qua parte annuliformi cartilagini conjungitur, productum, in arytænoidè terminatur, sic concurrentibus extremis, ut unius musculi faciem exprimant. Ab hoc pari, dum basis arytænoides oblique movetur, atque adducitur, *Rimula* quoque *Laryngis* comprimitur.

Par tertium *Cricorytenoides posticum* indigitant. Nam à cricoidis five annuliformis cartilaginis lato dorso posterius profectum, brevi nervo-foque

COMMENTARIUS.

adhærescit, quam hæc cartilago. Imo integrum circulum absolvit, adeoque Laryngem apertam semper servat.

Tertia & quarta] Hæc Cartilago ut notat *Fallopianus in Observat.* revera gemina est. Ait *Galen. de usu part. II.* & cum eo *Riolanus* non nisi pro una habent, non male, siquidem actionem respiciamus, nam actionem edit ut una, hoc est, quatenus duæ illæ inter se junguntur. Ita illum excusat *Fabr. ab Aquapend. lib. de Laryng. part. I. cap. 6.* alias revera binæ hæc cartilagines sunt, facile sine ullâ laceratione separandæ. Gemina verò licet sit, attamen omnium minima est. Inhsit utrimque Cricoidis lateri superiori & posteriori intra cavitatem Thyreoidis. Processum habet superiorem ac inferiorem, superior mollior est & flexilis, inferior portionem constituit sui lateris Glottidis seu rimulæ, vocis organi.

Arytenoides] *Guttales* etiam dicuntur & *Gutturni formes*, quia cum utriusque processus superiores communi membrana involuti spectantur, eleganter exprimunt figuram gutturnii, five mucronis & orificii vasis illius, quo abluendis manibus aqua effunditur.

Rimula Laryngis] Similis iis quæ in instrumentis musicis, quale fistula est, reperiuntur.

Glottis] Quasi lingula, non quod corpus aliquod sit linguæ substantia simile, sed quod rimula hæc ejus sit amplitudinis, ut à lingua commodè claudi possit; lingua autem hæc non intelligenda majoris alicujus animalis, aut hominis, utpote nimis ampla, sed bruti cujusdam minoris angustioris linguam habentis, aut in homine Epiglottis ipsa, linguæ & formam & nomen habentis. Nomen adeoque trahit à foramine fistularum.

Quatuor musculorum paribus] Horum duo externa superiora sunt par scilicet primum & ultimum duo interna inferiora, secundum & tertium.

Laryngis rimulam adstringit] Quo sic melius cohibere spiritum valeamus, ad excretionem juvandam eorum quæ in Intestinis sunt, Vesica, Utero. Quin etiam, ad comparationem tum roboris in subeundis laboribus, tollendive ponderibus, tum levitatis in natando & similibus.

Secundum par Arytenoides dictum &c.] Hoc Musculorum par pro unico tantum musculo cum Columbo habet *Ful. Cass. Placentinus lib. I. de Vocis Org. c. 7.* contra *Vesalium & Fuchsum.*

Cricorytenoides posticum] Hoc omnium maximum est.

foque tendine inferius arytænoidi inferitur : quam dum retrorsum atque exterius abducit, *Rimam* quoque *Laryngis dilatat*.

Quartum par *Cricoarytænoides laterale* appellatur, quia à cricoide five annuliformi cartilagine protensum, in latera arytænoidis posterius definit, & ad latus abducta arytænoidē *Rimulam* pariter *Laryngis dilatat*.

Quinta cartilaginum *Epiglottis* est, glottidis five rimulæ operimentum; ne inter deglutendum cibus potusque in arteriam asperam delabatur : quamvis non tam exquisita sit commissio, quin humidum tenue, quodque blande huc repit, insinuare sese canali isti queat. Cartilaginibus reliquis paulo *mollior* existit, hederaceum folium æmula *figura* exhibens.

Larynx

COMMENTARIUS.

Cartilaginum quinta Epiglottis est] Epiglottidis Synonyma varia habes apud *Placentinum loco dicto*. Interdum osseam induisse duritiem, impeditaq; deglutitione mortis causam existisse, observasse se scribit *Pavius ad Epit. Vesal.*

Glottidis] Glottis quandoque, ut hic, pro solâ rimâ quam Aritænoidææ Cartilagine conjunctæ efficiunt, sumitur, quandoque pro substantiâ quâdam Membranosâ, Cartilaginosa, Glandulosâ, aut Adiposâ, in superiori Laryngis parte linguam seu lingulam referens; qualis in avibus, variisque animalibus reprehenditur. Videri hic possunt quæ adducit *Placentinus loco sepius citato*.

Rimulæ operimentum] Magnitudine itaque paulo amplior est Epiglottis hac Laryngis rimulâ, quo eam ut bene annotavit *Fernel.* melius claudere valeret. Non tamen continuo operculi vices gerit, sed tunc saltem, ubi cibus, potum, salivam aut aliud quid, deglutimus, extra enim hunc actum erecta stat, rimam in totum apertam relinquens. Quod autem in deglutitione ita claudat foramen, pendere videtur à motu linguæ cujusradici Epiglottis continua est, ipsiusve Epiglottidis mobilitate, sic ut dum cibus linguæ apice incurvatâ & antorsum sursumve elevata ad radicem ejus detruditur, depressâ instat ponticuli rimæ necessario supersternatur, nec adeo necessarium hic esse cum *Vesalio*, *Aquapendente* aliisque, musculos huic usui peculiariter inservientes unum, aut plures in homine præsertim excogitare, in animalibus variis ali-

quem dari non repugno. Videatur hæc de re *J. C. Placentinus lib. 3. de Vocis Organis, cap. 6.*

Delabatur] Et sic vel tussim excitare gravissimam, vel omnimodam stranguationem, ut variis accidisse. Authores observarunt. Non tamen hoc semper fieri exemplo patris sui docet Medicus quidam Amstelodamensis, qui historiam conscripsit, & *D. Slado* prælegit, hæsit enim in ipsâ arteria annis aliquot.

Quamvis non tam exquisita commissio &c.] Rationes quibus hoc assertum confirmari posse putamus, variæ sunt, præcipuè. 1. quod contra tussim, atque raucedinem adhibeantur Syrupi & similia Saccharata variæ formæ, quæ non videntur aliquid posse auxilii adferre nisi in Tracheam deferantur immediate. 2. quod ex usu Spiritus vini subtilissimi tussis excitetur, eo quod facillimus ipsi ob summam tenuitatem in eam sit delapsus, & 3. quod nimiam post vociferationem aut loquelam orta siccitas illico levetur potu. Sunt tamen qui pertinaciter satis quicquam in Asperam Arteriam intrare posse sine læsione negant, experientiæ omnino contrariantes.

Paulo mollior existit] Ut adeo substantiam mediam veluti inter membranam & Cartilaginem obtineat.

Hederaceum folium æmulâ figurâ exhibens] Ut inquit *Hipp. lib. 4. de Morb. t. 32.* è quo habet *Pollux t. II. cap. 4. 25.* Similior videtur gallinæ uropygio, cui *nonnemo* aptè comparat, sic scribit *Lindanus in Physiol.*

Larynx igitur quo fuerit amplior, glottis latior, aëris & quidem copiosi impulsus validior; ita vox quoque robustior, & gravior evadit. Quo vero minor larynx, & ficcior, rimula angustior, aëris & quidem pauci impulsus debilior, eo vocem pariter languidiorem, exilioremque fieri necessum est.

Conjunctum est laryngi OS HYOIDES, quod & *ψψιλοides* nominant, basis instar linguæ substratum, non fulcimenti minus gratia, quam motus. CONSTITUITUR ex *Offibus tribus*, quæ junctim *ψψιλον* Græcorum figura exprimunt. Horum quod situ *Medium* amplius est, latum, & nonnihil excavatum, cui *Reliqua duo* cornuum instar committuntur.

Junguntur his *appendices* cartilaginosaë plures, quæ & ipsæ nonnunquam ossæ evadunt. E quibus frequentiores sunt duæ, magnitudine, formaque granum tritici æmulantes, circa medium os, quod basin hyoidis appellant, consistentes: duæ item aliæ, quæ lateralibus ossibus, quæ cornua vocantur, inhærent, & nerveo ligamento styliformi appendici porro connectuntur: qua forma cum in humano corpore sæpius occurrant, tabulæ sequentis figura undecima, & duodecima representandas curavimus.

Movetur os hyoides quinque *Musculorum* paribus. Eorum primum, quod *Recto ductu deorsum movet*, à supremo sterni exteriorius profectum, in basin hyoidis ascendit, & *Sternohyoides* appellatur.

Oblique deorsum movet par alterum, quod à latere superiore scapulæ juxta coracoiden processum exortum, medioque corpore nervosum, in latera ossis hyoidis fertur, *Coracohyoides* antiquitus dictum.

Tertium par, quodque *oblique sursum trahit*, styliformis appendicis extremo, tereti ventre productum, in hyoidis cornua porrigitur, adeoque *Styloceratohyoides* olim nuncupatum fuit.

Quar-

COMMENTARIUS.

Ita vox robustior &c.] Fernelio aliisque primum statuitur vocis instrumentum, quod falsissimum esse quivis vocis organa perpendens facile cognoscet.

Linguæ substratum] Unde & *Os linguæ* dicitur.

ψψιλοides] Ob figuram, quoniam simile est Elemento *ν* litteræ Pythagoricæ, minusculæ scilicet, non majusculæ, aut capitali, ut vocant Typothecæ. Aliis nominibus vocatur etiam licet minus propriè *Lambdoides* à figurâ

litteræ *λ*. Notat *Cass. Baubinus Anatom. lib. 3. cap. 87.* hoc os figura rectius *ν*, quam *λ* referre, cum sinu, non angulo Acuto terminetur. *φάρυγγος*, quoque dicitur, quia in faucibus consistit iisque inservit. Rectius illius figuram comparari cum inferiori maxilla indicat *Spigelius lib. 2. cap. 14.*

In Hyoidis cornua porrigitur] Non habet finem suum præcise in cornubus, unde ab Anatomicis malè etiam *Styloceratohyoides* dicitur, sed, ut benè notavit *Marchette*, in illâ parte

qua

Quartum, *Rectaque sursum trahens* par, à menti interna & humiliore fede ad basin ossis hyoidis extensum est, appellaturque *Geniohyoides*.

His merito addimus par quintum, quod linguæ vulgo tribuitur, & *Gènioglossum* dicitur, quod interius à mento sub geniohyoide pari proveniens in *Basin* quoque *Hyoidis* defigitur, quam *Recta sursum* trahit, respectu præcedentis, *Geniohyoides par internum* rectius nominabitur.

J U N G I T U R os hyoides appendici styloformi, tum cartilagini scutiformi laryngis, præcipue vero linguæ, ob finem declaratum, & epiglottidi, quam sinu suo excipit.

Est autem **L I N G U A** sermonis promptuarium, cibique deglutendi ac stomacho præparandi adminiculum.

S U B-

C O M M E N T A R I U S.

qua basis ossis hujus cornubus adhæret, sic ut convenientius Stylohyoides appelletur. Ante insertionem ferè semper à Musculo Digastrico perforatur.

Geniohyoides] Externum aliis vocatur, oritur à mento, interno latere, immediatè sub Digastrico, lato satis principio, ita quidem ut sua latitudine figuram alarum obtineat.

Geniohyoides internum] Quam graviter errat, quod hujus musculi descriptionem veram sibi arroget *Riolanus*, vide hic *Anat. D. Marchette*.

Lingua] Appellatur *Varoni* à ligando, seu quod cibum liget, id est in quacunque voluerit oris parte ita detineat, ut veluti ligatus esse videatur; seu quod robustissimè & validissimè ossi hyoidi alligata est, inferiori item maxillæ mediante fræno, aliisque partibus. Nonnulli à lingendo dictam linguam volunt, quod eâ lingere soleamus, & præsertim bruta animalia, ut canes.

Sermonis promptuarium] Non quod unica & sola per se sensa exprimere & sermonem formare possit, cum concurrent & oris palatum, dentes, narium foramina, aliæque partes variæ, sed quia primaria & principalis pars est, undè & idiomata varia Linguæ solent appellari, quod à linguâ pronuncientur. Rarum est quod mihi literis retulit *Patinus*, vidisse se in urbe Parisiensi adolescentem quandam Pictaviensem, cui lingua exciderat à variola-

rum malignitate corrupta & exesa, qui tamen loquebatur articulatasque voces proferebat, circa annum 1631. quo de casu mirabili libellum gallicum scripsit *Marcus Duncanus* Medicus Salurnienensis eruditissimus, sub titulo *Aglossostomographiæ*.

Cibique præparandi & deglutendi adminiculum] Nec hæc solum corpori præstat lingua, sed & Sapores dijudicat, eximio ut inquit *Fernel*. & voluptario gustandi sensu prædita, præcipuè & excellentissimè, non sola tamen, cum & palato sua vis gustandi insit, ex communicato ipsi à quartâ conjugatione singulari nervorum pari, imò nulla pars in oris sit capacitate, quæ non aliquam gustandi vim habeat, quo ad nullam oris particulam materia gustanda venire queat, quæ non percipere posset qualitates saporiferas. Lingua autem quia gustatorios maxime insignes nervos accepit, quibus si opticos excipias in cerebro vix dantur majores, ex tertiâ conjugatione prodeuntes, primarium gustus organon est, maximè quoad tunicam extrinsecus investientem, minus quoad substantiam, minimè verò quoad musculos, & hæc causa est, quare gustatorii nervi in tunicam linguæ inferuntur maximè, parcius in substantiam, nullo modo in musculos. Imò nec omni parti linguæ æqualis vis inest, præstat quæ in extremitate seu mucrone est, undè extremitati solemus gustanda admove-
re.

SUBSTANTIA prædita carnosâ, molli tamen, & rara, *Membranaque* pariter levi, & porosa velatur.

Sortitur VENAS binas à Jugularibus externis, quæ *Raninæ* dicuntur: ARTERIAS totidem à Carotidibus: NERVORUM quoque paria duo, quorum quod tenuius à quarta conjugatione derivatum, per exteriora linguæ fertur: quod vero crassius existit, interiora ejusdem subit, & à septima conjugatione huc propagatur.

Movetur lingua tum illis *Musculis*, quorum paria ossis hyoidis propria dixi, tum suis singularibus, quatuor itidem paria constituentibus. Primum horum, quod linguæ genuinum est, eamque *attollit*, à styliformi appendice natum, circa medium illius inseritur, idque *Styloglossum* veteres appellarunt.

Deprimit linguam par Alterum, à basi ossis hyoidis ortum, quod in mediam pariter linguam extenditur, *Basoglossum* dictum.

Quod *exserit linguam* par, *Genioglossum* dictum, inter ossis hyoidis proprios musculos propositum est, quippe quod in basin ejus defigitur: adeoque tam origine, quam officio, geniohyoidi pari socium.

Ad

COMMENTARIUS.

Substantiâ præditâ carnosâ] Cui similis in toto corpore non datur, distinctâ quodammodo à carne musculorum, ut aded non sciam quid rationis habeant illi, qui Musculos solos linguam constituere dicant. Videri hic possunt quæ habet *Nicolaus Stenonis Opusculo de Musculis & Glandulis*.

Membranaque levi & porosa velatur] Villosa est valdè, & hinc optimè qualitates saporiferas imbibere dicitur.

Levi] Prætenuem eam dicit *Fernel*. respectivè saltem, sic enim Uteri tunica, Meninx dura aliæque tunicæ variæ crassiores sunt tunica linguæ, aliàs enim satis crassa est, quod in elixis bubulis linguis apparet si detrahatur, insignem satis crassitiem deprehendimus, qualem & humana lingua habet, licet minorem. Toti hæc ori communis est, imò & œsophago, ventriculoque, quarum partium superficiem investit, adeoque causa est magni illius consensus inter has partes, maximè ventriculum & linguam.

Venas binas] Quarum una in dextram linguæ partem inseritur, altera in sinistram.

Raninæ] A ranis, quemadmodum enim

ranæ in locis degunt irriguis, humidis, sic hæ venæ declivius infra linguam, infima oris parte, maximè irriguâ & humidissimâ habentur, secari cum fructu solent in anginâ, & manifestissimè rubedine livoreque in conspectum sese dant.

A carotidibus] Hic si quis naturæ consultus quærat ex me, ad quid membro tam parvo opus est hic vasis tam magnis? Respondeo cum *Lindano pag. 572.* ut caro linguæ propria, quæ substantiam seu corpus ejus constituit, ab influente sanguine rigida reddi, vectis instar, queat. Absque hoc enim rigore tam eam Musculi non possunt regere, quam non possunt manum humero fracto. Is ipse si nimius sit, ut solet in Ira, ita impedit linguam, ut bambaliones hæsitatoresque faciat, imò ut loqui non possit.

Quod verò crassius &c.] Crassiores licet sunt & duriores hi nervi, quam qui per exteriora linguæ sparguntur, longè tamen minores sunt seu angustiores illis. Præter duos eos nervos Tertium bis tervè se observasse scribit *Marchette*, qui à quinto pari ortus in musculos Linguæ abit.

Circa

Ad latera movet par musculorum Tertium, linguæ proprium, idque à cornibus ossis hyoidis prognatum, lateribus linguæ jungitur, neque aliam ob causam *Ceratoglossum* dicitur.

Addunt his Quartum musculorum par, quod circa dentium molarium postremos prodiens, *Myloglossum* nominatur. Hoc vero non in linguam immediate, sed in illius tantum ligamentum inseritur, *linguamque sursum convertere* perhibetur.

Obtinet autem humana lingua corporis HABITUM mediocrem, veluti *lineola* per mediam excurrente signata.

QUALITATUM manifestarum harmonia temperata est; quantumvis ex accidenti frigidior, & humidior.

JUNGITUR partibus subjectis *Ligamento* membranoso, valido, cujus extremum in frenulum procurrit: cætera ossi hyoidi, tum laryngi committitur.

Appa-

COMMENTARIUS.

Circa dentium molarium postremos] Ab inferioris maxillæ internis lateribus. Rarissimum omnino hoc par esse, inter alios *Marchette* testatur.

In illius tantum ligamentum] Quo faucibus annectitur.

Habitu mediocrem obtinet] Magnitudine est mediocri & ori respondenti, quæ si nimia sit, ut moveri expedire nequeat, blæsi fiunt & balbutientes, & si nimia mollitie humiditateque abundet, ut in infantibus, minus rectè articulatae voces proferuntur. Linguam vitio morbi in portentosam magnitudinem crevisse, adeo ut ore non caperetur, notarunt *Galenus*, *J. Camerarius*, *Zacutus Lusitanus*, *M. Donatus*, *Johan. Waleus*, ut testatur *Bartholin. histor. 22. cent. 2. & Anatomic. pag. 370.*

Veluti lineola &c.] Quæ linguam quasi in duas partes dividit, quo, non minus ac reliqui sensus externi, læsa una parte illic tota gustandi actio auferretur.

In frenulum procurrit] De hoc *Fernel* appositè admodum *Phys. cap. 8.* Cumque summe volubilis esset & incitata, ne fortè indomita plus æquo in loquacitatem solveretur, subdito vinculo tanquam habenis cohibetur. Quamvis enim nimia loquacitas seu garrulitas non dependeat à solius linguæ volubilitate,

sed principaliter à voluntatis & arbitrii proterviâ & petulantia, tamen volubilitas hæc menti nostræ magnam ansam præbet garrulitati tempus impendendi, mens enim humana facillimè inclinatur ad id quod in corpore nostro facile fit, frænari linguam & cavere sibi à lingua, esse rem difficillimam tenendum est, qua de re insignis exstat locus in sacris apud *Jacobum Epist. cap. 3. v. 1. &c.* Præcipuus itaque frænuli hujus usus est; ut per illud lingua fiat stabilis, nisi enim alligata esset, fluctuaret, & hinc inde moveretur; retrorsum iret etiam, adeoque anteriorem oris partem relinqueret. Ex hoc stabilitate quod lingua mediante hoc fræno habet, sermonis apta ratio plurimum dependet. Hinc ubi frænum hoc in infantibus nimis longe antrorsum mucronem linguæ versus producit & excrescit, ita ut propterea nec bene vagire, nec lac ex mammillis fugere possint, ut medela huic malo afferatur, portio ligamenti hujus solvitur, sive id à nutrice fiat opera digitorum divellendo, sive à Chirurgo auxilio forcis dissecando, in qua tamen dissectione curandum maximè est, ne nimis profunda ea instituatur, adeoque nervus lædatur, & ita in Paralyfin conjiciatur infans, aut etiam vas aliquod sanguineum, & inducatur Hoemorrhagia gravis.

Apparent ad radicem linguæ *Glandula* duæ, ANTIADÉS, & *Paristhmia* Græcis scriptoribus dictæ, Latinis TONSILLÆ. Circumdat eas, à palato utrinque demissa, carnosæ, laxaque substantia quæ sicuti glandulas dictas sinu suo excipit; ita pituitosi excrementi copiam ad eas derivat.

Sunt & aliæ glandulæ sub mento, inter hyoidis, & linguæ musculos, tum retro aures observandæ, quæ PAROTIDUM singulari nomine capiuntur. *Uusus* harum communis, redundantes humiditates colligere, partesque rursum vicinas humectare.

Cæterum imminet epiglottidi ab extremo palato pendulum corpus, fungosæ, rubicundaque carne productum, GARGAREONEM vocant auctores, & *Uvulam*. Move-

COMMENTARIUS.

[*Antiades*] Quasi contrariæ & oppositæ, quod è regione sibi invicem opponantur, una enim dextra est, altera sinistra.

[*Paristhmia*] Voce composita ex *παρ* & *ἰσθμῶς*, maris angustia, interjecta inter duo terræ promontoria, quoniam angustiori sunt sitæ loco.

[*Tonsillæ*] Diminutiva voce à tonsis, tonsæ autem proprie loquendo remorum partes sunt extremæ, latæ, non acutæ, quibus unda verberatur remigando, adeoque immergi solent in aquas, & id triplicem ob similitudinem; 1. quod ut tonsæ remorum versantur indefinenter in aqua, ita hæ glandulæ in loco humido, & imbibunt humorem. 2. quod quemadmodum remorum tonsæ ab utraque parte habentur, ita hæ glandulæ. 3. quod ut tonsæ extrema parte latæ sunt, ita & hæ tonsillæ. Vocantur & Barbaris Amygdalæ, Belgis de *Amandelsen* / quod figura sua Amygdalam singulæ referunt.

[*Tonsillæ*] Ipsarum ulcera, præsertim à lue Venerea inducta, ægre adeo curationem admittunt, ut nisi Sulphuris Calchantive oleo tractentur, nunquam ad sanationem deducantur.

[*Sunt & aliæ glandulæ sub mento inter hyoides & linguæ musculos*] Sunt & in ore ipso sub lingua ad radices dentium tam molarium quam incisorum sitæ, ad apicem linguæ sese extendentes. In his notabilis *Ductus* ille *Salivæ* dictus, nuperrimum *D. Warthoni* Angli inventum, qui quid de glandulis oris ductuque

dicto habeat *Adenographiæ suæ cap. 21.* in Commentario huic subjiciendo adducam, ubi & de Salivæ ductu superiore quædam addentur.

[*Ab extremo palato*] Palatum ita dictum vult *Baubin.* quasi dentibus ceu palis vallatum. Puto propius accedere qui quasi cœlum dici volunt, unde & Cœlum oris vocari legimus, Belgicè *'t Ghehemelt* / ob insignem cum cœlo similitudinem, quæ in his 4. maxime observatur. 1. quod quemadmodum cœlum est pars suprema totius mundi, ita palatum totius oris. 2. ut Cœlum superius convexum est, inferius concavum, ita & palatum. 3. ut Cœlum ad omnes sonos resonat, ita & palatum ad voces. 4. ut Cœlum oblitum est & insignitum variis stellis, ita palatum innumeris foraminulis, per quæ destillat humor pituitosus.

[*Rubicundaque carne*] Carne constat propria sui generis, & licet sint qui dicunt Anatomicum, licet exactissime eam dissectet, aliud quid quam carnem non reperire membranâ tenui cinctam, falli tamen eos Autopsia demonstrat; habere enim gurgulionem sua vasa inflammationes frequentes clare satis demonstrant, & egregie confirmat infelix Presbyteri casus apud *Valesium de Tarentâ lib. 3. cap. 5.* cui ex improvidâ abscissione subsecutus fuit lethalis sanguinis fluxus. Ea tamen vasa conspicua vix sunt, ne quidem in inflammato.

[*Gargareon*] *γάργας*, à sono quem edunt ii qui gargarismate utuntur; aut quod nulla particula sit quæ in gargarificatione magis afficiatur,

Movetur duobus *Musculorum* paribus : quorum id quod *Externum* est, ab ossis Cuneiformis apice prope maxillæ articulum originem trahit, transiensque tendine suo per rimam alæ ossis illius incisam, in *latera gargarionis* deferitur, quæ *antrorsum*, depressa fortiter lingua, *movere* conspicitur.

Par alterum, quodque *Internum* dicitur, paulo altius ab apice ossis temporum, qui alam internam ossis cuneiformis spectat, initium sumit, & carnoso, teretique corpore, in *uvulam* mediam descendit, quam *retrosum movere* videtur. Utrumque ad alimenti facilem descensum, vocisque lenitatem, tum aëris pectus subeuntis aliquam præparationem conducibile,

Porro medii ventris appendix **COLLUM** est, ad vocis modulatum longule productum, cujus posteriora *cervicis* nomine magis veniunt. Sunt in eo, tum communia corporis tegumenta, & ex vasis Venæ, Arteriæ, Nervique; tum Vertebræ, Musculique proprii.

VERTEBRARUM septem sunt, quarum Spinæ bifidæ, & Processus Transversales, ad vertebralis arteriæ ascensum, perforati.

Prima

COMMENTARIUS.

ciatur, aut quod in affectu hujus particulæ uti soleamus gargarismatibus. Haud dispar ratio appellationis, qua *Gurgulio* dicitur, procul dubio etiam à sono gargarisantium desumpta, cum liquores illidunt gurgulioni, & quasi resiliant. Nonnulli vocant *Infundibulum*, quod figurâ suâ externâ referat infundibulum, pars enim superior, quæ palato adnascitur, lata est, quæ verò pendet inferius, angustior. Aliis etiam *Tintinnabulum* dicitur, hoc est parva campana, quod aëre ipsam veluti campanam percutiente vox efformetur.

Uvulam] Diminutivâ voce, *εμφυλὴ* Græcè, quasi baccam referens, quæ tamen appellatio impropria omnino est. & parti huic sanæ minime competens, sed tum saltem, ubi intumefacta nimium est, adeoque amplior atque latior est debito. Eadem ratio & denominationis illius est; qua *Columella* appellatur, utpotè quæ tantum ipsi columnæ instar extensæ, hoc est longæ tenui & angustæ, competit.

Vocisque lenitatem] Vocis primum instrumentum linguam esse diximus, secundaria autem reliquas oris fauciumve partes, & inter

has etiam Columella est, ad suavitatem vocis maximè conducibilis, hinc solus homo inter omnia animantia pedestria accepit, qui solus inter ea vocem edit suavem & articulatam; & hinc etiam in avibus plurimis vocem & tantum sonum edentibus observatur adesse.

Par musculorum externum & internum] Illud *Pterygostaphilinum Externum*, hoc ejusdem nominis *Internum* dicitur, de quo utroque *Fallopins in Obs. Anat.* accuratè scripsit, ut adeo non habeat hic quod sibi arroget *Riolanus*.

Collum] A colendo, quia ornari solet, vel à colle, quod exsurgat à corpore, ut à reliquâ terrâ collis.

Ad vocis modulatum longius productum] Collum qua ratione inserviat formationi vocis, & an in omnibus piscibus pulmones collumque adsint, egregiè explicavit Cl. *Senguerdius Disput. Phys. de Sceletio Quarta, in Osteologia* ejus contenta.

Vertebrarum septem sunt &c.] Quod in aliis vertebris, imò omnibus ferè totius corporis ossibus, verum *Mecum* deprehendit Vir in scribendo investigandoque accuratissimus *Arnold*.

Senguer-

Prima *Atlas* dicta, substantiæ tenuioris, spinaque destituta, quæ caput tanquam Olympum corporis proxime sustinet, cui valido ligamento devincta est. Amplior est in leonibus, in hyæna, similique ferarum genere, transversis processibus in alas veluti insignes diductis: quæ res, sicuti

COMMENTARIUS.

Senguerdus, dum quam curiosissimè quæ quidem in præcipuis ossibus humanis notari queant, perlustravimus & examinavimus, idem & in Vertebra Cervicis, & præcipuè, locum habere reperimus, Anatomicos nempe plurimos Osteologiam hominis exhibituros, non ita propriis quam alienis oculis videre, dum quæ ab aliis in hac materiâ tradita legunt, parum aut nihil immutata exscribunt, quasi omnia exacte sic se haberent, nec ullo modo iis aliquid addendum foret, quæ ab antecessoribus exhibentur, qui sæpe non magis Sceleton examinarunt, ne dicam viderunt, quam illi ipsi. Idem & de nobis dicere successoribus nostris quo occasionem omnem præscindamus, non minus Vertebra Colli, quam alia corporis nostri ossa, penitus inspicere placuit. Illa itaque verbis *Sengueri*. Dispositâ descriptas hoc modo exhibemus. Cum omnes vertebrae non conveniant in omnibus, de singulis quædam separatim proponam. Prima, quæ speciali nomine *Atlas* dicitur, quia caput sustinet, spinâ caret, ne moto capite muscoli ledantur, ejus loco tuberosa quædam inæqualitas conficitur à parte posteriore. Duas habet Apophyses superiori parte ascendentes, duas item à lateribus descendentes perforatas; anterius Tuberculum sive protuberantiam valde duram & solidam, & quatuor eminentias obliquas, an Apophyses vocari debeant nec ne, his de voce foret. Sub cavitate interiore caput spectante, in lateribus concurrunt due foraminum conjunctiones. Secunda peculiarem habet Apophysin adscendentem ad summam altitudinem primæ vertebrae, quæ ob dentis similitudinem Dens nominatur; unde etiam tota hæc vertebra eo nomine quandoque venit; à similitudine nuclei, dicitur *Pyramoides*. Hic etiam occurrunt Eminentie superiores in parte anteriore, utrimque una, & Apophyses laterales perforatæ. Præterea, Apophysis à parte posteriore, infernè, utrimque una, major; superne, utrimque una, valde exigua. Hæc vertebra longitudine & crassitie primam manifeste superat. Acumen spinæ diversum ha-

bet, in duas præcipue partes, quæ in minores dividuntur. Tertia manifestius habet duas Apophyses à parte anteriore; utrimque unam, quæ efficiunt sinum, in quem se insinuat secunda vertebra. A lateribus præterea habet duas obliquas Apophyses descendentes, utrimque unam; quarum cussilibet Acumen in duo capitula discescitur. Adhuc, à posteriore, habet quatuor Apophyses laterales sive transversas, utrimque duas; & spinam in varias extremitates divisam. Quarta, tertia similis est, excepto, quod spina ejus in tres majores partes divisa est. Quinta duabus prioribus similis est, exceptis: primò, quod Apophyses anteriores, oblique, quæ à lateribus sunt, in hoc magis excavantur, quam in superiore, & ad semicircularem figuram magis accedant. Secundo, quod spina hujus in duas magnas partes divisa sit, dextram & sinistram, magis sejunctas, & majores, quam in superiore Tertia, superiores magnitudine superat, magisque versus posteriora est extensa. Sexta à prioribus recedit; primo quod duæ ipsius Apophyses anteriores majores, sint magis protense antrorsum. Secundo, cavitas in Apophysi laterali adhuc major & rotundior est. Tertia hujus spina quintam magnitudine superat estque in duas partes divisa. Septima vertebra non habet Apophyses laterales; quæ antrorsum exsunt. Hujus spina reliquas omnes magnitudine longe superat, ut ipsa quoque vertebra. Tum etiam spina ejus in longitudinem posterius valde quidem extensa est, non tamen acuminata, sed obtusa, quasi capitata, in qua divisio vix apparet. Cur spinæ vertebrae cervicis in adeo diversas minores Apophyses, sive processus, dividantur, ratio petenda est à musculis, qui magna copia & diverso modo, in posteriori cervicis sede repositi sunt; ut scilicet hi promptius principium ducerent, & validius in vertebrae spinæ insertionem molirentur. Duas priores cervicis vertebrae frequentius & facilius luxari, quam luxantur illæ, quæ infra dentiformem sunt, ob causam, quia mobiliiores sunt, cum super illis caput moveatur, monet Petrus Vascus Castellus de Angina cap. 2.

sicuti robur colli, sic aliquam ejus rigiditatem inducit; quam falso veteres singulis rectisque ossibus tribuere.

Excipitur hujus sinu vertebra secunda, *Epistropheus* à vertendo nuncupata. Processum emittit rotundum, & dentis instar oblongum: unde vertebræ toti nomen Hippocrates imposuit. Circa hunc caput cum prima vertebra rotatur, ligamentoque singulari, & occipitio connectitur, & ambitu comprehenditur. Vertebrarum tertia *Axon* antiquis dicta, qui reliquis nomina distincta non invenerunt.

Movetur *Cervix* quatuor *Musculorum* paribus, quorum duo *Flectunt*, & totidem *Extendunt*. E *Flectentibus* primum *Longum* dicitur, quod sub œsophago à quinta thoracis vertebra ascendens cervici deinceps, ejusdemque præcipue primæ vertebræ innectitur.

Accumbit longo musculorum pari *Brevius* aliud, quod à processibus transversis inferiorum colli vertebrarum profectum in capitis basin assurgit, adeoque cum mastoide pari, non ad colli, sed capitis flexum, comparatum est.

Secundum par à figuræ collatione *Scalenum* dictum est, quod à prima thoracis costa, lato, carnosoque principio productum, sensimque gracilius redditum, vertebrarum cervicalium transversos processus obliquatis fibris accedit. Tertium, & Quartum musculorum par in sequenti sub caput extendentibus musculis detegemus.

COMMENTARIUS.

Brevius aliud] Musculos hos non debere distinguì à longis, eò quod horum sint solum continuationes vult *Marchette*, at revera diversos eos respectu originis autopsia demonstrat.

Vertebræ toti Hipp. nomen imposuit] Non autem (ut *Julius Pollux* & *Coelius* dissektionum imperiti malè recensent) primæ, ut inquit *Vesalius lib. 1.*

Circa hunc caput cum primâ vertebra rotatur] In motu Capitis triplex motus distinguendus est, unus quo annuimus h. e. ad anteriora caput inclinamus, consentientes ea de quibus proponitur interrogatio, & renuimus, hoc est, ad posteriora idem movemus, adeoque negamus propositum; Alter, quo caput in orbem circumgyramus. Tertius, quo caput movemus dextrorsum vel sinistrorsum. Quod motum spectat ultimum, illum authores fere omnes, excepto *Riolano in comm. de Ossib.* docent fieri cum motu omnium Vertebrarum cervicis. Quod priores *Galenus lib. de Ossib.*

cap. 8. videtur sentire motum annuitionis & renuitionis, perfici beneficio secundæ cervicis Vertebræ; illum, quo caput in orbem ducitur fieri supra primam, cui etiam sententiæ post alios accedit *Senguerdus*. Plerique Anatomicorum ejus sententiam improbant, asserentes, motum priorem fieri ope primæ vertebræ; alterum vero supra secundam. Rationes adducit in *Osteologiâ Senguerdus*

Duo flectunt & totidem extendunt] Recta quidem, si simul agant consortes, oblique vero, sic alteruter eorum seorsim.

À quintâ Thoracis vertebra] Anterior quâ costis jungitur.

Primæ Vertebra innectitur] Acutis nerveisque tendinibus.

Obliquatis fibris accedit] Perforati sunt muscoli Scaleni, quo Nervis ad brachia destinatis ex cervicis medullâ descendentes, vasisque aliis sanguineis via detur.

TABULÆ CAP. XI. Declaratio.

Proponuntur in hac Tabula Cartilagine Laryngis, earumque Musculi, tum Os hyoides cum Musculis; Lingua item, ejusque Nervi & Musculi; Uvula cum duobus Musculorum paribus, & adjacentibus Tonfillis: tandem colli Vertebrae, illiusque Musculi flexores.

FIG. I.

Cartilaginis Scutiformis externa facies.

FIG. II.

Cartilaginis Scutiformis facies interna.

FIG. III.

Cartilaginis Annuliformis posterior aspectus.

FIG. IV.

Cartilago Annuliformis antèrius conspicua.

FIG. V. VI.

Cartilagine Arytænoides.

FIG. VII.

Epiglottis Cartilago.

FIG. VIII.

A Cartilago Thyroides sive Scutiformis.

BB Par Musculorum Hyothyroides.

CCCC Par Musculorum Sternothyroides.

DD Musculi exigui Cricothyroides dicti.

FIG. IX.

A Epiglottidis Laryngi conjuncta facies externa.

BB Musculi Thyroarytænoides.

CC Musculi Cricoarytænoides laterales.

D Cartilago Cricoides sive Annuliformis.

EE Aspera Arteria portio, antèrius conspicua.

FIG. X.

A Epiglottidis facies Interna.

aa Cartilaginum Arytænoidum prominentia.

BB Musculi Arytænoides undique soluti.

CC Musculi Cricoarytænoides postici.

D Cartilaginis Annuliformis pars latior.

EE Aspera Arteria portio Membranosa posteriùs conspicua.

FIG. XI.

A Ossis Hyoidis pars, Basis dicta.

BB Ossis Hyoidis partes duæ reliquæ, Cornua dicta.

CCCC Etc. Appendices Cartilagineæ Ossis Hyoidis.

FIG. XII.

A Facies Interna Ossis hyoidis, quâ basin exhibet

B Ejusdem Ossis Latera, sive Cornua.

CC Appendices duæ Cartilagineæ.

FIG. XIII.

A Latera Ossis Hyoidis.

BB Musculi Geniohyoides deorsum conversi.

CC Musculi Geniohyoides interni, vulgò Genioglossi.

DDDD Musculi Sternohyoides.

EE Musculi Styloceratohyoides.

FFF Musculi Coracohyoides.

ff Pars Intermedia tendinosa.

FIG. XIV.

A Lingua pars suprema inferior.

BBBB Musculi Basiglossi.

ββ Nervæ substantia musculis interposita.

CC Musculi Ceratoglossi crassiusculi expressi.

DD Musculi Styloglossi.

EE Musculi Myloglossi.

aa Nervi lingua à quarta conjugatione.

bb Nervi lingua à septima conjugatione.

FIG. XV.

A Gargareon sive Uvula.

BB Par Musculorum exterius.

bb Tendo ejus, qui rimam transit.

CC Par musculorum interius nonnihil compressum.

D Pars Palati à qua Uvula dependet.

FIG. XVI. & XVII.

Glandulæ, quas Tonfillas nominant.

FIG. XVIII.

AA Musculi Longi Collum flectentes.

BB Musculi Collum flectentes, Scalami dicti.

aa Per Nervorum ad Brachium tendens.

CC Musculi caput cum Mastoideis flectentes.

FIG. XIX.

Compages septem Vertebrarum Cervicis.

FIG. XX.

Vertebra prima cervicis, in qua

aa Sinus duo occiput suscipientes.

bb Foramina lateralia, per quæ Arteria ad cerebrum ascendunt.

FIG. XXI.

Vertebra cervicis secunda, in qua

a Processus, qui Dens appellatur.

b Spina Bifida.

FIG. XXI.

Vertebra cervicis septima, in qua

a Spina simplex: cetera dorsæ Vertebrae similia.



CAPUT XII.

De Musculis Scapulæ, Dorſi, & aliquot Capitæ.

DOrſum multiplices occupant *Musculi*, quorum nonnulli proprii ejusdem ſunt, quidam propinquis partibus movendis diſtinati.

Primi autem diſſectionis ordine ſunt *Musculorum gemelli*, **T R A P E Z I I** dicti, & *Cucullares*, quia junctim figuræ ſimilitudine cucullum religioſorum, aut trapezium adumbrant, ſcapulæ movendæ dicati. Principium late ſumunt ab Occipitio, & proceſſibus poſticis *Vertebrarum cervicis*, & ſuperioribus *vertebrarum dorſi*, membranoso nexu invicem copulati. Hinc paulatim collecti in *Claviculæ parte*, *Humeroque ſummo*, *Spina præcipuè Scapulæ tota*, & baſis ejusdem parte, finiuntur. Nec tamen in tanta exortus latitudine ſimplex eorum motus eſt. Nam pro fibrarum tractu diverſo, ſcapulam non minus *Retrorſum agere poſſunt*, quam *Oblique ſurſum, & deorſum*.

Subjectum eſt trapeziis *musculorum* par **R H O M B O I D E S** appellatum, quadrilateram ob formam, qua rhombum figurat. Hoc *Scapulæ* quoque peculiare. Initium habet à tribus inferioribus *Vertebrarum colli*, totidemque ſuperioribus *vertebrarum dorſi ſpinofiſ proceſſibus*: mox oblique descendens, principio ſineque carnoſum, ad *Scapulæ baſin* fertur; quam *Retrorſum*, ſed & *Oblique ſurſum* agit.

Scapulam movet antroſum *musculus* **S E R R A T U S** *Minor anticus* de quo capite nono mentio facta. Proprium denique ſcapulæ eſt

L E V A T O R I U M par, ab officio ſic vocatum. Originem obtinet à tranſ-

C O M M E N T A R I U S.

CUcullum Religioſorum adumbrat] Credo inquit Riolanus in Animad. ad Veſling. me rectius deſcripſiſſe ortum & inſertionem *Trapezii musculi*, quam Veſlingius fecit. Nam deducit ab occipitio, cum à partibus inferniſ potius oriatur, niſi diverſos ortus & diverſas actiones ei tribuas, ut attollat ſcapulam, retrorſum trahat & deorſum, ſimulque ad erectionem dorſi à renibus uſque ad caput. Hunc muſculum notat à quibuſdam vocari *Cucullarem*, quia *Cucullum religioſorum* adumbrat. Veſlingius prudentius locutus eſt, quam *Bucretius* qui *Os ſacrum* comparavit cucullo *Monachorum*. At nunc odioſum eſt hoc nomen *Monachi*: atque inde capio occaſionem indicandi cucullum *Monachalem* primi

parentis ejusque ſobolis *humeris impoſitum fuiſſe*, tanquam teſſeram vitæ religioſæ, quæ *muſculus* iſte *Trapezius* cum ſuo pari eleganter exprimit cucullum *Monachalem*, ac proinde ſcapularis dicitur, quia *ſcapulas* noſtras obumbrat. An autem *muſculus* iſle primis parentibus impoſitus ſit tanquam teſſera vitæ religioſæ, ſicut conjicit *Riolanus*, cum *Bartholino* non credo, quia & alii religioſi ſine cucullo, & cum hoc plurimi minus religioſi, ſive profeſſionem ſive mores ſpectes.

Trapezium] *Mathematici* hoc nomine figuram quadrilateram inæqualibus lineis circumſcriptam denotant.

Levatorium] A *Spigelio* per jocum *Musculi*.

transversis secundæ, tertiæ, quartæ item, quintæ Vertebrae colli processibus, deorsumque porrectum, carnosum, robustoque sine Scapulæ angulo superiori innectitur, *quem juxta cum humero anteriora versus attollit.*

Dorsales musculi ut rectius detegantur, separandum est prius musculorum par amplum, quod LATISSIMUM *dorsi* nuncupant; quamvis non dorso, sed humero peculiare. Principium ipsi membranofum, & latum, à posticis Vertebrae processibus, qui à sexta dorsi ad sacri ossis medium usque numerantur, tum parte ossis ilium. Hinc itaque superius, atque inferius per latera dorsi protensum, dum angulum Scapulæ inferiorem prætervehitur, carnosius, pariterque contractius, brevi robustoque tendine juxta *caput humeri* terminatur, quod *valido motu retrorsum agit.*

Dorsales propriè musculos agnoscimus, Serratum utrumque posticum, ob dentatas in ferri modum productiones, sic dictum, Sacrolumbos item, Longissimos dorsi, & Semispinatos.

E *Serratis posticis* musculis duo superiores sunt, qui minores, duo quoque inferiores, qui majores.

SERRATI *Superiores*, tenui, ac membranoso principio, à tribus inferioribus Vertebrae colli posticis processibus, primaque spina producti, post in descensu carnosi ad tres quatuorve superiores Costas feruntur, prout duobus aut tribus dentatis productionibus præditi fuerint.

SERRATI postici *Inferiores*, à Spinis vertebrae dorsi inferiorum, membranoso exortu & ipsi producti, transversim deinde excurrentes, quatuor inferiorum Costarum intervallis innectuntur: quamquam utrumque par, aliis haud inepte initia sua potius à costis earumque intervallis, finem autem in spinis vertebrae, obtinere videatur, atque *ad vertebrae circumactum* conducere.

Sa-

COMMENTARIUS.

lus patientiæ dicitur, quod ægrè ferentes, quæ nobis fortè adversa accidere, scapulam hujus ope cum humero, patientiæ amarum ingemittentes nomen, elevemus.

Latissimum dorsi] A fœdo usu quem interdum præstat scalpendo vel tergendò nates, *Aniscalptor*, vel *Aniterfor* dicitur.

Serrati postici] A multis Anatomicis neglecti, vel non animadversi, quia in elevando Trapezio nisi diligenter advertes, simul detrahuntur.

A Spinis vertebrae dorsi inferiorum] Quatuor inferiores intellige, quibus aliquando prima lumborum addenda.

Transversim excurrentes] Infra tendinem musculi latissimi dorsi cui firmiter adhæret.

Intervallis innectuntur] Instar ferræ.

Quamquam utrumque par &c.] Non posse eam actionem præstare putant varii, at nullam adferunt suæ opinionis rationem; quod dicant non posse Spinam circumagi propter arcum ginglymum vertebrae, qui solum motum rectum admittit, non obliquum, falsum est, licet enim motus ille vertebrae obliquus haud ita evidens sit, quam quidem rectus, cum tamen nullum omnino adesse vix crediderim.

Sacrolumbis musculis origo est ab ossis Sacri extremo, nervoso exteriorius, intus carnofo principio. Hinc juxta Ilium sedem assurgentes, circa infimam dorfi Vertebram à Longissimo ejus musculo nonnihil secedunt ad Costas, quibus varia tendinum serie prospiciunt, *ut in expiratione thorax constringatur.*

LONGISSIMIS dorfi musculis, principium, & progressus ab osse sacro, lumborum Vertebris & osse Ilium cum Sacrolumbis commune est, adeoque his uniti, circa dorfi primùm infimam vertebram distinguuntur, transversisque vertebrarum Lumbalium, ac Dorfi processibus, tendines largiuntur. Sunt autem *dorfi, imo & vertebrarum omnium, quarum processus accedunt, validi extensores.*

His annumerantur SEMISPINATI, dorso pariter *Movendo extendendoque comparati.* Instrati sunt omnino Vertebris, earumque Spinas ab ima ad summam tendine instruunt.

Illud constat, enarratos tres musculos, si principiorum conjunctio spectetur, membranarum continuïtas, operisque communio, unicum exprimere musculum, si tendinum multitudo, terminorumque diversitas consideretur, repræsentare musculos quam plurimos.

Subjacent Sacrolumbis, Longissimisque musculis, *Extensores lumborum* duo, SACRI nominati. Hi ab osse sacro exterius progressi vario tendinum apparatu lumbalium Vertebrarum spinas obliquoque processus extendunt.

Opponuntur illis *Lumborum flexores*, QUADRATI dicti, qui interius ab ossis Sacri, & Ilium parte producti, à lato, carnofoque sensim graciliores, transversis lumbalium Vertebrarum processibus sese jungunt, eosque flectunt. Cæte-

COMMENTARIUS.

Nervoso exteriorius, intus carnofo principio] Tendinosum principium est, quod ubi ossalium transcendit duplicem dictam faciem assumit.

His uniti] Principium longissimi dorfi & sacrolumbi separari nequit.

Distinguuntur] Et ita inter sacrolumbum & semispinatum sursum tendunt, tendines ad latera dimittentes, usque dum deveniant ad vertebram colli secundam. Ad latera verò qui demittuntur tendines non solum ad processus vertebrarum transversos feruntur, sed etiam, ut benè notat *Marchette*, ad Costarum processus. Ut adeò exindè haud inconvenienter colligat inservire eos costarum depressioni, pro expiratione.

Semispinati] Principium sumunt, non idem cum Sacrolumbo & Longissimo dorfi, uti etiam *Veslingius* tradit, sed, ut benè observavit *Marchette*, ab ultimâ Vertebrâ Thoracis, ne fiat confusio hujus cum musculo lumborum sacro, circa hanc vertebram finem habente. Imò quod *Riolanus in Anim. ad Vesling.* dicit Musculos semispinatos longissimos esse aliorum musculorum dorfi, falsum est; & ponamus Spinatum colli huic conjungi, non tamen ex utroque conjuncto ea longitudo exurget quæ est longissimi dorfi.

Sacri] *Riolanus lib. 5. Antrop. cap. 32.* Vult hunc musculum acuto & carnofo principio à posteriori parte ossis sacri oriri, quod falsum, princ-

Cæterum qui *ad Caput* referuntur musculi, *alii* totum movent, *alii* determinatis ejusdem partibus inserviunt; de quibus capite sequenti.

Motum totius capitis perficiunt, musculi Splenii, Complexi, Recti majores, & minores *extendendo*; Obliqui superiores, & inferiores *Circumagendo*; Mastoidei vero *flectendo*.

SPLENIIIS musculis à laterum figura nomen inditum Origine gemina, partim à quinque Spinis Vertebrarum colli inferiorum, partim à totidem apicibus vertebrarum Thoracis superiorum prodeunt, atque obliquatis nonnihil fibris in Occiput inferuntur.

COMPLEXI, à partium distinctione sic vocati, ex transversis quatuor processibus Vertebrarum Thoracis superiorum, & Spina septimæ vertebræ cervicis enascuntur, Capitique à medio occipite ad apophysin usque Mammiformem fortiter inferuntur.

RECTI MAJORES breves sunt, carnosique musculi, qui à spina secundæ Vertebræ cervicis profecti circa Occiput medium terminantur.

RECTI minores sub majoribus, à primæ Vertebræ tuberculo exorti, atq; progressu nonnihil divisi, eandem cum prioribus metam contingunt.

Nec vero extendendum tantum caput fuit; sed etiam hinc inde *Circumagendum*. Hoc consequitur opera musculorum parvorum quidem, sed validorum: è quibus duo Obliqui superiores dicuntur, & totidem obliqui inferiores.

OBLIQUI Superiores à primæ Vertebræ processu transverso producti in Occiput juxta latus externum rectorum desinunt.

OBLIQUI Inferiores à Spina secundæ Vertebræ Colli profecti, in primæ vertebræ colli processu transverso finiunt, adeoque commota hac vertebra caput circumducunt.

Flectunt universum caput MASTOIDEI musculi, longi, satisque crassi. Ortus iis partim à summo Sterno, partim à Clavicula, corpore propemodum gemino atque obliquo per collum ascensu in Processum Mammiformem deferuntur, à quo nomen obtinuerunt.

His veluti socii junguntur, musculi *duo* in collo siti, qui à transversis

Pro-

COMMENTARIUS.

principium enim latum valdè habet, finem acutum & pyramidalem.

Splenii obliquatis nonnihil fibris in occiput inferuntur] Antequam autem hoc fiat tendinem unum validum, nonnunquam geminum processui transverso vertebræ colli secundæ largitur.

À laterum figurâ] Triangulari.

À partium distinctione sic vocati] Aded ut ex tribus musculis constare videantur.

Obliqui superiores Sc. in occiput desinunt] Tendinosi omnino.

Obliqui inferiores] Possunt & à figurâ Rotundi dici.

Caput circumducunt] Mediante itaque vertebrâ agunt.

Corpore propemodum gemino] Aded ut etiam initio duos musculos efformare videatur.

His veluti socii junguntur Sc.] Interdum in parte

Processibus vertebrarum illius orti in capitis basin conscendunt, idque una *flectunt*.

Remotis musculis propositis, supersunt *Cervicis Extensores*, & quidem Transversales duo, cum duobus Spinatis.

TRANSVERSALES quod à sex Vertebrarum Thoracis superiorum transversis processibus initia petant sic denominati sunt, exteriusq; in Cervicalium vertebrarum transversos processus singulos defiguntur.

SPINATI autem à spinis septem vertebrarum superiorum Thoracis, & quinque Colli transversorum processuum radicibus, varia principia nacti, in secundæ Vertebræ spinam inferius porriguntur.

COMMENTARIUS.

parte anteriore colli longo musculo alter brevior exterius accumbit, qui cum mastoide caput flectit: à Galeno propositus fuit lib. de Dissect. Muscul. descriptus à Fallopio, quem Bartholin. Eustachius & Riolanus sæpius observarunt.

In secundæ vertebræ spinam porriguntur] In vertebrâ colli secundâ finem habent, spinati appellati, quod tendinum ope spinis adhæreant vertebrarum.

TABULÆ CAP. XII. Explicatio.

Complectitur Musculos, in ventrem revoluti cadavere, circa Scapulas, Dorsum, Lumbos, & Cervicem conspicuos.

FIG. I.

- AA Musculus Trapezius uterque in situ.
- BB Musculus Rhomboides nonnihil detectus.
- CC DD Musculus latissimus dorsi, in quo
- CC Partem ejus carnosiores denotat.
- DD Principium ejusdem Membranosum circa Lumbos exprimit.

FIG. II.

- AA Trapezius extra Situm suum reflexus.
- BB Rhomboides Musculus totus in Situ naturali detectus.
- C Idem Musculus extra Situm abductus, basi scapula adhuc conjunctus.
- DD Musculus uterque scapula levator.
- E Serratus posticus minor in suo situ.
- F Serratus posticus major in naturali situ.
- G Idem Musculus extra situm retractus.
- HH Musculi Splenii ex majore parte in situ suo conspicui.
- II Musculorum complexorum portio.
- KK Musculi Mastoidei superius aliquantum separati.
- LL Musculi Sacrolumbi, nondum è situ suo dimoti.
- MM Musculi Longissimi dorsi, nondum separati.
- NN Musculorum Sacrolumbi, & Longissimi dorsi principia unita.
- OO Musculi lumb. Quadrati, nonnihil detecti.





FIG. III.

- AA Principia unita musculorum Sacrolumbi, & Longissimi dorsi.

- BBBB Sacrolumbi musculi, loco nonnihil moti, & in tendines suos distincti.
- CCCC Musculi Longissimi dorsi, aliquantum extra situm protracti, & ut priores in tendines explicati.
- DD Musculi Spinati nondum separati.
- E Musculus Complexus Capitis in suo situ.
- F Idem Musculus à Capite separatus, ut reliqui subjecti in conspectum veniant.
- GG Musculi Colli Extensores, adhuc in situ positi.
- H Mastoidei Musculi pars antèrius jam soluta.
- I Musculus Rectus major Capitis, extra situm nonnihil diductus, ut rectus minor appareat.
- K Musculus Obliquus superior capitis.
- L Musculus Obliquus inferior.

FIG. IV.

- AA &c. Musculus Spinatus sede suâ evulsus, ut tendinum series exactius conspiciatur, grandiusculè delineatus.
- BB Musculus lumborum Sacer dictus in suo situ.
- CC Musculi lumborum quadrati portio in suo situ.
- DD Musculi colli Spinati dicti in situ suo conspicui.
- EE Musculi colli Transversales, juxto grandius, & longius expressi, locoque dimoti, ut tendinum series agnoscat.
- FF Mastoidei musculi à sterno separati, atque ad posteriora reflexi.
- GG Musculi Obliqui capitis inferiores.
- HH Musculi Obliqui capitis superiores.
- II Musculi Recti capitis majores, nonnihil diducti.
- KK Musculi Recti capitis minores in situ constituti.



CAPUT XIII.

De partibus Capitis externis, earumque Ossibus, & Musculis.

INfimo, medioque Ventri, supremum adjungimus, nobiliorum animæ functionum sedem. Hic ambitu capitis circumscriptus, Faciem anteriorius, media regione Sinciput, posteriorius Occiput complectitur. Contemplanda in eo sunt *Externa omnia*, tam *velamenta*, quam munimenta: sive *Communia* sint *Partibus aliis*, sive *Capiti propria*, tum vero Cerebrum ipsum, & inter organa sensuum, Oculi, atque Aures.

Ordiamur à communioribus, iisque externis, è quibus **CUTIS** *crassitie* per capitis superiora insignis est, ut & vim fortuitorum facilius avertat, & radicibus seu bulbulis Capillorum profundius demittendis aptior sit, quorum in cute capitis foecundam pariter, ac densam produxit cæsariem provida utilitatum natura. Non ornamenti potissimum studio, sed ut noxium Boreæ frigus, & inclementes sub acriore sole radios, nonnihil excluderet.

Subjecta

COMMENTARIUS.

Caput] Caput vocari illud totum quod supra collum sursum est, satis constat.

Supremum] Supremum hunc natura fecit tres maxime ob usus seu causas principales, 1. ut parti nobili quale Cerebrum est obtineret locus nobilis. 2. quod organa sensuum exteriorum supremum locum obtinere debuerint, & cerebro esse vicinissima, ut ex eo loco velut ex Speculâ omnium rerum species melius recipere atque cognoscere queant. 3. Ut homo residentis cerebri hujus altitudine de rerum coelestium ac proinde creatoris in cœlo residentis contemplatione moneretur.

Ut radicibus capillorum profundius demittendis aptior sit] Communiter hæc occasione Capillorum de Pilis agere solent Anatomici, ut adeo mirum sit, cur *Veslingius* parcè adeo de iis differat. Nos ne quid necessarii desit huic operi, eorundem historiam ad Caput ultimum hujus Syntagmatis ubi de Unguibus agitur, tum ob utrorumque affinitatem, tum & ob loci commoditatem, ex eo quod Commentarius illic loci non ita prolixus sit, ablegabimus.

Fœcundam & densam produxit cæsariem.]

Poëtæ si quem à pulchritudine commendare fatagunt, ut bene *Lauremb. in Pascompe* habet, semper mentionem faciunt comarum seu promissorum capillorum, sic *Apollinem*, ductorem unum Deorum pulcherrimum decorum fuisse longâ cæsarie innuit *Horat. lib. 1. Od. 21. & lib. Epod. Od. 15. Ovidius 3. Metam. 12. met.* Varia sunt exempla hominum à cæsarie commendatorum, quæ adducere nimis prolixum foret. In sacris duo sunt cæteris illustriora *Christi & Absolonis*. Dammandus abusus, quo curiose pilos crispant homines, fingunt, fucio inficiunt, &c. Præter longitudinem in Capillis requiritur & certa copiaratio, ut nec nimis densi sint nec nimis rari. Quamvis *Horat. lib. 3. Od. 19.* pulcherrimi Telepsi etiam spissam comam laudaverit. Hujusmodi tamen spissitudinem intelligit, quæ non à mediocritate recessit. Nam si alterutrum foret eligendum, pulchrior esset coma spissa, quam rara & sobria nimis. Plura respectu Qualitatum in capillis pulchris desiderata loco dicto apud *Lauremb.* videre licet.

Non ornamenti potissimum studio &c.] Videri possunt, quæ hæc de materiâ in *Pascompe* cap. 9.

Subjecta porro cuti PINGUEDO, sed exigua, ne transpirationem vaporum infarctus densior impediret.

Pinguedini proximus est PANNICUS CARNOSUS, in quo productas musculorum tenues expansiones propriis locis proponemus.

OSSA ad tutelam capitis comparata, non varia minus, quam valida requirebantur. Hæc membrana cinguntur, quam PERICRANIUM appellant, TENUI quidem, attamen DUPLICI, sensu prædita exquisito, propter NERVOS, qui per occiput ad eam & tempora sparguntur.

Suturis firmiter CONJUNGITUR, demissis per commissuras ad Meningem usque duram nervosis fibris; unde facilis inter utramque membranam consensus ratio deducitur.

Cæterum ossa capitis, vel ad Cranium referuntur, vel ad Maxillas. Ad *Cranium* pertinent ossa Frontis, Sincipitis, Occipitis, Temporum, Sphenoides, & Cribriforme. OS

COMMENTARIUS.

cap. 9. proponit Petr. Lauremb. ex Ambrosio, Apulejo, Ovidio, non tantum ad necessitatem, sed & ad pulchritudinem à naturâ productum esse capillum declarans.

[Non varia minus quam valida requirebantur] Caput totum, & speciatim ipsum Cranium, non fuit unum & continuum à naturâ conditum, sed partes habuit, & hoc propter multa. Primo, ut, si fieret nocumentum in unâ parte, alteri non communicaretur, vel toti, adeoque si forte violenter vulneretur, ictus sistatur, neque totum hoc corpus simul ex uno vulnere frangatur. Secundo, ut fumositates possent per juncturas extra cranium expelli, & sic halitibus, quibus cerebrum alias oneraretur & afficeretur, concedatur egressus, atque hanc ob causam pueri quibus cerebrum humidius est, hæc suturas obtinent longè patientiores, magisque deductas, præsertim vero in brechmate, ubi plurimâ scatent humiditate. Tercio, ut virtus medicaminum tempore necessitatis possit ad subjectam cerebri substantiam penetrare.

[Valida] Crassities non est in omnibus subjectis eadem, sive aëris, regionumque habetur ratio, sive integumentorum capitis, sive etiam vaporum ex inferioribus adscendentium. Densitas seu soliditas Crassitie, quandoque & Raritas ipsi comes, in hisce etenim

summa etiam varietas, sic ut certi nihil hinc determinare liceat.

Hæc membranâ cinguntur, quam Pericranium appellant] Non quidem immediate, si temporalia excipias, sed mediate, intercedere enim videtur inter eam & ossa ipsa membrana alia ossibus ferè omnibus communis, Periosteum inde dicta.

Suturis firmiter jungitur &c.] Originem Pericranii, inquit Lindanus in Physiolo. cap. 8. artic. 5. omnes à crassa Meninge, perque suturas elapsa arcessunt. Solus Spigelius, eam solummodo nervis quibusdam fibris necti cum dicta Meninge contendit. Non displicet hoc Highmore, mihi placet etiam. Non dubito, Musculorum frontis, temporum & occipitii tendines usque ad proximam sibi suturam protendi & nervis fibris ad cranii inferiora penetrare. Nisi enim ita est, ubi habent laudati muscoli firmamentum suum? Unde illud robur, quod præstant, nec tamen abrumpuntur? Unde itaque Pericranium vulgo, inde Periosteum ego nasci puto, & obtendi immediate ossibus Cranii omnibus, si Temporalia excipias. Crassiam quippe Meningem adscendere per suturas, certum est. Ea enim productio in infantibus & antequam cranii ossa per serratas suturas coierunt, manifeste videtur.

[Cranium] Græce νεῖρον dicitur, quod quidam deducunt à voce νεῖρον, galea, quod instar

OS FRONDIS MAGNITUDE satis eximium, UNICUM ferè, nonnunquam geminum est, etiam adultis.

Lamina CONSTRUITUR duplici, pumicosa quadam substantiâ repleta.

CA-

COMMENTARIUS.

instar galeæ cerebro sit circumjecta, ad cujus etiam similitudinem galeas fabricatas multi putant, quod tamen haud credimus. Latinis *Calva* etiam dicitur, & Calvaria quod sæpe calvities ex capillorum defluvio oriatur, non quidem in ossè sed cute ei inducta. *Usum* qualem habeat Cranium, quivis facile intelligit, propugnaculi instar est Cerebro, variisque partibus aliis, & firmitatem Meningi duræ præbet, ligamenti tendinibusque variis; transitum partibus, humoribusque, forsitan & figuram Cerebro. *Propugnaculi cujusdam munere* Cranium fungi, visus docet, Cerebrum enim oculos, organa auditûs aliaque tegit atque tuetur, quæ aliàs in excelfo corporis loco collocata externis injuriis quam maximè exposita. Eundem usum & in specie respectu aliarum partium, tendinum scilicet, habent processus, ut id in zygomatico patet. *Firmitatem meningi duræ atque stabilimentum præbet*, fibrarum membranæ duræ beneficio suspensum illud tenendo, ne aliàs facillimè mollitiæ causâ concidens gravia mala causaret, quod in validis corporis motibus verendum maximè. Firmitatem & præbet ligamenti, membranæ, tendinibusque variis, ut articulatio ejus variis cum ossibus docet. *Transitum præbet vaporibus* ubi futuræ, *Excrementis* crassioribus, ubi meatus ad os & nares, *Vasis* omnis generis, ubi foramina, imò *Aëri* ipsi sonum ad aures deferenti. *Figuram attribuat cerebro*, res non est ab Anatomicis plenè decisa, *Laurentius* alique contrarium verosimilius judicant, à Cerebro nempe figurari cranium, eò quod cranium formatum propter cerebrum. Dicimus paucis (longiore enim explicatione non indiget res nihili) cum commodius figuretur mollius à duro, quam durum à molli, probabilius esse secundum minores partes cerebrum figurari à cranio, quam hoc ab illo, in genere autem eâ figurâ à naturâ formari videri qualem requirit.

Cranium] In Cranio humano nonnunquam

Cornua excrescunt, modo mollia, modo duriora, exempla habent varii, notabile est quod in *Observat.* habet *Bartholinus*.

Os frontis] Nomen *Os frontis* accepit, quasi ferontis, quod animi mores, impudentiam & ingenuitatem præ se ferat. Inde homines, qui sunt impudentes, perfrictæ frontis dicuntur. Eadem ratione *Inderecundum* dicitur. Quod primum visui se offerat *Os Proræ* vocatur. *Coronale* autem dicitur, quia & futura coronali circumscribitur, & ut notat *Casaubonus Com. in Athenæum titul 15.* in conviviis publicis os frontale certis corollis & sertis antiquitus coronabatur.

Nonnunquam geminum est, etiam adultis] In infantibus semper duplex est, frequenter in adultis, futurâ sagittali ad nares usque pertingente. Consulantur *Fallopins expos. de off. cap. 12. Mantiss. Anatom. Joann. Rhodii Observatio 1. Hofmannus Instit. Med. lib. 2. c. 61.* in iis omnibus inquit, in quibus fons cerebri post septimum annum non ossescit, sed fovea manet, quæ ad 20. usque annum durius contractata dolet, semper est duplex, & futura sub digitis manifesta est. In horum censu se esse testabatur.

Laminâ construitur duplici] Duplici constat laminâ, ne in percussionibus ictus totam penetraret substantiam. Harum una est *Interna*, alia *Externa*, quæ medio quodam à se invicem plurimis in locis sunt discretæ. Interna respectu externæ tenuis est, densa, & solida, nullis manifestis foraminibus prædita, & hanc ob soliditatem cum admodum fragilis sit, ut vitrum, vitrea dicitur. Et ut omni loco, non æque est fractioni obnoxia, sed præcipuè ad tempora, ita etiam diversitas summa in tenuitate est. *Tenuissima* enim ferè est ad concursum futurarum coronariæ & sagittalis, quia ibi ultimo concrevit in ossèam duritiem, unde etiam propter facilem penetrationem medicamenta eo loci applicari solent. *Crassior* est in fronte & occipite. Lævis quidem ubique

CAVERNAM præcipue ad narium confinia amplam possidet, simplicem aliquando, nonnunquam uno, duobusque veluti septis distinctam; quam medullosum stipat corpus, membranula fere viridi succinctum, idque aëris ad cerebrum commeantis præparandi gratia factum creditur.

CRAS-

COMMENTARIUS.

que est, sed tamen inæqualis plurimisque sulcis exarata, in quibus delitescunt vasa, quibus etiam satis firmiter annectitur, quod maxime notandum Chirurgis, ne factâ terebratione os circumterebratum vi quâdam avellant, unde ruptâ venulâ aut arteriolâ hæmorrhagia sequi potest. Externa vitreæ nomen non meretur. Est enim internâ longè densior & crassior, multoque porosior, ut hoc antiqua crania manifeste exhibent. Substantia hæc ossea in genere non est densa & tenuis omnimodo, sic enim ruptioni esset maxime obnoxia, neque densa & crassa, gravaret enim caput, sed crassa & rara. Crassa quidem, quo exterius occurrentibus melius resistat. Rara tamen simul & cavernosa, tum ob levitatem, tum ob perspirationem vaporosarum fuliginum. Non autem ubique cranium duplici ex laminâ constat, quibusdam etenim in locis simplex est, tenue & pellucidum, absque meditullio, ut ex particularibus plenius constabit. Unde saluntur Chirurgi, qui in abstractione laminæ primæ tamdiu secant donec sequatur sanguis.

Pumicosâ quâdam substantiâ repleta] *Celsus* medium hoc vocat *Ossium partes interiores* quibus inter se connectuntur. Qui Latine amant inquit *Lindanus in Physiol. Meditullium* vocare solent. Apud Medicos plurimos obtinuit, ut *Diploë* potius, Græcâ voce, appelletur. *Lindanus Commissuram* dicere mavult, quia utramque tabulam suo interventu committit. *Substantia* Os est, & hinc plurimis pro mediâ & tertiâ Cranii tabulâ habitum. *Pumicosum* valde, cellulisque plurimis, carunculis similia corpuscula sanguinea continentibus, partim ad levitatem partim ad irrigationem, nutritionemque commodam, præditum.

Cavernam præcipue &c.] Cavitates in hoc ossæ notabiles sunt plerumque duæ, ad radicem nasi, substantiâ albicante mucosâ semper repletæ, ad id maxime ordinatæ, ut muci in naribus collecti, quem evacuare occasio non

permittit, diverticulum quoddam sint. Videri de usu earum potest *Schneiderus lib. I. de Cathar. pag. 217.*

Quam medullosum stipat corpus, membranulâ viridi succinctum] *Riolanus animadv. in Anat. Laurent. lib. 2. cap. 9.* scribit *Vesalium* decepisse omnes Anatomicos, esse enim sinus hosce vacuos, nec ulla membrana velatos. Sinus hosce albicante quadam & q. medullari substantiâ repleri, nunquam notare licet, uti nec viridis membrana sese offert. Mucosam quandam materiam in iis reperimus, quæ extrinsecus membranâ molli internæ superficiei cavitatis arcuè adhærente vestitur, quæ tum vix alium quam albicantem colorem habet. Hi illi sinus sunt ex quibus veterinarii vermes æstatis ferventissimo tempore in iis genitos, vertiginemque inducentes, eximere solent. De Colore membranæ hujus eleganter *Sneiderus*, viridem nempe eum contrahi, diutius in humido detento cerebro.

Idque aëris ad cerebrum commeantis gratiâ factum creditur] Ingeniose *Veslingius* creditur inquit, de usu enim harum cavitatum maxime dubitatur, suas quisque habet conjecturas. *Lindanus Physiol. p. 369.* Pituitæ transmissioni à cerebro ad nares eas inservire vult, idque probari ex puris, aquæ, vel sanguinis per nares caput valde dolenti effluxu cum levamine. Sunt qui volunt vocem hîc clariorem & suaviorem fieri, quos citatos legere licet apud *Bauhinum Theat. Anat. lib. 3. cap. 6.* & *Hofman. de Usu part. n. 446.* ast quâ ratione hîc possit aër reverberari cum *Lindano* non video. Nec placet sententia eorum qui censent attractum per nares aërem, & ad cerebrum iturientem heic fisti ac alterari, ne aut cruditate sua, aut insigni, qua non raro pollet, intemperie offendant nobile illud viscus. Quo minus id nunc metuamus, crassa inprimis Meninx facit, arcendo aëri à cerebro interveniens, alias sententias lubens prætereo.

CRASSITUDINEM obtinent, si cum Bregmate, & Occipitio in comparationem veniat, mediocrem; **FIGURAM** propemodum circularem.

PROCESSUS ejus exigui sunt, ad oculorum angulos utrinque prominuli.

FORAMINA in superciliis *duo*, quæ nervis à tertia conjugatione pervia sunt: quamvis, sæpe natura non integra foramina, sed *fossulas* tantum efformet, nervorum dictorum tutelæ, ac distributioni sufficientes. Quibus *tertium* accedit foramen, cristæ ossis ethmoidis anterius subjectum, quod in cavernam dictam sese aperit.

Os ipsum Frontis inferius ossi Cuneiformi, Ethmoidi, Maxillæque subjectæ ossibus decem; superius mediante Sutura Coronali vicinis ossibus Sincipitis **COMMITTITUR**.

OSSA SINCIPITIS sive *bregmatis* dicta, tam **NUMERO**, quam parietum constitutione gemina sunt.

TENUIORA præ cæteris, & **FIGURA** inæqualiter quadrata. **LÆVO-**

COMMENTARIUS.

Crassitudinem obtinet mediocrem] Variatamen crassities hæc & in ipso pro diversitate loci, tenuissimum enim est intra oculi orbitam, tenue ad tempora, sub fronte crassius.

Figuram propemodum] Recte *propemodum* addit, revera enim circularis non est, nisi rudiori Minerva instituitur dimensio. Natura autem calvariam condidit globosam & circularem, quamquam leviter utrinque depressam, tres in fines ac usus, tum ut plura comprehenderet, quia figura circularis est omnium capacissima; tum ut minus posset lædi, quum enim angulis careat, non facile in offensionem incurrit: tum ut promptius atque expeditius quoquoersum posset moveri; Corpora enim rotunda nullo fere labore, quanquam maxima sint, motu cientur.

Utrinque prominuli] Eorum majores duo ad majorem quisque oculi angulum, minores, qui & Zygomatici dicuntur, ex adverso illis, ad minorem consistunt.

Foramina in superciliis duo] In media sede superciliorum, in orbitam oculi desinentia.

Coronalis] Coronalis dicitur anterior hæc Cranii futura, 1. quod antiqui ea capitis parte coronas gestarint. 2. quod coronæ vel circulo aliquo modo similis appareat. Arabibus *Ar-tualis* dicitur & *Puppis*.

Ossa Sincipitis sive bregmatis] Dicuntur & ossa *Verticis*, quod verticem constituent, qui nihil est, quam centrum eorum, locus inter frontem & occiput medius, à vertendo, quod nempe capilli hic in gyrum vertantur, sic dictus, *Parietalia*, quod quasi duos parietes constituent, *Arcualia*, à figurâ arcus quam referunt, *Nervalia*, *Rationis* seu *Cogitationis*, quod à Cerebro hoc loco recumbente nervorum exortum deducant, & in eo rationis sedem esse velint Anatomicorum plurimi. *Bregmatis* autem dicuntur quia sub ipsis cerebrum humidissimum & molliissimum est.

Tenuiora præ cæteris] *Substantiâ* ait Hippocr. de Vuln. cap. text. 4. *totius capitis tenuissimum & infirmissimum est os bregmatis*. Pene iisdem verbis Aristot. lib. 1. histor. anim. c. 16. *Supra cerebrum, tenuissimum os atque infirmissimum est, quod vocatur bregma*. Hæc quomodo intelligi debeant *Lindanius Phys. cap. 8. art. 9. §. 96.* egregiè declarat. Ossa hæc bregmatis anteriori sui parte, ubi sagittalis sutura conjungitur coronariæ, non omni tempore æque crassa & densa sunt; in recens enim natis simpliciter membrana est, quæ successu temporis primo Cartilaginis & tandem Ossis naturam induit. Atque hic locus in infantibus

LÆVOREM exterius tactui exhibent, & **FORAMINULA** prope Sagittalem vasis patentia : intrinsece *fossulis* venarum per meningem duram assurgentium elaborata, *Suturaque* propria, quæ *Sagittalis* nuncupatur, inter se discriminantur.

In ambitu vero Frontis, Occipitis, ac Temporum ossibus **DISTINCTA**.

OSSA TEMPORUM itidem **BINA** sunt, reliquis **MAGNITUDINE**.

COMMENTARIUS.

bus *Fontanella*, *Fons pulsatilis*, *Triangularis lacuna* appellari consuevit. Tempus autem illud intra quod ossa hæc efficitur pars, admodum diversa est. Sunt quibus circa illud tempus, quo puer articulas voces proferre incipit, pars ea omnimoda clausa est; sunt in quibus natura illud prævertit; sunt & in quibus assequitur ferius, ut exemplum *Baubini* de uxore propria cui ea pars indurata fuit non nisi circa annum ætatis 26. & *Barthol.* de viro quadragenario hanc partem membranosa ut in infantibus habente, testantur. Ratio autem cur adeo tarde hæc substantia cranii os fiat, est, quod cerebrum hoc loco valde humidum sit, sic ut induratio non possit sequi. antequam illud sub hac parte siccus sit factum. De duritie & crassitie sincipitis ossis exemplum vide quod refert *Cl. Bartholin. obs. Anatom. cent. 5. hist. 44.* de viro quodam religioso quadragenario, qui hac parte tam firmum habuit cranium, ut sine damno rotam quadrigarum super transeuntem pertulerit. De Cranio Egilli scallagrimii ex terra in Islandiâ fossio narrat *Aragrimus Jonas l. 2. Crymogæ seu Rerum Island.* nec securi, nec malleo grandi ab adstantibus potuisse frangi. Ossiculum quo hiatus hanc ossium Sincipitis natura claudit, reliquis capitis ossibus nunquam similem induere crassitiam nec soliditatem *Cl. Pavius* prodidit, sic ut lumini admotum cranium hoc loco transpareat. Hoc licet in plurimis verum esse concesserim, in omnibus tamen locum habere ut admittam nil est quod urget.

Fossulis venarum] Imo & Arteriarum, ut modo vidimus.

Per meningem duram assurgentium elaborata] Monet *Spigelius lib. 2. de human. corp. fabric. cap. 8.* Vasa hæc Chirurgis sedulo notanda esse, ne ubi terebrâ cranium aperien-

dum erit, imperite eadem cum vitæ periculo vulnerent, quam imperitiam in eo produnt, dum in terebratione nimis præcipitanter procedunt, non attendentes ad conditionem loci. Tum ait *Celsus lib. 8. cap. 3. lentius ducenda habena*, suspendendaque magis sinistra manus est, & sapius attollenda, & foraminis altitudo consideranda.

Sutura sagittali inter se discriminantur.] Vidi quam sæpissimè Crania, in quibus hæc desiderabatur. Suturae quæ extra consuetum naturæ ordinem hic occurrunt, eæ sunt quæ ossicula illa quæ in aliquibus subjectis in ossibus sincipitis, quâ parte ossi occipitis conjunguntur se exhibent, circumscribunt, quâ de re inter alios videri potest *Pavius*. Dixi extraordinarias eas esse futuras, eò quod nec in omnibus, nec certis locis notentur, adeoque naturæ potius lusus, quam ritam operationem arguant. Has sedulo Chirurgus notet.

Sutura Sagittalis] Hujus in adultis absentis, mediæ, aut ad radicem narium excurrentis exempla à *Fr. Plazzone*, *Antonio Molineto*, *Petr. de Marchettis*, *Fabr. Bartholeti* observata recenset *Rhodijs in Mantissâ*.

Ossa temporum] Ita communiter appellantur, quia canitie se primum ibi ostendente, tempus, id est annos ætatis produnt, dicuntur & ossa *lapidosa*, *petrosa*, *saxosa*, partim ob insignem duritiem, partim etiam & præcipue ob processus, quos habent inæquales & asperos, instar asperarum petrarum. Vocantur & *mendosa* & *squamosa* vel à futuræ diversitate vel etiam ab ipsius ossis circa futuram figura; quæ tamen appellationes magis partium superiori ubi conjunguntur ossibus Sincipitis conveniunt, quam illæ parti inferiori, ubi ossi cuneiformi.

Itidem bina sunt] Interea ex valde multis compo-

TUDINE cedentia, & laminarum quoque duplicatura non ubique distincta.

DURIORA præ cæteris, adeoque *petrosa* dicta, atque ob tenuitatem circa medium admoto lumine transparentia.

FIGURA superius circuli segmentum exprimunt, inferius varia, Extuberant in PROCESSUS diversos, & exterius quidem versus faciem recurvam proferunt Apophysin, quæ cum processu primi ossis maxillæ superioris conjuncta *Zygoma*, sive *os jugale* constituit.

Mastoiden deinde *Processum*, sive *mammiformem* dictum, quoniam à latiore basi in obtusum verticem protensus vaccinum uber similitudine exprimit.

Addunt his, quum adultior ætas *styloiden*, qui *styli*, aut graphii instar in acumen definit. Sed appendicis verius, quam processus nomen meretur.

Interius ossa Temporum exhibent processum latum, *petrosum* dictum, in quo cavitates Aurium internarum efformatæ, & earundem Ossicula reposta sunt: de quibus capite decimo sexto dicendum fuerit.

SINIBUS excavantur *Tribus*, quorum *unus* auditorium meatum continet: *alter* maxillæ inferioris articulum excipit: *tertius* occipiti communis, interius petrosi processus posteriorem sedem excavat.

FORA-

COMMENTARIUS.

compositum est utrumque, undecim, ossa auditus etiam computando, cum processibus, *Pavins lib. de Ossib. cap. 8. part. 1. pag. 56.* enumerat.

Inferius varia] Ob asperas inæqualitates ossis petrosi, quod quasi in complexu foveat scopulos, horridasque rupes.

Zygoma sive os jugale] Ait *Celsus lib. 8. c. 1.* appellari jugale posse ab eadem similitudine, à qua Græci *ζυγωδες* appellant: Etiam *σζογώδες*, quasi conjugiale, seu ex duobus conjugatum, si credimus Doctiff. viro *Jac. Sylvio in Galen. de Ossib. cap. 2.*

Mastoidem processum] Substantia spongiosus est, & serò perficitur. Servire auditui quatenus cavitas hic magna constituitur voluit *Vesalius lib. 1. cap. 5.* & *Columbus lib. 5. cap. 5.* sed quomodo? *Fallopins* enim in *observat.* docet eum in pueris ferè nullum esse, nec habere cavernas; cum tamen infantes æque ac adulti auditu indigeant, impossibile censemus certi quid hic determinare.

Styloiden, qui styli instar in acumen definit] Dicitur & à calami scriptorii figura *Graphioides*, ab acus similitudine *Belenoides*, à calcaris gallinacei forma *plectrum*.

Sed hic appendicis verius quam processus nomen meretur] Hæc sanè opinio omni modo admittenda non est, licet enim in nuper natis cartilaginosa omnino conditionis sit, imò in plurimis jam adultioribus Epiphyseos specie se exhibeat, varii tamen contra se offerunt, imò plures aliis, in quibus inseparabilis maxime est, adeoque pro vero processu habendus.

Alter maxillæ inferioris articulum excipit] Hic sinus quandoquidem superficialis aliquomodo est, nec ita profundus, quo articulatio foret firmior, natura addidit cartilagineam quandam crustam, quæ ligamenti vicem gerit, & facilitatem motus plurimum promovet. Nihilominus tamen vehementius oscitantibus interdum, sed raro maxilla hæc luxatur, non sine periculo gravi.

Unicum

FORAMINIBUS *quinque* pervia sunt, quorum *primum* in processu petroso conspicuum, nervo quinti paris suscipiendo comparatum.

Alterum amplius, & inæquale, sub appendice styloformi situm, majorem Arteriæ Carotidis ramum, per foramen quintum ossis cuneiformis, cerebro transmittit.

Tertium & ipsum magnitudine insigne, occipiti commune, & venæ jugulari, arteriæque carotidis ramo minori ingressum, nervo autem sexti paris egressum præbet.

Quartum inter processum mammiformem, appendicemque styloiden observabile, oblongo canali quinti paris ramum duriores emittit.

Quintum quod alicubi deesse solet, post mastoiden processum situm, ramo jugularis externæ cranium subeunti transitum concedit.

Addunt his *foraminulum* rimæ instar angustum, & inæquale, quod è processu petrosi anteriore latere arteriolam emittit: reliqua in processu hoc obvia foramina in auditus historia recenserebimus.

Cæterum ossa ipsa temporum, superius per squamosas, mendoasve dictas futuras, vicinis Sincipitis ossibus CONJUNGUNTUR: cætera tam ossi Frontis, quam Cuneiformi, atque Occipitis adhærent.

OCCIPITIS OS UNICUM est in adultis, CRASSITIE, & DENSITATE reliquis conspectius: quamvis inferiore parte magis attenuatum, ubi assurgente oblongo Tuberculo robur ipsi addendum fuit.

SINUS in eo novem numerantur, è quibus præcipue spectabiles duo, qui cerebelli protuberantias suscipiunt.

FORAMINA vero plura sunt, quorum quod *Maximum* est dorsi medullam in vertebrae subjectas transmittit.

Secundum, & *Tertium* foramen non per se, sed cum osse temporum constituit, estque tertium illius supra propositum.

His

COMMENTARIUS.

Unicum est in adultis os occipitis] Vidit tamen *Sylvius* etiam hoc os in duas partem partes, à futura sagittali ad magnum usque spinalis medullæ foramen excurrente. Ut notat *Pars in Vesal.* Aliter hoc os quoque Basilare, Puppi, Pyxidis, Memoriae, Nervosum dicitur. *Basilare*, quod non contemnendam basis capitis sustineat partem. *Proræ* quod puppi navis simile sit, & in parte posticâ situm, *Pyxidis*, *Lambdæ*que à figura, *Memoriae* quod conservet cerebellum, in quo

memoriam habitare vulgus credit. *Nervosum* denique quod ab occipitio Nervorum statuitur exortus.

Crassitie reliquis conspectius] Quia nequimus à tergo nobis cavere.

Densitate reliquis conspectius] Lamina tamen duplici, & intercedente Diploë constat, præcipuis sui partibus.

Magis attenuatum] Tenuissimum adeo, simplicique Lamina donatum.

His propinquum est *Quartum*, & *Quintum* occipitis proprium, exiguum, rotundum, per quod septimum nervorum par è cranio descendit.

Accedunt his nonnunquam foramen *Sextum*, & *Septimum*, quibus multiplicatos vertebraliū arteriarum, & venarum ramos natura destinat.

Superficie externa magis æquabile occiput deprehenditur: interna varium, & quinque laterum *FIGURA* propemodum coactum, à propinquis Bregmatis ossibus Lambdoide futura dirimitur: à lateribus temporum ossi, tum in medio sphenoidi *Committitur*. Primæ quoque cervicis vertebræ duplici *PROCESSU*, ad motus, nexusque securitatem aptandum fuit.

In concursu Lambdoidis, & Sagittalis futuræ interdum *Ossiculum* conspicitur forma *TRIANGULARE*, nunc simplici, nunc duplici, lamina, quamvis non exacte oppositis locis productum: quod inter Epilepsiæ antidota præcipuè commendatur. Huic similia plura, sed

COMMENTARIUS.

[*Æquabile occiput deprehenditur*] Si id non redderent inæquale sinus quatuor semicirculares, quorum duo majores, duo minores, pro insertionē musculorum, in eo reperiuntur.

[*Quinque undique laterum figurâ propemodum coactum*] Verior sententia *Ingrassia in Galen. lib. de ossib. cap. I.* septem lateribus totidemque angulis constare, & hanc etiam probat *Lindanius*; à *Bartholino* dicitur esse figuræ trianguliphœerici, à *Laurentio* rhomboides.

[*In concursu futuræ sagittalis & coronalis ossiculum apparet &c.*] *Roslinckius Dissert. Anat. pag. 306.* Ossiculum hoc singulari naturæ instituto in calvariâ comparere minime credendum esse, sed casu potius occurrere censet, adeoque lusum solum esse variantis naturæ, quæ non hoc tantum in loco, sed alibi etiam varias futurarum excursions admittit solet, præsertim verò in duarum futurarum concursu. Ad confirmationem suæ sententiæ adducit auctoritatem *Petri Pavii* se miros naturæ in futurarum productione lusum observasse *Com. in lib. Hipp. de Vulner. capitis* notantis. Quod vero peculiari contra Epilepsiam potentiâ donatum esse dicitur, illud, siquidem eventus conprobat, ipsi non proprium, sed cum omnibus universim ossibus calvariæ imò totius corporis commune esse existimato.

[*Huic similia plura &c.*] Præter hæc ossa triquetra, alia in futurâ Lambdoideâ invenit *Wormius*, utramque cranii Tabulam perforantia, à paucissimis hætenus animadversa de his in sequenti Commentario figuram exhibebimus. Triaut plurimum in dextro, totidem in sinistro ductu, magnitudine, figurâ & situ discrepantia, quæ etiam in infantibus accuratè discernuntur. Infimum ad processum mammillarem conspicitur, medium paulo superius, vix dimidii digiti intervallo, tertium aliquanto longius à secundo distat. Figurâ sunt varia, triquetra, oblonga, ovalia, interdum instar exostoeon in viventibus eminuisse notavit *Barthol.* ut tactu perceperit. In sinistro ductu majora omnia apparent; Maximum tamen unguem pollicis non excedit. In concavâ cranii parte distincta magis quam in conversâ apparent, quare omnia observantur clarius ablata calvariâ. Notandum tamen in diversis craniiis tam numero quam magnitudine & figurâ situque variare hæc ossa Wormiana, ut modo quatuor sint, modo duo; atque in dextra linea tantum, aliquando in ipsa junctura sagittalis cum Lambdoideâ, aliquando etiam in squamosis temporalibus. Usum credit *I.* Ut ampliori circa ea tractu futuræ ad excrementorum exitum ampliuntur. *2.* Ut

cranium

sed minora officula intra futurarum verarum lineamenta sæpe natura efformat, simplici fere lamina constantia, cum interioris laminæ commissio, harmoniæ magis, quam futuræ similis observetur.

OS SPHENOIDES sive *Cuneiforme* basin cranii constituit: UNICUM in adultis, CRASSITIE, & tenuitate varium, FIGURA quoque multiforme. Nam PROCESSIBUS exornatur diversis, quorum qui *externi* sunt, alii *anterior* conspicui, & ob figuræ convenientiam *Pterygoides*, sive *aliformes* nominantur: alii vero *posterior*, qui geminis apicibus versus styloformem appendicem protenduntur.

Interni ossis Sphenoidis processus haud secus atque externi varii sunt: horum *Anteriores* duo, à latiore basi paulatim in acumen attenuantur, *Posterior* totidem, in latum porrecti, quotiescunque elegantius efformati sunt, extremis suis in duos apices acuminantur, superne concursu in medio leviter sinuati. Atque hi processus juxta cum spatio, quod eos intercedit, sellæ equinæ sive Ephippio ab auctoribus comparantur.

SINUS ossis Sphenoidis plures sunt. Insignis præ cæteris est, qui *Ephippii* medio producitur, glandulam pituitariam suscipiens, juxta quem antè, posteriusque duo minores oriuntur. Consideratione quoque digni sunt, qui in processibus aliformibus consistunt, oblongi, & profundi sinus, pterygoidi musculo interno sedem tutam præbentes.

FORAMINA in utroque ossis Sphenoidis latere *Septem* recensere licet: quorum *Primum* juxta processus anteriores ephippii nervum opticum ad oculos perducit.

Alterum

COMMENTARIUS.

cranium plurium officulorum contextu in contusionibus magis sit tutum.

Os Sphenoides sive cuneiforme] Sic dicitur, non quod cunei formam habeat, sed quod cunei modo interjaceat ossibus pene omnibus capitis & maxillæ superioris. *Basilare* etiam dicitur quia basis est calvæ, & in ea tanquam basi maxima cerebri portio quiescit. Vocatur & os *Multiforme* πολύμορφον, quod variæ figuræ sit, imò & *Os Colatorii*, ab usu. Egregie Ossis hujus significationes varias exhibet *Sneiderus lib. I. de Cathar.* ubi etiam erudite quid Cuneus sit, quid cuneare, &c. ostendit.

Crassitie & tenuitate varium] Ad latera tenuius ferè notatur, quam in medio ad capitis basin. Nec tamen, quamvis crassum maxime medio hoc loco, solidum omnino est, quin

potius rarum valde spongiosumque existit, etiam sub sellâ Turcicâ, sive ut levitati confunderetur, sive excrementorum traductioni, sive utrique, qua de re alio loco, & egregie *Sneiderus lib. I. de Cathar.*

Alii anterior conspicui] Ad latera foraminum quæ in nares patent.

Aliformes] Alis vespertilionum similes.

Geminis apicibus] Quorum anterior obtusus & parvus, posterior longus & acutus est.

Sellæ equinæ seu Ephippio comparatur] Egregie hæc de re disserit *Sneiderus lib. I. de Cathar.*

Foramina septem] Hæc in plerisque craniis se manifestare solent, in variis enim etiam naturaliter & alia se offerunt.

Primum nervum opticum ad oculos perducit] Arteriola quoque per hoc foramen simul

Alterum priori laterale ex initio rotundo in rimam protenditur. Fertur per eam ad oculum par secundum nervorum, & ramus à pari tertio: tum arteriæ carotidis ramus amplius, cum redundante in propinqua pituitaria glandula tenui humiditate.

Tertium foramen secundo subiectum exiguum est ac rotundum, per quod ramus nervi tertii paris ad temporalem musculum, & pterygoïdes propagatur.

Quartum in externo latere orbitæ oculi, fossæ potius amplæ & inæqualiter latæ, quam foraminis speciem exhibet, per quam nervi quartæ conjugationis ramus primus cum præcedente tertii paris, temporali musculo distribuitur. In profundum autem superioris maxillæ descendens, partim in amplitudinem nasi sese aperit, partim per os illius sextum, quarti paris furculum palato distribuendum, angusto foramine demittit.

Quintum foramen sub processu posteriore ephippii obvium, longum atque asperum, majorem arteriæ carotidis ramum capiti suppeditat.

Sextum ad latus præcedentis externum observabile, ovali figura præditum est, quartum nervorum par extra cranium deducit.

Septimum sexto proximum, perexiguum, ac rotundum, venæ jugularis internæ ramum minorem duræ meningi subministrat.

JUNGITUR os sphenoides superioris Maxillæ ossi primo, quarto, & sexto: *inferius* palato. *Per latera* processui ossis temporum petroso, ejusdemque regioni anteriori reliquæ cohæret: *anterius* ossi frontis; *posterior* vero occipiti: idque per *Suturas*, vulgo mendosas dictas, atque harmonias, quas provecior ætas plurimum obliterat.

OS

COMMENTARIUS.

ex interioribus ad oculum transit, hinc etiam majoris est amplitudinis, quam nervi optici crassities requirebat.

Fertur per eam par secundum, & ramus à tertio pari &c.] Par secundum non distribuitur ad omnes oculi musculos, sed præcipuè saltem ad attollentem, adductorem, deprimentem, & obliquum minorem uti etiam inter alios *Vesling.* ipse cap. 14. testatur. Ramus à pari nervorum tertio pro primâ ejus radice habetur, hæc in duos furculos dividitur, quorum unus ad frontem frontisque musculum transit, imò & cum qui palpebram superiorem claudit, alter ad narium tunicam internam. Præter Nervos dictos & alii per idem fora-

men egrediuntur, quæ de re consule *Ingrasiam, Sneiderum, Willis.*

Tum arteriæ carotidis ramus amplius] Retiformi à plexu originem sumens. Et hæc omnia per foraminis dicti partem inferiorem ampliolemque feruntur. Per superiorem, magis angustatam, venæ jugularis externæ furculus secundus deducitur.

Cum redundante humiditate] Hæc expurgatio quo modo fiat alibi elucidabimus.

Septimum &c.] Addi his possunt foramina duo in utroque latere, processui pterigoidæo, ubi basis ejus est, insculpta, quorum infimum vomeri vicinum, in foramen tertium ossis temporum, desinens, altero in ipso sinu processus

OS ETHMOIDES five *Cribriforme* reliquis ad cranium relatis ossibus minus est, & habitudine varium.

PARTIBUS compositum videtur sex. E quibus *prima*, & *secunda* est, quæ cribri modo perforata, nomen ossi toti perperit. Vestitur meningē dura quidem, sed porosa; idque non minus ad aëris, odorisque susceptionem, quam pituitosi excrementi exclusionem.

Pars Tertia est processus interior, gallinaceæ cristæ haud absimilis, inter olfactorios nervos, five processus cerebri papillares assurgens.

Quarta pars est processus alius, parte inferiore, ex adverso præcedenti oppositus, tenuis quidem, sed durus, naresque superius dextrorsum, & sinistrorsum distinguit.

Pars quinta, & *sexta*, spongiosa tota, ac foraminulenta est, nariumque cavitatem superiorem à lateribus stipat. Cæterum amplitudinem narium fere adæquat, ossi frontis, secundo maxillæ superioris, & sphenoidi levibus harmoniis **JUNCTUM**, quasque senecta ætas frequentius delere solet.

Sequuntur **MAXILLÆ**, quarum quæ **SUPERIOR** est, è duo-

COMMENTARIUS.

cessus hujus notabili, majus est. Utrumque Nervorum egressui servit. *Baehnius* foramina decem enumerat, *Sneiderus* duodecim.

Os Ethmoides seu cribriforme] Dicitur & *os Colatirium*, *Isthmoides*. *Galenus lib. 8. de usu part. cap. 7. & lib. 4. cap. 3.* docet hoc os rectius *Spongiosum* quam *Cribriforme* nominari, quia foramina ejus non sunt recta instar Cribri, sed obliqua & leviter torta, qualia sunt foramina Spongiæ. *Laurentius Anatom. lib. 2. cap. 15.* & alii notant, si totum hos os consideretur quod cribrosum & spongiosum solet vocari, illud nec totum cribrosum, nec totum spongiosum esse, verum partem internam, quæ capiti conjungitur, Cribrosam esse, h. e. pertusam multis foraminibus instar cribri: exteriorem ejus partem extra Calvariam, in narium cavitatē contentam fungosam & Spongiosam esse. Significationes varias vocis Ethmoides *Sneiderus* habet *l. 1. de Cathar. sect. 11. cap. 1.*

Partibus compositum videtur sex] *Fernelius* ex tribus constare docet, *Fallopium*, *Baehnius*. *Capivac. Spiegel. Barthol.* alique ex quatuor. Sunt & qui ex septem constare tradunt.

Idque non minus ad aëris odorisque susceptionem, quam pituitosi excrementi exclusionem]

Fuse hæc de re differentem adi *Rosfinckium Disquisit. Anatom. lib. 2. cap. 19.* licet aliquomodo diversum quid hic à nobis sentire videatur. *Conradus Victor Schneiderus de Cribri-formi osse libello pag. 72. & libris de Cathar. maxime 11.* foraminum horum utilitates insigniores esse credit, quam aërem, aut mucum transmittere, quin potius membranas à meningibus productas, medullaque plenas, vel potius ipsos sensificos nervos per ea ad earum tendere tunicam; verum odoratus instrumentum. Opinio sanè in totum haud rejicienda, antequam ulterior diligens inquisitio falsam eam invenerit. Crediderim ego licet, si aliqua, non tamen omnia transmissioni dictorum nervorum inservire foramina, cum & excrementorum expurgat. quædam videantur deberi.

Gallinaceæ cristæ haud absimilis] Cristæ galli hic similis aliquomodo processus, in medio ossis cribrosi positus, distinguit illud in duas partes, ne una male affecta statim etiam afficeretur alia.

Maxilla] Græca vox est à *μᾶνω* mando; à mando est mandibula, quæ idem est, quod maxilla. Hæc alio nomine *Mala* quoque vocatur. Et placet Grammaticis malam esse di-

è duodecim componitur ossibus: ex quibus in utroque latere sex recensentur.

Primum ad angulum oculi externum est, & cum processu ossis temporum anteriore conjunctum, apophysi sua os Jugale, sive zygoma producit.

Alterum os oculi canthum internum constituit, meatu præditum amplo, per quem ad nares redundans oculorum humiditas descendit.

Tertium intra oculi orbitam, reliquis duobus interpositum.

Os *quartum*, maximum omnium, genarum, & palati potissimam absolvit partem, dentiumque cavernis elaboratum. *Foramine* conspicuum est evidenti, juxta oculorum orbitam, per quod à tertio pari nervus excurrit.

Quintum juxta cum pari Nasum constituit.

Sextum extrema Palati cum osse socio terminat: atque hæc omnia harmoniis potius, quam futuris combinantur.

Mo-

COMMENTARIUS.

Etiam à maxilla per abjectionem mediarum litterarum, ut ex axilla iis placet fieri vocem ala. Propriè tamen *maxilla* est latinis inferior, *mala* superior. Vide *Andernac. in Egin.*

E duodecim componitur ossibus] Quot sint ossa maxillæ superioris, non convenit inter auctores, dum alii plura alii pauciora quam duodecim numerant. Cujus rei *causa* varia est. Et quidem *Prima*, quod modo sola ossa maxillæ propria considerentur, modo & ea simul sumantur, quæ ipsi cum cranio sunt communia, ut os Ethmoides &c. *Secunda*, quod id quod unus pro uno & simplici osse exhibet, alius pro duplici. Et *Tertia*, quod septum narium ab aliquibus ossibus dictis adscribitur, ab aliis non ita. Numerum *Veslingianum* etiam habet præter alios *Vesal. lib. 1. cap. 9. Spigel. lib. 2. cap. 12. Leon. Fuchsius institut. Medicin. lib. 1. sect. 5. cap. 2.* Sed cur ex tot? quia pro diversitate usus in diversis locis variare debuit substantia, non poterat utique ex uno esse. Sed & commissuris opus erat ad firmationem musculorum.

Alterum os maxillæ superioris &c.] Tenue admodum hoc est os, & admodum laxè aliis ossibus vicinis junctum, unde facile deperditur, & in craniis è terra effossis rarò reperitur.

Meatu præditum amplo per quem ad nares oculorum humiditas descendit.] Et cum ea quæ oculo ab extra accedunt. Ita refert *Sneiderus*

lib. 2. de Cath. cap. 7. se observasse in puellâ quadam quod ad oculi pustulam variolis contractam, collyrium croco tinctum applicatum, eodem colore imbutum per nares reddiderit, & in alia, margaritam minimam, ad festucam oculis pungentem extrahendam, oculo impositam.

Tertium] Hoc similiter ac secundum tenue est ac squamosum.

Quartum] Considerabile in hoc osse Cavernula magna est, quæ quia observationis rarioris, ejus historiam & delineationem ex *Higlmoro pag. 226.* in Commentario nostro subjiciemus.

Foramine conspicuum est &c.] Foramina in hoc osse diversa reperiuntur, præcipua sunt illa duo circa orbitam oculi, quorum unum interius, alterum exterius, nervis ad faciei musculos & palatum exitum præbentia. Illud illic loci, ubi conjunctio hujus ossis cum pterigoideo processu est, se manifestat, per os sextum maxillæ in palatum excurrentis. Hoc in ipsa orbita fossæ speciem habet. Hic accedit *Tertium*, quod simplex, in ipsa divisione ossis palati existens ad dentes incisivos, vasis membranulæque palatum succingentij in narium cavitatem viam præbens, circa Vomer manifeste divisum.

Sextum] Foramina in hoc osse varia exigua admodum se offerunt, illic loci ubi pterigoideo

Mobilem esse maxillam hanc in Crocodilo, à veteribus proditum est, cranium ejus exiguum ab ingenti rictu non distinguuntibus, cum quo in dilatatione oris attollitur, corpore ob pedum brevitatem in terram prono. Quicquid enim ossium maxillam superiorem in aquatili crocodilo constituit, cranio per harmonias firmiter commissum est: neque aliter in serpentibus, & piscibus sese res habet, in quibus similis ossium nexus est, & muscoli proprie superiorem maxillam moventes nulli sunt.

Cæterum MAXILLA INFERIOR vigente iam ætate in os UNICUM coalescit, DURITIE, CRASSITUDINE, adeoque robore infigne.

PROCESSUS attollit duos, *acutum* unum, qui *Corone*, tum *retusum* alterum, qui in *capituli* formam collectus *Condylus* appellatur.

CAVERNULIS prædita, ut superior maxilla, ac dentium locellis.

FORAMINA obtinet in superficie interna duo, ad processuum dictorum initia, per quæ ramus nervi quartæ conjugationis, dentibus distribuendus, admittitur. Duo item in superficie externa, per quæ ramus idem, antè ad labium, ejusque musculos, instratamque cutem excurrit.

Denique *processu* suo crassiore, mediante membranoso ligamento, ossi petroso COARTICULATUR.

At vero DENTES singulariter maxillas armant: ossa scilicet minuta,

COMMENTARIUS.

goidæo ossis sphænoidis processui unitur, inter quæ eminet amplitudine quod transitum præbet quarti paris nervorum furculo manifesto ad palatum à ramo per foramen quartum sphænoidis ossis exeunte.

In os unicum coalescit] Maxilla enim puerorum, ut capite octavo author indicavit, ex duobus constat ossibus, cartilaginibus intervenientibus; quæ ubi in os mutata, ex duobus iis fit unicum. De Tempore quod duplicitati ossium horum tribuendum sit, vide quæ tradunt Vesalius lib. I. cap. 10. Laurent. lib. 2. cap. 19. Barthol. lib. 4. cap. 11. Riolan. com. in Galen. de ossib. cap. 12. Fallop. exposit. de ossib. cap. 16. Probabile esse cum Senguerdio, aliisque censemus, naturam non magis in harum partium quam aliarum induratione statam legem servare & tempus, imò indurationis hoc tempus in homine non esse perspectum.

Acutum unum] Quo os jugale subit; & in

quem inferitur tendo muscoli temporalis. Ut per alium obtusum sit articulatio maxillæ inferioris cum osse temporali.

Ramus nervi quartæ conjugationis dentibus distribuendus] Ramuli item à Venis jugularibus & Arteriis carotidibus.

Ramus idem] Non modo Nervorum sed & Venarum atque Arteriarum.

Dentes] Quanta fuerit omni tempore dentium nobilitas, quanta æstimatio, egregiè Moëbius Fundam. Medic. cap. 9. tradit, ubi ostendit, quod non solum Deus Opt. Max. in Lege Mosaicâ servum cui Dominus dentes effregisset, manu mittendum mandaverit, sed & veteres plumbeum odontagon in Apollinis templo suspenderint, ne eos evellerent posteri; nisi cariosos; & summè mobiles; plumbeoque instrumento cessuros; Turcæ itidem, Menavio scriptore Italo lib. 3. cap. 22. referente, non nisi impetratâ Regis licentia dentes

nuta, non tantum ad cibum comminuendum, conterendumque, sed vocis etiam expressionem, conducibilia, dum valli instar linguæ, ærrique refluenti objiciuntur.

Reci-

COMMENTARIUS.

dentes extrahere ausi fuerint. Quin & novi orbis Incolæ, eos ut partes corporis cæteris chariores sibi met ipsis exemerint, idolisque ceu munus pretiosissimum obtulerint, aut diis sacrificarint. Nomen dentis derivatum vulgo censetur ab edendo, ut *dens* dicatur quasi *edens*, dentibus enim edendo utimur. Simili de causa Græcis dicuntur *ὀδόντες* quasi *ἐδόντες* voce deducta à verbo *ἐδω*, comedo.

Ossa minuta] An ossibus annumerandi, ab authoribus valdè controvertitur. Negativam varii defendunt, variis rationibus moti, quas inter alios solidè refutavit *Laurentius*, nobis affirmativa placet, quia corpora ficcissima, durissima, solidissima sunt. Et huic sententiæ favet etiam *Aristot.* qui *lib. 1. de Histor. animal. cap. 11.* dentes osseos vocat: neque alia ipsius mens *lib. 3. de Histor. animal. cap. 9.* ubi dicit dentes ossium naturam æmulari. Licet vero dentes sint ossa, plurimas tamen habent proprietates cæteris ossibus non competentes, ut ad eò judiciose à *Scaligero* ossa suæ speciei dicti fuerint. Præcipuas earum *Senguerdus Exerc. Physf. 7.* adduxit, hoc ordine. *Primo* partes extrinsecus ab iis per continuum attritum ablatae, semper fere reparantur: secus ac fit in aliis ossibus. *Secundo*, primis annis excidunt, iisque ablatis in priorem locum substituantur alii, cum reliqua ossa nec excidunt naturaliter, nec si præter. nat. ablata, renascuntur. *Tertio*, reliqua ossa (paucis, iisque minimis exceptis,) periostii investiantur, ne utique dentes. Ne continuo dolore afficerentur non solum à contritione, sed alteratione, partim ab alimentis aut potulentis quæque eo spectant, partim etiam ab aëre pendente, originem fumente. Quin & impossibile erat periostia integra permanere. *Quarto* dentes reliquis ossibus multo duriores, solidioresque sunt, ita quidem ut ex quarundam bestiarum dentibus ignis, ut ex filice, excuti queat. *Sojerus* mercator Amstelodamensis, inquit *Barthol. obs. cent. 2. hist. 24.* quando ligno dentes suos percussit, filicis instar scintillas inde

provocavit, quod & à fratre ejus Patavi *Guiljelmo Sojero* litteraturæ Græcæ peritissimo, & ex filio in Belgio audiui confirmatum. Tantam dentibus duritiem tribuit *Baubin. Anat. lib. 3. cap. 77.* ut soli aciei ferri resistent. Verum hoc meruit censoriam virgulam *Joh. Riolani*, cum dentes sculpi & cælari possint. Sarcophago lapide defunctorum corpora intra quadraginta dies absumi, dentibus exceptis, ob summam duritiem, ex *Plinio* referunt, cum alii, tum *Scalig. Exercit. 291. §. 2.* *Bernard. Cæsius de Mineral. lib. 3. c. 10. sect. 11.* *Mæbins Fund. Med. pag. 113.* quod an verum sit, non immerito videtur dubitare *Andreas Laurent. Anatom. lib. 2. quest. 14.* Sive autem hoc verum, sive falsum sit, quod in medio relinquo, dentium substantiam durissimam & reliquis ossibus duriores esse, certum est; voluit autem hoc natura, ut duriores & solidiores cibum frangere & attenuare possent. *Quinto* & hoc discrimen assignat *Cass. Baubin. Theatri Anatom. lib. 3. cap.* quod inter ossa dentes exquissite sentiant, cum soli inter ossa nervos intra suam cavitatem admittant. Hoc an verum sit, nec ne in seq. videbimus.

Non tantum ad cibum comminuendum &c.] *Ufus* dentium *Primarius* est Cibi præparatio, imprimis solidioris, liquidi enim & molles dentium opera non indigent. Hæc incisione, fractione, & masticatione peragitur. *Secundus* vocis articulatio. Hunc *Lindanus* in *Physf.* *primarium* dicit, masticationem autem *secundarium*, eò quod infantes qui dentes non habent vagitum edant, qui duos aut tres, mussitent, qui plures, distinctius loquantur, imò qui anteriorum aliquot amiserunt, vocis læsionem incurrant. Accedit *Lactantius de Opif. Dei cap. 10.* At verò si dentium usus *primarius* sermo, id de primoribus in primis verum est, utpote maximè ad loquendum facientibus, satis enim commodè loquimur licet molares ablatis. Convenientius itaque censem *Primarium usum* dicere Masticationem utpote quæ omnes dentes requirit, *Secundarium*

Recipiunt singuli ARTERIAM à carotidibus, VENULAS à jugularibus, NERVOS à ramo quarti paris, à quibus quod radices dentium intus cingit subtile perioestium, ipsique adeo dentes, exquisito valde sensu perfunduntur.

NU-

COMMENTARIUS.

rium sermonem qui saltem anticos. Præter duplicem hunc usum, dentes etiam videntur facere ad Ornatum, hinc edentuli, quique nigricantes, cariososque habent dentes, deformes habentur. Imò brutis quibusdam roboris & armorum loco dati sunt, tum ad invadendum, tum ad defendendum.

Recipiunt singuli Arteriam à Carotidibus] Arteriis dentes gaudere præcipuè declarat dolor pulsatorius in dolore dentium interdum se exhibens, & hæmorrhagia larga ab extracto dente obveniens, sæpè mortem insequentem habens. Exemplà videri possunt apud Highmorum, Hollerium comm. 2. in f. 2. lib. 2. aph. 18. coac. prædict. Platerum, Rousseum lib. de hominis primordiis & hysterici affectibus. Usus harum arteriarum idem qui in aliis partibus, nutrimentum nimirum dentibus & spiritus vitales adducere. Helmontius tract. de aliment. tartar. in potu. evincere conatur dentes non solum radicibus suis, sed & lateraliter ex ipsis gingivis nutriri, quam sententiam Mœb. p. 125. solidè refutat, qui videri potest.

Venulas à jugularibus] Venæ sunt à jugulari internâ in duos ramos anteriorem & posteriorem divisa. Ab interiori suas habent dentes superiores omnes, ab exteriori inferiores.

Nervos &c.] Usus Nervorum in dentibus quis sit non facile est determinare, ad sensum non videntur necessarii, magis impedimento masticationi futuri, verosimile Mœbius censet usus horum nervorum primarios esse, 1. ut beneficio membranulæ, quam expansi in cavitate internâ formarunt, dentes firmentur. 2. ut nutritio eorum sit perfectior, nec diminuerentur dentes. Plura vide apud dictum Authorem pag. 125.

Nervos à quarti paris ramo] Ad hujus corroboracionem facit, quod de moniali quadam refert Bartholin. lib. 4. Anatom. Instit. cap. 17. quæ Patavii dentem, quem habebat præ aliis longissimum, cum secari curasset ad deformitatis curam, statim convulsa & epileptica de-

cidit, in parte autem dentis absecta nervi vestigium apparebat.

A quibus ipsi dentes exquisito valde sensu perfunduntur] De sensu dentium Senguerd. lib. cit. habet, quæstum est, an in dentibus tactus detur & doloris sensio? an in Odontalgia dolor tantum sit in partibus dentis corpori vicinis, an vero in ipsis dentibus? Andreas Laurentius l. 2. Histor. Anatom. c. 20. & quæst. 12. putat totum corpus dentis sentire, exquisitius quidem interna parte, & quo propius ad nervos membranasque accedit, minus externa, quia ab aëre alteratur. Bartholin. lib. 4. Instit. Anat. cap. 12. interiori parti dentis sensum tribuit. Sensum dentibus attribuit etiam Bauhin. Thet. Anatom. lib. 3. c. 80. Dentem in substantia sua sentire, asserit quoque Excellent. Plempius l. 2. Fundam. Medic. sect. 5. cap. 3. Nobis de hac questione dicendum videtur, quod licet in Odontalgia propter propinquitatem & consensum partium gingiva doleat, ipsi tamen dentes non sint planè destituti omni omnino sensu tactus. Hæc sententia confirmatur his rationibus. Primo quia in dentibus dantur Organa tactus, venæ, arteriæ, nervi; quare cum natura nihil frustra faciat, sed omnia ad proprium usum dirigat, rationi consentaneum est, in dentibus etiam tactum dari. Secundo probatur illud per experientiam, quæ docet quod si quid extreme calidum, ut ferrum candens, vel frigidum ut glacies, falsum vel acre, dentibus præsertim erosis, adjungatur, licet gingivam non tangat, hoc tamen medianibus qualitatibus tactilibus percipi à dentibus, alterationem vel dolorem creare. Tertio, idem docet stupor dentium: cujus enim sensus remitti, minui, obstupescere potest, nihil certius est, quam quod illud sensu sit præditum: stuporem vero dentium frequenter in nobis ipsis observamus post acidos & acerbos cibos: stupor ille dentium oriri præsertim videtur à frigidis. Ex dictis quodammodo apparet, quid de questione superiori affini judicandum sit, quæ queritur, quid sit propriè in dentibus quod sensu præditum est? scilicet, in dentibus sensio-

NUMERO feminis sæpe quatuordecim, viro frequentius quindécim, aut sedecim in utraque maxilla.

MAGNITUDE in homine mediocres.

DIFFERUNT partim figurâ, partim officio. Nam alii *acuti* sunt, qui *Canini* dicuntur, alii *retusi*. Nonnulli *Incisores*, qui & ipsi acuti, extremis tamen suis latiores, quam canini. Alii denique *Molitores*, quorum

extre-

COMMENTARIUS.

nem exercere *Nervos*, vel membranaceam nervorum substantiam, *Venas*, & *Arterias*. Quod si ulterius queratur, an partes ossæ dentium, sive ipsa ossæ dentium substantia sensu prædita sit? negativam, ut probabilior, præferimus contra Laurentium. Hic enim dentium & reliquorum ossium in eo par ratio videtur, quod hæc omnia ob duram & terrestrem substantiam, sensu careant: in dentibus tamen ea ratio magis urget quam in reliquis ossibus, quia duriores sunt. Hæc ratio experientiæ planè consona est, quæ constat exteriores dentium partes, nullo affici dolore. licet pungantur, vel ustulentur; quia scilicet ad extremas usque partes non solent excurrere *Nervi*, *Venæ*, *Arteriæ*. Accedit, quod si extreme partes dentium sentirent, dolore ferè continuo afficerentur, tum ab aère, tum ab alimentis quæ assumentur & manducantur.

Numero 14, 15, aut 16. sunt in utraque maxilla] Natura communiter homini, multisque aliis animalibus, concedit dentium pluralitatem, ita dispositam, ut in qualibet mandibula detur unus dentium ordo. In aquatilibus varii ordines dentesque diversimode dispositi, observari possunt, ita serpentes duplicem dentium seriem in utraque maxillâ habent. Mantichora bellua apud Indos nota triplici serie, teste *Æliano* & *Arist.* armatur. Idem in pisce *Moraxo Riolano* monente observatur. Cancris non tantum dentes exterius ad cibum accipiendum habent, sed etiam in ipso ventriculo, visu mirabile, triplici situ respondentibus obtinent. Ita differit *Mœbius in Fund. Med.* Hæc dentium multitudo facit ad faciliorem & meliorem ciborum comminutionem, ejusque præparationem ad Chylifin. Præterea, posita dentium pluralitate, uno vel altero affecto, & dolente, reliquis vitium minus communicatur: si vero natura quamlibet maxillam fecisset unum os continuum absque dentibus, læsa il-

lius aliqua parte, totum hoc corpus facilius quam jam, affectum fuisset: & ita dolente hoc toto corpore, non potuisset commode actio peragi, cui natura dentes destinavit. Numerus hic ordinarius fere est, sæpe enim naturæ lusu augetur minuiturve, sæpe casu. Casum quod attinet, uno amisso quandoque duo subnascuntur & os fœde deturpant atque incommodant. Observatum etiam non succrevisse alium, sed reliquos duos vicinos ita coivisse, ut nullus defuisse putaretur. *Pyrrhus* Epirotarum Rex non habuit dentes discretos, sed tradente sic *Plutarcho* unum os continuum lineis tantum distinctum. Idem accidit Romanorum fortissimo *Sicinio* qui hinc *Dentati* cognomen adeptus: ut habet *Agellius lib. II. c. 12.* Idem *Valerius lib. II. cap. 89.* de filio Regis Prusiæ notat in superiori ordine dentium & de Barbaro quodam ex *Gronlandia* adducto *Bartholinus*. *Timarchum* *Nicocli* filium duos ordines habuisse refert *Plinius lib. II. c. 37.* Idem de *Mithridatis* filia refert *Valerius Maximus*. Ferunt *Herculem*, inquit *Bartholin. in Hist.* triplicem dentium habuisse ordinem. Constans fama fert, in *Ludovico XIII.* Rege Galliarum, duplicem in una maxilla seriem loquendi promptitudinem impedivisse. Simile de *Mantichora* prodit *Solinus*.

Magnitudine in homine mediocres] Interdum dentes peccant magnitudine, cum plus justo prominent præsertim anteriores. Id quod accidit 1. iis vacillantibus, vel eorum radicibus laxatis à causâ externâ violentâ, aut interna humectante, vel erodente. 2. Citra laxitatem & mobilitatem cum augentur, id quod plerumque fit, si dens oppositus deest, teste *Columbo lib. I. cap. 10.* Nonnunquam magnitudo imminuitur, à causâ itidem externâ, aut interna cariem inducente.

Molitores] A molendo sic dicti, quod molant

extremos duos, juvenili vel senectâ ætate prodeuntes, *morum*, ac *sapientia* dentes nuncupant.

Incisores quatuor sunt, antèrius locati, atque origine primi, quibus veluti socius operis in utroque latere *caninus*, vulgo *ocularis* dictus, additur: reliquum deinde maxillæ *molares* occupant, ampliores, & lata, quantumvis inæquali sinuosaque basi conspectiores.

COLLOCANTUR dentes in maxillarum alveolis, aut ternis radicibus,

COMMENTARIUS.

lant quasi cibum, eum comminuendo & lævigando. Vocantur & *Maxillares* & *Mandibulares*, quia majorem partem occupant maxillæ.

Juvenili vel senectâ ætate prodeuntes] Erupcionis tempus varium est. Interdum enim 18. anno erumpunt; quibusdam, ut exempla authorum testantur, 26, 80, 89. Anno supra trigesimum vel tribus quod sciam prorupserunt. Ex dentis hujus extractiōe aliquem mortuum esse refert Cl. *Tulpius*.

Morum ac sapientia dentes nuncupantur] Sic dicti, quia erumpunt ea ætate ferè, qua homo sapere incipit. Appellantur & *Genuini*, quod à genis pendeant, οὐζυνοί, fero geniti, quia omnium ultimo oriuntur, & non nisi in adultioribus.

Anterius locati] Hinc & *πρωτοί* vocantur, quod inter cæteros videntibus primi nudantur. E Græca Latinam vocem *Martialis* fecit lib. 7. *Epigram.* 24. Nec grata est facies, cui *Gelasinus* abest. Ob situm etiam *Anteriores* dicuntur, & *Primores*, licet & hoc nomen habeant, quia prius prodeunt.

Origine primi] Prodeunt ferè dentes septimo abortu mense, vel etiam citius; ubi vis formatrix fortior, quod quidem rarius, in ipso utero gingivas penetrant, statimque in recens nato sunt conspicui, cujus rei exempla adducit *Mæbius* ex *Hildano Epist.* 68. *Plinio hist. nat. lib. 7. cap. 16. & 17. Antigono de mirabilibus, Polydoro Virgilio lib. 3. prodique.* & maximè *Schenkio observat.* 380. *Joan. Rosso Warvicensi.* Mutat dentes homo, imò ætate cadunt omnes; raram est eos renasci post annos multos, & in senectute, ut exempla varia à *Barthol. Sennerto, Rolsinkio, Schenkio*, aliisque allata testantur.

Caninus vulgo Ocularis dictus] Caninus dicitur à similitudine figuræ cum dentibus ca-

num, qui ima in parte lati sunt, in summa acuti. *Vulgus ocularis* vocat, quod evulsi oculis ferè molestiam creant; de causa autem hujus rei disceptatur; duplex mihi fuisse videtur, una eorundem longitudo quoad radicem maxima, qua fit ut ad orbitam oculorum sæpius pertingant. *Aliera* nervi ex orbita oculi per foramen internum ejus ad dentes dictos propagatio. De quâ re miror summam *Risiani* vel ignorantiam vel in scribendo inconstantiam, dum in animadversionibus suis ad *Laurentium* expresse dicit, *ad Caninos superioris maxillæ non proferri portiunculam nervi oculos moventis*; imò in animadv. ad *Bauhin.* se certò scire asserit, *nullum surculum nervi oculos moventis denti canino suppeditari*; & tamen in animadv. ad *Spigel.* hæc verba profert: *Tolerabilis est opinio, dentes ocularis superiores recipere nervum ab illo qui spargitur in musculos faciei, & egreditur ex orbita inferiore oculi, sed dentes inferiores canini maxillæ infernæ portionem istius nervi non admittunt, ideoque non possunt dici ocularis.*

Inæquali basi] Hujus quanta in præparatione ciborum in ore sit utilitas, in præcedentibus ostendimus. Asperitas hæc quia deteritur usu, nihil mirum est, in senibus molitores nolle amplius molere.

Collocantur dentes in maxillarum alveolis] Cavitates maxillarum quibus dentes inhaerent Græcis *φάρυα, φάραγ, μύθλια* dicuntur; Latinis *Præsepiola* à similitudine quam obtinent cum brutorum præsepibus: Aliter *Fossule, Alveoli* à fovearum similitudine, quin etiam *Locelli, Mortariola*. Præter naturæ ordinem etiam accidit nonnunquam extra Alveolos dentes reperiri; Cuidam in palato dentem vidit enatum *Plinius Natur. hist. lib. 2. cap. 27.* Idem observavit *Alexan. Benedict. & Eustach. lib. de Dentib. cap. 29.* duabus historiis confir-

dicibus, aut quaternis, ut superiores, vel denique radice simplici ut Incisores, & Canini. Connexionem ipsam *Gomphosin*, sive conclavationem veteres appellarunt.

Superfunt, quibus determinatæ capitis partes erant movendæ, MUSCULI nimirum frontis, palpebrarum, nasi, aurium, labiorum maxillarumque proprii. FRONTIS utrinque unus est, qui ab intermedia ejus regione descendens in superciliarum confinio terminatur, quæ *attollit*, unaque firmiter connexam sibi cutem in plicas rugasque contrahit.

PALPEBRAS *Claudunt* musculi duo, qui semicirculari ductu ab angulis oculorum internis ad externos protensi, palpebras claudunt: rectius tamen simplicem musculum constituunt.

Addunt his *Ciliarem* musculum exilem, qui cilia palpebrarum cingens ad earum exquisitam commissionem concurrat.

Aperit

COMMENTARIUS.

mat. Sic se vidisse hominem cui dens anno ætatis 60. in mediis faucibus enatus, similis lapillo triquetro, qui è Cyprinorum capitibus eximi solet, sed durior, testatur *Schenck. lib. I. observ. 410. Jac. Hollerius in singul. observ. ad consilia* admirandum exemplum habet, cujus dentes maxillæ continuabantur, imò *Columbus* insertos quidem maxillæ vidit dentes, at simul adnatos.

Aut ternis radicibus aut quaternis, ut superiores; vel radice simplici ut incisores & canini] Molares inferiores ut plurimum radicibus præditi sunt duabus, superiores verò tribus. Cujus rei rationes has communiter dant auctores. 1. quod substantia maxillæ superioris mollior sit & rarior quam inferioris; undè vix satis firmiter inhererent ipsi, si radix tertia ipsis non fuisset addita. 2. quod inferiores gravitate suâ incumbant in radices, contrà ac superiores qui penduli sunt, adeoque pluribus indigent vinculis. *Galenus lib. de Ossib. cap. 5.* quandoque & quartam radicem addi scribit. Hoc autem solum genuinis competere tradit *Abuali Ibnisina*, quem vulgò *Avicennam* vocant, *Canon. Medic. lib. I. sectat. I. doct. 5. sum. I. cap. 5.*

Frontis utrinque unus] Revera non esse Musculum jam antea ostendimus.

Descendens] De fibrarum in musculis frontis (siquidem sic dicendi) ductu, controversia

est inter *Barthol. & Hofmannum*. Verba *Bartholini, lib. 3. Anat. cap. 7.* sunt: *Fibras habent rectas. Non ergo à Chirurgo transversim incidendi sunt, ne pereat superciliarum elevatio, sed sursum secundum longitudinem.* Fibras obliquo post *Aquapendentem* urget *Hofmannus*, in dextra quidem parte à dextro ad sinistram, in sinistra verò contra. Sed reluctante experientia, & ratione. Nam frontis cutis recto tractu vel elevatur vel deprimitur ope fibrarum rectarum, à quibus rectus motus. Ad hæc sectio per transversum à Chirurgo plerisque damnatur. Vide *Pavium, Senn. Plempium Libello Belgico de Musculis*, aliosque. Consentunt in fibris rectis *Anatomici Magni Vesalii, Laurentius, Bauhinus, Platerus, Veslingius, &c. Hofmannus in Instit. Medicin. lib. 2. cap. 17. §. 53.* in fibris frontis *Bartholinum* errare *Vesalii* errorem scribit. Ad hæc *Bartholinus* vindiciis suis *Hofmanno* oppositis, ingeniose admodum respondit, qui videri potest.

Palpebras claudunt] De Motu Palpebrarum, an nempe inferior æque ac superior mobilis, controversatur etiam inter *Barthol. & Hofmannum*, ut cui volupe est, legere potest in *Vindiciis. Anatom. Barthol. pag. 105.* consulere etiam potest *Plempium in Ophthalmographiâ.*

Addunt his Ciliarem Musculum &c.] Animadversor assiduus *Riolanus* se primum hoc significasse gloriatur; Inanis sanè gloria ex re

Aperit palpebras musculus singularis : de quo capite decimoquinto.

NARIUM *alas attollunt , diducuntque* musculi *gemini* in utroque latere , quorum *prior* trianguli speciem exhibens , à summo nasi , per latera ejus descendit , adque alam subjectam expanditur. *Alter* à propinquo maxillæ superioris osse delatus , partim in alam nasi exterius , partim in labii subjecti sedem elatiorem descendit : adeoque utrique movendo , atque attollendo accommodatus.

Dilatant alam nasi musculi *duo* exiles , qui per eandem ad sphæram nasi transversim excurrunt.

His opponuntur intra alam musculi *duo* , magnitudine similes , qui ab ossium nasi extremo producti , in alam ejus utramque expanduntur , *quam leviter adstringunt* ; quamvis hoc munus labiorum etiam orbicularis musculus adjuvet , ac consummet.

Communes porro **GENIS LABII** Sque musculi dicuntur **Quadratus** uterque , & Buccinator. **QUADRATUS** Galeno *expansio musculosa* dictus. Re enim vera membrana est pinguedini subdita ; sed obliquo hîc carnosarum fibrarum contextu prædita. Latum ipsi à sterne , clavicula , collo , scapulaque principium est , finis in mento , ubi *maxilla inferiori inhaerens , eam cum annexis partibus deorsum trahit*.

BUCCINATOR alter , ita dictus , quod in buccinantibus collecto spiritu protuberet. Originem habet in summis superioris maxillæ gingivis , intusque communi oris tunica succinctus , desinit in gingivas maxillæ inferioris , & collectis fibris *buccas introrsum compellit*.

Proprie vero labiis inserviunt paria musculorum *quinque*. E quibus *primum* superius labium attollit. Exortus ejus à maxilla superiore , ubi *genarum*

COMMENTARIUS.

non existente , nisi sibi Musculum talem effecerit , cum aliis Anatomicis , vitio resectionis.

Labiis Labia Latinis dicta à Græco *λαβειν* , sumere , assumere , quoniam esculenta & protulenta sumimus commodius , quam si non haberemus ea , unde etiam à nonnullis dicuntur à lambendo , quod mediantibus his liquida plurima sumamus.

Finis in mento Labiis & radice Nasi , aliquando & Aurium. Imò ferè ad caput ipsum *ascendit* , quod obvelat , musculos frontales , occipitales , aliosque constituens. Nil enim est , quam panniculus carnosus. Dicitur & *platysmamyoides*.

Oris Ad nomen Oris quod attinet , *Johan.*

Riolan. Antropograph. lib. 4. cap. 7. scribit , dictum esse ab *O* littera , quoniam dum ore hiatus , tum hiatus ille *O* litteram refert , qualem figuram etiam videmus habere in aliis animalibus , præsertim piscibus , ubi quantum possunt aperiunt os ; an autem verè nomen id inde *Riolanus* deducat , judicabunt doctiores. Græcis *σῆμα* & *λογεῖν* à sermone , quem os efformat ; in Ore enim interiore & nullibi alibi sermo fit , quasi particula à qua sermo fit. Oris enim nomine revera tota illa capacitas intelligitur , quæ ab extimis labris extenditur usque ad intimas fauces.

Primum, alterum &c. Anno 1637. *Joannes Veslingius* musculum superius labrum elevan-

genarum cavitatem constituit, copiosaque fere pinguedine circumfusum, in Labrum superius descendit.

Propè hoc, ab eadem Maxillæ superioris regione, oritur musculorum par *alterum*, tenue pariter ac latum, quod in *labium* subiectum demissum, illud *sursum commovet*.

Par *tertium*, carnosum est, & teres, quod à processu primi ossis Maxillæ superioris Zygomatico sive Jugali natum, obliquo per genas progressu, in labri utriusque confinio definit, quod ad latera *sursum versus abducit*.

Quartum par, juxta latera à maxillæ inferioris humiliore sede perfectum, obliquoque processu, ex latiore basi angustius reditum, in latus labii inferioris prope finem inseritur, quod *deorsum versus abducit*.

Quintum par, in carnosis corporibus conspectius, oritur circa menti medium, fibrisque rectis ad *labrum inferius* ascendit, quod *deprimit*.

Addendus his labiorum *Constrictor*, quem substantia ipsorum mollis, ac spongiosa constituit, sphincteris instar orbem commeantibus fibris concinnata.

Musculos ad Aures externas spectantes, ubi de illarum structura tractabimus, rectius proponemus: è quibus & ii sunt, quos *Occipitales* à situ nominare licet.

INFERIORIS MAXILLÆ validissimus motus variis, robustisque musculis adjuvandus fuit: quorum in ea quinque paria similiter recensentur.

Primum par CROTAPHITES sive *Temporale* constituit, quod pericranio coopertum, circa sincipitis ac temporum os, tenui latoque principio diducitur. Crassius fit, quo propius os jugale contingit: sub quo descendens brevi quidem, sed robusto tendine, *maxilla inferioris acutum processum amplectitur, quem sursum trahens, maxillam pariter attollit*. Fibræ ejus quo magis à medio recedunt, eo magis oblique versus tendinem suum feruntur. Vulnere hujus musculorum paris non æque

COMMENTARIUS.

vantem ostendit geminum. Anno 1650. Antonio Molineto Veneto Vestingii successori dignissimo tres apparuere parte dextra origine distantes. Referente sic Joan. Rhodio in *Man-tissa Anatomica*.

Temporale] Sic dicti hi Musculi, quod singulari naturæ artificio in temporibus insculpta sit pro iis cavitas, in quo tuto lateant.

Maxillam pariter attollit] Riolanus robustissimos vocat totius corporis, ceu qui constri-gant maxillam & elevent sustineantque majora pondera in quibusdam, quam reliqui musculi simul agentes. Exempli singularis meminit Lindanus *Phys. cap. 13. artic. 2.* Validissimum esse maxillæ motum sursum ait Hier. Fabricius *Opere Chir. part. 1. cap. 32.* illi facile

æque omnia pernicioſa ſunt. Nam ſuperiore illius regione, obliquis, tranſverſiſque plagis late ſauciatâ, ægri mortem evaſere; quo loco, cum ex lapſu fiſſum temporum os foret, admotis terebellis hominem exitio ſubducere licuit. Quæcunque tamen humiliorem nervoſamque partem affligunt noxæ frequenter lethalium convulſionum diſcrimen ſecum trahunt.

Par alterum DIGASTRICUM, ſive *Biventre* dictum, prope mammiſormem proceſſum originem adipiſcitur. Hoc itinere medio in nerveum, ſive tendinoſum corpus anguſtatur, iterumque carnoſum, ad menti partem anteriorem, mediamque, interius deſinit, & *maxillam deorſum trahit*. Quo in motu nimiam retroceſſionem annexo ligamento natura cavit. Concurrit officii ſimilitudine Quadratus muſculus iam explicatus.

Tertium par *Laterale* appellatum, & MASSETERIUM partim nervoſo, partim vero carnoſo exortu, à Maxilla ſuperiore, atque oſſe Jugali productum, maxillæ inferiori late valideque connectitur, *quam ob fibrarum diverſitatem dextrorſum, laevorſumque, tum etiam antrorſum commovere poteſt*.

Quartum par PTERYGIDES ſive *Alare internum* eſt. Sic nuncupatum, quoniam ab interna ſede proceſſuum aliformium demittitur. Carnoſum obſervatur, & lato robuſtoque tendine in partem inferiorem interni lateris maxillæ inferioris deſertur, *quam adducit, & quum extrorſum converſa eſt retrorſum agit*.

Quintum par PTERYGIDES ſive *Alare externum* præbet. Hoc gemino ſæpè corpore carnoſo ab externo proceſſuum aliformium latere prodit, & in latus pariter internum inferioris maxillæ deſigitur, qua parte ad latioreſ ejus proceſſum cervicula porrigitur. Itaque *maxillam inferiorem abducit, atque antrorſum movet*.

COMMENTARIUS.

facile concedent, qui viderunt dentibus & ſua inferiore maxilla trabem geſtari ducentorum & quinquaginta librarum pondo.

Quam adducit, & quum extrorſum converſa eſt, retrorſum agit] Falfum hoc eſſe *Riolanus* inquit in animad. ſuis, maximè quod retrorſum agi non poſſit propter oppoſita oſſa, in-

ſufficiens ſanè argumentum, ubi enim jam extrorſum producta eſt, quis non intelligit, ſatis ſpatii intercedere, antequam ad oſſa oppoſita accedat, & ad ea ubi venit, naturali loco eſt.

Abducit atque antrorſum movet] Tumque dentes inferni procedunt ultra ſuperiores ea diſtantia ut minimus digitus introduci queat.

T A B U L Æ C A P. XIII. Declaratio.

Complectitur hæc Tabula Musculos Faciei, & Maxillæ inferioris,
tum Offa Cranii, & Maxillæ utriusque.

FIG. I.

AA	Cutis Capitis detracta.
BB	Panniculus Carnosus separatus.
CC	Pericranium detractum.
DD	Cranium nudum.
E	Musculus frontis.
FF	Musculus Palpebrarum clausor.
G	Musculus primus nasi.
H	Musculus alter Nasi.
I	Musculus Alas dilatans.
K	Musculus Labrum attollens primi paris.
L	Musculus Labrum sursum abducens.
M	Musculus Labrum deorsum abducens.
NN	Musculus constrictor Labiorum.
n	Musculus Labrum deprimens.
O	Musculus Buccinator.
PP	Musculus Temporalis in situ.
Q	Musculus Auriculam rectâ attollens.
R	Musculus Auriculam obliquè movens.
S	Musculus Masseter in situ.
TT	Musculus Digastricus à principio solutus

FIG. II.

AAA	Temporalis Musculus extra Situm, maxillâ dissectâ.
aa	Insertio ejusd. in processum maxilla acutum.
BB	Masseter separatus.
CC	Digastricus à fine solutus, & distractus.
DD	Pterygoides internus.
EEEE	Pterygoides Musculus externus.
F	Quadratus Musculus, sive expansio Musculosa separata.

FIG. III.

A	Os Frontis.
aaa	Sutura Coronalis.
a	Foramen Ossis frontis, pro Nervo tertii paris.
B	Os Sincipitis dextrum.
bb	Sutura Sagittalis.
C	Os Sincipitis sinistrum.
D	Os Temporum.
cc	Sutura mendosa.
d	Processus Mammiformis.
e	Processus fugalis Ossis temporum.
E	Maxille superioris Os primum.
F	Ejus processus fugalis.
G	Os secundum maxilla superioris umbris occultatum.
H	Os ejusdem tertium.
I	Os quartum maxilla superioris.
i	Foramen illius pro Nervo tertii paris.
K	Os illius quintum.

L	Maxilla inferior.
l	Foramen ejus anterius per quod Nervus à quarto pari egreditur.
M	Processus maxilla inferioris acutus.
N	Processus inferioris maxilla retusus.

FIG. IV.

A	Os Sincipitis sinistrum.
aa	Sutura Sagittalis.
B	Os Sincipitis dextrum.
bb	Sutura Lambdoides.
C	Os Occipitis.
D	Officulum triangulare.
φ	Portio Ossis temporum cum processu Mammiformi.

FIG. V.

AA	Sinus Ossis occipitis intra Cranium, in quibus Cerebellum recumbit.
B	Ossis Sphenoidis interna facies.
CC	Os Ethmoides.
D	Cavitas Ossis frontis supra nasum.
ca	Foramen primum Ossis Sphenoidis, seu Cuneiformis.
aa	Foramen ejusdem secundum.
bb	Foramen tertium Ossis cuneiformis.
cc	Foramen sextum Ossis cuneiformis.
+	Foramen septimum ejusdem.
dd	Foramen quintum Cuneiformis ossis.
ee	Foramen primum Ossis temporum.
ff	Processus petrosus Ossis temporum.
gg	Foramen tertium Ossis temporum.
hh	Foramen quartum & quintum Occipitis.

FIG. VI.

AA	Os Occipitis infernè conspicuum.
aa	Processus occipitis, quibus Vertebra prima colli jungitur.
BB	Ossis Temporum pars.
CC	Processus Mammiformis.
DD	Processus vel appendix Styliformis.
EE	Processus fugalis.
F	Ossis Cuneiformis externa facies.
GHGH	Processus Pterygoides sive Aliformes.
I	Os quod Nares distinguit.
KK	Os sextum maxilla superioris.
kk	Foramina qua sobolem Nervi quarti paris ad palatum emittunt.
LL	Pars Ossis quarti maxilla superioris.
m	Denotat quatuor Dentes incisores.
nn	Denotat duos Dentes caninos.
oo	Denotat reliquos Molares dictos.

CAPUT XIV.

De Cerebro, & Cerebello.

Cerebrum ipsum Palladis Mnemosynesque delubrum in conspectum daturus, ejus velamenta ut subducatur, necessum habet. Ea vero sunt membranæ duæ, quibus commune *Meningum* nomen Græci, Arabes *Matrum* imposuerunt, quod consuetum iis sit, blando hoc vocabulo mollem rei cuiuscunque sedem ac tutelam exprimere.

Harum quæ cerebrum immediate non ambit, ab habitudinis modo, **MENINX CRASSA**, vel *Mater dura* dicitur, ascendentibus per latera Venis, Arteriisque non paucis prædita. Et **VENÆ** quidem à Jugularis Venæ internæ anteriore ramo profectæ sunt: **ARTERIÆ** autem ab internæ Carotidis ampliore, ac anteriore ramo productæ, sanguinem huc, spiritumque vitalem diffundunt.

Amplectitur vero cerebrum ambitu laxo, ne incrementis ejus obstet, asperior exterius, intus lævior.

PROCESSU duplicatur gemino, quorum qui supra medium cerebrum antrorsum porrigitur, figuræ quadam æmulatione *Falx* nuncupatur: alter brevior est, & cerebri, cerebellique limites definit.

His

COMMENTARIUS.

EA vero sunt membranæ duæ &c.] Officia *Crassæ* Meningis tria præcipue sunt. 1. commune est ipsi & tenui, ut sit tegumentum cerebri; 2. Eidem proprium, ut sit quasi vallum defensorium Cranii appulsibus oppositum, qui usus quanti sit, disci potest ex historiis Medicorum. 3. est ut cerebrum & à se & à cerebello dividat. *Tenuis* tria itidem sunt. 1. ut sit tegumentum connatum cerebro. 2. ut stabilimentum ejus tanquam substantiæ humidæ, mollis ac fluxilis. & 3. ut vinculum variorum omnium ejus.

Meningis] Quasi *ἰσχυρὰ* membrana per excellentiam, non quod non aliæ sint in corpore nostro membranæ, sed ob usum quem præstat insignem. *Meningis*, *Matrisque* vox quam varias habent significationes, egregie docet *Sneiderus lib. 2. de Cathar. cap. 2.* Putant plerumque has tunicas idèò nominari matres, quod ab iis aliæ membranæ propagentur, verum

Plempius lib. 2. de Fund. Med. cap. 6. ineptè hoc factum credit, quum vox qua Arabes utuntur matrem quidem significet, sed præterea etiam usitate receptaculum, tegumentum, & quidlibet cui altera res ingeratur.

Meningis crassa] *Crassa* proculdubio dicta fuit, in comparatione ad subditam sibi tenuem, sed & si compares cum universis in toto corpore membranis, reperies omnibus crassiorem, & substantiâ duriorem ac valentior. Eapropter dura mater passim appellari consuevit. Substantiæ is modus quantum conferat securitati nostræ, experimur in vulneribus Capitis. Ubi quot sæpè & quanta, & quam aculeata fragmenta sustinet? quantam sanguinis, quantam puris aut saniei vim? quibus cum noxis?

Falx nuncupatur] A posteriore enim sede, quæ cerebello contigua est, in priora delatus sensim falcis in morem stringitur & angustatur,

His processibus SINUS, five *canales* insculpti sunt, minores alii, alii majores. E *majoribus* duo dextrorsum sinistrorsumque per occipitii latera cerebellum obliquo ductu conscendunt, principiis suis, venæ jugularis internæ ramum majorem admittentes. *Tertius* è majoribus sinus, juxta processum Falcis longitudinem protensus, ramulos copiosos, tam ad meninges, quam mediotullium cranii dispergit. Frequens super eum excrementorum collectio, & putredo foeda: interdum & callosa concremента, & lapides, dissectio detexit, *Quartus* è majoribus sinus brevior est, inter cerebrum, & cerebellum incedens, productisque prius furculis duobus, partim corpori calloso infertur, partim anteriores cerebri ventriculos bifidus ingreditur, portionem plexus choroidis constituens. Ubi finuum

COMMENTARIUS.

tur, donec in processum superiorem ossis spongiosi, quem Cristam galli vocant, alligatur.

Sinus five canales] Horum structuram ubi vis apud Anatomicos invenire licet, officium verò docent ut sanguinem à Venis & Spiritus ab Arteriis pro cerebri nutritione & Spirituum generatione recipiant & conservent. Verum enimverò cum *Higmore* potius statuere placet, eos esse pro receptaculo quodam & quasi Mare magnum, quod minores rivulos, venas scilicet sanguinem ab Arteriis adducentes recipiat, ut idem *Disquisit. suæ lib. 3. pag. 1. cap. 5.* abunde demonstrat. Curiosus in horum sinuum usu explicando *Thom. Willis lib. de Anatomie Cerebri*, ut ex sequentibus plenius constabit.

Venæ jugularis internæ ramum majorem admittentes] Venæ quidem jugularis rami inferuntur manifestè, & recipiunt ex sinibus sanguinem ad Cor deducendum, sed & Arteriæ à Carotide, five mediate per ramulos quoddam sinuum, five immediate sinibus annexæ, exonerant se in sinus ipsos.

Quam mediotullium cranii dispergit] Inferuntur in eundem Venæ atque Arteriæ quæ ab exterioribus Jugularis & Carotidis ramis ad summam Calvam sunt propagatæ, atque ubi per Anastomofin unitæ, mox cranium perforant.

Dispergit] Tertius hic uti & sequens quartus sinus in priores duos seu laterales majores desinere videntur, præeunte *Fr. Sylvio*, in cerebri sectione versatissimo.

Lapides dissectio detexit] Refert *Riolanus Enchir. Anat. pag. 253.* intra cavitatem suam quædam continere exigua officula, Carotidem Arteriam ubi caput ingreditur in Calvariæ basi, instar eorum quæ sesamoidea dicuntur. Testatur & *Fabr. Hildanus lib. 1. Observat. Chirurgic. II.* in adolescentuli cadavere tale quid repertum fuisse, quod non nisi magnâ à meninge violentiâ separari & avelli potuit. Etiam aliquoties circa crassiâ Meningem officula parva lenti similia observavit *Rolfinck.* ut in *Dissert. Anat.* habet. Author est *Botallus de Catheno*, sub sagittali commissurâ inter utramque cerebri partem, dextram & sinistram, quatuor ossa reperta fuisse, ad Phæoli magnitudinem accedentia. Officula sex lata & compressa in interiore parte dextrâ duræ Meningis, versus processum falciformem adnata fuisse testatur *Neander in Tabacologia.* In dissecto capite, medio inter duram meningem & totam cranii basin, duram & siccam crustam cranii ossibus tenacissime adhærentem, albam tamen deprehendit *Falcoburgius.* Nec solum supra Meningem duram lapides inventi, sed & infra illam; ut inter alia testatur exemplum à *Bartholin. histor. 85. cent. 2.* allatum.

Portionem plexus Choroidis constituens] Sinibus descriptis quatuor tres alios *Fr. Sylvius* addidit, quorum primus à *Vesalio* etiam notatus, per partem falcis infimam fertur, undè & sinum falcis inferiorem eum appellavit, ad distinctionem ejus, qui in parte habetur superiori

sinuum horum concursus, & commune veluti forum adest, ibi *torcular Herophilianum* vulgo constituitur.

CONJUNGITUR dura meninx suturis cranii nexu firmo, potissimum vero ossi sphenoidi. Alibi tam à Cranio, quam tenui Meninge, tantum recedit, quantum augmentum cerebri, decrementumque requirebat.

Altera meningum, ob habitus conditionem diversam, **MENINX TENUIS**, & *Pia mater* nominatur: re vera tenuis, mollisque membrana,

COMMENTARIUS.

reriori & definit ipsi in sinum quartum. Alii duo laterales minores, utrinque unus, transverso circiter pollice à majoribus distant, in dura membranâ cerebrum à cerebello distinguente siti, nec adeò longi; eorum alter in lateralem majorem abit: ut hos omnes figuris exprimere studuit *Bartholin. Anatom. reformat. pag. 315. & 319.*

Conjungitur dura Meninx suturis Cranii nexu firmo] Hinc est quod ubi Anatomicus Cranium in orbem sestrâ pro commodiori cerebri ejusve partium demonstratione dissecavit, idque sic dissectum auferre conatur, duo observemus contingere. 1. strepitus quidam & fragor auditur, qui ex disruptione oritur fibrarum nervosarum à Meninge durâ ad futuras extensarum. 2. stigmata apparent quamplurima sanguinolenta tam in superficie Cranii quam Meningis, quæ lacerationi vasorum ad futuras similiter discurrentium debentur. Nec tantum Meninx dura nexu firmo suturis conjungitur & adhærescit, sed & mediantibus fibrillis plurimis ipsas futuras penetrat, perfusio, vel potius pericranio sese jungens, quod natura eum in finem videtur effecisse, ne dura Meninx suo pondere cerebrum obrueret, & impediret liberum ejus motum; Arteficio hoc graphice depingit *Andr. Vesalius lib. 7. de corp. hum. fabr. cap. 2.*

Alibi tam à Cranio, quam tenui Meninge tantum recedit, quantum augmentum cerebri decrementumque requirebat.] Negat distantiam *Hofman. in Galen. de usu part. num. 584.* multosque ibidem habet suæ sententiæ patronos, qui ante illum idem senserunt, & adhuc sentiunt. Ita *Sneiderus lib. 2. de Cathar. p. 20.* citat *Nic. Massam, & Berengarium*, ipseque

acriter, autopsiâ edoctus, eam opinionem defendit. *Hofmanniana* hæc sententia patronum invenit *Lindanum*, ut verba ejus *Physiol. pag. 389.* testantur, ubi inquit: *Quod distantiam attinet alteram, quam inter crassam membranam & cranium sibi quidam imaginantur, eam laudatissimus mihi Hofmannus comm. in Galen. de usu part. num. 584. & deinceps tam solide refutavit, ut mea alie hic esse partes nequeant, quam laudandi & commendandi.* Hofmanno se opponit *Bartholinus Vindiciis Anat. Hofmanno oppositis pag. 97. §. 29.* prolixè contrarium defendens. Ne quid dicam de Meningibus brutorum, in quibus nunquam non arctè satis omnibus cranii partibus adhærere observavi, licet ad futuras arctior sit cohærentia, & solus, & cum aliis Doctissimis Medicis, à Chirurgo curioso *Henrico à Rodenbuisen* ad ejus rei inquisitionem inductus, in variis craniis humanis verum esse reprehendi, publicèque diverso tempore ostendi, Meningem hanc cranio ubique satis firmiter esse agglutinatam. Quod attinet distantiam inter utramque membranam, egregiè hac de re differentem adi *Lindanum Physiol. cap. 8. §. 109. & Bartholin. Vindic. Anatom. Hofmanno oppos. pag. 96.*

Tenuis] Imò è tenuissimis membranis quæ in toto habentur corpore.

Mollis] Ne afficeret cerebrum, quod pulvis instar molle est, tenerum atque fragile, sed tamen servet. Quod autem à multis tradatur cum spoliatur cerebrum hanc tenui membranâ, & in tabella ponitur, non servare suam formam, sed defluere & in se concidere, verum minime, nisi morbo vel morâ in defuncto fluxile q. redditum.

brana, proxime cerebrum non tantum obvelans ; sed Venas etiam Arteriasque comitata plurimas, gyros ejusdem, & anfractus profundius involvit, qui ob hoc ipsum separari atque explicari facile possunt.

CEREBRI autem nomine, tum propriè sic dictam partem accipimus, tum etiam cerebellum.

Productum est è pellucida seminis *substantia*, spiritum elaborans, animale nuncupatum, cujus ministerio sensuum interiorum, exteriorumque, tum voluntarii motus functiones anima princeps corporis ac gubernatrix exsequitur. Itaque in viventibus calore blando, spirituque turgidulum.

In vita defunctis dissectum tenues in laminas, alabastri instar etiamnum RESPLENDET, Haud levi piscorum conjectura, qui ab atra bile diffusa, aut sublatis ex ea vaporibus, ceu tenebris inductis obscurari cerebrum tradiderunt.

Vulnera altius in sinus ejus penetrantia recte lethalia pronuntiavit Hippocrates. Ingens tamen hic, ratione proprietatum in naturis, atque aëre ambiente discrimen est. Sunt quibus leves cranii, at meningum offensæ

COMMENTARIUS.

Venas etiam Arteriasque comitata plurimas] Hinc ejus membranæ inflammatio gravis, ut exempla testantur. Videat. *Fontanus in Aleët.*

Gyros ejusdem & anfractus] *Thomas Willis* tractatu sæpius citato meningem hanc duplicem q. statuit, sic ut una pars se dimittat intra fissuras Cerebri, quousque ipsæ descendunt fissuræ, altera exterius fissuras has connectat. Inter hos, monstratore *Fr. Sylvio fissuræ* duæ satis profundæ excurrunt. Una inde à radice ferè oculorum retrorsum usque supra radicem Medullæ Spinalis, dividens partem superiorem ab inferiori. Altera mox sub ea, sed brevior, nec æque profunda. In his multa & satis insignia vasa cernuntur, quam causam etiam esse putat *Fr. Sylvius*, quod ita febricitantium & quandoque etiam aliorum partes illæ laterales doleant & pulsant.

Profundius involvit] Adeò profunde se dimittit tenuis Meninx ut etiam ad ipsos Ventriculos Cerebri pertingat ; certo indicio eam suo ambitu debere aliquoties cerebro esse majorem, unde cognorint aliqui è nostris, trecenties ampliores esse, conjicere non possum, cum nullum medium investigare valeam, quo illud mediante effecerint.

Cerebrum] Nomen unde ducatur non reperio apud Veteres ; sed si conjecturæ locus est, critici nonnulli quatuor tradunt. 1. Nonnulli quasi *Carebrum* τὰ τὸ κάρως dictum volunt, unde & Græcis ἐγκεφαλόν, Belgis 't Wæpen à bregmate appellatur, quoniam situm est sub bregmate maximâ parte 2. alii quasi *Cellebrum*, quod Dyastole & Systole motu indefinenter agitetur, à cellere, motitare, agitare, apud veteres. 3. alii quasi *Ciebrum* à cieo, moveo, quod moveatur perpetuo. 4. denique alii à *Cera* nomen deducunt, cum quâ maximam similitudinem habet in teneritudine, mollitie, laxitate. Sed conjecturæ ut dixi, solæ sunt ; imò hæc similesque Etimologiæ cum nullius pretii sint, non opus est, ut in iis quis cere comminuat brum ut quidam veterum ait.

Spiritum elaborans animale nuncupatum] Quâ ratione, quave in Cerebri parte Spiritum hæc peragatur elaboratio alibi traditur. fusè *Lindanus*, & *Mæbius* hanc rem pertractarunt, & post hos *Thomas Willis*, in *Anatom. Cerebri*.

Sunt quibus leves cranii Meningumque offensæ &c.] Exempla videri possunt apud *Hildanum*,

offensæ certum exitium accelerant : sunt qui magnis cerebri vulneribus superstites feliciter discrimen evaserunt : quamvis portio ejus aliqua sublata, aut suborta putredine separata fuerit. Vulnere item coalescente, profundius adacti globi plumbei retinerentur, stylosumque fragmenta cerebro, & meningibus infixæ multis annis inhærent.

VENAS utrinque cerebrum suscipit à ramis internis Jugularium venarum, tubulosque è Sinibus duræ meningis sanguinem devehentes. **ARTERIAS** à Carotidibus, atque iis, quæ per vertebrae assurgunt, tunica simplici venarum æmulas. **NERVUM** in substantia propria nullum possidet, adeoque sensus expers est; quamvis è basi sua, productaque medulla nervis omnibus scaturiginem præbeat.

AMPLITUDO ejus in homine insignis, cui lunaris quoque luminis, vel dispendia, vel incrementa, accessionem, diminutionemque afferunt.

DIRIMITUR in partem *dextram*, & *sinistram*, intercedente falcato duræ meningis processu,

SINIBUS excavatur diversis, quod in particularium per investigatione dissectio patefaciet.

Calorem, ut dictum est, obtinet satis evidentem; licet calidioribus comparatum visceribus, frigidi, humidique **TEMPERAMENTI** æstimationem subeat. Quin & ex accidente humidius fieri cerebrum necessum est, cum transmissus è ventre, ac thorace vapor illius tepore in aquam cogitur. Cui resolvendæ continendæque si vires non habet, refluxu in partes inferiores, ægritudinum Ilias producit.

GYRIS in ambitu, ac veluti mæandris exornatum.

FIGU-

COMMENTARIUS.

anum, Forestum, Platerum, Fontanum, Tulpium, Bartholinum, Beverovicium, Dodonæum, aliosque innumeros.

Venas Sc.] Dum cerebri portiones absconditis ait ex *Plempio Moebius pag. 592.* adverte guttulas, & punctula sanguinis in cerebri substantiâ, & discite, *Aristotelem lib. 1. hist. anim. cap. 16.* item *lib. 9. hist. anim. cap. 3.* non vera docere, dum scribit Cerebrum nihil venarum in se continere. Ast quâ ratione probabunt arterias non æque sanguinem hunc exhibere in dissecto tali cerebro quam venas.

Amplitudo ejus Sc.] Eleganter de magnitudine cerebri *Lindanus Physiol. cap. 8. art. 19.* inquit: Testatur *Baubinus lib. 3. Theatr.*

cap. 11. tantæ molis esse, ut aliquando in publica Anatome ponderanti libras quatuor, aliquando quinque æquare apparuerit. *Piccol-hominus* semisse gravius deprehendit, *lib. 5. prælect. Anat. lect. 11.*

Dirimitur Sc.] Non totum sed maximâ sui parte, ita ut divisio ea penetret interius in cerebrum ad duorum aut trium digitorum transversorum altitudinem, usque dum ad Corpus accedat callosum, quo mediante dextra cerebri pars cum sinistra continuari incipit.

Gyrus exornatum] Hi superius quodammodo arcuati sunt, undè semper inter ipsos fulcus quidam relinquitur, antequam lateribus suis se

con-

FIGURA sphaeræ in modum superius rotundatum est. Nec mirum cerebrum, auctore Plinio, hominis coelum, perfectioris figuræ sacra quadam nota partem mundi nobiliorem æmulari.

POSITUM est ab architecto provido intra validum cranii munitum, duriorique meningi, vasorum quæ mutuatur opera, laxè conjungitur.

MOVETUR cerebrum, veluti commotæ arteriarum agitatione membranæ: adeoque non ab insita vi; sed à corde potius communicata virtute.

CEREBELLUM altera cerebri pars, ex eadem cum ipsa **SUBSTANTIA** productum, iisdemque **VASIS**, quamvis paucioribus præditum.

MAGNITUDE cerebro longe cedit, compressæ **ROTUNDITATIS**, nec gyris, sed pluribus veluti laminulis compactum.

RECONDITUR intra ossis occipitis amplios sinus, singularique facultatis officio memoriæ consecratum traditur.

His præmissis, recepta antiquitus dissectionis methodo particulariter in **CEREBRO** contemplanda *substantia distinctio*, tum *corpus callosum*, *ventriculi duo anteriores*, *speculum lucidum*, *fornix*, *plexus choroides*, *ventriculus tertius*, & juxta illum antèrius, posteriusque productæ *eminentiæ*. Hinc ad latera diducto cerebro, processuque breviorè duræ meningis distracto, *nervi olfactorii*, *nervorum prima, secunda, tertia, quarta, quinta, & sexta conjugatio*: *infundibulum* item, cum *glandula pituitaria* observanda sunt. Tandem cerebro cum cerebello dextre inverso, *rete mirabile*,
cere-

COMMENTARIUS.

contingunt. Notandus iste nobis est, & unahumor, qui instar limpidaë gelatinæ ibi concretæ cernitur, etiam in bene sanorum cadaveribus.

Movetur cerebrum] De Cerebri motu multum inter Anatomicos disceptatur. Certè eum omnimodo negare velle, ut plurimi tentant, stultitiæ indicium certum æstimamus, manifeste enim Sytolen & Diastolen in cerebro æque ac in corde notamus, uti id in capitis vulneribus, recentèrque natis se nobis videntum exhibet. Quam autem certum est motum hunc adesse, tam incertum à quânam causa dependeat. Meningibus malè tribui vel exinde constat, quod ablatis iis cranii cum portione motus tamen cerebri observetur. Cerebri Substantiæ longè minus motus ille compe-

rit, utpote quæ summam ob mollitiem & flacciditatem ad movendum omnino inepta est. Melius meo judicio facere videntur illi, qui Arteries tribuunt, cerebri etenim motus cum Arteriarum motu coindicit, ut in infantum capite, cranii fracturis, viventibusque animalibus, observatu promptum est, & varii celeberrimi Anatomici notarunt.

Ex eadem cum ipsa substantia productum] Duriore tamen & firmiore, quod certissimum tactu quivis cognoscere potest, & author in seq. indicat.

Pluribus veluti laminulis compactum] Hæ sibi invicem coeparum in modum appositæ videntur. Consule inter alios *Thomam Willis* *Tractatu dicto*.

Intra

cerebelli processus, ac sinus qui *quartus ventriculus* habetur, tum *principium spinalis medullæ* ipsum considerandum est.

SUBSTANTIA cerebri duplex videtur. *Externa*, quæ mollior, ac cinereo, luteove colore prædita: tum *interna*, quæ solidior, & colore candido perfusa. Hanc *medulla* illam *cortici* comparant.

CORPUS CALLOSUM est portio cerebri duriuscula intra divisionem illius anteriorem conspicua, cui à lateribus duo *ventriculi anteriores* subjacent.

Sunt hi **VENTRICULI** cavitates cerebri, sinusve amplissimi, tenui undique membrana induti, longitudine medullosum illius substantiam, ob flexum insignem, excedentes. Parte superiore, à latiusculo; obtusoque principio, versus tertium ventriculum, sive communem cavitationem nonnihil arctantur. Hinc parte postica denuo rotundius explicati deorsum ad cerebri basin incurvantur, falcisque æmula figura, paulatim versus priora attenuati, propè nervorum opticorum exortum desinunt.

Dividuntur in ventriculum *dextrum* & *sinistrum*, intercedente ab ipsa cerebri substantia tenui quodam septo, quod diductum quoniam admoto lumine transparet, **SPECULUM LUCIDUM** appellant.

Huic conjungitur superius **FORNIX**, substantia cerebri callosa, nomen hoc sortita, quod testudinis instar in ædificiis, sinus ventriculorum,

COMMENTARIUS.

Intra divisionem illius conspicua] Supra id velut supra pontem transeunt vasa duo admodum insignia & facile obvia attendenti. Unde miramur, illa nemini fuisse observata ante *Cassarium* in *Tab. Anat. Spigelio* additis lib. 10. *Tab. III. fig. I. Q. Q.* ubi oriri dicit à sinu quarto.

Ventriculi anteriores &c.] Horum Ventriculorum situm atque structuram ex *Barthol.* atque *Higlmoro* imo ipso *Willis* pete, ne nimium increseat opus nostrum. De usu ventriculorum vide prolixè *Sneiderum* & *Willis*.

Tenui undique membranâ induti] Negat hoc *Vesalius*, *Platerus*, *Rod. à Vega*, contra adfirmant *Massa*, *Arculanus*, *Benedictus*, de *Partibus*, *Carpus*, de *Vigo*, *Piccolhom*. *Baehnius*, *Arantius*, *Laurentius*, *Flud.* *Spigelius*, *Hofmannus*, *Lindanus*, *Plempius*, aliique plurimi, imò autopsia ipsa.

Dividuntur in *Ventriculum dextrum* & *sinistrum*, intercedente ab ipsa cerebri substantia

tenui quodam septo &c.] *Columbus* lib. 8. de *re Anatom.* cap. 1. *Piccolhom* lib. 5. prælect. *Anat. Lector.* 3. *Lindanus* *Physiol.* cap. 4. aliivè speculum hocce volunt esse Meningem duplicatam, adeoque respondere *Mediaſtino* pectoris. Sic ut similiter ac *Mediaſtinum* postquam pectus investit, revolvitur duplicatum à sterno ad spinam, ut distinguat illud, ita hæc tunica ab imis Ventriculis per latera adscendat ad corpus callosum: hinc jam geminata descendat ad fornem, atque ita superius cerebri cavum distinguat in duos Ventriculos. At verò quam incerta est sententia de duplicatura *Mediaſtini*, tam etiam hæc de septo Cerebri. Membranam hinc adesse, certum est, imò observante *Sylvio* cavitas intra membranam duplicem, ast nihil cerebri contineri intra eas nondum demonstratum. Dum autem distinguit, non constituit omnimodam separationem, inferiori enim loco, ubi fornix, duo

rum, ac molem deorsum inclinantis cerebri, sustinere videatur. Subnixa *cruribus* tribus, quorum *duo* posterius, versus cerebri basin deorsum porriguntur, & spinalis medullæ radicem juxta latera complexa, singulari subiecta prominentia, recurvoque veluti vallo, sinum inferiorem ventriculorum anteriorum utrinque designant. Arantius hippocampi, seu equuli marini, bombicumque nomen iis imposuit. Crus *tertium* fornicis supra communem dictis ventriculis cavitatem antrorsum extensum conspicitur.

Obvius præterea in anterioribus ventriculis PLEXUS CHOROIDES, è *membrana* subtili, minutissimisque *glandulis*, & *vasorum* varie complicatis ramulis contextus, qui tum à quarti sinus propaginibus, tum arteriæ carotidis, vertebralisque furculis suppeditantur. Elegans ejus & mira per sinum ventriculorum inferiorem distributio, tum vasorum ex eodem in basin sinuum propagatio conspicitur.

In hoc *plexu*, quemadmodum & in rete mirabili, sanguinem ad spirituum animalium generationem in cerebro præparari: *ventriculos* autem enarratos, juxta cum sequentibus, vel ad aëris, vel ad pituitæ redundantis collectionem comparatos esse, acceptior medicorum scholis, veriorque sententia est.

Etenim quæ media decurrit ventriculorum anteriorum valle rima, leviter diducta, TERTIUM exhibet, secundum veterum placita, cerebri VENTRICULUM.

In

COMMENTARIUS.

duo illi Ventriculi concurrunt, & constituunt tertium, commodè speculum septum hoc vocari non puto.

Plexus Choroides] Sic dictus à similitudine cum extimâ membranâ foetum ambiente Chorion appellatâ, ob vasorum per eam texturam, unde & *Rete Mirabile Recentiorum* ad differentiam illius quod *Galen*i dicitur, & in basi cerebri residet, si non ita manifestè in homine saltem in animalibus, de quo postea.

Surculis] Paucissimis tamen, nec adeo copiosis, quam vulgus sibi imaginatur.

In hoc plexu quemadmodum & in rete mirabili, sanguinem ad spirituum animalium generationem in cerebro præparari, acceptior Medicorum Scholis, veriorque sententia est] De hac actione, similiter ac omnibus aliis agere hîc animus non est, alibi ea exhibetur, interim legi possunt quæ de hac materiâ in *Anatome Cerebri* habet *Thomas Willis*.

Vel ad Pituitæ redundantis collectionem comparatos esse] Negabat hoc inter alios *Adrian. Falcoburgius*, dicebatque se in sanis dissec'tis nunquam aliquid pituitæ in Ventriculisprehendisse, licet in morbis concederet. Sed certè quandoquidem omnium Ventriculorum cerebri seriem natura continuaverit cum infundibulo, quis vocare in dubium potest, hoc ipso eam quasi intento digito nobis monstrare, usum illorum esse, ut cerebri excrementa pituitosa colligant, & deponant ad pituitariam dictam glandulam, indè per ductus ordinatos ad oculos partim, & nares faucesque partim ad palatum & os expurganda. Videri hîc possunt quæ habet *Schneiderus lib. 2. & Moebius cap. 21.*

Tertium exhibet Ventriculum] Latera quippe amborum, inferiora versus & ad se mutuo magis magisque contendunt, tandem velut

Ec

latera

In eo observabiles sunt *meatus* duo, quorum *anterior* deorsum fertur ad Infundibulum, eminente processu quem *puendo muliebri* comparant: *posterior*, quem *ano* assimilant, ad Spinalis Medullæ sinum fertur, & spatium illud præmonstrat, quod ejusdem medullæ principia mutuo concursu efformant, quatuor protuberantiis insigne, adeoque **QUARTUM** designat **VENTRICULUM**, inter cerebrum, & cerebellum vulgo constitutum. At vero sinus ille, quem quarti ventriculi nomine dignantur principes dissectionum auctores, cum cerebello potius insculptus videatur, paulo post, cum eo sectionis ordine perducimur, describemus.

Cæterum è **PROTUBERANTIIS** dictis aliæ minores sunt, cerebrique propriæ, quæ *Testes*, aliæ majores, quæ *Nates*, à similitudinis qualicunque rudimento nominari solent.

Iisdem contigua est **GLANDULA**, **PINEALIS** dicta, quod
pini

COMMENTARIUS.

latera navis in carinâ uniuntur, faciuntque foveam penè pari cum Ventriculis primis longitudine, figurâ Sphœricè triangulari, adeoque non absimili sentina navis.

Puendo muliebri comparant] *Vulva* dicitur. Aliis protuberantia quæ foramini huic adstat, nomine eo donatur.

Quod ejusdem medullæ &c.] Placent quæ hic ad hanc materiam facientia profert *Lindanus Phys. cap. 9. art. 1.* his verbis. *Et Cerebrum & Cerebellum de se promit geminos ramos. Utrumque ea parte, qua sibi mutuo vicina sunt, supraque ostium illud magnum, qua descenditur in Sacram fistulam. Nempe hoc loco utriusque lateris cum Cerebrum tum Cerebellum germinat quasi ramum. Rami Cerebri majores & in initio crassiores: Cerebelli minores & ubique quasi æquales sunt. Omnes primum sursum nonnihil & oblique progressi, hinc deorsum flectuntur penè eo modo, ac si digitum videas medio articulo flexum ad angulum. Faciunt itaque in flexura eminentiam quandam: & Cerebri quidem rami, majores & gibbiflores: Cerebelli autem, minores acutioresque. Istæ sunt, quos Testes Anatomici: illæ, quos Nates appellant, & revera hæcenus non satis sciverunt, quid essent. Docuit hoc nos primus Highmorus & Tab. 15. fig. 2. tam ad vidum exhibuit, ut & omnem dubitandi ansam abstrulerit, & palmam meruerit ante*

omnes. Rami isti quatuor, quia ubi primum germinant, & inflectuntur, undiquaque sunt à se invicem distitissimi, & hinc paulatim ad se mutuo inclinant, donec coeant: hinc fit, ut necessario inter ipsos relinquatur cavitas quedam, quasi ex quinque cavitatibus constituta: quarum nempe una fit inter Cerebri; una inter Cerebelli; duæ inter Cerebri & Cerebelli ramos sibi è regione sitas; una denique in medio omnium. Omnes non nisi una tamen Cavitas sunt, & assimilis pyramidi inversæ & cujus latera cavæ sunt. Hæc est illa cavitas, quam Galenus lib. 8. de Usu part. cap. 12. & 14. Cerebelli: lib. 9. de Admin. Anatom. cap. 4. posteriorem: Bartholinus lib. 3. Instit. Anatom. cap. 4. nobilem: cæteri Anatomici ordinariè quantum ventriculum: Arantius Anatom. observ. cap. 7. cisternam vocant. Confer. quæ sunt ad Hofmannum in de Usu part. num. 631. & seq. aliquot. & 644. Plura hac de materiâ eam illustrantia vel corrigentia ex Thomæ Willis Anatome cerebri peti possunt.

A similitudinis qualicunque rudimento] Nomina hæc ridicula à Veteribus his particulis imposita creduntur, ut etiam pueros suos docerent & ad difficile cerebri examen pellerent.

Glandula pinalis] Dicitur & *Conarium* à cono. Lapides in eâ aliquot in dissecto cadavere

pini turbinatum fructum figuræ quadam similitudine repræsentet. Est autem *Substantia* duriusculæ, facile resolubilis, tenuique *membrana* succincta. *Præponitur* meatui posteriori ventriculi tertii, canali scilicet, qui ad finem principio spinalis medullæ insculptum ducit, sive valvulæ, sive firmandi plexus choroidis munere fungatur.

Iam cerebro, ablatis per dissectionem partibus superioribus, ad latus reclinato, cerebelloque detecto, basis utriusque cum spinalis medullæ principio patescit, à quibus *Nervi* communem originem trahunt.

Sunt autem *Nervi*, vasa ejusdem cum cerebro *Substantia*, tenues, candidosque funiculos, si primum secundumque par excipias, exprimentia, quæ meningum interventu copulata, longos, teretesque canales efformant, per quos spiritus animalis, sensus motusque localis auctor, in partes corporis singulas defertur.

Venas adipiscuntur, & *Arterias*, nutrimentum, vitalemque calorem subministrantes.

Cavi-

COMMENTARIUS.

vere invenit *Paulus Barbette* Pract. Amstelod. expertissimus, præsentè Medico Clarissimo *D. Math. Slado*.

Meatui posteriori] Quem *ano* assimilari modo dixit.

Valvulæ munere fungatur] Eundem habere usum, quem & reliquæ glandulæ venis appositæ, ut earum scil. divisiones firment, testatur *Baubin*. Specialius nos rem hanc declaratos judicamus, si dicamus cum Recentioribus aliquibus Glandulam hanc eum in usum hoc loco à natura collocatam, ut foramen, per quod vena exiverit ejus beneficio obturetur, ne impuritates, Cerebri in Ventriculis congregatæ, per illud in quantum Ventriculorum vulgo dictum deferantur, adeoque sic spinalis medullæ principium comprimendo efficiant, ne ad partes inferiores Spiritus deferri queant. *Carthesius*, & qui eum sequuntur existimant, Glandulam hanc in medio Ventriculorum in vigilia Spiritibus perpetuò distentorum sitam. 1. omnium objectorum motus excipere. 2. animam in hac sola per hos motus, sensibilia externa, & omnes Ideas, quæ à quinque sensibus proficiuntur, apprehendere, tanquam in centro, & discernere, atque deinde ejus ope Spiritus ad varios nervos mittere, sicut in speculo Sphærico exili

omnia eo ordine recipiuntur, quo vel in campo vel musæo sunt. Sed quandoquidem exculta nondum satis hæc est doctrina, eam quam cum *Highmore* Author noster proponit, æquo commendamus lectori, donec de hæc melius constiterit.

In finem spinalis medullæ principio insculptum] Ad quartum nempe vulgò habitum Ventriculorum.

Sunt Nervi &c.] *Structuram*, inquit *Mœb.* pag. 606. Nervorum quod attinet, omnes Cerebri Nervos, exceptis Opticis, & Oculorum motoris, ex plurimis filamentis, simul complexis conflatos esse notabis, quæ quidem filamenta origine sua sunt discretæ, mox in unum coalescunt amplexu membranæ firmissimæ, quæ revulsæ facile filamenta separantur. Confule de Nervorum omnium naturâ constitutione, distributione, & Usu, quæque eo faciunt Tractatum aureum *D. Willis de Nervorum descriptione*, & quæ exinde à nobis translata sunt in Commentaria hîscæ subjuncta.

Per quos Spiritus &c.] De usu Nervorum *Mœbius* loco dicto varias sententias habet, *Galen*i nempe, *Hippocratis*, *Backii*, *Gliſsonii*, & *Charleton*. Concluditque genuinum eorum Usum esse, 1. ut Spiritum animale elaboratum in Cerebro motuque ejus ad medullam

Cavitatem quidem oculis observabilem non habent, cum albicante potius medulla stipati intus videantur: diffundi tamen per eos tenuissimam illam substantiam, abunde tum vulnera, tum obstructions, quibus affliguntur, arguunt.

Mira servandis iis naturæ solertia est. Nam & ex alto, & quodam insuper flexu, nervos ad partes sibi destinatas deducit. Per meatus vertebrarum abituros, seminalis substantiæ indumento munit, atque exauget. In plurium concursu, plexum ante, & commune veluti foedus instituit, imo ganglio similem substantiam prius circumfundit, quam ulterius evagentur. Denique longius excursuros, in progressu ipso duriores reddit, & tanquam vires unitura conjungit.

Inter nervos igitur, qui intra cranium exortus suos habent, anterieus protinus sese conspiciendos exhibent *nervi olfactorii*. Principium ducunt exile à basi cerebri, ultra foramen processus petrosi, quod nervum quinti paris admittit, paulatimque viciniore facti, & crassiores, supra Os Ethmoides protenduntur, intercedente processu, quem cristam vocant. Extremis suis tumiduli *Processus* exprimunt *mammillares* dictos: quamvis hi in animantibus, quibus odora vis major est ampliores pariter, ac conspectiores observentur.

Sequitur proxime *par nervorum*, è veterum recensione *primum*, & *Opticum* dictum, magnum quidem, sed molle, præque cæteris porosum. Id posterius à spinalis medullæ initio, qua crura fornicis duo exporriguntur, profectum, in medio sese itinere jungit, ut facilis spiritui ab uno

COMMENTARIUS.

oblongatam & spinalem deductum hauriant, & ad partes pro motu, sensu, nutritioneque promovendâ vehant. 2. ut simul succum alimentarem, quo ipsi nutriuntur, è medullâ imbibant.

Longius excursuros in progressu suo duriores reddit] Quo cerebro, undè proveniunt, viciniore sunt, eò propter illius humiditatem humidiora sunt, & per consequens debiliora. Notante id *Jul. Caf. Placentino*, lib. I. de *Organis vocis*. cap. 8.

Processus exprimunt mammillares] Hoc organum verum odoratus esse neutiquam admiserim, sed separatos nervos. Ut pluribus demonstravit *Sneiderus de osse cribriformi*, & *Catharris*.

Magnum quidem] Imò maximum omnium totius corporis; si enim eos singulos seorsim

sine fibris spectes, nullus est crassior in universo corpore nervo optico. In brachio quidem & femoribus maximi habentur, ast simplices non sunt, ex variis nervis compositi. Accedit hoc quod Visorii in suis principiis bono intervallo disjuncti, at verò in medio ubi coalitus est, notabilem crassitiem habeant.

Præque cæteris porosum] Nervum opticum revera perforatum esse demonstrare nititur *Plempius Ophthalm. lib. I. cap. 19.* ubi sex requisita recenset, ad investigationem foraminis hujus necessaria, quæ sunt, ut animal cuius oculus dissecatur sit magnum, nuper mactatum, clara lux, culter acutissimus, nervus non comprimatur aut extendatur; & denique ultra coitionem dividatur.

In medio se itinere jungit] Disceptatio hæc inter Anatomicos est, an conjunctio hæc per medullæ

uno oculo in alterum transitus fit, moxque separatim, per foramen utrumque primum ossis cuneiformis, in oculum tandem dextrum, finistrumque conscendit.

Sublato hoc pari venit in conspectum *Infundibulum*, membranofus canalis, qui à basi latiore paulatim angustior, ad glandulam subiectam redundans phlegma derivat.

Glandula ipsa adeo *pituitaria* dicitur, & in ephippio ossis cuneiformis reposita susceptas humiditates per foramina propinqua ad palatum deducit.

Secundum vero Nervorum par, *Oculorum motorium* ab opere dictum, prope primum paulo intimius originem consequitur, initio unitum, moxque sejunctum, per foramen secundum ossis cuneiformis ad oculos fertur, & palpebræ superioris, oculique levatori musculo, tum ejusdem adductori, & obliquo minori suis ramulis prospicit.

Huic nervum sociamus, quem propaginem minorem quinti paris appellant, qui à media cerebri basi profectus ad musculum recta oculum abducentem contendit.

Tertium nervorum par, à basi cerebri posterius originem mutuatur, atque in progressu præcedenti conjunctum in oculi specum deferitur, quam cum attingit, *duobus* spargitur *ramis*, quorum *unus* oculum supergressus, per canalem osseum, aut foramen ossis frontis, in palpebram superiorem, musculumque frontis, ac cutem distribuitur: *alter* ramus sub oculo, inter duas laminae osseas, procedens, dimissis tum ad Narium tunicam, tum ad Temporalem musculum furculis, per foramen ossis quarti maxillæ superioris in Labii superioris, aliosque Faciei musculos

excur-

COMMENTARIUS.

medullæ confuſionem fiat, an simplicem contactum, an verò etiam per intersectionem, adeò ut in dextro cerebri latere exortus finistrum oculum petat, & in sinistro dextrum. Ego cum *Plempio* aliisque per contactum seu connascentiam potius fieri dixerim; sic ut nervi in exortu duo & duplices sint, in progressu non confusi, sed copulati tantum, unoquoque suam substantiam secretam & separatam servante; ut hujus doctrinæ rationes ex *Plempio lib. 1. Opth.* peti possunt.

Ut facilis spiritui &c.] Propter quid nervorum opticorum conjunctio facta sit, diversimodè explicant Authores; nobis probabilissima omnium ea videtur opinio, quæ eam

inservire putat uberiori Spirituum in oculos distributioni, *Vesalius* enim exemplum habet Nervi optici separati nullo hominis incommodo. Vid. praxis *Senn. de Oculorum affectibus*, & *Thom. Willis in descript. Nervorum*.

Glandula pituitaria] Ab usu sic dicta, quod excrementa cerebri ex Ventriculis per infundibulum suscipiat. Rotunda esse dicitur *Fernelio* aliisvè, non tamen *inæquā* inferiori enim sui parte ubi reconditur in fellâ equinâ, gibbosa est, superiori verò ubi infundibulum recipit, sinuosa, & tota ejus circumferentia quadrata.

Susceptas humiditates] Non in poris saltem, quibus hæc pars plurimis abundat, sed & in

excurrit. Atque hoc par, aliis ramus primus, aliis propago prima & secunda tertii paris constituitur, qui id sequenti quarto pari jungunt.

Addimus pari tertio *nervulum*, qui à basi cerebri juxta prominentias, quæ Testes appellantur, ortus, orbitamque oculi ingressus, ad Trochlearem ejus musculum fertur.

Quartum par, à basi cerebri cum præcedente, sed antè paulo ortum, descendit per offis Cuneiformis foramen sextum, sicque pergens, postquam Temporalis præcipue musculo, Alari item externo, & buccis, tum Maxillæ superioris Dentibus, Palato, ac Gingivis ramos impertitus est, fertur in foramen inferioris Maxillæ internum, dentiumque radicibus surculos præbet, atque ex ejusdem maxillæ externo foramine denuo egressus in Labrum inferius, illiusque cutem spargitur. Qui superest ramus hujus paris insignis, transiens per musculos in ore latentes, in latera Linguae propagatur.

Ab hoc quoque pari non alienus est *Nervulus*, quem simpliciter veteres quartum par constituunt, & in Palatum ejusque tunicam se diffundere tradunt.

Par Quintum è spinalis medullæ principio, qua parte cerebello continuum est, proficiscitur. Suscipitur intra petrosi processus canalem proprium, sive foramen primum offis temporum. Portione constat molliore, quæ potissimum auditus organo prospicit: tum *duriore* altera, quæ per foramen Cœcum antiquis nuncupatum, extra cranium, inter Mammi-formen processum, appendicemque stylo similem delapsa, Maxillæ musculis, Faucibus, atque Auris etiam externæ cuti sese miscet. Hujus progressum in aures vid. cap. XVI. Fig. XII.

Par Sextum, quinto paulo inferius exoritur, descendensque per foramen tertium offi Temporum cum Occipite commune, & utrinque per internos externosque ramos divisum, mirabilem illam nervorum, per medium, infimumque ventrem sparforum varietatem parit: quorum in partibus singulis, ac præcipue Capite tertio hujus tractatus, mentio facta est.

Septimum tandem *par* è medulla cranio iam egressura producitur, cæterisque durius, per quartum & quintum Occipitii foramen delabitur. Superato cranio, sub communi involucro sexto sese pari conjungit,

COMMENTARIUS.

cavitate, quâ aliquali in medio suo prædita | re hîc valdè utile quæ de hujus partis naturâ
est, ut ingeniose indicat *Fernelius*. Consule- | est usu habet *Schneiderus lib. I. de Catharris*.

Circa

git, à quo, postquam particula aliqua sui oblata secessit, partim in ossis Hyoidis cartilagines, partim in Linguam ipsam distribuitur: de quo vi. de Tabulam Capitis Tertii Figura VII. & Tabulam cap. XI. Fig. XVI.

Separatis Nervorum initiis, Glandulaque pituitaria ex Ehippii sinu eruta, consideratione dignus est circa basin cerebri ortus ex Arteriarum Carotidum ac Vertebraliū conjunctione PLEXUS veteribus RETIFORMIS dictus, recentioribus RETE MIRABILE: quamvis ejus sub humano cerebro rudior expressio vix comparationi locum permittat. Usus ejus cum plexu choroide idem est.

In CEREBELLO particulariter expenditur ipsius corpus solidiusculum, si cum cerebro comparetur, & in duos veluti globos distinctum. Inter hos PROCESSUS duo VERMIFORMES conspiciuntur: quibus circa posteriora truncorum spinalis medullæ tertius accedit, quem *Cerebelli pontem* Varolio nominare libuit: quanquam is simplex perpetuo non sit, sed aliquot veluti tuberculis inæqualis interdum observetur.

Cæterum inverso cum cerebro cerebello, medullæque dorsalis annexa portione, ac globis cerebelli blande diductis, in illius basi cavitas patescit, quam VENTRICULUM QUARTUM præcipui dissectionis

COMMENTARIUS.

Circa basin cerebri] Ad latera sellæ equinæ.

Retiformis] Ut enim rete piscatorium efficitur ex multis funiculis, ita & hic plexus; ut illud multis nodis inter se connexis funiculis constat, ita & hic. Hunc plexum in homine dari negat *Thomas Willis*.

Recentioribus rete mirabile] *Galenus* primus mirabile rete vocavit, cujus appellationis ergo acriter reprehenditur à *Vesalio* & *Columbo*, plexum vasorum in Ventriculis multò esse hocce artificiosiore, adeoque majori jure mirabilis nomen ipsi competere contendebat. Sed sanè inanis est disceptatio, *Galenus* enim non negat plexum vasorum in Cerebro elegantem admodum adeoque & mirabilem esse, hic autem qui à lateribus sellæ equinæ utrimque mirabilior ipsi; vis causam? dicam. Ex suscepta illo ævo sententiâ putabatur *Galeno* mirabilior ille contextus, qui ex solis Arteriis constituitur, quam qui ex Venis æquè ac Arteriis cum interpositis glandulis. Imò mirabilis æquè, si non mirabilior hic plexus est ad latera sellæ equinæ, quam qui in

Cerebri Ventriculis, in brutis animantibus, ad quæ *Galenum* maximè respexisse dici etiam potest, capiti humano Rete admirabile ut peccudis capiti qui assignat, in varios ipse laqueos induit se ac irretit sponte.

Vermiformes] Quod vermibus similes, non quidem cuius, sed quales in putridis lignis nascuntur, brevibus nimirum & crassis.

Ventriculum quartum] De hoc *Valverdi* lib. 5. *Anat. cap. 4.* Tribus hisce Ventriculis cerebri, alius insuper accedit, qui exigua cavitas est, dorsalis medullæ initio & cerebello communis, in quam tertius Ventriculus pertinet, quæque quartus Ventriculus cunctis dicitur; etsi non video, quam benè id ei nominis adaptent. Sed Ventriculus appelletur, an non, parum omnino interest: illud intellexisse sufficiat, ipsum adesse, nihilque præter aquam in se continere. *Hoc sicuti in demortuis quandoque verum est: ita in sanis nunquam. Quod dicat exiguam cavitatem esse, verum est, in comparatione ad dextram sinistramque. Cæterum Arantius ea amplitudine dicit esse, ut non*

sectionum professores constituunt. Herophilus ventriculum principalissimum, Arantius cisternam appellabat. *Subrotundus* quidem ejus ambitus, latiusculus tamen, & duobus veluti sinibus distinctus. Limini ejusdem, qua finum spinalis medullæ contingit, processus vermiformis imminet, ac tenui insuper *membrana* obducitur. In ea puriorem aërem, ex anterioribus ventriculis haustum, ad spirituum animalium refectio- nem, asservari, vero dissentaneum haud videtur.

Dependet à cerebro, cerebelloque SPINALIS MEDULLA, utriusque geminatus veluti truncus, ab ampliore duplicique *bulbo* deorsum porrectus, à quo intra vertebrarum ampla foramina tanquam thecam recepto nervi omnes in ambitum corporis atque extrema distribuuntur.

MEM-

COMMENTARIUS.

non admodum grandis possit in hoc sinu facile recondi. Quod dicat, non recte Ventriculum dici: in hoc sibi assentientem habet Spigelium lib. 10. de human. corp. fabric. cap. 7. cujus de quarto hoc Ventriculo hoc judicium est. Si rem æqua metiaris æstimatione, Ventriculi nomine prorsus indignus est: cum in ipsa cerebri cerebellivè substantia non sit situs, neque primaria intentione à Natura exsculptus; sed ex corporum dispositione talis emergat. Non placet hoc Bartholino l. 3. Anatom. ref. cap. 4. nempe quia destruunt principalissimi Ventriculi nobilem usum, tantopere in Patris gratiam dilectum defensumque. Sed audi, famigeratissime Vir, Highmorus (lib. 3. Disquisit. Anatom. part. 1.) accuratissimum Anatomicum, neque enim pigebit colligere & exscribere, quæ sunt ibi statumina sententiæ ejus, quam meo consensu ac certa ratione foveo promoveoque, prorsus nullius usus esse hanc cavitatem, tantum esse ex necessitate. Dicit pag. 214. cavitatem hanc abusive quartum Ventriculum nominari. Pag. sequenti: Ex contiguo corporum eorum rotundorum, natium testiumque, spinam versus progressu cavitatis illa, quam quartum Ventriculum appellarunt, efficitur. Quæ verè nihil aliud est, quam intervallum, quod ex concursu quatuor horum corporum rotundorum ob figuræ necessitatem sequitur & formatur. Pag. 216. De quarto Ventriculo Galenus ait 8. de usu part. 10. illum spiritus in superiori- bus elaboratos recipere, & ad cerebellum

deducere. Sed quicumque hujus Ventriculi structuram examinaverit, facile concedet posse Galenum errare. Quid ni, homo fuit. Ita de hoc Ventriculo disserit Lindanus Phys. cap. 9. pag. 456. Cognitu considerationeque etiam digna sunt, quæ de eodem Ventriculo habet Thom. Willis.

Vero dissentaneum haud videtur] Imò dissentaneum omninò esse jam vidimus, ubi aërem cerebrum, indeque & hunc Ventriculum ingredi negavimus.

Utriusque geminatus veluti truncus] Etenim inquit Lindanus Physiol. pag. 458. divisuræ illæ, inter radices seu ramos inconjunctos manifestæ, nisi ad sensum non pereunt, testibus ratione & sensu. Hic dicit, leviuscule coctam facili negotio in duas partes dividi. Illa dicit, posse in quatuor, si accedat industria, quia singuli rami involuti sunt Meninge tenui, assumpta ab ea cerebri vel cerebelli parte, cui ortum debent. Iterum illa dicit, hujus discriminis ratione fieri Paralyzin dextram aut sinistram. Heic, ait Highmorus l. 3. part. 1. cap. 7. ineffabilem Naturæ providentiam decantare debemus, quæ cæteras partes penè omnes gemellas constituens, ut læsa una altera totum præstet officium: hic non solum binæ, ut sic dicam, cerebra fabricavit, Cerebrum scilicet & Cerebellum: verum etiam utrumque ita divisit, ut vel unica quarta pars sana ac integra existens, spiritus ad vitam sufficientes effingerentur. Atque ideo à productionibus illis quatuor Medullam & spinam constituentibus, Nervi omnes emanant.

Venis

MEMBRANIS obducitur duabus, ut cerebrum.

SUBSTANTIA in progressu paulo duriore prædita, VENIS, ARTERIISQUE vertebrarum foramina subeuntibus respersa, ut sanguine, & spiritu vitali perfundatur.

Circa principia sua, ut dictum, manifeste DIREMPTA quidem est, & SINUM exhibet teretem, in acumen paulatim desinentem, fissuraque tenui distinctum. Herophilus calamo, qua parte ad scribendum excisus est, comparabat: alii quarti ventriculi iam propositi partem constituunt.

In progressu tamen paulatim jungitur, externa specie simplex; sed per sese vere *multiplex*, in nervulos vix numerabiles distrahitur: quorum pluribus aut paucioribus ambientem membranam permeantibus, in rimum deinde unicum collectis, tot paria per foramina vertebrarum distribuenda producuntur.

Et ex vertebra quidem cervicis septem feruntur paria: quorum superiora tria capitis, collique musculus suppeditantur, quartum item cervicis, scapulæque musculos accedit. Quintum, sextum, & septimum in brachia excurrunt: de quibus capite ultimo tractandum fuerit. Dorsum si medulla duodecim paria subministrat, membranis pectoris, tum dorsum si, costarumque musculis dicata: quamvis superiora duo brachio pariter prospiciant. Lumborum medullæ quinque assignantur paria: sex vero ossi Sacro, è quibus quæ ad pedem feruntur capite postremo particulariter describentur.

COMMENTARIUS.

Venis arteriisque Sc.] De his Schneiderus lib. 3. de Catharris cap. 4. pag. 155. Sc. Et Thomas Willis in Nervorum descriptione Cerebrique anatome.

In progressu tamen paulatim jungitur Sc.] Erroris hic aliquot notandi sunt, qui à plurimis Anatomicis committuntur. Quorum primus est quod depingi curent spinalem medullam à cerebro ad os sacrum semper angustari & gracilescere, quod falsum esse quivis accuratè circino explorare potest. Secundus est, quod putent, figurisque declarent nervos recto ductu ex spinali medullâ deferri per foramina vertebrarum, nervus enim quilibet ex spinali medullâ ortus paululum deorsum progreditur, antequam per foramen suum vertebrale exeat, & quo magis inferius nervi ex ea

oriuntur, eò etiam magis deorsum feruntur & longius descendunt, antequam extra foramina deferantur. Tertius est, quod depingant spinalem hanc medullam acutè in fine definire, cum revera in plurima filamenta, & nervosas partes plurimas definat, unde & Cauda ibi equina dicitur, quæ optime videtur, si in aqua tepida concutiat, è corpore exempta. Quod autem ita errarent causam puto, quod non discernerint spinam vel in ejus constitutione cognoscendâ non ita laboraverint, idque factum judico quod vel in alia tamdiu inquisiverint, donec cadaver inidoneum factum fuerit, vel aliis negotiis fuerint distracti, ut non habuerint tantum otii ad ea inquirenda, vel si dissecaverint, non habuerint pictorem excellentem ad manus.

TABULÆ I. CAP. XIV. Declaratio.

Exhibet hæc Tabula Prima Cerebrum Cranio denudatum, cum tenui, duraque Meninge, Sinus item ejusdem, & Processus, tum quicquid superius Sectio detegere potest.

FIG. I.

- AA Dura Meninx Cerebrum adhuc operiens.
 aa Vena & Arteria per eandem sparsa.
 B Cerebrum piâ tantum Matre vestitum.
 bb Anfractus Cerebri.
 ccc Vasa è Sinu tertio ad Tenuem Meningem sparsa.
 C Dura Meninx deorsum tracta.

FIG. II.

- AA Processus longior dura Meningis, Falx dictus, extra situm conversus.
 aa Sinus Tertius dura Meningis apertus.
 bb Sinus ejusdem inferior minor.
 BB Corporis callosi portio detecta.
 CCCC Cerebrum ad latera nonnihil diductum.
 ccc Vasa è Sinu quarto per corpus Callosum protensa.
 DD Meninx dura utrinque dependens.

FIG. III.

- AA Cerebri substantia dissectione aquata.
 BB Corpus callosum extrorsum aliquantulum diductum.
 bb Crura duo Fornicis nonnihil detecta.
 C Processus Falcatus retrorsum abductus.
 DD Ventriculus anterior dexter parte superiore detectus.
 EE Ventriculus anterior sinister similiter apertus.
 FF Plexus Choroides.
 G Speculi lucidi portio.
 HH Dura Meninx utrinque detracta.

FIG. IV.

- AA Cerebrum aequali sectione explanatum.
 B Fornix sublata, & deorsum reflexa.

- CC Ventriculi anterioris dextri pars superior diducta.
 DD Ventriculi anterioris sinistri pars superior similiter explanata.
 E Rima Tertium Ventriculum designans.
 FF Dura Mater.
 a Glandula Pinealis.
 bb Protuberantia, qua Nates dicuntur.
 cc Protuberantia, qua Testes nominata.
 d Protuberantia, qua Vulva appellatur. At hæc cum Glandula, & Testibus, in Tabula sequentis figura prima, accuratius expressa est.


FIG. V.

- AA BB CC Cerebrum, & Ventriculos anteriores innuunt, parte superiore explanatos.
 ff Plexus Choroidis portio, per anteriores Ventriculos superius protensa.
 D Processus dura Meningis brevior.
 EEE Ejusdem Processus longior, Falcatus.
 F Torcular Herophili.
 G Dura Mater detracta.
 a Dura Meningis sinus primus.
 b Dura Meningis sinus secundus.
 ccc Dura Meningis sinus tertius.
 d d d Sinus in Processu falcato minor.
 e Sinus quartus dura Meningis.


FIG. VI.

- AA BB CC ff Eadem qua in quinta figura denotant.
 DD Cerebellum in situ naturali conspicuum.
 E Processus Cerebelli Vermiformis.
 FF Dura Meninx dependens.
 GG Eadem cum sinibus deorsum compulsa.


I




IV




II




V



III



VI



TABULÆ II. CAP. XIV. Explicatio.

Tabula hæc grandioribus repræsentat figuris, tam Cerebri, quam Cerebelli sinus, prout retenta priscorum Dissectione, detegi, ostendique possunt.

FIG. I.

Demonstrat hæc Figurâ inferiorem Sinum anteriorum Cerebri Ventriculorum, exortus Nervorum opticorum, tertii Ventriculi partem, & Quartum vulgò dictum Ventriculum, cum protuberantiis, quas obtinet. Fornicis quoque crura, & quicquid ejus Hippocampo, seu potius Bombyci Arantius comparavit.

- AAAA** Dura Cerebri Membrana hinc inde detracta.
B Processus Offis cribriformis, crista similis.
CC Offis sphenoidis pars, sub Membrana ablato Cerebro se proferens.
DD Processus Offis sphenoidis anteriores, sinum Ephippii ex parte producentes.
EEEE Portio Cerebri à sectione superstes.
F Fornicis crus anticum, in posteriora deflexum.
GG Expansiones Fornicis, qua crura dicuntur postica.
HH Hippocampi Arantii, vel Bombyces ejusdem.
IIII Sinus inferior Ventriculorum anteriorum.
K Corporis callosi extremum, natium instar protuberans.
L Glandula Pinealis dicta.
MM Protuberantia testibus aequiparata.
NN Sinus inter Cerebrum, & Cerebellum, Quartus vulgò Ventriculus habitus.
OOOO Plexus Choroidis pars reflexa, qua per superiorem Ventriculorum sinum ferebatur.
PP Basis Cerebri portio anterior.

Q

Fundus Ventriculi tertii, in quo foramen posterius, quod ano comparant, ad principium Spinalis medulla tendit: antè foramen, cui protuberantia vulva similis præponitur, ad infundibulum fertur.

R R R R

Plexus Choroidis portio reflexa, qua per sinum inferiorem IIII extendebatur.

SS

Nervorum opticorum radices.

T

Nervorum opticorum unio.

VV

Nervi optici denuò sejuncti, & versus Oculos porrecti.

FIG. II.

Exprimit hæc figura Ventriculum Cerebelli proprium, quem quartum Ventriculum præstantiores Anatomici constituunt.

- AAAA** Cerebelli lobus uterque à Sectione integer.
B B B B Interna Cerebelli facies incisione detecta.
CC Processus Cerebelli vermiformis, cujus pars superior rotundiorque sectione ablata.
DD Ventriculus proprius Cerebelli, duobus sinibus excavatus.
E Prominentia inter duos sinus conspicua.
F Foramen meatus, qui è tertio Ventriculo ad Spinalis medulla principium fertur.
G Sinus Spinalis medulla, calamo, qua parte scriptioni aptatus est, similis.
H Rima in sinu dicto observabilis.
II Truncus descendens Spinalis medulla abscissus.

Fig. i.





FIG.

II.



T A B U L Æ III. C A P. XIV. *Declaratio.*

Ostendit hæc Tabula Nervorum intra Cranium exortus : tum Ramos præcipuos tertii, & quarti paris. Hinc Glandulam Pituitariam, cum Infundibulo, Rete mirabile, Ventriculum quartum, & Nervos insigniores, a Spinali medulla profectos.

F I G. I.

Cerebrum, magnâ ejus portione superius ablata, cum cerebello ad latus ductum, in quo

- A* Nervus olfactorius.
a Processus ejus Mammillaris nuncupatus.
B Nervus opticus scilicet primi paris.
CC Nervus secundi paris.
DD Nervus tertii paris.
EE Nervus quarti paris.
FF Nervus quinti paris.
GG Nervus sexti paris. Nervus septimi paris ob profunditatem ortus sui non apparet.

F I G. II.

Effracto à latere Cranio, cum Oculi specu, maxillaque divisa, detegitur

- A* Nervus tertii paris.
B Ramus ejus, qui per foramen Ossis frontis egreditur.
C Ramus ejusdem paris, qui per foramen Ossis quarti maxilla superioris prodit.
D Nervus quarta conjugationis.
E Ramus ejus, qui ad maxilla superioris dentes, & Gingivas abit.
F Ramus quarta conjugationis, qui fertur ad linguam.
G Ramus ejus, qui maxillam inferiorem ingreditur.
H Ramus idem, quo loco maxilla foramine anteriùs egreditur.

F I G. III.

Cerebro cum Spinali medulla inverfo, conspiciuntur sequentia.

- AA* Nervi olfactorii.
aa Eorum Processus mammillares.
BB Crura duo Nervorum primi paris.
CC Arteria Carotidis ramus major, interior, Arteria vertebrali *oo* conjunctus.
D Glandula Pituitaria.
E Infundibulum.
F Protuberantia Cerebri meatui preposita, qui ad Infundibulum pituitam ducit.
GG Nervi secundi paris abscissi.
HH Nervorum tertii paris initia.






- II* Nervorum quarti paris initia.
KK Nervorum quinti paris origo.
LL Nervorum sexti paris exortus.
MM Nervorum septimi paris principia.
NNN Principium Spinalis medulla, intra Cranium ad primam Vertebra præsum.
OO Ramus communis Arteriarum vertebrarum, qui divisus post unionem, datus Arteria carotidi *CC* se jungit, circa sellam Ossis cuneiformis plexum retiformem cum ea constituit.
PPPP Ramuli Arteriarum minuti, qui nonnullis Rete mirabile designant.

F I G. IV.

- AA* Cerebellum, ejusque glôbi.
B Processus Cerebelli vermiformis.
CCCC Processus Cerebelli pontem innuentes.
DD Spinalis medulla principium.
E Sinus Spinalis medulla Calamo scriptorio comparatus.
F Quartus Ventriculus ex parte detectus.

F I G. V.

- A* Truncus descendens Spinalis medulla, prout exemit corpore publicè ostendi potuit.
BB Rami è tribus Cervicis, & duobus Thoracis Nervorum paribus orti, ad manum distribuendi.
bb Ramuli ad scapula Muculos excurrentes.
CC Primum par Nervorum manus.
DD Par secundum.
EE Par tertium.
FF Par quartum.
GG Par quintum.
HH Par sextum, quod Subcutaneum dicitur.
IIII Paria Nervorum Intercostalium, è quibus tamen inferiora duo ad Lumbos pertinent.
K Primum Par, quod ad pedem fertur.
LL Par secundum.
MM Par tertium pedis.
NN Par quartum, & maximum.
O Nervi Spinalis medulla minuti, qui ad Vesicam, Anique Musculos, tum genitalia utriusque sexus porrecti.



CAPUT XV.

De Oculis.

INter externos sensus, eximia præ cæteris videndi facultas lucidis oculorum orbibus indita, quos animi vascula & fenestras, visibilem ejus partem transmittentes, amorisque faces, haud vane veteres prædica- runt.

Lustrandæ primum PALPEBRÆ sunt, oculorum velamenta, quæ

COMMENTARIUS.

ANimi vascula] In oculis quoque Veteribus religio fuit, siquidem in his imago & natura hominis ac tacitus sermo mentis maximè exprimitur. Quemadmodum enim cauda leonibus, aures & nares equis, animorum indicia præstant, sic ex oculis hominum mentis imago apparet. Et enim ex his virtutes vitiaque agnoscimus; iratum vel propitium, animum letum aut affectum perpendimus; dignitatemque oris oculi exhibere consueverunt, vitamque à morte distinxerunt. De quâ re prolixè & eruditè disputat Levin. Lemnius; ubi quoque dicit: Medicos in morbis studiose oculorum constitutiones contemplari. Si enim rubore perfusi sunt, aut sanguineis filamentis striati, ex cerebri inflammatione, furorem ac Phrenesin indicant. Quod si livescant, aut plumbeo nigroque colore perfusi sint, caloris nativi extinctionem, vitæque interitum denunciant. Instabiles autem, pernicktantes, mobiles, inquieti, inconstantes, mentis alienationem & delirium designant. Languidi, humentes, flaccidi, lachrymis perfusi, tenebrosi, tremuli, rigidi, vibrantes, tumidi, cavi, conditi obtusi, conviventes, præter diversos animi defectus, in sanis, tum in ægrotis non sine vitæ perniciæ, cerebri intemperiem, ex humorum copia vel defectu, caliditate aut frigiditate commostrant. Lufci pero, peti, strabones, & qui obliquo fidere limisque obtuentur, præter contortos atque in diversum convulsos musculos, hujus naturæ errorem consecuti sunt. Quod vitium quoniam circa cerebrum mentis domicilium, vel potius regiam consistit, ut foris nonnihil oculos deformat, ita animum quoque quibusdam vitiosis affectibus imbuït, &c. Sic de oculis habemus egregium exemplum apud Li-

vium. Memoriam enim tradidit, quod oculi Romanorum visi sint ardere in prælio Samnitibus. Et Aquileienses milites, qui subito eruptione ex occulto cuniculo facta Attilam paucis comitatum invaserant (quem tamen non noverant) postea falsi sunt, se nulla re magis perterritos fuisse, quam quod in ejus oculis scintillas veluti igneas, quum pugnans eos fremebundus aspiceret, emicantes conspexerint, sicut P. Callimachus & Nicolaus Olahus scribit. Non frustra igitur Cornelius Tacitus dicit: Primi in omnibus præliis oculi vincuntur. Sic in historiis legimus C. Marium, à Minturnensibus percussorem inmissum vultus autoritate deterruisse, ob eamque rem incolumem dimissum, ut Plinius testatur. Huc referri potest, quod Aristoteles & Adamantius Physiognomici observarunt; Eos videlicet, quibus subsanguineos oculos natura attribuit, esse inverecundos, & audaces: iracundos, quibus siccos: ebriositatem humidos oculos denotare: subrubescentes, si late pateant, intemperantis oris hominem, mulierosum, stolidum & aleonem. Si glauci sanguineique fuerint, hinc caliditatem, inde vesaniæ proximorem audaciam coarguent. Hinc etiam apud Homerum Achilles caninos oculos ob impudentiam objicit Agamemnoni; quod canes plurimum oculis sanguine suffusis conspiciantur. Camerarius Oper. subciv. pag. mihi 252.

Palpebræ] A palpitando Latinis dictæ, quod tam inter loquendum, quam aliàs frequenter palpitent, id est celeriter motitentur, unde variis apud nos Winck-hæuten dicuntur. Græcis palpebra βλέφαρον dicitur quasi φάλαξ βλέφον operculum visus, obturant enim & te-

quæ exterius CUTE CONSTITUUNTUR tenella, quamque pinguedo nulla stipat interius Pericranio succinguntur.

Intercedit has partes MEMBRANA vere *carnosa*, quippe cui *Musculi* duo *palpebrarum clausores* dicti intexuntur, quorum capite decimo tertio meminimus: tum *Musculus*, qui palpebram superiorem attollit, singularis, qui circa foramen nervi optici intra thalamum oculorum exortus, & à tenui carnosoque principio paulatim diductus, lato tendine pariterque subtili, in palpebræ dictæ marginem expanditur.

Extremis illarum CARTILAGINES inducuntur, quas *Tharfos* Græci nuncuparunt, ad palpebrarum stabilem expansionem, exactamque commissionem, inducto pariter exiguo musculo, comparatæ.

Efformant apertæ ANGULOS duos, qui veteribus *Canthi* nominantur: *minorem* unum, eumque *externum*, cui intra oculi orbitam glandula adjacet insignis, tum alterum *majorem* qui *internus*.

Recum-

COMMENTARIUS.

& tegunt visum. Palpebræ oculorum singulorum *duæ* sunt, una *superior*, altera *inferior*, quarum *hæc* in homine minor, *illa* major est, utraque deinde mobilis, ad mutuam contactum, adeoque oculorum occultationem, sed major etiam speciatim contrarium motum habet, unde oculi aperiuntur, adjuvante apertionem fortè etiam gravitate inferioris palpebræ.

Cute constituuntur tenella] Imò tenellior nuspiam est, adeò ut etiam obducta oculis splendorem aliquem transmittat. Vid. *Exerc. Phys. Senguerdii*. Et talis esse debuit, ut in motionibus palpebrarum commodissimè explicari & iterum corrugari queat.

Palpebrarum clausores dicti] De Motu Palpebrarum variorum varia iudicia. *Highmorus* & *Barthol.* cum paucis aliis solam superiorem moveri, inferiorem autem immobilem volunt, ut ex hujus *Anatom. lib. 3. cap. 8. & Vindicis Anatomicis, contra Hofmannum §. 34.* Ex illius autem *Disquisit. Anat. lib. 3. part. 2. cap. 2.* videre est. Alii contra, quibus & nos libentes accedimus, utrique motum adscribunt. Hinc *Plempius Ophthal. lib. 1. cap. 2. Palpebris*, inquit, *ita fabricatis motus necessario debebatur ob multas utilitates, & quidem moveri ipsas quilibet videt. Multos porro sua auctoritate Gale-nus seduxit, contendens inferiorem palpebram non solum non moveri; sed & magna incommoda*

parituram esse, si moveretur: qui si palpebras suas ample diduxissent, aciemque intendissent: inferioris palpebræ motionem minorem quidem quam superiorem, attamen manifestam conficcati fuissent. Enimvero si integumenta hæc officium suum usumque oculis præstare debebant, necesse erat & superius & inferius mutuo occursum coire, ut ita utriusque ope fieret celerior nictatio. Sensui igitur fidissimo testi accedentes, ambas palpebras mobiles esse constanter asseveramus. Quadrupedes binas habent palpebras, sed solam superiorem manifestè movent; homo utramque, sed superiorem manifestius movet; Volucres utramque movere possunt, sed loco superioris utuntur membranâ nictatoriâ, quam adesse autopfia docet.

Extremis illarum] Dicuntur hæc extrema vulgò *Cilia* ab antiquo verbo cillere q. ciere, quoniam moventur & cientur & quidem quam celerrimè, quamvis & ipsi pili palpebris infixi hoc nomine appellentur.

Tarfos] Tarsus dictus est ab ordine, quo dispositi sunt pili in palpebris, sicuti remi navium, digiti, & milites in acie dispositi sunt, *ἰσὶ τῷ τάττειν*. Alii Tarsum dictum volunt à *τέτρεται* à siccando, quoniam hæc palpebrarum particula dura, sicca & solida est.

Insignis] Major est & mollior altera, pinguedine involuta.

Recumbit in eo *CARUNCULA* spongiosa, & mollis, meatum subjecti ossis, qui ad nares pertingit, operiens, ut fluxum per eas lacrymarum impediat, unde lacrymalis dicta est.

In limbis palpebrarum cartilagineis, circa majorem angulum, prominente leviter callo, obvia sunt tenuia *FORAMINA* duo, *Puncta lacrymalia* nuncupata, immissam setam intra membranas palpebrarum perducentia. Conspectioria sunt in animalibus magnis, hominibusque in fletum pronis, & lacrymas oraque humectantes rivos suppeditant. Unde igitur liquor ille, inquires, in dolore tam foecundus, tam paratus? Non ab ipsis sane oculis, sed à cerebro, per secundum cuneiformis ossis foramen, tum à vertice capitis ac lateribus ad punctorum propofitorum ductus confluit. Hinc contingit, ut sauciata cum subjecto panniculo cūte, quæ ab externo angulo ad aurium helicem porrigitur, prodeunte limpidi feri magna copia, diuturna lippitudo celeriter sublata fuerit.

Inserti præterea palpebrarum extremis *PILI* sunt, in rectum crescentes, & longitudinem suam certa naturæ lege definientes, quorum occurfu, veluti objecto vallo, non tantum volitantia per aërem corpuscula oculis abarcentur; sed etiam inductis leviter umbris, intuitus luminosorum perfectior evadit. Perit eximius hic usus, quotiescunque sub naturali pilorum ordine plures nascuntur, atque introrsum converfi sphaeram oculi compungunt: quod nunc tumentibus, nunc laxatis immodice palpebris, evenisse compertum est.

OFFI-

COMMENTARIUS.

Caruncula spongiosa] Hæc in vivis aperto, abductoque oculo manifestè patet.

Ut fluxum per eas lacrymarum impediat] Hujus rei maximum indicium est, quod ii quibus hæc caruncula ex quacunque causâ absumpta est, laborent affectu eo qui *jaids* dicitur, qui perpetuo malas madore perfundit.

Puncta Lacrymalia] Ut in angulo interno foramina seu puncta lacrymalia duo observantur, ita & in externo duo se invenisse scribit *Marchette* satis patentia, quæ eundem ordinem tenebant, quam interna.

Conspectiora in animalibus magnis, & hominibus in fletu pronis] Egregiè de hac re disse-rit *Schneiderus de Cathar. l. 3. pag. 348.*

Pili] In rectum licet extenduntur, in sui tamen extremitate incurvantur quodammo-

do, sic quidem ut superiores frontem spectent, inferiores genas.

Longitudinem suam certâ naturæ lege definientes] Contemplatu dignissimum habetur, quod toto vitæ tempore nunquam accrescant aut decrescant, nunquam majores aut minores fiant, sed eadem ratione semper permanent. Ast de hac re valde dubito, saltem in superciliis falsum.

Volitantia per aërem corpuscula] Arena, fumus, animalcula, & similia, hoc experitur qui locum fumosum adit, statim claudit oculos.

Sub naturali pilorum ordine plures nascuntur] *terxiants* hic affectus dicitur, faciem deturpans & visum impediens; quale malum incolis Alexandriae in Ægypto familiare est; curationem vide apud *Hildanum & Sennertum.*

Officium

OFFICIUM palpebrarum conspicitur oculos humectare, aperire, claudere, obvelare, idque tanta muneris necessitate, ut nihil cogitantibus aut volentibus nobis finem tamen suum natura consequatur: rarissimumque adeo fit, constantibus palpebris, contra comminationem aliquam haud connivere,

Ad oculorum, frontisque confinia, SUPERCILIA produxit architectus divinus arcum crassiore cute prominulum, pilisque pressulis hirsutum: non tam formæ lenocinio, umbræque offundendæ gratia, quam ut defluentes per frontem sudores ab oculis summoveret,

Cæterum OCULI ipsi, visionis organa, multiplici partium apparatu instructi sunt, Vasis, Musculis, Membranis, ac Humoribus.

VENARUM aliæ externa sunt, atque in oculi albo spectabiles; interna aliæ, atque occultæ. Externa venæ à Jugularium externis ramis oriuntur: interna, quæ nervum opticum comitantur, ab internis jugularibus, plexuque choroide subministrantur.

Non dispar est ARTERIARUM series, quarum exteriores à Carotidis externo ramo assurgunt: interiores largiuntur carotides arteriæ, plexum retiformem cum vertebralibus constituentes. Ea res efficit, ut oblati externis irritamentis, effuso cum spiritu sanguine, oculi & rubescant facile, & vehementer sæpe inflammentur.

NERVOS fuscipiunt varios, è quibus insignis præ cæteris Opticus dicitur, qui spiritum visionis auctorem invehit, & substantiæ suæ veluti expansione quadam facta, triplicem oculis tunicam conferre videtur.

Huic

COMMENTARIUS.

Officium palpebrarum &c.] Qui benè rem totam considerat, quadruplicem usum palpebrarum maximè observat, quorum duo priores primarii sunt, reliqui secundarii. *Primus* est ut corneæ sordes nictando extergant. *Secundus* ut vehementia luminis arceatur, adeoque reddatur suggrundatione earum illustrior imaginum pictura; unde connivere nos videmus palpebris, cum quid exactius contemplari placet. *Tertius* ut oculis fiat umbra per somnum se & corpus totum recreaturis. Undè in vitæ periculo sunt, quibus umbraculi hujus beneficium denegatur, ut exemplum Attilii Reguli de quo Cicero ad Pisonem, testatur, qui resectis palpebris vigilando necatus. *Quartus* denique ut arceantur pulveres, fumus, animalcula & id genus alia.

Oculi] Quasi occulti dicti sunt Latinis, quod non tantum antè tegantur, verum in antris suis profundissimis occultentur, adeo ut omnes regiones cingant, quæ longius extant quam ipsi oculi, sic ut si quis sese vel baculo aut aliquâ re obtusâ velit percutere bulbos oculares nequaquam offendet, eò quod partes ossæ ictum accipiant. Græcis communissimè ὀφθαλμοὶ nominantur, quod veluti lectulus, & conclave sint visus.

Triplitem oculis tunicam conferre videtur] Meningis enim duræ propago in corneam abire dicitur, tenuis in veram medullam retiformem; Addit *Lindanus*, arteriosum ejus in Vitreâ transire tunicam. Credo cum D. *Slado* oculos prius formari, in pullo, quam Meninges cerebri.

Huic proximus alter est minor, qui juxta cum fociis nervulis duobus, musculos oculorum dispersis ramulis ingreditur, ab actione *Motorius* appellatus, quemadmodum capite præcedente pluribus traditum.

MAGNITUDO oculorum homini iam adulto mediocris est: NUMEROQUE gemini sunt, ut in alterutrius læsione haud deesset, qui in communis ac necessarij muneris subsidium veniret. Facit tamen admirabilis eorum consensus, ut uno præter naturam ab internis potissimum causis affecto, similis in altero noxa vel saltem languor vix arte ulla impediri queat, ut phlegmone, suffusioneque frequenter ostendunt.

Qualitatum conditionem si spectemus, ob contentos humores, frigidam quidem humidamque TEMPERIEM oculi præ se ferunt. Quam ipsam tamen haud parum minuit, caloris spirituumque per tot vasa copiosus influxus, qui tantus, ut ultra naturæ modum plusculum incalescentes, & specula sibi propinqua diffusis acribus calidisque radiis vitiare, & intuitu fixo alienis etiam oculis intemperiem ac labem communicare queant.

Imo lucem habent oculi *congenitam*, à qua tum humoribus inclusis, tum membranis splendor est. In homine quidem satis ea mediocris, qui diurnis actionibus occupandus erat: major in animantibus, quæ nocturnis venationibus victus indigentiam explorare debebant, quorum oculi clare fulgentes circumfusas tenebras facile vinct.

Vix alia corporis humani pars secundæ adversæque valetudinis signa manifestius profert. In homine sano pleni sunt, ac splendidi; in male affecto collapsi, mœsti, turbidi, obscuri, donec inter extremos triumphatæ naturæ conatus, vacillant, fractique luminis horrore tristes, casum virium omnium, & vitæ pariter occasum prænuntient. Denique vim omnem animi oculis inditam esse, veteribus persuasum fuit, quod nullius belluæ tam immanis impetus esset, cujus feritas obductis oculis non consideret.

FIGURA bulbi instar rotundi esse debuere, ut tam ad motum aptiores, quam ad imaginum visibilium receptionem commodiores se præstarent. Dignæ hac figura siderum æmulæ partes, & quarum beneficio stellarum ortus, obitusque metimur, quasque ante extremum funus cœlo ostendere prisco Quiritium ritu sacrum fuit.

CON-

COMMENTARIUS.

Licet habent oculi congenitam &c.] Hac in opere quod de luce Animalium accude luce fusè etiam egit *Bartholinus Fil.* eo ravit.

Ossa

CONSTITUIT oculos sapientissimus conditor in cranii celfo robustoque specu, ut vigilum in morem fortuitorum occursum prospicerent, ab externis pariter iniuriis ossæ in sede tutiores.

Actionem autem illorum ut rectius agnoscamus, musculos primum, deinde membranas, humoresque contemplabimur. MUSCULI oculos moventes *sex* in homine sese offerunt, quibus adeps interponitur copiosus, opportunum adversus exsiccationem frigorisque vim præsidium. Exiis quidam recti dicuntur, quia rectos oculi motus perficiunt, quidam autem obliqui.

Rectorum æqualis fere magnitudo, & crassities est, principiumque ducunt ex interno thalamo ossæ, circa foramina ampla quæ nervos admittunt, & sub annata tunica ad corneam usque tunicam feruntur. Horum quatuor numero sunt, è quibus *Primus* oculum *attollit*, quod ipsum quoniam elatæ frontis hominibus frequens est, musculus hic *Superbi* nomine denotatur.

Alter priori oppositus oculum *deprimit*, quo motu cum modestiæ ac submissiōis speciem exprimamus, musculus item *Humilis* appellatur.

Tertius oculum ad angulum internum recta *adducit*, *Bibitorius* dictus, quum potum haurientes aciem oculorum ad poculum convertere videantur.

Quartus denique *rectorum* musculorum oculum ad angulum palpebræ externum *abducit*, *Indignatorius* nuncupatus, quod trucem iracundorum aspectum sic exprimat.

Obliquorum musculorum duo sunt, *Amatorii* vocati, ob nescio quas petulantium oculorum illecebras amasiam speculantium. Horum qui

Minor,

COMMENTARIUS.

Ossæ in sede] Orbita hæc oculi dicitur, communissimo nomine, à similitudine quam habere dicitur cum orbita, quæ vestigium est curruum, sed certè parvi momenti ea est, nisi quod ut orbitæ cavitatem habent à curru impressam, ita & ossæ hæc sedes ab oculo, potior mihi comparatio cum ipsâ curruum rotâ, ut enim hæc rotunda est, ita & orbita oculi, & ut concavitatem habet, in quam axis definit, ita & orbita.

Sex in homine] Annon ergò deterioris hominis conditionis quam bestia est, cui septimum natura adjecit? Non est, neque enim indiguit

cælum tueri jussus, non terram, veluti pecora quæ natura prona atque ventri obedientia fecit. Musculus enim hic brutorum nervum opticum molliter involvit, adeoque oculum sustinet, ne lapsus ejus fieret, hoc est extra orbitam excidat, cujus periculum in homine metuendum non erat. *Galenus* hunc Musculum describens à variis reprehenditur, eò quod in homine non detur, sed certè immerito: non enim Musculum eum humano tribuit oculo, sed oculis brutorum quamplurimorum, præsertim eorum quæ gramina campi solent decerpere, adeoque oculos deorsum

Minor, situque inferior, qua parte primum maxillæ os quarto in extrema inferioris orbitæ parte jungitur, exortus, versus externum palpebræ angulum oblique sursum ascendit, brevique tendine ad iridem propagatur, oculum deorsum obliquando versus externum angulum convertit.

Alter obliquorum *major*, longior item, situque superior, commune cum tertio rectorum musculorum principium sortitus, juxta internum oculi angulum tenui corpore trochleam ingreditur cartilagineam, hinc obliquo flexu per oculi superiora progressus, juxta finem tendinis obliqui inferioris muscoli terminatur, oculumque versus angulum internum circumvolvens, ob trochleæ suæ robur, in obtutu rerum visibilium figit.

MEMBRANÆ porro oculum includentes, communes sunt, & propriæ. Communium prior *Adnata* sive *Conjunctiva* dicitur, neque aliud est quam pericranium ad palpebras, atque oculi album expansum.

Altera *Innominata* vocatur, & tendinum, musculorum præcipuè rectorum,

COMMENTARIUS.

pendentes habent. Turpiter at erravit *Vesalius*, qui in suis scriptis Anatomicis septimum oculi musculum descripsit, imò & depinxit, cum tamen hominis Anatomiam se scribere dicat.

Adnata] Dicitur sic duplici de causa, 1. quia ipsa membrana bulbo oculari, & corneæ membranæ adnascitur, ei nimirum parti ejus quam album oculi appellamus. 2. quoniam eâ mediante bulbus ocularis circumjectis partibus, palpebris nimirum, periosio, & pericranio adnascitur, & sic adhæret ipsis ossibus, ne facilè extra orbitam antrosam oculi prociderent.

Conjunctiva] Tunicam adnatam ab officio conjunctivam vocari omnes asserunt, at quid & quomodo jungat, non omnes eodem modo explicant. Officium ejus plurimi esse volunt, ut totum oculi globosum corpus tegat adeoque efficiat, quo humores intus contenti fluxiles in sua sede melius contineantur. At si hoc munus alicui tunice adscribendum erat, sanè corneæ adscribi debebat meritissimo jure, utpote quæ & humores proximè ambiat ac complectatur, & totum circumdet oculi globum: adnata verò nec totum circumdet nec ambiat proximè. Melius itaque mihi facere censetur illi qui ideo eam à

natura fabricatam judicant, ut oculum tum ossibus, tum palpebris aliisque dictarum partium jungat, quo in thalamo suo stabiliatur.

Ad oculi album] Corneam ipsam non tegit, ne ob crassitiem illam obumbraret, & visum impediret. Ex hac membranulâ substantia quædam tenuis primò mox crassescens & carnosior reddita, à majori oculi angulo, aliquando totam corneam obtegens, atque visibilibus speciebus aditum intercludens, enascitur; à Græcis *πλεψύγιον*, à Latinis *Unguis* dicitur.

Innominata] *Gratia est habenda*, inquit Plempius lib. 3. cap. 5. *Ophthalm. Columbo*, maximo, si Deo placet, *Anatomico*, quod hanc nobis tunicam in natura recessu latentem, nullique, ut ait, antè cognitam, è tenebris eruerit. At cur nomen non indidit? putabat nempe ad nominis famæque celebritatem consequendam efficacius, si *Innominata* Columbi per Dissectorum ora circumferretur; ita enim eadem opera & sibi arrogabat inventionem & majores omnes inscitie insinulabat. Sed factum est recentiorum diligentia, ut quantum gloriæ ambiret, tantum reciperet infamia, dum ostendunt Galenum tunicam hanc ad amussim delineare lib. 10. de usu part. cap. 2. & 8.

Tendinum Musculorum subtilis quædam expansio

etorum, subtilis quædam expansio videtur, ad iridis usque sive corneæ membranæ circumferentiam producta,

Propriarum membranarum prima *Sclerotes*, sive dura, ob crassitiem, & habitudinis modum appellata, parte anteriore qua transparet *Corneam* tunicam exhibet, quia tenuem è cornu laminam pelluciditate refert, antrorsum nonnihil protuberantem.

Secunda membranarum propriarum, *Uvea* anteriore parte dicta, præcedente longe tenuior, variis coloribus, ac potissimum interius atra quasi

COMMENTARIUS.

panfio videtur] Plerique eam tunicæ nomine indignam existimantes, nihil aliud esse scribunt, nisi ipsos dictorum muscutorum tendines; grandi, me iudice Plempius idem inquit lib. I. c. 8. naturæ injuria. Si enim sapientissima illa Architecta tendines istos in tunicam transire noluisse, fecisset eos utique pro ratione suorum muscutorum & exiguos & angustos, atque ita non tertiam bulbi ocularis partem obsedissent. Nunc vero cum certos ob usus tunicam ibi fabricare constituisse, nihil erat vel expeditius, vel magis ad manum, quam illos tendines findere, atque in membranam amplificare, quæ oculi orbem æque atque adnata complecteretur. Quia ergo tunica hæc muscutorum tendinibus propagatur, tendineam quoque naturam & qualitates nanciscitur: est enim nervacea, alba, lucida, ac splendida, dura, lævis, & densa. Itaque tunica Tendinea posset appellari. Putat Cl. Aquapend. (à quo idem alii surripuerunt) adnatæ lucidum candorem tunicæ huic acceptum referendum esse. Ego adnatam ab hac subjacente per dissectionem separavi, & nihilominus tum candore tum nitore eam præstare comperi, sive à tendineâ tunicâ se jungeretur, sive applicaretur eidem: non enim perlucet adnata, addò ut tendineâ splendor ipsam tranare nequeat. Quapropter candorem splendorem adnatæ proprium atque insitum opinarer: nam omnia simul alba & lævis sive polita sunt & splendida.

Ad Iridis usque sive corneæ membranæ circumferentiam producta] Ejus usus mihi videtur subfterniculi vicem gerere, ad quod pinguedo appulsa concrecat. Membranis enim amat pro sui adhesionem & concretione in animalibus pinguedo. Itaque totum penè oculum ambire debebat Innominata,

quia pinguedinem toti penè oculo circumvolvi oportebat.

Sclerotes sive dura] Sic mihi cum Cl. Plempio fingi duas hæc propositæ tunicæ partes taliter se differre, ut expolitus limatusque adamas differt à se rudi adhuc & scabro, qualis è fodinis eruitur: vel qualiter summa pars bubuli cornu lucens & lævis à suâ basi corio propinquâ aspera, tristi, luridâ. Adeoque, duas prædictas tunicæ portiones nequaquam natura, verum attenuatione solum atque expolitione inter se distingui censeo.

Pelluciditate refert] Hæc unica & sola denominationis ratio non est, sed & ea quæ à duritie desumitur & soliditate, imò & quæ à laminarum multiplicitate.

Antrorsum nonnihil protuberantem] Protuberantiæ hujus rationem vide apud Keplerum.

Uvea] A similitudine cum Uvæ acino. Ut enim pellis acini exterius gibba, intus concava ita & hæc tunica. Ut ea colorata est colore cæruleo, hæc etiam. Ut illa comprehendit pulpam vinosam, ita & hæc reliquas membranas atque humores. Quemadmodum denique, si pediculum uvæ abripias, relinquitur in eâ foramen, ita & in hac observatur foramen, anteriori sui parte, per quod species recipit.

Longè tenuior] Quid mirum, oritur enim *Uvea* à tenui cerebri Meninge, quantum licet oculorum observatione assequi, seu à tenui membranâ ipsius nervi optici, quem ubi obvolvitur, antrorsum vadens, sub corneâ late scit, atque ubi Oculi Iridem attingit, rotundam relinquens fenestram rursum resistens duplicatur. Itaque anterior ejus pars posteriore duplo est crassior, nam duplex est: Ejusdem tamen atque illa substantiæ:

quasi fuligine perfusa. Ad visionis perfectionem eam requiri, vel hoc argumento fit, quod in rudi adhuc embryo, nondum oculis per velamenta palpebrarum opertis, à natura producat, nigricante colore per ipsam quoque Scleroten membranam se manifestante.

Portio illius, quæ per corneam transparet, ob colorum quos trahit varietatem *Iris* dicta, foramine patescit, quod *Pupillam* nominant, per quam veluti fenestram, rerum visibilium species oculum subeunt.

Eadem à nexu quidem anterioris, posteriorisque libera est, attamen in circumferentia corneæ firmiter oris duræ membranæ conjuncta, *Ligamentum* illud constituit, quod *Ciliare* auctores vocant, à quo secundum latitudinem uveæ, versus prominentem crystallinum humorem, exiles veluti fibræ excurrunt, quæ lineolas atras, ciliis pilis palpebrarum similes adumbrant. Harum opera foraminis uveæ contractionem, ac dilatationem, tum crystalli ipsius lenem versus anteriora posterioraque motum fieri, vero maxime consentit.

Pars reliqua, & major secundæ membranæ, posteriora oculi & latera circumdans, ubique scleroti connexa est, *Choroides* tunica dicitur, quia

COMMENTARIUS.

tia: quis enim adeo fungus est, ut rem duplicatam à se simplici differre natura sentiat? quod miror oculatissimum latuisse *Aquapendentem*. Plempius lib. I. cap. 10.

Ob colorum quos trahit varietatem] Videatur *Simon Portius de Coloribus Oculorum*. Color hic nonnullis cæruleus, nonnullis cæsius, aliquibus coloris est alterius, pulcherrimi judicantur oculi cæsi, qui ex nigro & fulvo sunt commixti; minus pulchri, cærulei *Blæuwe Oogen*. Hæc illa est nigredo, quam in puellarum oculis tantopere laudant & commendant elegantes formarum spectatores.

Pupilla] Quasi pupulam ut inquit *Lucret. lib. 3. Natur. rer. 409.* diminutivâ voce, pupus puer est antiquis, puppa autem puera, vel parva puella, haud dubie inde quia cum à nobis inspicitur, ipsi nos intus quasi pupulum seu puellum parvulum intuemur.

Ligamentum ciliare] *Vesalius* tunicam appellavit: quam appellationem impropiam esse admodum quamvis à *Fallopio* monitus esset in *Observat.* voluit tamen eandem in examine earum *Observat.* & retinere & tueri; non minus inquiring. tunicæ nomen mereri,

quam vel adnatam vel araneam. Sed immatrem esse disparitatem ei fiet clarum, qui rem oculis usurparit: vere enim nihil est aliud tum re ipsa tum officio, quam nexus quidam & ligamentum; ut proinde nexus stamineus non inepte vocetur, prorsus enim refert stamina id est fila recta in opere textorio, & stabilia per pectinem transmissa.

Foraminis Uveæ contractionem] Videatur hæc de re *Scheiner. Fundament. Optic. lib. I. Cl. D. Sladus* ligamentum ciliare nihil aliud esse putat, quam venulas & arteriolas, nescit enim cur magis ligamentum sint, quam omnia illa vasa nigra, quæ tunicam uveam cingunt, in ranis plus vice simplici nigra vasa etiam extra caput reperit.

Tum crystalli ipsius lenem Sc.] Necessarium omnino, hic, inter alia aliorum scripta, ea perlegere quæ habet *Plomp. Ophth. lib. 3. cap. 9.*

Pars reliqua & major Sc.] Non possum recipere, inquit *Riolan. Animadv.* Choroidem & Uveam geminam tunicam constitutere, ista duo nomina uni membranæ conveniunt, quæ vel uvea vel choroides dicitur. Futilis omnino animadversio, cum cuivis vel leviter Linguae

Latinae

quia & plurimum oculi ambit, & chorii instar venulis non paucis prædita conspicitur.

Quemadmodum autem providus opifex corneam tunicam pellucidam effecit, ut objecti visibilis simulacro imbutum lumen ad oculi interiora illibatâ formâ pertingeret; ita secundam oculi membranam opaco infecit colore, ut recepta in oculum visibilis imago, veluti circumfusus umbris vigescens flammula; magis elucesceret.

Tertia membranarum oculi propriarum *Retiformis*, sive *Amphiblestroides* vocata, mollis est, mucosaeque substantia, cui nomen inditum, quod projectum in aquas reticulum æmuletur. Protenditur ab ipso nervi optici centro, supraque vitreum humorem expansa ad ligamentum usque ciliare porrigitur.

Quarta membrana *CrySTALLINA* appellatur, & crystallinum humorem anterieus ambit: tantæ subtilitatis, ut tenuem araneæ textum præ se ferat, unde & nomen *Aranea tunica* consecuta.

Quinta,

COMMENTARIUS.

Latinae gnaro constet *Vesling.* hinc neutiquam geminam hanc tunicam facere, licet diversa nomina ejus anteriori, posteriorique tribuat parti.

Magis elucesceret] Accuratissima sunt quæ hæc de materia habet cum *Plempio* conveniens *Highmorus* lib. 3. part. 2. cap. 3. *Intus* verò, inquit, nigro colore circumquaque tingitur, adeo ut totum oculum interne nigrum & tenebricosum efficiat. Atque hoc ideo à natura est institutum, ut species, quæ coloribus lucidioribus alias dissiparentur, fortificentur, & in propriis naturis facultati visivæ offerantur. Neque dubiet quisiā visionem *Cymmaris* hisce tenebris in oculo obscurari; Species enim rerum omnium liberatæ & emissæ, ob luculam quam à luce excitante acquisivere, sine alius medii illuminatione per densissimas tenebras feruntur. Cujus rei exemplum in *Camera Opticâ* videre liceat, ubi Camera ita undiquaque luce privatur, ut nullibi nisi per foramen unum minutulum lucis admittatur; per quod foramen Species visibiles rerum externe existentium ingrediuntur, & in opposito muro secundum figuram, distantiam & colores objectorum videntur; depinguntur. Sic in oculo nigra undiquaque (nisi ubi perforatur,) hæc tunica cincto Species ingressæ, se in oppositam oculi partem, eo ordine iisdemque coloribus quibus res ipsæ prædictæ fuerunt, disponunt; nisi deturbentur & à splen-

didore objecto, simul cum speciebus ingrediente, & tenebras hæc illuminante, obscurantur. Quod ipsum illis qui diu solem aspexerunt accidit, aut sub dio, sole maxime splendente, aut in nive diutius occupati fuerunt. Hisce species lucis copiosæ per pupillam irruentes, tenebras hæc illuminant, ac cæteras debiliores objectorum species, corpora tenuissima, confundunt & obscurant; uti minora lumina ad majoris adventum deminuantur & obscurantur. Sic quando ex tenebris subito in lucem prodimus, aut ex luce in tenebras, caliginem quandam ante oculos cernimus, ac obscuriores & uliginoso visui redduntur imagines.

Reticulum æmulatur] Græcis vocatur ἀμφιβλεστροειδής, nobis cum *Plempio* *Retiformis*, non quod retis texturam habeat, continuum enim sine cancellis corpus est, sed quod hemisphæricæ circumferentiæ figuram referat, quale est quoddam retis genus, quod ex ligneo circulo, cui circumassuitur, dependet, perticaque affixum piscibus captandis in aquam mergitur.

Anterieus ambit] Falso *Galenus* anticae solium crystallini parti tunicam hanc obtendi scribit, id quod gregarii aliquot nostro ævo *Anatomici* etiam docuerunt; Mihi enim verò adeo posticâ ejus parte tunica adesse videtur ut & crassior hæc parte sit, quam anticâ, quicquid inculcent cæteri dissectionum procures. *Plempius* lib. I. cap. 10.

Tantæ subtilitatis ut tenuem araneæ textum

Hh

præ

Quinta & ultima, *Vitrea* membrana dicitur, humorem vitreum amplexata, lævore, & tenuitate insignis, quam in animantium oculis, leni prius coctione densatis, juxta cum præcedente, facile ab humore contento discernere licet.

Jam HUMORES oculorum tres habitu differentes observantur, aqueus scilicet, crystallinus, & vitreus, pellucidi omnes, colorumque expertes, ut rerum visibilibus ideæ propriis quos obtinent coloribus accuratius exprimerentur.

Ex humoribus *Aqueus* prior est, tenuior, magisque fluidus, crystallinum humorem cum propinqua vitrei parte antè alluens, tam intra quam extra uveam membranam diffusus. *Colligitur* antè intra Corneam, postè à crystallina, vitreaque tunica, & ciliari ligamento comprehenditur.

Crystallinus humor purioris concretionis glaciale gemmam æmularur, singulari præ cæteris soliditate, perspicuitate, splendoreque totus spectatissimus, Producitur à natura è seminis portione pellucida, simul atque oculorum fundamenta locat, ut errent, qui calore, spirituque destitutum arbitrantur, atque è partium viventium censu rejectum vera nutritione augescere negant, *Ortus* enim ipsi è spermate est, & simile cum aliis partibus incrementum. *Figura* lenticulæ in modum pressulæ rotunditatis apparet, qua parte pupillam spectans in aqueo humore prostat: qua vitrei humoris in sinu recumbit, in sphæram longiorem devexus conspicitur. Neque hoc tamen perpetuum est, nam interdum globosior antè, postè obtusior observatur; nunquam

COMMENTARIUS.

præ se ferat Sc.] Accipienda textura quam manibus vel digitis vulneratis quidam imponere solent, & omnino continua est.

Vitrea tunica] Negat hanc diversam esse à Retina *Marchette*, at videtur experientiæ omni modo contradicere.

Aqueus] Albugineus etiam vocari solet, quod ovi candido similis sit, similitudinem quidam consistere volunt in eo, quod cum ovi candidum diu conquassatur bacillo, tenuitatem, & claritatem recipiat. Alii non ipsi ovi candido simile esse volunt, sed guttis iis quæ continentur intra pelliculam ovi postquam albumen & vitellus effusi sunt. Alii iterum ei humori similem esse, qui exsudat ovo cum igni assandum apponitur.

Tenuior est magisve fluidus] De substantia erudiri cupidus ovi illum liquorem album cui comparabat *Galenus* inspiciat protinus ac positum est ovum, & quantum possibile est naturalissimè calet.

Colligitur Sc.] Quisquis spatium quod occupat, novit; noverit simul, quanto paucior sit vitreo, à quo altero tanto superatur ut vicissim ille ab hoc ea prærogativâ superatur, quod oculo effusus renascatur, iis, qui à principiis generationis etiamnum propè absunt, ideoque vegetam adhuc formatricem vim habent, quæ à penu suo novam materiam huic humori redintegrando surroget. Exemplum habet *Benivenius Observ. cap. 74. Langius l. I. Epist. 7. Varolius lib. I. Anat. cap. 4. Columbus lib. 10.*

nunquam utraque facie complanatus. *Collocatus* in medio quidem oculi est, sic tamen ut anteriorem in partem magis promineat.

Vitreus humor reliquis duobus copiosior, vitroque fuso non minus substantiæ modo quam claro nitore similis, superstitem oculi cavitatem omnem occupat. Posterius ac per latera rotundum ambitum designat, antè leviter sinuosus, ubi crystallino sedem suam exhibet.

A C T I O oculi visio est: in ea tamen absolvenda, ex tot partibus enarratis, si visibilis speciei intra oculum expressionem attendimus, humori crystallino principatus debetur: si speciei expressæ sensum ac perceptionem, penes nervum opticum, quæque medullæ ejusdem expansio videtur retiformem tunicam palma fuerit.

Quin & amoris tacitos quoque conciliatores oculos esse nemini ambiguum fuerit, cogitanti, non colores tantum ab iis comprehendendi, sed figuras etiam, partiumque symmetriam universam; decus adeo, & pulchritudinem ipsam per oculos animo adverti.

C O M M E N T A R I U S.

lib. 10. Hildanus cent. 1. Observ. Chyr. 26. Tulpus lib. 1. Observ. cap. 30. Remedium exhibet Ab Heers.

Actio oculi visio est] Hæc de re consule *Dioptricen Nob. Renati des Cartes.*

Retiformem tunicam] Qui Physica hæc & Optica amant animæ vel oblectamenti vel exercitamenti causa, consulant *Joh. Kepler. Paral. ad Vitel. cap. 5. Chr. Scheiner. Fundam. Optic. lib. 11. parte 11. Plemp. Ophthalm. lib. 2. cap. 19. lib. 3. cap. 12. R. des Cartes Dioptric. cap. 5.* quo certè nescio num quis eam rem

penè omnibus suis numeris absolutiorem reddiderit. Quorum sententiæ quod ad usum Retinæ accedunt aut accedere saltem videntur *Galen. lib. 7. de decret. Hipp. & Plat. cap. 6. Alhazen lib. 1. Optic. cap. 11. & seq. aliquot, imprimis 16. Vitellio lib. 3. Optic. cap. 20, 21, 22. Rog. Baco perspect. cap. 5. Platerus lib. 2. de struct. hum. corp. pag. 186. C. Gemma lib. 2. Cosmogr. pag. 120. Georg. Horstius lib. 1. de Natur. human. exercit. 10. And. Spigel. lib. 10. de hum. corp. fabr. cap. 9. Ita Lindanus in Physiol. differit.*



TABULÆ CAP. XV. *Declaratio.*

Comprehendit hæc Tabula Palpebras cum Musculo levatore, tum ad Oculum pertinentes Musculos proprios, Membranas, & inclusos Membranis Humores.

FIG. I.

- AA* Musculus Palpebra superioris levator,
B Ejusdem Tendo tenuiter expansus.
CC Tarsi Palpebrarum.
D Caruncula Lachrymalis in angulo interno.
dd Puncta Lachrymalia.
E Angulus Palpebra externus.

FIG. II.

- AA* Adeps posterius Oculis affusus.
BBB Musculi Oculorum nondum separati.
CC Pars Oculi Musculorum tendinibus adhuc operata.

FIG. III.

- A* Musculus rectus Oculum attollens.
aaa &c. Nervuli vim motricem, & sensum cum spiritus conferentes.
B Musculus rectus Oculum deprimens.
C Musculus rectus Oculum adducens.
D Musculus rectus Oculum abducens.
E Musculus obliquus inferior, cujus tendo cum sequente tantum ex parte separatus.
F Musculus obliquus superior.
G Ejusdem Musculi trochlea.
H Sclerotes Tunica posterius Oculum velans.
II Nervi optici portio Oculo inserta.

FIG. IV.

Oculum exhibet Ovillum, ut in eo Musculus septimus, quo homo non indigebat, repræsentetur.

- A.B.C.D.* Musculi quatuor recti.
E Musculus obliquus inferior, hic amplius.
F Musculus obliquus superior, exilis.
G Trochlea Musculi obliqui superioris.
H Musculus septimus brutorum, Oculum attrahens.

- I* Pars Oculi posterior tendine Musculi septimi operata.
K Nervi optici portio Musculo septimo inclusa.

FIG. V.

- A.B.C.D.* Eadem qua præcedens figura exhibent, remotis Musculis obliquis.
aaaa Membrana communis Innominata dicta.
bb Iris cum Pupilla per corneam Tunicam transparens.

FIG. VI.

- AAA* Membrana Sclerotes dissecta.
B Membrana Cornea.
C Portio Nervi optici superstes.

FIG. VII.

- A* Tunica Uvea.
a Foramen Uveæ, seu Pupilla.
BB Ligamentum ciliare, cum exporrectis fibris.
CC Membrana Chorioides nigricans.










FIG. VIII.

- AA* Membrana Retiformis.
aa Ruptura ejusdem supra Vitream, quæ ob mollietatem in dissectione vix evitabilis.
BBB Choroides Membrana nondum separata.
CCC Sclerotis Membrana crassities.
D Optici Nervi residuum.

FIG. IX.

Humores Oculi tres, vasculo excepti.

- A* Humor Crystallinus, in sinu Vitrei positus.
BB Vestigia fibrarum ciliarium.
CC Humor Vitreus.
DD Humor Aqueus paucus, Vitreo circumfusus.



CAPUT XVI.

De Auribus.

Quemadmodum ad vitæ mortalium jucunditatem usu lucis conducunt oculi, partes corporis pretiosissimæ; sic ad sapientiæ disciplinarumque cultum organum auditus præstat. Hujus pars alia manifesta oculis, abdita alia & intra petrosi ossis cavernas recondita.

Manifestam organi partem aurem, Auriculam item, distinctiusque **AUREM EXTERNAM** vocant. Hæc variis construitur partibus, Cute, Pinguedine paucula, subditaque Membrana carnosæ; proprie vero Cartilagine, Lobo, Vasisque privatis. **CARTILAGO** superiorem atque ampliorem auris externæ portionem constituit, ut interdiu noctuque patula servetur auditus via; sinus ejusdem & productæ cavitates non facile excutiantur; molli tamen flexu reclinato capiti, aliisque externis cedat; præcipue vero sonum adfluentem fortius introrsum compellat.

Inferiorem partem, quæque **LOBUS** dicitur, substantia occupat mollis, pinguedini quam carnisimilior, à qua perforata elenchi gestantur. Non alia in parte vel priscis seculis feminis majus impendium fuit, margaritis dependentibus. Nec minor hodie Arabum mulieribus infania, quæ annulis ingentibus aures detrahunt, quos & in narium pinnis gestare decorum existimant.

Accedunt has partes **VENÆ** à Jugularibus externis, atque internis: **ARTERIÆ** à Carotide utraque, tum **NERVI** duo, à secundo præcipue pari medullæ cervicalis producti: quibus addendus furculus à por-

COMMENTARIUS.

Auris] Latinis dicitur detracta aspiratio-
ne quasi hauris ab hauriendo, quoniam
vocem & audibiles qualitates haurit, ut *Vir-
gil. lib. 3. Æneid. Vocemque his auribus hausit*,
indicat ingeniosè. Aliis dicitur quasi audis ab
audiendo, quoniam est organum auditus.
Aliis à Græco verbo *αὐδῆ* quoniam vocem
percipit.

Superiorem auris externæ partem] Pinnam
Fernelius aliique appellant, ab illâ conchæ
marinæ specie, quæ pinna appellatur, quem-

admodum enim concha ea multos anfractus,
convolutiones, & meandros habet, ita &
pars superior auris. Græcis *περυγία* vocatur,
quia figura, situ, usu, alas refert, quemadmo-
dum enim alæ superius gibbosæ, inferius con-
cavæ, ita & auriculæ; sicut illa una à dextro
altera à sinistro latere habetur, ita & auricu-
læ, feriunturque ab aëre uti alæ.

Lobus] Appellatur Lobus *δότ τῆ λαμβάνειν*
apprehendere, hanc enim partem solemus
apprehendere quotiescunque aliquâ aliquem
de

portione quinti paris duriore , quæ per Foramen cœcum progreditur. Atque hi latera, posterioremque auriculæ regionem perreptant.

Imo ne quid homini ad nobilissimi sensus perfectionem deesset, circa propositam cartilaginem MUSCULOS produxit divinus plastes, quos ob singularem tenuitatem Perigraphias seu lineamenta musculorum Galenus appellat, in subjecta pinguedini membrana, carnosio fibrarum intextu, nunc evidentius nunc obscurioribus vestigiis expressa, ut eâ porrectâ, quoties attentius audituri, leviterque diductâ exterius auriculâ, tympani membrana per abditos organi musculos rectius contendatur. Horum qui *sursum antrorsumque cartilaginem movet*, musculo temporali impositus, juxta principium externum muscoli frontis descendit, & versùs auriculam paulatim angustior in suprema ejusdem parte desinit. Qui *sursum oblique, deorsumque auriculam moveant*, etiam quinque recensere licuit : è quibus tamen frequentius cum præcedente occurrit is, qui à musculorum occipitio insertorum confinio, supra mamillarem processum, è transverso deorsum tendit, distinctisque nunc duobus nunc tribus tendinibus radici cartilaginis posterius inhæret.

MAGNITUDO externæ auris homini satis exigua, promissaque cæsarie facile velanda.

Partium præcipuarum dispositione FRIGIDI SICCQUE dominium exhibet. FIGURA propemodum ovalis; variis tamen PROTUBERANTIIS elaboratâ est. Illarum quæ extremam designat oram *Helix* ob tortuosum flexum appellatur: altera interior, & priori respondens, *Anthelix*. Quæ tempora spectat eminentia, pilis aliquot hispida, in quibusdam densam hirci barbulam exprimens, *Tragus*, & opposita altera *Antitragus* dicitur.

CAVITATES in auriculis tres quoque spectantur. Interior una, quæ ipsius meatus auditorii vestibulum, sive initium: *secunda* huic circumducta est, & à similitudine figuræ *Concha* nuncupatur. Inter helicem, & anthelicem *tertia* comprehenditur, quæ nondum apud auctores nomen invenit.

COLLO-

COMMENTARIUS.

de re admonemus, hinc Ciceroni Ansa vocatur; pars est exigua cum tota consideratur.

Musculos] Auris musculos elegantissimè descripsit Fallopius & Jul. Placentinus.

Helix, anthelix &c.] Videatur Georgius Valla Placentinus, opusculo de partibus corpo-

ris humani, erudito sanè, & ad nominum partibus corporis impositorum accuratam cognitionem accommodatissimo.

Cavities in auriculis tres] Non cavities dici vult Riolanus, inani distinctione, sive enim circulum nominem sinus istos, sive cavities quid interest.

Cavi-

COLLOCAVIT auriculam in edita corporis specula sapientissimus conditor, quum aër qualitatis vehiculum facilius sese in sublime gyris suis diffundat.

JUNXIT cartilaginem ossi petroso, per validum ligamentum, quod à pericranio producitur: cætera musculorum tendinibus communibusque velamentis continuata sunt.

U S U S auricularum non est ornatus capitis, & stalagminiorum insertio, quamvis natura foraminuli vestigium lobo impressisse videatur. Non item cerebri tutela, quod munimentis propriis abunde roboratum; sed ut collectus tot cavitatibus exceptusque cum aëre sonus rectius deinde in cavernas aurium internas succederet. Itaque licet animalium plurimis externa hæc auris desit; in homine tamen ad perfectiorem auditum eam conducere palam faciunt ii, quibus aut inhoneſto vulnere, aut frigoris injuria mutilatæ, aut compressis cavitatibus capiti nimis applicitæ sunt, qui detrimentum sensus appposito manuum cavo supplere conantur.

Subjectæ sunt auriculæ glandulæ plures, redundantium humiditatum emunctoria, vasorumque sursum commeantium fulcra, quas ob vicinitatem **P A R O T I D E S** Hippocrates pronunciavit.

At internum illud & verum **AUDITUS ORGANUM** in ossis temporum petroso processu exstructum est, loco non solum adversus fortitorum impetum ob duritiem tuto, sed ad soni etiam conservationem propter siccitatem aptissimo.

Cavitates in eo, atque adeo aëris cum sono diverticula quam plurima: *quatuor* tamen à dissectionum auctoribus potissimum ad auditus usum relata fuerunt: nempe Meatus auditorius, Tympanum, Labyrinthus, & Cochlea.

AUDITORIUS MEATUS protinus à concha auriculæ externæ incipiens, tenui cutis amictu, membranaque pinguedini alias summissa, & peri-

COMMENTARIUS.

Cavitates in eo quamplurimæ] De concavitate aurium primâ fronte controversia esse videtur, nam quidam unicam tantum alii quamplures concavitates statuunt. *Fernelius* unicam videtur statuere, *Laurentius*, *Fabr. ab Aquapend. Casp. Bauhinus*, *Casserius*, aliive multas concavitates volunt; Unicam etiam *Andr. Vesalius* defendit. Reipsa tamen auctores non pugnant. In interiore enim aure

unica est, & continuata cavitas, sed quoniam respectu & ratione quam plurimorum accidentium dividitur in varias partes, describunt eas pro variis meatibus, non aliter ac una est fistula ab ore usque ad anum, & tamen auctores in Intestina, Ventriculum, Oesophagum diviserunt. Non aliter ac in cerebro unica est cavitas quam in Ventriculos quatuor distinxerunt.

& pericranio ad oras usque tympani vestitur. Tortuoso ductu fursum nonnihil conversus ne quid confertim posset ingruere, & allapsa forinsecus, introve collecta, prona via facilius extrorsum ferrentur.

In limine meatus auditorii humor colligitur viscidus, flavedine quadam, & amatore præditus, vulnerum, ulcerumque remedium. Antiqui *Cerumen* vocabant, & locum ipsum, in quo deprehenditur, *aurium alveolare*. Usus harum sordium non aspernendus. Nam irrepentia aures minuta quæque infecta, lentore ceruminis tanquam visco illaqueata, vel amaritudine ejusdem absterrita, ab adytis aurium in ipso aditu arcentur.

In fine meatus auditorii membrana deprehenditur, quam veteres Græci communi nomine Meningem, Hymenemque aurium, recentiores imminentis cavitatis ratione MEMBRANAM TYMPANI appellarunt. Est autem velamentum auris internum, tenue quidem, attamen ob singularem lentorem, subtensumque exile ac nerveum *ligamentum*, satis firmum, ut non minus externam aëris vim, citra facilem noxam sustineat, quam illapsam soni speciem siccitate conservet, atque in cavitates auris penitiores trajiciat.

Perioestii expansio quædam videtur, quo separato & ipsa protinus secedit, sensuque propter *nervos*, & quos suscipit, & qui sub ea progrediuntur, exquisito valde prædita.

Duplex interdum conspicitur: frequentius autem à condensatis excrementis, adhærente veluti crustula, obducitur, non sine auditus ipsius læsione.

Situs ex obliquo in primum despicit, sic tutior ad impulsus vehementiorem, & ad suscipiendam vocis imaginem aptior futura.

Adhæret

COMMENTARIUS.

Veteres Græci] Ita *Aristotel. lib. de anim. text. 83.*

Recentiores] Inter hos & *Baubin. Anatom. lib. 3. cap. 50.*

Subtensumque exile & nerveum ligamentum] Omisisse *Veslingium* Chordam tympani membranae attensam, notabilem tamen, in animad. suis annotat *Riolanus*, inutiliter admodum, licet enim Chordam dictam non descripserit, omisisse tamen dici nequit, cum alio nomine de eâ agat. De hac Chordâ sic differentem audi *Baubin. Anatom. lib. 3. cap. 45.* Chorda etiam membranula subjecta est tenuissima, nervosa tamen, quæ non ex toto membranulam succingit, sed ipsius medium percurrens, illi arti-

culo, quo *stapes* cum *incudis* crure altero copulatur, attenditur; & si extrahatur triplo, aut quadruplo longior est: hæc à quibusdam filum appellatur, & aliis arteriola, aliis nervulus, aliis ligamentum, aliis tendo censetur. Verum vel ex ligamento, vel ex nervo, vel utrisque junctis consistere debet: at ligamenta duriora sunt, quam ut parvo ictu cedant: nervus vero ita robustus est, ut quamvis vehementer impellatur difficulter frangi possit; ita mollis, ut ex commotione facile moveatur, quod ad sonum excipiendum requiritur. Quare ramulum nervi quarti dicti partis cerebri esse *Eustachius* asserit. Hujus usus ad pulsationem: quemadmodum enim in tympano bellico, ex chordæ per corium expansæ repercussione,

Adhæret firmiter officulo, cui mallei nomen impositum est, tum proximæ cavitatis orbitæ, si partem excipias, quæ superiorem auditorii meatus regionem attingit. In ea enim laxior omnino connexio est, ut evolvi membrana atque explicari nonnihil queat.

Etenim in superiore meatus auditorii atque interiore sinu, coalescenti cum cute membranæ *Musculum* intexuit providus opifex, non in adultis tantum, sed etiam infantulis evidenter ac perpetuo conspiciendum. Hic tenui carnosarum fibrarum perigraphia, è latiore principio sensim contractior, subtilissimòque tendine membranæ tympani contiguus, ad malleolum usque fertur, ut sursum extrorsumque nonnihil circa superiora tensâ membranâ sonus rectius & conservetur, & ad internos aurium recessus propagetur.

Alblatâ in circuitu membranâ patescit *Cavitas* ampla, quam Hippocrates optime *antrorsam* nominat, ob sinus in quos diffunditur varios. Fallopius *TYMPANUM* appellat, quod ahenei instar tympani circum oras membranâ propositâ ceu tergore sit obducta.

Hanc accuratius inspecturus, tria prius *OSSICULA* eximet in ea recondita. Exigua illa quidem, sed arte summa perpolita. *Membranis* destituta sunt, circa tamen extrema, quibus committuntur, *ligamento* exili ad nexus stabilitatem obvincta.

Illo-

COMMENTARIUS.

sonus, sic in aure hæc chorda ex exceptione verberationis à tribus ossiculis facta, aërem congenitum percutit.

Adhæret] Videatur *Sneider. l. 3. p. 402 c. 10.*

Proximæ cavitatis orbitæ] In ambitu membranæ Tympani circulus adest osseus, cujus similis omnino usus est, ac circuli lignei in Tympano bellico: retinere scilicet membranam pellemque in sede suâ. Est autem circulus neutiquam completus & integer, sed ex parte deficiens, qualis ferè ferrea solea equorum.

Tympanum] Censor hîc castigat *Veslingium*, quod cavitatem hanc Tympanum cum *Fallopio* dixerit, non *Concham*, cum tamen minimè neget Author eam *Concham* dici posse; nominalis quæstio cui usui, nec ideo cavitates aliter exposuisse dicendus.

Tria prius ossicula eximet] Primi eorum Inventores quinam fuerint, variè controversitur inter Anatomicos. *Barthol. Eustachius in tract. de Organ. auditus, Alexandrum Archillinum Bononiensem Philosopherum, & Jacobum Car-*

pum Chirurgum, primos Inventores Mallei & incudis constituit. Nic. Massa, Fabricius, Casserius, Volcherus Coiter utriusque ossiculi *Carpum* authorem constituunt solum, eumque jam antè *Achillini* tempora duo hæc ossa descripsisse volunt. Tertium Ossiculum quod spectat *Columbus* se primum ejus Inventorem gloriatur. *Barthol. Eustachius lib. de Auditus Organ.* idem sibi tribuit, laudemque inventionis derogat *Joh. Philippo Ingrassiæ*, Medico Siculo, qui comm. in *Galen. de Ossibus* se illud os à nemine antè inventum & adnotatum Neapoli reperiisse, idque coram Siculis studiosis *Stapham* appellasse ait. Huic & *Fallopius in Observat.* inventionis laudem assignat. *Vesalius* licet in *examine Observ.* se idem casu reperiisse gloriatur.

Membranis destituta] Ne ad soni receptionem inepta fiant, quod si enim corpus aliquod durum panno molli involveris, illud percussum eum sonum non edit, quem cum denudatum esset edebat. *Baubin.*

A figu-

Illorum primum, à formæ qualicunque rudimento, *Malleolum* nuncupant, capitulo præditum rotundo, à quo paulatim in cervicem attenuatur. Circa medium *processibus* ornatur duobus: brevi uno, cui se *Musculus* internus jungit: altero longiore, sed magis tenui, qui tympani orbitæ incumbit. Reliquum officuli, sive id *pediolo*, sive *caudæ* compares, extremo suo introrsum aliquantulum contortum, adhærentem sibi membranam leviter circa medium intorquet. *Fungitur* capitulum opposita sibi Incudi, nexu tamen ob ligamenti laxitatem minus arcto. Firmius autem *pediolus* membranæ subditæ committitur, ad cujus ut tutelam sic etiam motum unice malleolus comparatus est.

Nimirum, cum ad exquisitiorem soni transmissionem, haud satis esset membranam tympani extrorsum nonnihil superius explicari, sed reliqua dimensione omni intendi deberet, *Musculum* produxit solertissimus plastes, exiguum quidem, sed partium omnium integritate vel maximis parem, eumque petrosi ossis singulari meatu occultavit. Initium sumit ligamento simile, qua parte lapideus processus ossi cuneiformi conjungitur, paulatimque carnosior, bifido fere, nonnunquam simplici, tendine processum malleoli brevior, proximamque ejus cervicem accedit. Ideoque introrsum versus anteriora commoto officulo annexam pariter membranam tympani introrsum sinuando contendit.

Alterum officulorum auditus *Incudis* nomen obtinet, crassiore corpusculo diductum. Hoc *sinum* exhibet levem, quo malleoli caput excipitur, *Processusque* duos, quorum *brevior* tympani specui posteriori innixus: alter *longior* stapedis capitula per ligamentum laxiusculum sed firmum devincitur,

Est autem *Stapes* officulum tympani tertium, à figuræ convenientia merito sic appellatum. Capitulo præditum est rotundo, quod incudi, ut dictum, connectitur. Exporrigit à capite concava duo & in arcum sinuata *cruscula*, quibus *basis* inducitur tenuissima ac porosa, ne sonum huc commeantem quicquam remoretur.

Hæc ovali foramini figuræ ambitusve similitudine respondet, cui per

COMMENTARIUS.

[*A figuræ convenientia merito sic appellatum*] Stapes os hoc auditus nominatur à figuræ similitudine, quam habet cum stapede, non quidem nostrate sed Siculo, ex ligno confecto, quali ex mandato Vice-Regis uti solent qui in Sicilia mulis iter faciunt. Male

ergo *Columbus* comparat stapedi ferreo, à quo ait differre solum, quod illo foramine, quo lora transmittuntur careat. *Eustachius* non ineptè *Ναυ* Græcæ litteræ imaginem referre ait, hinc dicit à se Deltoida appellatum fuisse.

per ambitum lento undique laxoque vinculo alligatur, ut impelli quidem intra finem suum queat, attolli autem citra vim educique non possit.

Atque hæc duo officula malleoli gratia condita sunt, cujus ut idonea fulcimenta essent, motui pariter obsequentia esse debuerunt.

Stapedi additur *Officulum quartum*, rotundum, perexiguum, ligamento Stapedis innexum, quod *Francisco Sylvio* inventum adscribitur.

Iam cavitas ipsa, quam *tympanum* appellari innui, variam exhibet inspicienti faciem. Nam & sinus requirebat, anfractusque multiplices, in quos violentior aëris fluctus diverteret, & partium inæqualitate singulari reflexus vocis ac reciprocatio prohiberetur: poros item obtinet meatusque diversos sonorum imaginem transmittentes.

Superius, ubi processus incudis brevior consistit, *antrum* panditur *laxum*, quod cavernulis suis in mammiformis inexplicabiles recessus viam aperit. Inferius, atque anteriora versus, è tympano ad palatum *meatus* patet, cartilaginum accessione circa finem productior, per quem veluti excitatus in ore sonus cum aëre aurem subit. Ita collectæ præternaturam humiditates salubriter ad palatum eliminantur. Ea res efficit, ut hebetioris auditus homines, ore aperto, atque expiratione cohibita, exactius voces percipiant, oscitantes verò penitus obsurdescant, sermonem etiam proprium, quamvis externa auris omnino obstructa sit, optime tamen

COMMENTARIUS.

[*Stapedi additur officulum quartum Sc.] Nic. Fontano* squammæ lupi piscis simile habetur, *Lindano* Cochlear dicitur, à sinu amplo & scutellari, qui in præcipuo ossis vultur. *Cæcilius Folius* stapedis ossium globulum fortè indigitat. In costis vitulorum capitibus facilius reperiri ad magnitudinem majorem docet *Barthol.* Idem *Pavium* in bubulo capite annoso huic simile sesami formâ observasse scribit. Negat id *Os D. Marchette*, at experientia vim facit.

[*Ad palatum eliminantur*] Hæc si intus subsistant, vel aurem penitus obturent, vel à calore innato resolvantur, inflatus convertuntur, unde tinnitus aurium, susurrus, auditus depravatio & amissio, nisi per canalem hunc expurgeretur, quostamen symptomaticè expurgari curatio docet, quando masticatoriis utimur. Hinc Medicos notare convenit in aurium affectibus internis, masticatoria præstantissima

esse, cum ab auribus non angustis foraminibus, sed amplissima via, materiæ etiam crassæ, vel à natura expelli, vel medicamentorum masticatorum ope, commode expurgari possint: & sic meatus siccissimus ad soni exceptionem conservatur, cum sicca ad sonum recipiendum aptissima sint. Vide *Stenonium Tractat. de Glandulis*.

[*Ea res efficit Sc.]* Imò hujus meatus beneficio ex ore in Aures aër deferitur & furdastri contentur audire se, cum dentibus instrumenta musica tenent. Possè autem hoc modo sonum propagari contestatur *Joh. Bapt. Porta Mag. Natur. lib. 20. cap. 7.* qui, ut surdus musicam percipiat, jubet lyræ vel cytharæ capulum dentibus mordicus tenere. Sic enim si aliter eam pulset, omnem Harmoniam distinctè cognoscet. Nec solum capulum dentibus captans, sed & longissimam hastam, quæ lyræ tangat, per eam clarè audit sonum; dicitur

tamen percipiant. Neque alia causa est, cur ore naribusque compressis tympani membrana cum sonitu extrorsum compellatur, cumque major vis est, etiam lædatur. Collectum item plenis buccis nicotianæ fumum per eandem membranam meatumque auditorium exire cogant bibuli, adeoque spirare per aures videantur; quod de capiris olim Alcmaeon tradidit: aëre, & quicquid ipsi permittum est, sic facile è palato in tympanum irruente.

Medium antrosæ cavitatis, quod lævigato veluti colliculo protuberat, utrinque *foramen* detegit: quorum quod majus est, stapedisque tenui ac pellucida basi clausum, *Fenestram ovalem* nominant: quod minus, & declivius, *Fenestram rotundam*. Illud in labyrinthum, hoc in cochleæ principium præcipuè sonum deducit; quamvis ad finem ejus pori plures minutique conmeant.

Cæterum ovalis fenestra in cavitatem patefcit aliam, præcedente longe minorem: quam ob meatus osseos, in eandem cavitatem per circuitus redeuntis, LABYRINTHI nomine insignivit Fallopius. *Ambitus* ejus rotundus est, & præter ovale, quod ipsi imminet, *foramina* quatuor, veluti fores obtinet, in periodos circumducentes, tum quintum, quod in latioris cochleæ gyri finem sese aperit. Atque hæc foramina cum sua cavitate sequens tabula sufficienter manifestat. Labyrinthum integrum, cum suis circulis, adjunctamque cochleam, exactè Capitis octavi Tabula secunda, Figura septima, & octava repræsentat.

Est autem COCHLEA cavitas aurium insignis, *gyris* duobus, cum portione tertii, cochleæ in modum circumflexa. *Fundavit* eam divinus artifex in communi processu petroso; materia tamen seminali siccâ, levi, ac friabili ulterius induxit, aptissima gyrulo efformando, sonoque conservando substantia; tenuemque *porum* è medio cochleæ tanquam radium à centro producens nervum accumbentem vocali specie imbuat.

In his abstrusis cavitatibus statim ab ipso ortu AER continetur, internum

COMMENTARIUS.

que poterit, auditus non sensu, sed gustu perceptus. Quomodo surdos doceamus loqui & scribere egregiè docet Digbaeus de Immortal. animæ. Consule Schneiderum de Catharris l. 3. cap. 10. pag. 396, § 397.

Illud in Labyrinthum, hoc in Cochleæ principium] Si benè attendamus, una est eademque cavitas, figurâ tantum distincta, sic ut quatuor circumvolutiones Labyrinthum faciant, quinta Cochleam.

Cochlea] Cavitas tertia, Cochlea à meatus flexuosa obliquitate, quæ cochleæ gyrum elegantissime imitatur, dicitur. A Vesalio Buccinosum antrum vocatur, à buccina cornu recurvo ac contorto, quo pastores pecus convocare solebant; vel potius à buccina conchilii speciei; à quibusdem Foramen cæcum & cavitas cæca nominatur, quia exitum non habere nonnullis visum fuit: verum etsi spirarum modo convolvatur, tamen

ternum auditus medium, ob partium actu calentium, siccarumque contactum assiduum, externo aëre tenuior & siccior. *Quietus* idem, ne citatis in contrarium undis sonum accedentem repellat, sed ulterius transmittat. Quod officium ejus, arteriolarum per gyros atque anfractus osseos sparsarum blanda naturalisque micatio non pervertit.

Distribuuntur in reconditum hoc auditus organum VENULÆ, & ARTERIÆ exiguæ, ab internis, anterioribusque ramis, tum Venæ Jugularis, tum Arteriæ Carotidis profectæ: potissimum vero NERVI. Nam cum in meatum ossis petrosi posteriorem, sive foramen primum ossis temporum, quinti paris gemina feratur portio, *durior* una, quæ *Cæcum* veteribus dictum *Foramen* ingressa tortuoso itinere cranio elutatur, altera *mollior*, in extremo ossis meatus, à priore leviter prominente apophysi dirempta. Hæc parte majore cochleæ centro insistit, minore ad labyrinthi circulos porrigitur, utrobique audiendi munus, officiumque consummans. Addit sese his ramulus singularis, à quarta nervorum conjugatione huc productus. Is internæ auris secretiore cuniculo receptus in tympanum progreditur egressuque bifidus, partim quinti paris duriori portioni descendenti se jungit, partim in mammiformis processus cavernas spargitur.

Ab eo sensus membranis, musculoque interno movendi facultas subministratur.

In hac vero partium organi auditus tam insigni varietate si determinandum sit, quæ præcipua sit atque ad audiendum maxime necessaria, distinctione quadam opus fuerit. Nam cum partem respicimus, quæ in primis sonum conservat, intendit, & ad scopum intimum perducit, penes Cochleam utique principatus steterit: cum eam quæ ad recepti soni perceptionem requiritur pervestigamus, utique Nervi mollioris expansio, qui intimo cochleæ gyro accumbit, reliquis partibus dignitate præcellit.

Post videndi, audiendique sensus, non est quod *olfactus*, *gustus*, & *tactus* organa pluribus persequamur. Etenim ODORATUS instrumentum Nares sunt, de quorum ossibus, ac musculis, Capite Decimo tertio,

COMMENTARIUS.

exitu non caret, cum in medio, parte ea, cui spiræ innituntur à principio ad finem usque meatu angusto & recto pervia sit.

Nares] De Naribus, earumque usu ingeniosa sunt quæ proponit *Phys. cap. 12. p. 535.*

Lindanus, ea itaque verbotenus hîc inserere consultum censeo. *Nasus* inquit singulariter dicuntur, *Græcis* πῖς vocatur δὲ τὸ πῆρ, à fluendo, quoniam sinit per eum aër qui inspiratur, fuligo qui expiratur, qualitas odorabilis. & denique cerebi

tertio, præcipuè vero de nervis olfactum perficientibus Capite Decimo quarto satis actum.

GUSTUS organum Lingua est, de cujus substantia, musculorum apparatu, vasorumque copia, Capite Undecimo scripsimus.

Sensus

COMMENTARIUS.

cerebri excrementa. Hinc Hipp. lib. de Natur. human. fluxum fuliginum, odorum, & excrementorum ὁσάν vocat. Officia Nasi I. hist. de Anim. II. Philosophus facit tria: Spirandi, Olfaciendi, Sternutandi: atque is ordo: Naturæ, an dignitatis? Illius. Nisi enim respires, odorem non percipias. Ergo maximè necessaria Spiratio. Non necessaria tamen per nares. Sufficit os: nulli nasus. Magnus Theodora Beza error, veritatis apud Aristotelem: Non posse in pectus trahi spiritum nisi nariibus. Quin ore commodius. Hoc magnæ respirationes docent, intercurrere solitæ & supplere defectum earum, quæ per nares aliquandiu præcessere. Nec aliter in anhelitus difficultatibus. Illud patet in his, quibus narium angustias occupavit polypus. His perpetuo biat os. Quibusdam hoc in somno familiare. Utrique ladi se sentiunt spirando. Quare? quia, ajunt, brevior itinere frigidior intrat in pulmones aer quam expediat. Ego culpam in copiam rejecero. Quam non nocere æstuantibus, imo necessariam esse, experientia testantur. Ergo primus usus, servire respirationi. Servit autem non liberæ soli, sed & coactæ, quæ μετέωρ sublimis dicitur Hippocrati. Loca à Foëfio repeite. In libera Musculorum nasi nulla actio: per cartilagineas enim satis aperta sunt narium orificia. In coacta dilatant alas, ut aer confertus ingredi possit. Cum neque sic necessitate satisfat, ore spiramus. Hanc servitutem pectori debet. Quæ uti prior est: sic potior, quam Sensui exhibet. Licuisset animalibus ore tantum spirare, nisi olfactu indiguissent. Qui cum per aërem fiat, opus hoc adducto ad Sensorium erat. Adduci non potuit, nisi proximè illud esset via, qua commearet in pectus. Ergo primarius usus est Odorum perceptio. Hæc autem fit non nisi facta violenta inspiratione. Quo casu musculorum actio planè necessaria est. Violenta autem respiratio ut fortius aërem odorum attrahat: ita & in angustis narium cogit, ut fiat vis

unita fortior ad movendum sensum obtusorem. Quo beneficio quia carent quibus vel nasus absectus vel nares dissectæ sunt radice tenus, idcirco vel non olfaciunt, vel male. Non destituti interrim commoda spiratione. Istis usibus Aristoteles addit tertium, Sternutandi. Qui abusus est potius. Quippe per accidens. Non enim necessaria sternutatio: utpote non naturalis rei evacuatio: neque secundum naturam. Deinde multi vixerunt sine sternutatione. At nemo sine excretionem à Cerebro per hanc viam. Ergo substituitur isti alius, Excrementorum cerebri pituitosorum evacuatio. Ita dudum Lact. de Opif. Dei c. 10. In naso, quamvis simplici membro, tria sunt officia constituta: unum ducendi spiritus, alterum capiendi odoris, tertium ut per ejus cavernas purgamenta cerebri defluant. Quæ sunt ista purgamenta? Oportet intelligere blennam, quæ ex cortice Cerebri & gyris Piamatris detruditur in cavitatem illam, quam dextra & sinistra cerebri pars facit, & è rima illa, quæ supra Corpus callosum est, delabitur in nares. Nam reliqua, quæ in Ventriculis colligitur, hinc descendit per Os cuneiforme in palatum. Licetne quartum adjungere, quem confert pulchritudini? Foedæ nares patulæ & recurvæ: foediore ablatæ. Foedissimum, ablato naso velut in antra obscura introspicere. Idcirco Deus tam mirabili, quam divina ratione molitus est, ait Lactantius, ut hiatus ipse nasi, oris speciem non deformaret. Ita Lindan. cap. 12. pag. 535.

Odoratus instrumentum Nares sunt] Odoratum hoc modo fieri breviter concipimus. Particulæ odorabiles, subtiles nempè, Sulphuræ, quaquaversum licet ferantur, quia tamen igneæ magis naturæ sunt, sursum maxime moventur, hinc nares & in iis contenta ossa Spongiosa seu turbinata intrant, in quibus purioris a minus puro separatio peragitur. Ex iis partim motu proprio naturali, partim alarum nasi propulsione ad foramina ossis Ethmoidis ferun-

Sensus denique TACTUS cum partibus omnibus communis sit, quotquot aut nervis, aut membranis, nervorum furculis conspersis fruuntur, tractationem organi sui particularem nullam exigit.


COMMENTARIUS.

feruntur, ubi nervos odoratorios per foramina ea ad membranam narium transeuntia vellicant moventque, quos picturam quasi cerebro repræsentare constat.

Gustus organum Lingua est] Gustus ut in linguâ percipiat, particulae gustabiles, salæ nempe, & Mercuriales seu acidæ linguæ applicari debent, non enim per species in distans gustus propagatur, & quod ex Absinthio similibusve variis gustus in ore sentiatur, particulis levioribus vaporis specie exinde fuscitatis imputandum venit. Applicatio autem prima contingit, extimæ parti linguæ, quæ membranâ quadam aspera tegitur, ne facile aliquid devolvatur in gulam. Præterea ibi est Saliva, quâ quicquid Sapidum est elicitur,

comminutione & dilutione, undè in febribus ubi arida est lingua defectu salivæ sapor deest. Et cum saliva alienum saporem habet, omnia talem saporem retinent. Hoc quod jam à salivâ extractum est & ei communicatum, linguam intrat per membranam porosam, ubi penetravit saliva cum particulis lapidis allidit in nervos eosque movet, adeoque sensum cerebro adferre facit. Et hæc quidem ratio gustus & in lingua observatur, & idem in partibus aliis oris, palato nempe, si salsum, aut aridum quid admoverimus, sed ob exilitatem vix considerationem meretur.

Sensus Tactus] De hoc ubi de cuticula & cute.



TABULÆ CAP. XVI. Explicatio.

Repræsentat hæc Tabula, tam externam Aurem, cum Musculis, & Cartilagine, quam internum illud præcipuumque auditus organum, atque adeo cavitates ejus, Officula, Meatus, ac Nervos, quemadmodum in adultis laboriosâ dissectione exhiberi possunt.

FIG. I.

Exhibet Aurem externam integram, cum Musculis, & Sinibus.

- AA* Helix Auriculæ.
BB Anthelix.
C Tragus sive Hircus Auriculæ.
D Antitragus.
E Lobus Auris externa.
FF Concha Auris externa.
GG Cavitas inter Helices innominata.
H Musculus Auriculam rectâ sursum movens.
III Musculus tendine triceps, eandem obliquè sursum trahens, in portiones totidem separatus.

FIG. II.

Aurem designat externam posteriùs conspiciam.

- AA* Cutis cum Membrana deorsum sursumque protracta.
BB Cartilago Auriculam constituens.
C Foramen ad meatum auditorium pervium.
D Pertio Ligamenti externa Auris.
E Lobi Auriculæ pars.

FIG. III.

Auris internæ partem anteriorem ostendit.

- A* Pars Ossis temporum Processum petrosum continens.
B Meatus auditorius.
C Limen meatus auditorii, sive alveare.
D Processus Mammiformis.
 Processus Styloformis abruptus.

FIG. IV.

Os præcedentis figuræ monstratur, in quo meatus auditorius Scalpris excisus est, ut Tympani Membrana detegatur.

- AA* Vestigium meatus auditorii.
BB Membrana Tympani.
C Mallei pediculus per Membranam transparentem.
D Processus Mammiformis.
F Processus vel potius appendix Styloformis.

FIG. V.

Musculos ostendit Auris internæ, in qua

- A* Musculus Membranam cum Malleolo extrorsum movens.
B Membrana Tympani.
CC Musculus Malleolum cum Membrana introrsum movens.
E Caput Malleoli.

FIG. VI.

- A* Meatus auditorii pars ad Tympanum porrecta.
BC Tympani cavitas, in qua
B Foramen ovale, quod Stapede remoto conspicuum.
C Foramen rotundum ejusdem cavitatis.

FIG. VII.

Processum petrosum exhibet, cum Officulis Tympani intra situm, in quo

- A* Malleolus.
B Officulum Incus dictum.
C Stapedis pars superior conspicua.
DD Cochleæ flexus nativâ magnitudine detecti.

Kk

FIG. 7.

FIG. 7.

Officula tria extra Situm spectanda promit.

- A* Malleolus cum Processibus duobus, brevi, & longo, Fabricio ab Aquapendente aliisque descripto.
B Incus Malleolo applicatus.
C Stapes.
D Officulum parvum Ligamento stapedis innexum.

FIG. VIII.

Offis temporum faciem inferiorem complectitur.

- AA* Penna anserina extremum in meatum auditorium transmissa per meatum qui ad palatum fertur.
BB Meatum eundem proximè ostendit ex parte effractum.

FIG. IX.

- AA* Cochlea cavitas, cujus portio latior excurrit ad Labyrinthum.
BB Cavitas Labyrinthi, in quo Foramen ovale, propter Os à latere dissectum, transparet: quatuor Foramina alia in circulos se aperientia, nigro colore innumbrata sunt. Quintum in extremo Cochleae gyro latiori effractum est. Utamque cavitatem, si, quemadmodum in Fœtu preparari potest, integram videre libet, repete capitis octavi Tabulâ primâ Figuram septimam.

FIG. X.

- AA* Principium meatus, seu Foramen primum Offis temporum, in quod Nervus auditorius admittitur.
BB Processus petrosus Offis temporum, in quo demonstrata cavitates continentur.

FIG. XI.














- A.B.C.D.* Finis meatus, in quem Nervus auditorius progreditur, limâ ablato Offe detectus.
B Sinus, in quo portio Nervi auditorii mollior ad Cochleæ centrum recumbit.
C Apophysis inter utramque Nervi portionem pontis instar prominula.
D Sinus alter, ex quo per Foramen, propter Os dissectum transparens, & Cœcum veteribus, Fallopio Aqua ductus dictum, portio Nervi auditorii durior obliquè descendit
EE Vestigia duo circularum in Labyrinthum tendentia, quos vide integros Tab. I. Cap. VIII. Fig. VII. & VIII.

FIG. XII.

Continet Offis temporum portionem, in qua Scalpris dissipato Tympano, & meatu Nervum auditorium fuscipientem, apparet sub

- AA* Portio Nervi auditorii mollior.
BBB Portio Nervi auditorii durior, obliquè sub Tympano descendens, circa exitum crassior.
CC Nervulus à quarto pari, descendenti duriori portioni Nervi auditorii sese jungens.





CAPUT XVII.

De Ossibus Partium extremarum.

A Trunco corporis humani ad ejus Artus, ab intermediis ad partes extremas, manuum adeo, pedumque contemplationem, ordine tum naturæ tum dissectionum perducimur. Quorum hi bajuli corporis totius, illæ promi ejusdem & condi, robustis ossibus, validis musculis, tum vasis quamplurimis, vitæ, alimenti, motusque gratia indigebant.

OSSA

COMMENTARIUS.

H [bajuli totius corporis] Ut solus homo quia animalium sapientissimum erat, manus habuit Organum ante omnia Organa; ita solus inter pedestria bipes fuit & erectus homo, quia manus habuit. Quis enim pronus aut supinus equitare, vitam civilem ducere, scribere, naves construere, aras Deo erigere, omnia telorum genera jaculari, aliasque præclaras & pene divinas artes exercere posset? Fuiſſet prudentissimo animali quadrupedum figura omnino inutilis valdeque incommoda: nam nec cælum intueri, cujus gratia se natum dicebat Anaxagoras, nec vere sedere posset ad contemplationem: fit enim (ut vulgo dicitur) anima sedens prudentior: mitto quod non ei liceret per aspera, inæqualia & declivia loca tam facile ambulare, turres adscendere, domos edificare. Conveniebat quidem ad celeritatem pedum multitudo: sed homini quid ea celeritate opus erat, cum animalia omnia vincat industria sua, plus enim homini potest ratio quam natura brutis, plus lingua & sermonis velocitas, quam levitas ususque pennarum. Bipes ergo fuit & esse debuit, ideoque solus rectus stat, & solus sedet. Pedis proprium officium est ambulare, vera actio est ambulatio, ideo *ὁ γὰρ ἄνθρωπος περὶ τὰ πόδας*, instrumentum ambulatorium, non quidem simpliciter, sed ut maxime conveniat sapienti animali. Fit autem ambulatio altero quidem crure in terra firmato, altero vero circumlato: sed firmari quidem pedis, circumferri autem totius cruris est actio: ergo cum per stationem & motum fiat ambulatio, illius quidem, pedes extremi sunt instrumenta, hujus autem tota crura. Ad firmam autem utramque stationem & ad varios motus

perficiendos, figuram, & structuram qualem cernimus obtinuerunt pedes. Nam & in varios articulos divisi sunt, & oblongi latique constructi sunt, non tamen æque oblongi ac in manibus, non tam ad speciem, quam ut nisu concitatos in cursu juvarent. Etenim pressis in humum digitis mirum est quanto tutius totum propellatur corpus. Sed & cavi in medio fuerunt pedes, ut omnia loca pervadere queant: nam cavis & mediis gibba amplectuntur, digitis vero inrectis, obliquis, declinibus & præruptis utuntur. Pedum maxima est cum manibus similitudo & visi sunt sine manibus quidam, qui pedibus manuum functionem obirent. Laur. Anat. lib. 4. cap. 8.

Illæ Promi & Condi] Hominem audacissimæ & omnia confidenter molientis naturæ decus, nudum quidem & inermem in nuda humo natali die abiecit Deus ad vagitus statim & ploratum: sed duobus eum armavit præsidis validissimis, quæ cæteris animantibus denegavit, ratione & manu. Ratio artium omnium ars est & officina, ars ante omnes artes, manus organum est ante omnia organa. Cum enim nullum sit eorum, quæ particularia sunt omnium tamen est capax, & ut de anima dicebat Philosophus, potestate quodammodo est omnia. Manuum opera leges conscripsit homo, aras erexit Deo, naves, domos, lyram, omnia telorum genera construxit. Taceo pingendi, fingendi, scalpendi nobile artificium. Manibus pollicemur, vocamus, dimittimus, miramur, supplicamus, abominamur, timemus, interrogamus. Manuum opera licet inermis nascatur homo, à mutis tamen animantibus tutus est, & ea omnia, quæ firmiora nascuntur, imo ferociora, etiam si

OSSA quæ communiter MANUI adsignantur, sunt Humeri, Cubiti, & propria tandem Manus extremæ. Humeri ossis stabilimenta sunt Claviculæ cum Scapulis.

CLAVICULÆ utrinque os constituunt UNUM, pectori imminens, FISTULOSUM, CRASSUM, atque in viro magis, quam femina FLEXUOSUM.

Extre-

COMMENTARIUS.

etiamsi vim cœli fortiter patiantur, ab homine tamen tutæ esse non possunt plus denique, homini confert manuum industria, quam taurorum impetus, ferini aliorum dentes, ungule: nam quicquid universi ambitus complectitur, manuum solertia nostri fit juris. Ideo Anaxagoras quidam Physicus animadvertens, quanta cum ratione & quam scite hoc membrum fabricata natura esset, pronuntiavit, non posse ad ullarum rerum effectum excogitari organum magis affabre, aut accuratius perfectum, nec dubitavit, ut refert Plutarchus ἐν τοῖς χερσὶν τὸ αἰτίαν πρὸς τὸ ἀθεραπεύεσθαι, id est, manibus adscribere sapientiæ humanæ ortum & causam. Quod tamen non probat Galenus I. de usu partium. Non enim ideo sapientissimum est animal homo, quia manus habuit: sed quia est sapientissimum animal, ideo manibus instructus fuit: manus namque hominem artibus non instituerunt, sed ratio. Sunt manus rationis & sapientiæ Ministræ, sermonis velut vicariæ, conceptuum interpretes: cogitationes enim nostras amicis per litteras significamus. Manus fidei consecravit Numa Pompilius, propterea manuum contactu pacta confirmamus. Fuit etiam Persis sanctissimum fidei pignus: ideo majorum hæc fuit salutatio, ut hæc potissimum se corporis parte venerarentur. Qui adorant, manum soleni deosculari & capita submittere. Manus in Ægyptiorum Hieroglyphicis fortitudinem denotat, ideo qui auxilium querunt, dextram petunt. Est apud Chironamicos manus non modo organum organorum, sed velut figura temperamenti, habitus, morum: ut talis sit apud eos extima vola manus, qualis est intima cordis. Stigmata enim & lineamenta manus videntur esse velut cœbrum impresiones & naturæ nostræ vestigia, quæ internarum rotarum motus, utinam inclinationem, infortuniam, vitæ longitudinem & brevitem denotant. Ea denique est manuum dignitas, ut ideo figuram rectam & in

cœlum versam habuerit homo, quia manus habuit. Idem lib. 12. cap. 3.

Humeri ossis stabilimenta sunt Claviculæ cum scapulis] Reperiuntur quidem qui scapulam & claviculas ad Thoracem referunt, alii eas ad humerum & manum referunt. Et revera Thoracis, ad cuius constitutionem & perfectionem nihil faciunt, partes esse non videntur, posticâ enim solum parte ipsi accumbunt, ab eâque dependent.

Claviculæ] Claves etiam, Græcis κλεῖδες ἀπὸ τῆς κλῆω jungo, quod una cum scapulâ jungant summitatem pectoris, ab una enim parte cum summitate pectoris, ab altera cum scapula conjunguntur, & osse brachii. Aristoteles ad longævitatē vitæ conferre dixit, quoniam detinet brachium longè à pectore, quod alias gravaret pectus respirationis libertatem impediret, quæ sanè ad vitæ longævitatē summopere facit. Fernelius, Celsus, Plinius, aliisque Jugula appellantur triplici ratione. 1. quod cum jugulis quæ boum cornubus imponuntur figuram habeant. 2. quod unâ extremitate pectoris sterni junctâ vasa custodiant, quibus discissis jugulatur animal ob Hæmorrhagiam summam. 3. quod jungant sternum cum scapula. Conjunctæ hæ claviculæ cum summitate pectoris efficiunt eam figuram quâ Carpus aliique Furculam appellant, & quidem superiorem ad differentiam inferioris. Spiegel. l. 2. c. 15. aliiq; Claviculis nomen illud competere volunt, quod antiquorum clavisbus similes sint, figuram enim habent S majusculi Romani, cujus figuræ antiquitus fuisse perhibentur ædium claves. Undè & dicto loco refert, se juvenem cum Patavii litteris & Medicinæ incumbere, in antiquissimis ædibus hujus figuræ claves adhuc usurpatos vidisse.

In viro magis quam foeminâ flexuosum] Figurâ intortæ sunt, instar S litteræ Latinae,

Extremorum uno sterno **C O N T E R M I N U M** est, altero cum scapulæ processu superiore, ubi acromium sive humeri summum producit. Nexum ejus laxa quidem, sed valida **L I G A M E N T A** assumptis insuper cartilaginibus firmant.

At **SCAPULA** os est **L A T U M**, & **T E N U E**, non tam ad costarum dorsalium tutelam, quibus scuti instar incumbit, quam claviculæ, & præcipue humeri, tutam articulationem **C O M P A R A T U M**.

FIGURA triangulum exhibet, longiore latere in *basin* porrectum, cum qua reliqua duo, longitudine inæqualia, *Angulos* duos, superiorem unum,

C O M M E N T A R I U S.

& quidem in viris, ut dicit etiam author noster, magis quam foeminis. Illud propter musculos & vasa colli imprimis necessarium; hoc uti majus robur Viris, ita pulchritudinem majorem foeminis conciliare cum *Hofmanno Institut. Medic. cap. 100. §. 13.* docet *Cl. Lindanus Phys. pag. 617.* Verum accedere cogor hâc in re *Thom. Barthol. Vindiciis Anatomiae. Hofmanno Oppositis pag. 131.* ita differenti: *Claviculas in viris quam foeminis intorqueri magis, non putarim ad majus esse partium robur, quia illud in sexu discrimen perraro observatur; nec ab incurva clavicula formâ robur dependet, quum etiam in rectiori clavicula musculi potuerint inseri; sed à potentiâ caloris masculi. Cederem ad ornatum potius hæc comparata in foeminis ad pulchritudinem compositis.* Incurvatio hujus claviculæ respectu figuræ in hoc consistit; quod circa jugulum extrorsum convexæ seu gibbosæ sint, intus qua respiciunt Thoracem cavæ; contra verò ad scapulam extrinsecus leviter sinuatæ sint, intus convexæ, sic ut semicirculos duos opposito modo junctos videantur efficere.

Extremorum uno sterno conterminum est] Capitulum hoc est oblongum depressum figuræ quadrangularis, Epiphyssi atque superadditæ cartilagine donatum. Ad distantiam circiter sesquidigiti transversa (in adulto homine) ab illo capitulo, interius, ubi clavicula primam costam respicit, *Cl. Senguerdus* adhuc tuberculum aliud exiguum adesse notat in *Osteologia.*

Scapula] Nomen habet à cavitate, quæ scapham refert. *Scoptulem opertum à Celso* dicitur, *Riolanus in animadv. in Hofman. Sco-*

pulum opertum legit, ita, dum musculis tegitur, dictum, ut scopulum significat eminens quodvis. *Omplata* Græcis, quod ita lata sit sub humero, vel quasi humeri latitudinem constituens; videatur *Lindanus.*

Os est latum] De ejus quantitate notat *Forest. lib. 28. Observ. 70.* viros latis scapulis præditos foetus gignere admodum magnos. Hinc *Socrus Foresti* filias suas dare noluit viris scapulis amplis instructis, ne scil. in partu foetus magnitudine periclitarentur. Difficile dictum est, quare Gallicæ puellæ dextri lateris omoplatam plerumque sinistrâ altius sitam habeant, ut refert *Riolanus.* In Germania in quibusdam qui gibbosi ex ignotis initiis sunt, altiorum fere semper sinistram apparere scapulam observasse se scribit *Rolsinck. lib. disq. Anatom. 2. cap. 43.* cujus rei causam inquirens ita in hunc modum loquitur: Fitne frequentiori dextri brachii motu, quoniam pulmones & jecur ad dextram partem magis inclinant? an vero quia nutrices pueros ambulare incipientes sinistrâ manu frequenter præhenso trahunt violentius? imò recens natos teneros, dum continuo portant, infantes sinistrâ, inclinatione continuâ ad dextrum latus, sinistram magis elevatam gestant scapulam. Adfuetudine continuo habitus fit tandem.

Non tam ad costarum dorsalium tutelam] Quam ad ipsius cordis defensionem, posteriora enim cum manuum auxilio destituantur, aliis opus habuerunt munimentis.

Tutam articulationem] De hæc eleganter differentem adi *Vesal. lib. 1. hum. corp. fabr. cap. de Scapul.*

unum, alterum inferiorem constituunt. Concavum intus, exterius gibbum.

PROCESSUM emittit triplicem: quorum *unus*, qui summum humeri contingit, scapulæ *Spina* ob speciem vocatur, claviculæque connectitur. *Alter* humilior & minor, corvino rostro non absimilis, *Coracoides* appellatur. *Tertius* brevior est, intra cujus sinum, cartilagine ampliatus, humeri caput reconditur.

Accedunt his ADDITAMENTA propria, tum LIGAMENTA singularia, quibus capiti humeri, claviculæque scapula jungenda fuit. Illorum *quinque* vulgo recensentur, ac *primum* quidem latius cæteris, à supercilio processus brevioris enatum articulum totum ambit, atque in capitis humeri priorem, internamque regionem defigitur. *Alterum* insigni robore præditum, ab externo coracoidis processus latere productum, in acromium interius inseritur. *Tertium* ligamentum, rotundum, exterius à coracoide processu & ipsum originem sumit, atque in humeri capite interius terminum consequitur. *Quartum* superius à cer-vice scapulæ productum, caput humeri exterius sibi conjungit. *Quintum* idem cum priore nactum principium, circa exteriora capitis humeri posterius finem adipiscitur. Atque hæc ligamenta, quemadmodum articuli humeri cum scapula robur spectant; sic tertium, quartum, ac quintum, tendinibus musculorum humerum circumagentium suscipiendis aptata sunt.

Jam HUMERIOS amplum satis, & validum, caput obtinet magnum, & cartilagine superne munitum.

SCIS-

COMMENTARIUS.

Scapulæ spina vocatur] Sunt qui hîc diver-
sitatem aliquam agnoscunt inter spinam sca-
pulæ & extremum ipsius spinæ, quod in specie
Acronium vocatur, & *Galenus* atque cum eo
Riolan. Expos. de Ossib. cap. 2. contra *Vesalium*
id dari negantem separatim os constituunt ab
ipsa spina, sic ut sit intermedium aliquod os
cujus ope scapulam cum clavicula connecta-
tur, licet & vox *Aeromii* quandoque pro ipsa
dictorum ossium articulatione fumatur, sed
hoc sensu non tres, sed quatuor essent consti-
tuendi processus; & minimè necesse est diffe-
rentiam illam admittere, cum notetur proces-
sus ille spinosus continuato ductu usque ad
extremum excurrere. Cui tamen volupe est os
separatum hîc statuere, ei neutiquam repu-

gnabo, cum sæpissimè id distinctum & lineâ
manifestâ separatim observaverim.

Tertius brevior est] *Vesalius* hunc processu-
bus scapulæ non annumerat, sed simpliciter
Cervicem vocat, sicque duos tantum processus
exhibet. *Galenus lib. de ossib. cap. 14.* utroque
nomine utitur processum & cervicem scapu-
læ hoc appellans. A plurimis Anatomicis
etiam sæpè absolutè *Cervix* dicitur.

Amplum satis] Quantitate continua seu
magnitudine maximum omnium esse Os Hu-
meri, excepto femore pronuntiavit *Galenus*.
Hoc multis calumniandi occasionem præ-
buit, cum tibiæ os majus sit. Aliqui excusant
& ratione usus & actionis intellectum volunt,
quoniam ad multas actiones adhibetur exer-
cendas.

SCISSURA præditum antèrius, supra quam bicipitis musculi tendinosum principium alterum tutelæ roborisque causa descendit.

CONNECTITUR scapulæ per diarthrosin, id est, dearticulationem, Coracoide ejusdem processu cum spiniformi securitatem articulo præbentibus.

Intermedium humeri GLOBOSUM antèrius est, posterius *Depressum*.

Cæterum ut humeri superior pars manifesto semper APPENDICE prædita conspicitur; sic inferior mature oblitteratis appendicis vestigiis, PROCESSIBUS, iisque geminis, potissimum extuberat. Horum

COMMENTARIUS.

cendas. Imo poterit etiam femoris magnitudo & humeri eâ ratione comparari, & quodlibet ipsorum ad proprii generis, non ad alterius ossa referri, ut sit humerus totius manus pars maxima, sicut femur totius cruris. Sic os sacrum maximum est totius spinæ. Interdum ossa ab usu & officio magna dicuntur potius, quam à molis dimensione vel pondere. Ea ratione Pollex magnus digitus, & secunda cervicis vertebra magna appellatur, quia hæc magis potest in partem anteriorem moveri, & in posteriorem repelli: ille vero omnibus aliis digitis præstare creditur, quia cæteri sine eo inutiles ferè sunt.

Per diarthrosin] Quenam hîc detur diarthroseos species non omnes eodem modo exprimunt. *Baubin* lib. 4. cap. 26. dicit esse arthrodiam: sed magis hic placet cum aliis *Spigel* qui lib. 2. cap. 28. docet esse Enarthrosin, propter cartilaginem cavitatem ampliandam.

Inter medium humeri &c.] Hoc os humeri in superiore parte latum est; sed in descensu statim minuitur & angustius redditur: quale manet usque dum ferè perventum sit ad caput inferius, quod cubito jungitur, ubi dilatatur & planius redditur, acquiritque latitudinem multo majorem quam datur in ipsius parte superiore.

Cæterum ut humeri superior pars manifestè semper appendice prædita est] Accuratius ossis hujus superiores appendices exhibuit *Senguerdius* *Disput. Phys. de Scelet. septimâ*, ubi *Thesi 3.* hoc modo loquitur: Parte superiore, Epiphysin sive appendicem habet, donatam duo-

bus capitibus, interno & externo: sive, quo idem significo, totum superius caput est Epiphysis, divisa in duas partes, sive duo capita, sinu distincta, quorum unum est internum, alterum externum. Internum est magnum circulare, læve, cartilagine obductum, accommodatum omnibus humeri motibus ciendis: Inseritur acetabulo cervicis scapulæ per Diarthrosin. Externum interno multo minus est, & magis inæquale: multa foramina in se continens, spongiosum. Non excipitur in alterius ossis sinu. Dirimitur rursus intercedente sinu in duo capita sive tubercula, instar collis prominentia, quorum unum antèrius est; alterum posterius; ex quibus antèrius à posteriori non parum superatur magnitudinè. Sinus ille quo partes capitis exterioris à se invicem distinguuntur, antèrior scilicet à posteriore, magnus est in parte inferiore: extenditur enim per os humeri deorsum, in longitudinem quatuor vel quinque digitorum transversum.

Maturè] Circa primum septenarium.

Processibus iisque geminis potissimum extuberat] Processus sinulque inferiores ossis humeri admodum obscure tradit *Veslingius*, lucem dabunt ea quæ de his mecum non semel ossa perlustrando concepit litterisque consignavit *Arnold. Senguerdius*. Desinit (verba ejus sunt *Disput. citatâ legenda*) in varios processus qui possent quidem quinque numerari; sed facilius constitutio illius intelligitur, si primo notentur duo processus extremi, unus exterior, alter interior; Deinde inter hos extremos processus, consideretur Rotula sive Trochlea, ita à similitudine trochleæ, ad quam funes volvuntur, vocata, quæ cartilagine obducta est. Hæc trochlea

extra

rum *externus* metacarpi digitorumque manus extensoribus musculis principia præbet: alter *internus* carpi & digitorum flexoribus exortum suum largitur. Accedit his *exteriùs* *prominentia* alia, ad radii commodiorem flexum comparata.

SINUS hic spectantur quoque *duo*: è quibus *anterior* minor est, *amplior* autem *posterior*, quos circa veluti trochleam ulna convertitur.

CUBITUS è duplici componitur osse: quorum extrema quidem commissa sunt; intermedia autem invicem secedunt, quamvis membranoso *ligamento* copulata. Idque, ut non levior tantum cubitus, atque ad motum expeditior foret, sed etiam musculi tutâ magis regione disponentur.

Ossium cubiti primum ULNA vocatur, quia res mensurandas ad hujus longitudinem sæpius exigimus: olim os *cubiti*, *cubitusque* singulariter dictum fuit; quemadmodum humeri os brachium appellatur.

Id altero AMPLIUS est, LONGIUS, & à dorso latiore sensim velut in aciem attenuatum.

PROCESSUS obtinet supernè duos: *minorem*, ac magis acutum, qui antèrè conspicuus: tum *majorem*, magisque retusum, qui posterius, & *Ancon* à veteribus, atque *Olecranon* dictus fuit.

Addendi his SINUS duo, quorum *externus*, ac *minor*, caput radii à latere excipit: *amplior* alter, & *femicircularis*, per quem ulna humero jungi-

COMMENTARIUS.

extra processus anteriore sui parte prominēt, & distincta est in tres protuberantius, duobus intermediis sinibus, divisa: quorum tuberum sive processuum medius minimus est. Præterea, in parte anteriore prope & supra trochleam, inter dictos exteriores processus, notabilis occurrit cavitas sive sinus, os cubiti in se recipiens. Hic sinus in medio interstitium habet, ut sit quodammodo divisus in duos sinus, dextrum & sinistrum, sive interiorem & exteriorem. In postica parte inter eosdem processus exteriores, etiam occurrit cavitas sive sinus, sed qui priorem profunditate multum superat, in quem se insinuat ulna, sive caput inferioris ossis cubiti, quod movetur circa rotulam, cui per illam speciem articulationis, quæ *ginglymus* vocatur, conjunctum est.

Cubitus] A cubando Latinis dictus, ordinarium enim ferè meditabundus est & otiosè sedentibus caput cubito velut suffulcire.

Ulna] Græcum nomen est, inquit Lindan.

Phys. pag. 624. ὀλένη: unde nostrum. Eadem ὀλένη & πήχυς, ulna & cubitus. Pollux etiam πεπύχυν ab aliquibus appellari ait. Barbari, focile majus. Id proculdubio est à *focillo*, *foveo*, *faveo*, *adulor*. Pro illo alii *foculo* aut *focilo*. *Foculo*, πήνεια. Idem: *Focillo*, ἀναλαμβάνω. *Philoxenus*: *Focilat*, ἡσπάζω. Omnium horum signa facimus complexu ulnarum: amoris, favoris, obsequii. Nutricibus nihil prius, quam alumnos suos ulnis excipere, gestare, fovere, tueri. Alumni vicissim matri adhærescere solent & earum parvis adducere colla lacertis, ut *Naso* 6. *Metaph.* 626. *canit*. Conjugis amplexum venuste & pudenter exposuit *Claudianus* II. in *Eutr.* 187. Advolat, & niveis reducem complectitur ulnis, Infunditque animo furiale per oscula virus. Sic apud *Papinium* I. *Achill.* 574. *Thetis*, nil mali timens, *Achilles* occupat ora canentis, Et ligat amplexus, & mille per oscula laudat.

jungitur articulatione, quam ginglymum Græci nuncuparunt. Inferior ulnæ pars in rotundum definit tuber, & *processum* minorem acutum, qui *Styloides* vocatur, partimque cartilaginis interventu, partim ligamento carpi officulis **C O N N E C T I T U R.**

Alterum cubiti os **RADIUS** dicitur, **SITU** superius, & **BREVIUS**. Hoc extremorum uno tenuius, rotundoque præditum **CAPITE**, ab ulna proxima excipitur; quamvis & sinu singulari humeri os admittat. Altero extremo crassius evadit, **SINU**que minore ulnam, majore verò carpi officula suscipit.

Manus extrema tribus distinguitur partibus, Carpo, Metacarpo, & Digitorum phalange.

CAR-

C O M M E N T A R I U S.

[Qui *styloides* vocatur] Hic *στυλοειδής*, *αν* *στυλοειδής* & *γυροειδής* dicendus sit certamen certatum inter coccos. Ita loquitur Hofmannus, quis enim qui oculis uti potest ausit illum comparare cum stylo seu calamo scriptorio? *στυλοειδής* est à *steles* seu columnæ similitudine, Critico huic se opponit Barthol. in *Vindiciis suis Anatomicis* pag. 131. his verbis. Coccorum certamini se luscus ingerit. Quamvis enim ulnam styli acuti speciem non referre quidvis videat, acutiorem tamen esse radio, vel luminis orbis deprehendat, quippe utraque parte exstante & eminet, & acuminatur. Quin ipse fatetur tenuiorem esse inferiore. Quid quærimus ultra? præferre ipsi placet *σύλλω*, columnæ similitudinem, verum sine perpiscillis observavit columnæ appellationem minus mereri, quam vel radius, vel cubitus. Hujusmodi quisquiliis non attingerem, nisi ipse Anatomicos eodem pacto lacestrivisset, in minimis superbus verbisque ingeniosus. Sed sanè uterque hinc errare videtur, processum enim hunc stylium non referre rectum concedo, attamen recurvatum aliquo modo repræsentare certò assero, unde & à *Senguerdio* ungui gallinæ comparatur; talis figura qua ratione cum columna conferri queat, vellem mihi ab Hofmanno demonstrari, ego sanè comparationem illam non intelligo, & quod Bartholinum spectat, confundere videtur Ulnam totam cum processu: Neutiquam ab Anatomicis ne quidem ipso Hofmanno quæstio instituitur, an ulnæ os acuminatum magis radio sit, sed an processus inferior ulnæ referat stylium, quod

minimè ut debebat probat. Notat Fallop. *Expos. de ossib. cap. 27.* illam prominentiam styliformem manifestissimam esse in simia, non ita in homine; quod cum *Senguerdio* non ita accipiendum judico quasi ipse neget eum processum in homine dari, sed quod velit in homine illum non exhibere ita accuratè figuram recti styli, visus enim docet illum processum non esse homini denegatum.

[Rotundoque præditum capite] Non remotè ab hoc capite, vix ad distantiam unius digiti transversii tuberculum habet in parte interiore versus ulnam, cujus usum credimus esse firmiorem efficere musculorum insertionem.

[Altero extremo crassius evadit] Et in hoc capite plurimæ exiguæ protuberantiæ notantur, insertioni musculorum inservientes.

Manus extrema tribus distinguitur partibus &c.] *Extrema manus* tres habet partes dissimilares, *Carpum*, *Metacarpum* & *Digitos*. *Carpus* Græcis *καρπός*, Latinis *Brachiale*, *Rasseta* Barbaris, *Roseta* aliis, quia eam partem rosis ac variis floribus exornare solebant, octo constat ossibus, duplici ordine distinctis, quæ propriis carent nominibus. *Μετακαρπιον*, *αρθρον*, & constructionis forma cum pectore *σθῆθος*, Pectus, *κατένιον*, Avicennæ Pecten manus, Post brachiale, Celso *Palma*, dividitur in partem internam & externam. Interna quæ manum cavam reddit dum exporrecta est, *Σεία* Hipp. dicitur, quia per ipsam ictus insilgantur, Latinis *Palma*: dum curvata & concava, *ροτὸν* Vola manus. Externa quæ est aversa manus, *ἐκδοτὸν*, dicitur.

CARPUM OCTO absolvunt officula, MAGNITUDE, FIGURISQUE nonnihil discrepantia.

Quatuor horum inferius locantur, totidem metacarpi ossibus per synarthrosin JUNCTA: quatuor vero superius, è quibus tria cubito, radioque committuntur, quartum extra ordinem primo insistit.

LIGAMENTO compinguntur cartilagineo, tum communi alio transverso, quod tam ossa carpi tuetur, quam tendines musculorum ad digitos porrigendos coërcet.

METACARPUS QUATUOR ossibus componitur, LONGIS; sed gracilibus, atque intermedia regione sejunctis, ut sedes musculis interosseis tutior præberetur, nec manuum agilitatem pondus grandius remoraretur. APPENDICES habent inferiores latiusculas, quarum sinus carpi officula subeunt: superiores rotundas, ut aptius digitorum ordines sustineant.

DIGITOS, annumerato pollice, QUINDECIM perficiunt ossa,

COMMENTARIUS.

In palmâ & volâ manus multæ observantur particulae. Nam ejus initium aliquantulum extuberans *πίζαχευς*, Radix manus vocatur: medium, *μετασθίων* quasi Interstitium. Sunt & Tubercula manus pulpam constituentia Monticulos vocant Chiromantici & Lineæ. Monticuli prominentiores sunt & carnosiores partes, *γένεα* proprie dicuntur, *ἀπὸ τῆς γένειν*, id est, à Percutiendo. Monticulus pollicis substratus, mons Martis: qui indici adhaeret, mons Jovis: qui medio, Saturni: qui annulari, Solis dicitur: qui minimo subjicitur, Veneri dicatus est: Thénar autem, id est, spatium quod pollicem indicemque intercedit, Mercurii montem, hypothenar montem Lunæ vocant. Linea vero seu incisura, *χαίμα* & *τομή* in volâ manus multæ sunt, ex quarum aspectu Chiromantici mira pollicentur, & vitæ longitudinem ac brevitatem, infortunia, nativam inclinationem, eventus omnes præfagiunt. Quatuordecim describi solent, sed tres sunt præcipuæ: prima pollicis ambitum circumscribens *ὠκυρότης*, vitifera, Linea vitæ nuncupatur, ab aliis *καρδιακή*, *χρονική*, temporalis. Secunda transversim per mediam volam delata ad Lunæ montem extenditur, *ἡ πάλκη*, jecoraria, *αἰαγική*, naturalia dicitur. Tertia ab hypothenare incipiens, ad indicis monticulum fertur, Mensalis, Thoralis & Veneris linea

appellatur. Cæterum manus prona *πρηνὴ χεὶρ*, Supina *ὑπὲρ* dicitur: dum vero clausa est, *πυγμή* pugnus vocatur: dum compressa & digitis complicatis, ita ut articuli, præcipue medii digiti exstant, Condulus vocatur, unde condulo ferire dicunt. Rursum observandum manus duas esse: adjutricem enim alteri alteram efficit natura. Dextra *δεξιὰ*: sinistra, *ἀριστερά*, *λαία*, *ἀσκαία* dicitur. Sunt qui utraque manu commode utuntur, & hi *ἀμφότερον δέξιοι*, ambidextri appellantur. Mulier apud Hippocratem sect. 2. Aphorismorum ambidextra non fit. Videatur Laurent. Anat. lib. 12. cap. 6.

Digitos] Postrema superest manus pars, quæ digitos complectitur, *δάκτυλοι* dicuntur, quorum ordines velut in aciem dispositi *φάλαγγες* vocantur. Eorum pars vel interna est, vel externa. Internæ partis articulationes Internodia *συντελίδες*, *κνύδλοι* dicuntur: eorum autem partes extremæ ubi pulpæ teretes digitos terminant, *ῥαχες κερυφαί*, Latinis *urvae*, vertices, acini, cacumina. Externa pars protuberantias habet juxta articulos, quæ Græcis *κνύδλοι*, nobis Nodi dicuntur. Primi *πρωτοκνύδλοι*, medii *μεσοκνύδλοι*, postremi *μετακνύδλοι*. Sunt autem in quâlibet manu quinque digiti, nec plures aut pauciores, ut perfecta fieret apprehensio, esse debuerunt. Si enim pollicem demas, aliorum

ossa, MAGNITUDE diversa. Nam quod in unoquoque digitorum primum est, id amplius secundo; secundum iterum tertio, quod unguis munimento obtegatur.

Singula exterius ROTUNDA, interius complanata sunt, ut facilius esset solidorum comprehensio.

PROCESSUS obtinent latos inferius, quorum SINU quæ subdita sunt excipiunt: tum rotundos superius, quibus intra sinus aliorum excipiuntur.

Alteram extremorum partem PES constituit, qui sub communi hocce nomine, Femur, Crus, & Pedem deniq; proprie sic dictum comprehendit.

FEMORIS OS utrinque UNICUM est, robore tamen, & MAGNITUDE nulli secundum, utpote quod molem corporis universam robustâ cervice sustinere debuit.

ROTUNDUM est anterius, posterius nonnihil compressum, atque *aspera* veluti *linea* insignitum, sicque oblique versus inferiora protensum homini promptiorem genuum commissionem concedit.

APPENDICES habet superius inferiusque insignes, PROCESSI-

SESSI-

COMMENTARIUS.

omnium vis & robur perit, si minimum tollas, vix ea quæ circulo apprehendi debent amplexaberis. Fuerunt autem inæquales, ut figuras omnes & moles magnas parvasque comprehenderent. Primus, quod robore cæteris æquipolleat *Pollex* dicitur, Græcis ἀντέχειν, *Hipocr.* μέγας καὶ διήκων, quod duo tantum habeat internodia. Habet hic digitus peculiare musculos flectentes, extendentes, abducentes, quia habet in suis motibus aliquid peculiare. Secundus δεικνύς *Index* & *Demonstrator* ab usu vocatur, quod eo in rebus indicandis uti soleamus. *Laurent. lib. 12. cap. 7.*

Exterius rotunda, interius complanata sunt Per exterius hic author partem manus externam, per interius internam denotat. Ast quæri & hic possit, num hæc ossicula in suâ interiori cavitata medullæ expertia sint, nec ne? sunt qui affirmant, sunt & qui negant. Placet sententia negativa plurimivè Recentiorum, qui epim illorum opinionem assumemus, cui sententia ipse manifestè reclamationem.

Femur Latinis ita dictum volunt à ferendo, quod hac parte præcipuè animal sustineatur & feratur, Græcè dicitur μέγας, quam vo-

cem deducunt à verbo μέρω *divido*, vel nomine μέρῳ pars, quod à femore animal quasi dividi incipiat, quam accuratè Grammaticus videat. Os femoris utrinque unicum est, quod longitudine, crassitie & soliditate reliqua totius corporis humani ossa superat. Excavatum est in modum fistulæ. Figura ejus oblonga & rotunda est; non tamen penitus recta, sed oblique introrsum versus genu descendens: à parte anteriore gibba; posteriore concava: circa extremitates, præsertim inferiore parte, lata. Superior ejus pars per Enarthrosin articulatur cum Ischio, inferior per ginglymum, cum tibia; sed ginglymus non adeo evidens est, qualis fuit ossis humeri cum ulna, unde *Spigelius* dicit hæc committi per Enarthrosin.

Femoris os Huic ossi vicinus fuit Tumor ille enormis post annum septimum, plurium medicorum calculis, si non excedere, saltem suo pondere, accedere quam proximè, ad illam strumam, quam ibidem loci, olim vidit *Antonius Benivenius*, ponderantem sexaginta libras visus de quo summum illud *Amstelodamensium Medicorum Lumen Nicol. Tulpinus lib. 13.*

SIBUS suis junctas. *Superior* appendix cum adjuncto processu, amplum, globosumque femoris caput constituit, valida cervice subnixum, quod intra cavitatem ossis Ischii, Ilium, & Pubis concursu productam, (Acetabulum alias, Pyxidemque nominant) reconditur. Detinetur in hoc sinu robustis **LIGAMENTIS**: lato uno, & membranoso, quod articulum totum circumdat, tum *rotundo* altero, & *tereti*, quod ab ipsa cavitate productum, statim in caput susceptum demittitur.

Sub cervice femoris gemini spectantur **PROCESSUS**, & ipsi appendicibus suis adaucti, quorum qui *exterior Trochanter*, sive *rotator major* dicitur, sinu, lineisque propriis conspicuus. *Interior*, qui obtusi tuberculi figuram designat, *Trochanter*, sive *rotator minor* appellatus. Uterque horum, provido naturæ instituto; robustis musculis, aut stabile principium, aut validam tutamque insertionem largitur.

Inferior femoris appendix cum processu suo paulatim crassescens, gemina protuberantia, ac veluti capitibus duobus amplis, tibiæ subjectæ sinibus incumbit. Cavitatem ut antè levem, ita postèrè valde notabilem exhibet: per quam vasa ampla cum quarti paris vasto nervo ad crura deferuntur.

NEXUM femoris cum Acetabulo suo Enarthrosin veteres nominant, cum Tibia verò ginglymum.

Apposuit postèrè natura inferioribus femoris appendicibus *ossa sesamoidea* duo, quæ musculi gasterocnemii principia in motu validiore tumentur.

Antèrè femoris cum tibia articulo **MOLA** incumbit, quam & *Patellam* vocant, os **BREVE**, ac **ROTUNDUM**, tendinibusque musculorum tibiæ extendentium innatum.

E car-

COMMENTARIUS.

lib. 13. Observat. Medic. cap. 51. *Ida famula Regneri Neckii, amici nostri percussa vehementius, sensit ex inopinato illo terrore, nescio quem sibi oriri dolorem, circa genu, cum tumore femoris, indies usque eo invalescente.*

Gemini spectantur processus &c.] Præter duos & cervicem, hic attendi solent duo processus *Trochanteres*, Latine *Rotatores* dicti, quorum unus externus, alter internus est. Externus extrorsum protenditur, magna cavitate sejunctus à capite, cui opponitur: multo major est altero processu: undè etiam *rotator magnus* vocatur. Internus igitur multo minor est, qui ideo *rotator minor* nomina-

tur. Hic interius situm habet à parte postica, sub capite extra cervicem spectat & inclinatum est retrorsum. Præter duos hos processus, tertium adhuc in sceletis variis observavi, quod tuberculum est, magnitudine cedens duobus superioribus processibus: hic tertius processus, opponitur rotatori minori, extèrè quodammodo parte: situm habet sub rotatore majore. Sub hoc minimo processu, impressio vel finis datur longus, non multum excavatus, undè initium sumit linea deorsum tendens & os quodammodo acuminans.

Patellam vocant] Imò & *Scutum genu*, seu *Os scutiforme*.

E cartilaginea SUBSTANTIA paulatim osseam soliditatem acquirit. Planius foris est, & FORAMINULENTUM, intus gibbum, & cartilagineâ crustâ obductum.

Laxior tamen ejus NEXUS, ut luxationis alioquin proclivioris incommodum avertat, motui tamen musculorum haud officiat.

Cæterum CRUS, cujus nomine aliis pes universus denotatur, veluti cubitum, duo componunt ossa, crassitie, & robore plurimum differentia, intermediis partibus sejuncta, valido intercedente ligamento, musculis pedem moventibus sedem meliorem concedunt.

Primum itaque horum ac præcipuum TIBIA nominatur, AMPLUM pariter, ac validum, atque ob laterum varietatem TRIANGULI in modum protensum. Equibus quod antè versus interiora porrigitur, carne prorsus destitutum, propter acumen anguli veluti *spinam* constituit.

APPENDICIBUS intumescit magnitudine diversis. Quarum ea quæ *superior*, amplitudine insignis est, posteriusque duobus veluti capitibus diducta. In summo, duobus oblongisque *sinibus* concava femoris inferiorem appendicem suscipit. Ex intermedio sinuum tuberculo, ac veluti sepimento, enascitur *ligamentum* robustum, articulationi firmandæ cum primis idoneum, cui suppetias ferunt, tam membranosum illud, quod articulo ferè toti circumdatum, quam alia particularia, tum posterius, tum à latere externo, internoque accedentia.

Inferior tibiæ *appendix* minor est, *processu* tamen notabilis, qui ad internum pedis latus prominens *Malleolus internus* appellatur. *Sinibus* quoque prædita diversis, laterali uno, cui fibula proximè accumbit; duobus item aliis, levi protuberantiâ distinctis quibus talus subjectus admittitur.

Quemadmodum autem tibia superius femori; sic inferius quoque talo per ginglymum COMMITTITUR.

Alterum

COMMENTARIUS.

Ut luxationis alioquin proclivioris incommodum avertat] Sicque in locis declivioribus, & ubi pedis extensio firmior requirebatur ambulatio impediretur, aut prorsus pectus iret, quemadmodum solet accidere iis, quibus hujusmodi os fractum aut luxatum est, cum plana quidem loca tuto adire queant, at decliviora sine metu casus, nequeant. Vidit D. Sladus utrumque hoc os per transversum fractum à

Chirurgo Stapelmoer sanatum nullum incommodum peperisse ægræ, nisi quod in graduum descensu paulo tardior esset.

Ex intermedio sinuum tuberculo] Hoc tuberculum cum etiam notabilem in se contineat sinum, possunt in Epiphyssi superiore Tibiæ tres sinus constitui.

Duobus veluti capitibus producta] Præter hæc & in anteriore parte hujus tibiæ appendicis

Alterum cruris os FIBULAM nuncupant, LONGITUDINE quidem tibiæ par; sed longè TENUIUS, & debilius, atque ex dorso crassiore sensim gracilescens.

APPENDICE superius rotundâ SINUM exhibet levem, cui externum tibiæ tuberculum applicatur. Inferiore appendice alterâ tibiæ sinu excipitur, processumque demittit ad externa pedis conspicuum, qui *Malleolus* vocatur *externus*, talique cum tibia nexum optimè tuetur.

Jam *Pedis Extremi* ossa veluti manus, tribus classibus dirimuntur, Tarfi, Metatarfi, & Digitorum.

Ad *Tarsum* septem referuntur ossa magnitudine figurisque plurimùm discrepantia.

Primum eorum TALUS, seu ASTRAGALUS nuncupatur, ad pedis motum præ cæteris utilissimum. CAPUT promit amplum, leviterque sinuosum, ut aptiùs tibiæ submitteretur, à malleolis utrinque comprehensum.

JUNGITUR malleolis ossibusque tarfi variis validisque ligamentis, antèrèducitâ prominentia cum osse cymbiformi; subtus partim protuberans, partim laxiùs sinuatum, calcaneo connectitur.

Est autem CALCANEUS sive *Calx*, os tarfi secundum, reliquis MAGNITUDINE, & robore præstantius. OBLONGUM item, & versus posteriora protensum, ut firmiùs homo talo insisteret, nec lapsu facili retrorsum concideret.

TUBERCULIS hinc inde inæquale, ad validæ chordæ pedem extendentium muscutorum firmiorem nexum.

A lateribus SINOSUM est, ut tendinibus descensum præbeat: præsertim interno, quo tum tendines, tum vasa majora sub pedem feruntur.

Inferuntur in calcaneum, ab utroque malleolo transversim producta LIGAMENTA, sub quibus tuto itinere tarsum digitosque pedum moventium muscutorum chordæ progrediuntur.

Quem-

COMMENTARIUS.

dicistuberculum conspicitur insigne, nonnihil ad inferiora excurrrens, ut in non paucis cum *Senguerdio* notavi.

Fibula] Fibula propriè apud antiquos erat instrumentum quo subligabantur vestimenta, quo spectat illud Virgilii: *Aurea purpuream subnectit fibula vestem*. A simili munere & usu, idem nomen huic ossi tributum videtur: quia hoc os, inferiorem pedem reliquis parti-

bus annectit, eumque subligat. Alio nomine etiam dicitur *Canna minor*.

Longitudine quidem tibiæ par est] Quamvis enim infra tibiâ excedat, tamèn quantum ibi excedit, tantum superiore parte à tibiâ exceditur, nam supra ad genu non articulatur cum osse femoris, ut tibiâ, sed cum exteriorè capite seu Appendice ossis tibiæ à latere.

Pedis extremi ossa] Conferantur hic ea quæ habent

Quemadmodum autem antèrius ossi cymbiformi ; sic talo superius validis ligamentis **C O N N E C T I T U R**.

Tertium os tarfi **C Y M B I F O R M E**, seu *Naviculare* dictum est, quum à latiore veluti puppe ad proram angustiolem feratur ductu recurvo. Hoc sicuti capaci **S I N U** talum excipit ; ita à cuneiformibus ossibus rursus excipitur.

Quartum os **C U B I F O R M E** dicitur, quia laterum **Q A D R A T A** varietate cubum nonnihil refert. Ossi calcis præpositum est, cum quo, ut & cum tertio sphenoideo, duobusque metatarsi ossibus **C O N J U N G I T U R**.

Reliquam tarfi regionem, tria consummant ossa, quibus veteres nomina singularia non fecere. Fallopius **S P H E N O I D E A**, sive *Cuneiformia* appellanda censuit. Ex his primum magnitudine tertium superat, tertium secundum, & à latiore basi cuneorum instar sensim tenuiora fiunt.

Alteram pedis partem **M E T A T A R S U S** absolvit, **Q U I N Q U E** constructus ossibus, quæ in dispari **L O N G I T U D I N E**, **C R A S S I T I E M** quoque diversam obtinent. Valida tamen, ac **F I S T U L O S A**, medioque sejuncta corpore, musculis interosseis locum præbent. Crassiora sunt, qua tarso **J U N G U N T U R**, graciliora deinceps, tandemque processu atque evidentibus additamentis auctiora, digitorum sinui capitula submittunt.

D I G I T O R U M in pede **Q U A T U O R D E C E M** ossa recensentur. E quibus pollicis bina, viribus, atque amplitudine cæteris conspectiora.

C O M M E N T A R I U S.

habentur *Disput. Physic. Senguerd. de Sceletoseptimâ in Osteologia.*

Ex his primum &c.] Cuneiforme majus, sive Tarfi secundum, maximum ex cuneiformibus, internum pedis latus occupat, antèrius latum & longum, quo primum os pedii, quod maximo digito, sive pollici, substernitur, fuscipit. Hoc an sinuatum sit, an promineat ambiguum valde est : videtur tamen prominare, cum primum pedii os, quod huic conjungitur, sinum levem quidem, at evidentem fatis habeat. Posterius situm habet, quo navicularis processulum internum fuscipit. Superiore latere convexum, inferiore cavum, utroque tamen admodum aspero. *Cuneiforme minus, sive Tarfi tertium*, quod medium

locum obtinet, supernam partem quadratam habet, leviter arcuatam, infernam acutam, unde omnium aptissime cuneum exprimit : anteriorem, posterioremque, triangularem, cartilagine incrustatam, quarum illa metatarsi secundum os fuscipit, hac jungitur naviculari ; at latera quadrata, sed oblonga, ex quibus internum, sinum ingreditur lateris externi primi cuneiformis, externum, cum tertii interiore jungitur. *Cuneiforme medium, seu Tarfi quartum*, simile minori, nisi quod majus est, superna sede similiter quadrilateram figuram altera parte longiorem refert : inferne acuminatam, sed obtusiore nodo, in cuius nodo tuberculum exiguum, cui primus pedem oblique moventium, sive Tibiæ posticus

spectiora. Aliis porro digitis terna sunt, cum ossibus digitorum manus præter magnitudinem ferè convenientia.

Superfunt ossa SESAMOIDEA dicta, quod cum magnitudine, tum compressâ rotunditate, sesami semina majore ex parte referant. Ab ortu primo cartilaginea sunt, progressu tandem ætatis solidescentia.

MAGNITUDE, pro ossium quibus adhærent amplitudine, varia. Eorum duodecim in manibus, totidemque in pedum digitis communiter numerantur, ferè tamen pauciora.

ADHÆRENT articulis sub digitis, infixâ ligamentis, ut non tendines minus, quam articulos ipsos tueantur.

Quoniam autem in sequenti tabula elegans SCELETUM, five compages ossium totius corporis exhibetur, magnum operæ pretium fuerit, *nexum* in iis differentias paucis expendere.

Spectat

COMMENTARIUS.

cus inferitur: antè, tertium metatarsi os admittit: postè, levi sinu naviformis externum tuberculum suscipit: lateribustarsi os tertium, & primum, attingit.

Ferè tamen pauciora] Duo insignia secundo majoris digiti in pedibus internodio sunt subiecta. Horum alterum *Riolano* auctore com. de ossib. Magiæ sectatores *Albadaram* vocant, & illud esse tradunt, quod *Ciceris* magnitudini respondet, nullique corruptioni obnoxium instar seminis, in extremo iudicii die corpus regenerabit. Idem ossiculum sub nomine *Luz*, quod nulli sit corruptioni obnoxium, usque adeo ut nec igne vincatur, & ex eo ceu femine in resurrectione mortuorum nostrum animale corpus repullulabit describere videtur *Henr. Corn. Agrippa de Occultâ Physic. c. 20.* Tale os in humano corpore dari probant nonnulli ex verbis *Psalmi 34. v. 21.* custodit Dominus ossa iustorum, unum ex illis non confringetur. *Rabbini à Joh. Buxtorfio in Lexico Chald. & Rabbinico* allegati *Os Luz* non hoc sub magno pedis digito, sed vertebrarum os esse volunt. *Luz* est os inquit *Baal Aruch* parvum in fine octodecim vertebrarum. Totum corpus hominis putrescit, excepto illo osse, estque simile Amygdalæ quæ quam fabulosa sint quis non videt. Vide *Rolfinck. lib. 2. Disq. Anatom. cap. 54.*

Infixa ligamentis] Ut cum iis auferantur in repurgandis ossibus, nisi accedat diligentia.

Ut non minus tendines quam articulos ipsos tueantur] *Ufus est, ut existimo, Cavere ne ulla ratione comprimentur Tendines. Qui si tibi non placet, dic alium. Dicis primo: Retinent duritie sua tendines, ne ab articulo extuberante decident in motu. Oblitusne es, tertii articuli tendinem transire per fissuram secundi? Dicis secundo: Firmant commissuras, ut Patella genu. At commissuris non sunt imposita, ut hæc: sed capitulis ossium supposita. Dicis tertio: Replent intervalla vacua. Que? Dicis quarto: Reddunt apprehensionem firmiorem & constantiorem. Quomodo? Viden', quam sine ratione multa dicantur? Hoc multi non curant, modo aliquid dicant. Et quare interdum nolumus nostram ignorantiam profiteri? Non est nostrum, omnia scire. Nam quicumque, ait *Columella lib. 12. de Rust. cap. 57.* sunt habitati mortalium sapientissimi, multa scisse dicuntur, non omnia. Nostrum est, curare ne nos male habeat ignorantia sciendorum. Ita *Lindan. pag. 641.**

Sceletum] *Sceletum* vel *sceletum*, est compages ossium animalis aptè coherentium. Vocem si spectemus, *σκελετός* Latinis *exsiccatus, arefactus* dicitur. Derivatur à verbo *σκέδαω*, *exsiccō, arefacio*. Veteres solebant incipientibus cadavera exsiccata proponere.

M m

prius-

Speſtat autem *Oſſium connexio*, vel quietem, vel motum. Quietem quæ ſpeſtat, *Symphysis* dicitur, id eſt, coalitus naturalis. Hæc vero, vel immediatè fit, vel mediante corpore alio abſolvitur.

Quæ fit immediatè, perficitur tribus modis. Quorum prior eſt, *Rhaphè*, id eſt *Sutura*, quando connexio rerum conſutarum ſimilitudinem habet, ut in oſſibus cranii ſuperioribus. Alter eſt *Harmonia*, id eſt, connexio quæ ſimplicem lineam repræſentat, ut in oſſibus plerique maxillæ ſuperioris. Tertius eſt *Comphofis*, id eſt, connexio, quâ clavi inſtar os oſſi inſigitur, quemadmodum dentes alveolis ſuis.

Quæ verò unio fit mediante alio corpore iterum tribus abſolvitur modis. Primus ex his eſt *Synchondroſis*, id eſt nexus qui fit interventu cartilaginis. Talis inter oſſa ſterni, oſſa pubis, tum reliqua oſſa omnia cum ſuis appendicibus. Secundus eſt *Synneuroſis*, id eſt nexus, qui fit interventu partium nervoſarum, adeoque ligamentorum, ſive illa rotunda, ſive in membranas dilatata ſint. Tertius *Syſſarcoſis* dicitur, id eſt nexus, quo ſe caro oſſibus jungit, ut muſculorum circa humerum, & femur, gingivarum circa dentes.

At vero quæ motum ſpeſtat oſſium connexio, *Arthron*, id eſt, Articulus dicitur, dividiturque in diarthroſin, ſive dearticulationem, & ſynarthroſin, ſeu coarticulationem. Eſt autem *Diarthroſis* compositio oſſium, ad evidentem validum, facilem que motum comparata, qualis in brachio, manibus, femore, pede. *Synarthroſis* eſt compositio oſſium, in qua motus obſcurior, imbecillior, difficilior. Utraque hæc articulationis ſpecies, tribus in modis conſiſtit.

Horum primus *Enarthroſis* dicitur, fitque cum cavitas excipiens profunda admodum, & caput, quod in eam inferitur, oblongum. Atque hic conſpicitur in femore cum acetabulo, quod iſchio vulgo tribuitur: tum in altragalo cum oſſe cymbiformi.

Alter *Arthrodia* dicitur, in quo cavitas levis eſt, quodque ipſi committitur caput humile, ac depreſſum; qualis inter ſinciput, & primam colli

COMMENTARIUS.

priusquam eos perducerent ad accuratum totius corporis examen. Fieri poteſt, ut hinc vox *Sceleti* acquiſerit illam ſignificationem quam jam habet. Dici etiam poteſt hoc vocari *Sceletum*, quia propriè exſiccata & arida corpora ſunt, ex quibus illa compages conſtat.

Oſſium connexio &c.] Confer quæ hæc de materiâ habentur *Diſputat. diſtâ.*

Syneuroſis] Notatur hæc in articulationibus femoris cum oſſe Iſchio; ejuſdem cum tibiâ, humeri cum ſcapulâ, &c.

Hic conſtituitur in femore cum acetabulo] Et *Enarthroſis* eſt *Diarthroſeos*.

In Aſtragulo cum oſſe Cymbiforme] *Enarthroſis* eſt *Synarthroſeos*.

colli vertebram, inter maxillam inferiorem, & os temporum. In costis cum vertebris, earumque processibus transversis, iterumque inter cartilagineas costarum cum sterno. Inter ossa carpi cum metacarpo, atque in pede, inter ossa tarfi cum metatarso.

Tertius appellatur *Ginglymus*, in quo ossa sic conjunguntur, ut caput unius in alterius sinum condatur, vicissimque hujus caput in illius cavitate excipitur. Ita vertebrae parte posteriore junctas Hippocrati visum est: ita ulna cum humero, femur cum tibia, tibia cum astragalo, astragalus cum calcaneo necitur.

COMMENTARIUS.

Costarum cum sterno, ossa carpi Metacarpio, ossa tarfi cum Metatarso] Arthrodiæ Synarthroseos sunt.

Ginglymus] *Ginglymus* tertia species Diarthroseos est, quâ ossa invicem ingredientia conjunguntur. Hic simplex vel compositus est. Simplex constat duorum ossium mutuo ingressu; iterumque duplex est. 1. imitatur cardines, quibus duo asseres invicem coherant. Unius enim ferri gibba alterius cava ingrediuntur, & contrâ: & post clavus omnia gibba penetrat, talis est articulatio femoris ad tibiam. 2. imitatur cardines ostium & fenestrarum, quibus illæ parietibus firmantur; ibi est quod init, & quod initur. Horum unum mas, excipitur: Alterum fœmina, excipit.

Et talis est cûbiti cum humero. Compositus *ginglymus* ex tribus constat ossibus: manifestusque est in Vertebra. Vertebra in medio sedens recipit Vertebra superiorem marem, est recipitur ab inferiore fœminâ. Hunc *ginglymum* reprehendit *Vesalius* tribus nominibus. 1. quia *Ginglymus* unum solum habet motum flexionis & extensionis: Vertebrae etiam lateralem. 2. in aliis etiam quæ excipiunt & excipiuntur, ut digitorum ossibus esset admittendus. 3. cervicis & superiorum Thoracis Vertebrae est illa articulatio. Nos tamen his non moti eum retinebimus. Videatur *Rosfinckius*.

Astragalus cum calcaneo] *Ginglymus* est Synarthroseos.



T A B U L Æ C A P. XVII. Declaratio.

Proponit hæc Tabula compagem Ossium humani corporis, accuratè elaboratam, ut in præcedentibus enarratorum Ossium, ad Abdomen, Pectus, & Caput pertinentium naturalis compositio pateret. Præcipuè verò Manus, Pedesque antiùs, & posteriùs visenda Ossa, tum Femoris ac Tibiæ Ligamenta: tandemque Sesamoidea Officula curiosè repræsentantur.

FIG. I.

Skeleton exhibit corporis adulti, in quo

- AA Scapula utriusque internum latus.
 BB Clavicula utraque.
 CC Os Humeri, aliàs Brachii dictum.
 aa Caput Humeri ex appendice productum.
 bb Humeri utriusque Tuberculum externum.
 cc Humeri Tuberculum internum.
 DD Os cubiti, Radius dictum.
 EE Os cubiti, Ulna vocatum.
 FF Ossa Carpi numero octo.
 GG Pollex tribus Ossibus compositus.
 HH Metacarpus è quatuor Ossibus productus.
 II Digiti quatuor tribus Ossibus compacti.
 KK Femur, quod nonnullis Crus dicitur.
 LL Mola, sive Patella genuum.
 dd Caput Ossis femoris, sive appendix superior.
 ee Cervix Ossis femoris.
 ff Trochanter, sive Rotator major.
 gg Trochanter, sive Rotator minor.
 hh Appendix seu Capita femoris inferiora.
 MM Tibia utraque. NN Fibula.
 ii Malleolus internus. KK Malleolus externus.
 OO Ossa Tarsi numero septem, antiùs conspicua.
 PP Ossa Metatarsi quinque.
 QQ Ossa digitorum; è quibus duo pollici, reliquis digitis tria assignantur.
 ** &c. Appendices Humeri, Radii, Femoris, Tibiæ, ab Osse reliquo lineolâ intercedente distincta.

FIG. II.

Scapulam cum Clavicula complectitur, cui Humeri, Cubitique ossa, & manus conjunguntur.

- A Clavicula sinistras, in qua
 a. Capitulum leviter sinusum, quo sterno committitur.
 b Clavicula extremum alterum, quo Scapula processus Spinosi jungitur.
 B Scapula.
 c Scapula processus brevis Humerum suscipiens.
 d Scapula process. Coracoides ex parte conspicuus.
 e Scapula processus Spinosus, seu Spina.
 f Angulus superior. g Angulus inferior.
 hh Basis Scapula.
 C Os Humeri posteriùs notabile.
 f Sinus Ossis Humeri major sive posterior.
 g Processus Ossis ulnæ recurvus.

- D Os Ulnæ. E Os Radii. F Carpi facies externa.
 G Metacarpi regio, quatuor Ossibus comprehensa.
 H Pollex tribus Ossibus constans.
 II Digitorum Phalanges, sive ordines.

FIG. III.

Carpi Ossa octo continet, grandiusculè expressa, ut rectius distingui possint.

FIG. IV.

Os Ilium; Ischio, & Ossi pubis connatum ostendit sub quo Femur, Crus, & Pedem quoque complectitur.

- A Ossi Ilium facies externa.
 B Acetabulum quod Caput femoris suscipit.
 C Femur posteriùs conspicuum, in quo
 a Appendix superior. b Trochanter major.
 Δ Linea aspera femoris. c Trochanter minor.
 d Sinus posterior appendicis inferioris.
 ee Capita appendicis inferioris.
 f Prouberantia tibiæ sinus distinguens.
 D Tibia posteriùs conspicua.
 g Malleolus internus. E Os Fibula dictum.
 h Malleolus externus. ** Appendices Tibiæ.
 P Tarsi in Pede regio.
 G Regio pedis Metatarsus dicta.
 H Pollex duobus Ossibus constans.

FIG. V.

Ossa Tarsi distinctiùs proponit, in quo

- A Os Astragali. B Os Calcanei.
 C Os Cymbiforme. D Os Cubiforme.
 EEE Tria Ossa reliqua Cuneiformia.

FIG. VI.

Ossa quatuor Sesamoidea majora, totidemque minora adumbrat.

FIG. VII.









Portio femoris superior cum Acetabulo profertur.

- aa Est ligamentum latum, femoris articulum ambiens, Dissectum.
 b Ligamentum teres, ex Acetabulo natum.

FIG. VIII.

Portio femoris inferior ostenditur, & Tibiæ superior.

- a Est Ligamentum latum, articulum ambiens.
 b Ligamentum è sepimento productum.
 c Sinus Tibiæ femur excipientes.
 d Patella cum Tendinis adjuncti portione dependens.



CAPUT XVIII.

De Musculis Manus.

MANUS admirandorum operum instrumenta præstantissima valido varioque musculorum flexu carere non possunt. Horum maxima pars, juxta cum illis qui ad pedem feruntur, rectius musculorum, lacertorumque nomen sibi vindicat, quam qui circa pectus, abdomen, dorsum, & caput hætenus demonstrati sunt. Adeoque nec distinctionem partium averfantur, quâ in *Caput*, *Ventrem*, & *Caudam* vulgò dividuntur, si ad mures, aut lacertos respicias, pedibus eorum demtis. Accipiendum autem pro capite, musculi principium, parti, ad quam contractio fit, connexum: pro cauda finis musculi, sive portio ejus tenuior, ac nervosior, parti movendæ inserta: pro ventre denique pars musculi intermedia, quæ carni mole tumidior ferè atque auctior conspicitur.

Admirationem in his verè movent *Tendines* insigni robore, lucido candore, tum lævore, ac densitate eximii: quorum nomine licet caudam musculi communiter intelligamus; propriè tamen partem agnoscimus spermaticam, secundum longitudinem musculi omnem extensam, quæ nunc in fibras sparsa, nunc collecta, spirituque per nervos affluente imbuta, partem cui inseritur contractione factâ secum una movet.

Musculorum itaque manus ad humerum alii cubitumque, alii ad manum propriè sic dictam pertinent. **HUMERUM** *attollit DELTOIDES* à figura dictus musculus, amplus, & carnosus. Principio exoritur lato, à clavicula media, summo humero, seu acromio, scapulæque processu spiniformi, atque in humeri medium robusto tendine defigitur.

Ab hujus officio alienus non est musculus, qui à coracoide scapulæ processu, longo, carnosoque corpore deductus, in humerum interiùs circa medium inseritur.

Addu-

COMMENTARIUS.

<p>D <i>Eltoides à figurâ sic dictus</i>] Nam litteræ Græcorum Δ inversæ, similitudinem habet.</p> <p><i>In humeri medium robusto tendine defigitur</i>] Antequam verò hoc fiat, unâ parte musculo</p>	<p>pectoralis, aliâ infra spinato adhæret.</p> <p><i>Ab hujus officio alienus non est</i>] Coracoides plurimis dicitur.</p> <p><i>In humerum interiùs inseritur</i>] Exili & quasi invisibili tendine.</p>
---	--

Rotun-

Adducit pectori humerum musculus, PECTORALIS à situ dictus: ABDUCIT verò, & *Retrorsum cogit* LATISSIMUS DORSI: de quorum utroque superius capite Nono & Duodecimo actum est.

Deprimit autem Humerum musculus, à carnosio, crassoque, habitu ROTUNDUS MAJOR nominatus. Ortus ejus est, ex inferiore scapulæ angulo, juxtaque pectoralis musculi tendinem humero inferitur.

Deprimit quoque Humerum musculus *Rotundus minor*, prioris, si nexum spectes, quædam veluti portio: Origo ipsi ex inferiore scapulæ angulo; atque à rotundo ventre paulatim gracilior in humeri cervicem protenditur.

Circumagere videntur Humerum musculi tres, quorum duo supra scapulam, tertius infra eandem collocatur. SUPRASCAPULARIUM *primus* à scapulæ basi, supra spiniformem processum porrectus, antrorsum fertur, validoque tendine, quinto humeri ligamento innectitur.

Secundus sub spina scapulæ à basi profectus, cum præcedente carnosus, & crassus, brevi, latoque tendine, in ligamentum humeri, quod numero quartum constituunt, excurrit.

INFRASCAPULARIS à basi scapulæ, inferiore latere, carnosus latusque defertur, atque in ligamento tertio humeri finem suum affequitur.

CUBITUS *flectitur* duobus musculis antè locatis: è quibus primus à principio gemino BICEPS, à figura *Piscis* appellatus, partim à scapulæ acetabulo, sinuve, partim ejusdem processu coracoide exortus, & deorsum porrectus, tereti, sed robusto tendine, in superius radii caput descendit.

Alter flectentium musculorum est BRACHIÆUS. Hic præcedenti subjectus, circa medium humeri initium sumit, delatusque deorsum, carnosio

COMMENTARIUS.

Rotundus major, oritur ex inferiore scapulæ angulo] Carnoso principio, hinc supra angulum prædictum deorsum porrectus, in externo latere musculo longissimo dorsi alligatur, tandem valido robustoque tendine infra caput humeri finem sortitur.

Rotundo minori origo ex eodem scapulæ angulo] Medio tamen loco.

Suprascapularium primus] Vocatur haud malè supraspinatus, quoniam supra spinam scapulæ positus est; Similiter ut suprascapu-

larium secundus, à situ quam habet infra ejus spinam supra reliquam portionem scapulæ Infraspinatus.

Infra scapularis] Dicitur & immerfus.

Finem suum affequitur] Tendine coeteris latiore.

A scapulæ acetabulo] Principio tendinoso & longo.

Circa medium humeri] Ubi finis Deltoidis, duplici veluti principio, at carnosio.

Exten-

carnoso fine, tam in articuli ligamentum, quàm ulnæ, radiique appendicem superiorem definit.

Extenditur cubitus duobus aliis, sive posticis, quorum LONGIOR, primusque gemino principio componitur, sublimiore uno, circa scapulæ cervicem; humiliore altero, sub capite humeri, circa latissimi dorsi musculi tendinem assumpto, carnosus interius, in olecrano, sive cubito summo exterius terminatur.

Secundus extensor BREVIOR est, & ab humero circa medium profectus, priorique junctus in cubiti summum exterius defertur.

Accensetur extensoribus cubiti, musculis ANCONÆUS appellatus, corpore exiguus. Nascitur posterius ab inferiore humeri parte, cubitique duobus ossibus intermedius, in latus ulnæ nonnihil obliquè descendit.

AD RADIUM movendum quatuor producti sunt musculi, quorum duo, qui *pronatores* vulgo dicuntur, *radium introrsum convertunt*: reliqui duo, *supinatores* appellati, *movent extrorsum*.

PRONATORUM *primus*, quadratâ figurâ conspicuus, ab interno ulnæ latere transversim extensus, radii parti internæ committitur. *Secundus*, à corporis habitudine *Teres* dictus, ab interno humeri tuberculo productus, obliquè ad radii ferè medium decurrit.

SUPINATORUM prior qui LONGIOR, altius, & supra externum humeri tuberculum principium suum habet; demissoque membranofo tendine radii appendicem inferiorem accedit.

Alter

COMMENTARIUS.

Extenditur cubitus duobus &c.] Pro tertio musculo *Galenus lib. I. Admin. Anatom. cap. ult.* Molem carneam recenset, quæ cum duobus aliis confunditur & in eandem partem inseritur. *Brachium externum* eum appellat *Riolanus*, quia brachio externo infratus duobus aliis subjicitur. Monet tamen ibidem *Galenus* unicuique licere pro fibrarum rectitudine tres istos musculos accuratè separare.

Sublimiore uno] Membranoso & lato.

Tendinem assumpto] Exilis hic valde est.

In cubito summo exterius terminatur] Imò lato tendine ipsum in parte superiori investit.

Brevior ab humero profectus] Parte internâ.

Anconeus] Situm suum habet in posterioris cubiti flexura, quæ Græcis ἀγκών dicitur, & oppositus est, adeoque respondet popliteo.

Latus ulnæ descendit] Interdum, notante id *Riolano*, adeo cohæret extremitati carnosæ brachiei externi, ut ejus nullum discrimen appareat, tumque judicatur portio brachiei externi eò usque protensi.

Quadratâ figurâ conspicuus] Inter ulnam & radium, decliviori loco, prope carpum residet, ligamento membranoso istorum ossium impositus.

Ad radii medium] Latere interno.

Radii appendicem inferiorem] Malleolus est externus.

Circa

Alter BREVIOR ac tenuis, circa ligamentum humeri inferius exortus, propè radii medium terminatur.

CARPO quatuor adsignantur muscoli, quamvis eorum tres ad metacarpum usque protendantur. Ex his flexores duo, totidemq; extensores.

Flexorum carpi ob situs differentiam, alius *Internus* habetur, alius *Externus*. Uterque ab interno humeri tuberculo originem nactus; quamvis internus quartum carpi, ossiculum adeat, externus ad os metacarpi quod indici digito subjectum excurrat.

Extendentium musculorum *Internus* ab externo humeri tuberculo descendens fertur ad os usque metacarpi, quod minimo digito subjicitur. *Extendentium Externus* musculus, supra tuberculum humeri externum emergens, gemino sæpè tendine in primum secundumque metacarpi os defigitur.

Ad volam manus refertur musculus PALMARIS dictus, cujus operâ validior cutis corrugatio perficitur. Initium ducit ab interno humeri tuberculo, membranofumque tendinem per volam manus ad digitorum usque confinia propagat.

Corrugatam ab hoc musculo cutem CARNOSA MEMBRANA manu diducta iterum explicat.

At DIGITI manuum præcipuè motus varietatem pariter ac robur exigebant. Eos itaque multiplices, validisque tendinibus instructi muscoli, flectunt, extendunt, atque ad latera convertunt.

Flexores

COMMENTARIUS.

Circa ligamentum humeri inferius exortus] Tum à principio ulnæ, tum etiam radii externo & interno latere.

Propè radii medium terminatur] Parte laterali & externâ.

Extendentium internus] Supra ulnam descendit, ut externus radio adhæret.

Gemino sæpè tendine] Rarius hoc, ferè simplex is est.

In primum secundumque metacarpi os] In os carpi definit, quod pollicis digito adhæret.

Palmaris] Initium ducit ab interno ossis humeri tuberculo, tendinosum admodum, hinc ad exiguum spatium carnosus iterum degenerat in tendinem, qui supra flexores digitorum descendit usque ad palmam ubi dilatatus circa digitorum radices finem nanciscitur.

Palmaris] Musculum hunc interdum geminum in utroque brachio ab eodem loco

prodeuntem observavit Fallopius, si tamen ut unus in volam defineret; alter in ligamentum transversum carpi infereretur. Vidit Rhodius defuisse hunc musculus vidit & Riolan. cum tamen plantaris adesset, vidit eum tendine deficiente, à ligamento carpi originem sumere Marchette. In carpo summè observabile est ligamentum aliquod eo quod carpum totum cingat annulare dictum. Hoc præcipuis tendinibus carpi, maximè digitorum transitum præbet, præcipuis dico, palmaris enim musculi tendo ligamentum hoc supergreditur.

Corrugatio cutis] Cuti adèd tenaciter affixus est tendo membranofus hujus musculi, ut ab eâ vix aut saltem difficillimè secerni queat.

Digitos musculi varii flectunt &c.] De musculis his legi possunt quæ habentur *Medicinâ meâ universâ* p. 285. meliori ordine ac vulgo fit, & ab auctore nostro factum, ut spero, dispositæ.

Flexores musculi, pars pluribus inserviunt digitis, pars pollicis tantum. Qui pluribus inserviunt, sunt quatuor digitorum secundi, tertii, & primi internodii motui dicati.

Qui *Secundum internodium* flectit, ab humeri interno tuberculo principium trahit, dirimiturque in tendines quatuor eximios, circa finem veluti rimâ fissos, quibus secundum digitorum os aggreditur.

Tertium internodium flectens musculus, à tuberculo humeri interno, & ulnæ processu anteriore initium nactus, quatuor tendinibus robustis, rimas prioris transit, atque ad tertium digitorum os procedit: unde hunc musculum perforantem, illum perforatum nominant.

Flexores Primi digitorum *internodii*, ob tenue teresque corpus, **LUMBRICALES** appellati, à membranis tendinum præcedentis musculi oriuntur, & in primo digitorum singulorum osse terminum exterius consequuntur.

POLLEX, quia singulari præ cæteris robore pollere debuit, *Flexores* obtinet diversos. Etenim *primum internodium* ejus flectunt musculi duo, quibus ab annulari carpi ligamento, atque officulo pollicis subiecto principium, finis in primo pollicis osse describitur; quamvis altius assurgere videantur.

Secundum internodium tres quatuorve movent flexores; breves, sed carnosi. Oriuntur à metacarpi ossibus, indicem, medium, annularemque digitum sustinentibus, & in secundum pollicis os deferuntur.

Flexor Tertii internodii unicus est, sed prævalidus. Hic ab ulna, quo loco radii caput admittit, initium adeptus, robusto tendine tertium pollicis internodium occupat. Atq; his quidem musculis flectenda manus fuit.

Extensores digitorum, *secundi*, & *terti* internodii, bini vulgò constituantur, quamvis re vera unicus videatur musculus. Uterque enim ab externo humeri tuberculo nascitur; sed in progressu exquisitè juncti, tendinibus

COMMENTARIUS.

Flexores musculi] Observa naturæ industriam, quæ ut digitorum recta fieret flexio, secundum eorum longitudinem parte interna ex durissimis & ligamentosis membranis canalem effinxit, qui tendones musculi Profundi & Sublimis arctè complectitur, ne flexis digitis tendones incurvati à sua sede divellerentur, & tanquam funiculi exurgerent cutemque attollerent. Et quamvis tendones in isto canali sint arctè comprehensi, iter tamen & cursum liberum habent, quia pin-

gui & oleoso humore canalis inunctus est. *Hunc musculum perforantem*] Profundum *Riolanus* vocat.

Illum perforatum] Sublimem hunc dicit.

A membranis musculi tendinum oriuntur] Licet tendonibus profundi musculi sint implexi, & ab his oriri constans sit opinio, existimo tamen à nervoso orbiculari ligamento carpi enasci, ut ortum stabilem & firmum obtineant.

Tres quatuorve movent] Hypothenar pollicis *Riolano* dicitur.

Inter-

dinibus unitis, secundo, tertioq; digitorum ossi firmiter innectuntur, nec corporum, neque officiorum exhibitâ diversitate. *Primum* digitorum *internodium* extendunt muscoli interossei: de quibus mox dicendum.

Cæterum *Pollex*, quemadmodum flexores, sic *extensores* obtinuit singulares duos. Horum *Unus*, ab exteriori cubiti latere protensus ad tertium usque pollicis internodium ascendit: *Alter* simili principio provectus, portione superiore carpi ossiculum pollicis subditum accedit: inferiore alterâ, cum ad primum, tum ad secundum pollicis internodium, atque etiam ulterius tendine suo propagatur.

Præter hos verò motus, *Digitum*, & *Adduci* debuere, & iterum disjungi, seu *Abduci*. Munus hoc communiter absolvunt muscoli sex: quorum externos tres, inter metacarpi ossa locatos rectè INTEROSSEOS nominant auctores. Hi per latera digitorum interius, atque exterius assurgentes, tendinibus suis ad primum, secundum, & tertium usq; internodium porriguntur. Quibus accedunt musculi duo, simili officii genere præcedentibus auxiliares, qui primo, atque ultimo metacarpi ossi accumbunt.

Singulares *Abductores* nanciscuntur Index, Minimusque digitus.

Indicis abductor aliis rectius *Indicator* dictus, à cubiti medio profectus, geminato frequenter corpore & tendine, tam ad indicis, quam digiti medii primum internodium perducitur: nonnunquam tamen in metacarpi osse indicem spectante terminatur.

Minimi digiti abductor, à quarto carpi ossiculo, intra manuum volam prodiens, exterius internodio primo inferitur.

Pollex denique proprio tam *Abductore*, quàm *Adductore* musculo gaudet, in primum ejus internodium recepto. *Prior* horum, à carpi ossiculo pollicis conjuncto; *alter* ab osse metacarpi, quod indicem digitum sustinet, originem sumit. Hic tamen ob firmum cum primo indicis osse, per tendinosum corpus nexum, rectius indicem pollicis adducere videtur.

COMMENTARIUS.

Interosseos nominant. Imò & interni tres Metacarpi ossibus accumbentes Interossei dicuntur, licet minus propriè.

Singulares abductores &c. Extensores cum *Riolano* potius dicerem.

Quibus accedunt musculi duo &c. Horum alter Hypothenar. proprius est parvi digiti & in duos secari potest. Oritur ab osse tertio & quarto secundi ordinis carpi & in Phalanges ejusdem digiti lateraliter inferitur, ut cum abducat ad latus externum. Alter Indici convenit, & Antithenari subiectus, ab internâ

parte primi ossis pollicis enascitur & in Phalanges Indicis inferitur, ut hunc digitum ad pollicem trahat, undè musculus Abductor Indicis potest appellari. *Riolanus*.

Abductore Thenar *Riolano* dicitur. Græci enim eminentiores partes palmarum appellant *ἔνθα* deducto vocabulo *ἐν τῇ δυνάμει* à percutiendo.

Adductore Antithenar ipsi dicitur *Riolano*.

Nonnunquam tamen &c. Nunquam vidit *Marchette* tendinem musculi Indicatoris ad primum internodium Indicis pervenire.

TABULÆ CAP. XVIII. Explicatio.

Comprehendit hæc Tabula Musculos ad Humerum, Cubitum, Manumque movendam comparatos: quorum major pars principii suis, & fini inhæret.

FIG. I.

- A** Musculus Deltoides à principii separatus.
B Musculus Infraſcapularis ſeparatus.
C Musculus rotundus minor.
D Musculus rotundus major.
E Musculus pectoralis à Thorace ſeparatus, quem vide cap. XI.
F Musculi latiffimi dorſi portio Carnoſa, quem capite duodecimo vide in ſuo ſitu.
G Musculus biceps.
H Humerum attollens minor in ſitu.
II Brachius bicipiti ſubjectus.
K Palmaris Musculus ab origine pendens.
L Portio ſupinatoris radii.
M Carpi flexor externus.
N Carpi flexor internus.
O Flexor ſecundi digitorum Internodii.
P Flexor tertii Internodii digitorum.
Q Primi pollicis Internodii flexores in ſitu.
R Secundi Internodii pollicis flexores in ſitu.
S Digiti minimi abductor.
aa Scapula facies interna.
b Tendo Musculi palmaris.
c Portio Tendinis qui tertium pollicis Internodium ſectit.
d Carpi Ligamentum in ſitum ſuum reductum.

FIG. II.

- A** Musculus minor Humerum attollens.
B Musculus Brachius integer.
C Radii pronator teres.
D Flexor tertii pollicis Internodii extra ſitum.
E Radii pronator quadratus.
F Flexores primi pollicis Internodii extra ſitum.
G Flexores ſecundi pollicis Internodii extra ſitum.
aa Scapula latus internum.
b Os Humeri.
c Os Radii.
d Os Ulnæ.
ee Ligamentum Ulnæ & Radii Membranofum.
ffff Musculi adductores communiter dicti.
gh Digiti minimi abductor ſingularis.

FIG. III.

- A** Supraſcapularis primus, loco dimotus.
B Supraſcapularis ſecundus.
C Musculus rotundus minor.
D Musculus rotundus major.

- E** Musculus extenſor Cubiti longus.
F Extenſor Cubiti brevis.
G Carpi extenſor internus.
H Carpi extenſor externus, hic ſimplici Tendine præditus.
I Musculus indicis abductor ſingularis, ſimplici hic Tendine præditus.
K Secundi & tertii digitorum Internodii extenſores uniti.
L Extenſor tertii Internodii pollicis.
M Extenſor primi Internodii pollicis hic ſimplici Tendine, & corpore præditus.
aa Scapula proceſſus Spiniſformis.
a Musculus Anconeus.
bb Os Humeri.
c Externum Humeri tuberculum.
d Internum Humeri tuberculum.
e Tendines ſecundum & tertium Internodium extendentes collecti.
ff & c. Idem Tendines ſingulis Internodiis ſeſe applicantes.
g Ligamentum poſterius Carpi, annulare dictum, ſolutum.

FIG. IV.

- A** Scapula facies externa.
B Os Humeri Perioſtio ſuo tectum.
C Os Radii.
D Os Ulnæ.
E Musculus Radii ſupinator, longus dictus.
F Musculus Radii ſupinator brevis.
G Musculus Anconeus.
H Ligamentum Radii & Ulnæ Membraneum.
IIII Musculi tres Interſoſei, cum eorum auxiliario.
K Pollicis abductor Musculus.

FIG. V.


- A** Musculus ſecundum digitorum Internodium ſectens, Perforatus dictus.
aa & c. Ejus Tendines.
B Musculus tertium digitorum Internodium ſectens, Perforans appellatus.
bb & c. Ejus Tendines per ſiſſuram Tendinum præcedentis Musculi tranſeuntes.
CCCC Musculi primum Internodium ſectentes, ſeu Lumbricales.
DD Pollicis flexores in ſuo ſitu.
cc Portio Tendinis tertium pollicis Internodium ſectentis.

I


II

III

IV



V



CAPUT XIX.

De Musculis Pedis.

INcessus quoque, promptitudinem multiplici musculorum subsidio PEDES consequuntur. Horum itaque pars femur, & crus; pars pedem propriè acceptum, variis motibus aptant.

Ac FEMUR quidem *flectunt* musculus Psoas dictus, Iliacus internus, Triceps item, & Lividus.

Psoas in abdomine circa duas inferiores thoracis, & tres lumborum vertebrae superiores, initium affecutus, obliquo descensu in rotatorem femoris minorem deferitur.

ILIACUS internus, ab ossis ilium internâ facie proficiscitur, junctoque cum præcedenti tendine similem terminum nanciscitur.

TRICEPS musculus, præ cæteris amplitudine spectabilis, à coxendice, & osse pubis triplici principio demissus lineæ femoris asperæ inferiùs inseritur.

LIVIDUS juxta commissuram ossium pubis, productus, femoris internum latus brevi tendine instruit.

Exten-

COMMENTARIUS.

Psoas] Lumbalis itidem à loco dicitur.

Psoas] Sæpissimè in viris parvum musculum invenit *Riolanus* huic supertensum, qui in suo exortu minimi digiti longitudine & crassitie carnosus gracili & plano tendine super Psoam delatus cum Psoa & Iliaco finitur, sed cum pervenit ad Iliacum, in Aponeurosin latam ac firmissimam latefcit, quæ Iliacum & Psoam firmiter amplexatur: ideoque in robustis hominibus additum fuisse putat, ut Psoam arctè complectatur, & in suâ sede conformiter contineat, Parvum Psoam dicit. In mulieribus rarius reperiri docet, quam in viris, attamen anno Domini 1531. vidisse se eum in muliere robustissimâ Viragine. Sæpius eum etiam in foeminis se invenisse & ostendisse testatur *Marchette*, ejusve usum esse censet adjuvare motum ipsius psoas. Refert *Barthol. in Obs. I.* se alium Musculum psoam observasse, qui ex parte majori musculo Psoas subjacebat sed exterius ad latera magis vergens. Initium idem cum majore Psoas, carnosum, inferebaturque carnosus in superiorem ossis Ilii margi-

nem posterius, ubi Iliaci inferni ortus est. Existimavit usum hujus esse, ut pulvinaris instar majori substerneretur siquidem os Ilii ex se immobile, vel ut os idem sustineret, ne nimum stante homine oneri esset.

Junctoque cum præcedenti tendine] A quo absque dilaceratione separari non potest.

Triceps] Hunc verius ab usu adductorem appellandum censet *Marchette*.

Triplici principio] Ope cultri plura principia ipsi dari posse, bene indicavit *Marchette*.

A coxendice] Errat itaque *Riolanus* quod omnia principia ab ossibus pubis deducat.

Lineæ femoris asperæ inseritur] Hoc tamen, ut inquit *Marchette*, discrimine, quod unâ portione supra mediam femoris partem, altera paulo decliviori loco, & denique tertiâ tendine satis robusto ad extremitatem femoris producit, licet istæ portiones simul uniantur.

Lividus] *Riolano* Pectineus dicitur.

Femoris internum latus brevi tendine instruit] A commissurâ pubis ossium descendens, antequam, infra cervicem, lateri interno femoris inseri-

Extendunt femur musculi tres, Glutæi nominati, ad sessionis quoque commoditatem, tutelamque articuli ischii majorem singulari opificis nostri providentiâ comparati. Ex his qui **GLUTÆUS MAJOR** appellatur, ab ilium margine, osse sacro, & coccyge superius protensus, sub rotatore femoris majore finit.

MEDIUS GLUTÆUS ab osse ilium sub priore natus, tendine robusto in rotatorem dictum pariter defigitur.

MINOR GLUTÆORUM inferius ab osse ilium deductus in superiorem majoris rotatoris partem descendit. His itaque tribus, brevibus quidem, sed cernosis, validisque musculis, quemadmodum femoris extensionem debemus; ita quod femur introrsum cogere, malos navium, arboresque scandere, dorso equi firmiter insistere homo potest, tricipiti musculo superius allato acceptum referendum est.

Circumagunt femur, Pyriformis musculus, alias Iliacus externus dictus, Obturator item externus, & internus, cui Quartus additur qui ipsi subjectus.

PYRIFORMIS inferius ab osse sacro natus, transversim tereti tendine, majori rotatori posterius inseritur.

OBTURATOR externus, ab ambitu foraminis externo, quod ossibus Pubis vulgo tribuitur ortus, transversimque porrectus in sinum rotatoris magni recipitur.

OBTU-

COMMENTARIUS.

inserir, tricipiti adhæret, à quo tamen facile separari potest.

Superius] Exterius, carnosus valdè.

Glutæus major] Curiosum est quod habet Barthol. in *Observ.* de silicibus in hoc musculo in bove repertis. Quum inquit, in Regio Armamentario Hafniæ ex annona militari nautis distribueretur caro bubula, quidam ex illis famelicus domum reversus in frustulum incidit, quod cultro perrumpere non potuit. Pars musculi Glutæi majoris fuerat. Quo minus autem cultro pateret, obstitere duo silices oblongiores, in musculo parum à se invicem distantes suaque membrana inclusi, quorum unus pyramidalis extrema parte acutus, altera obtusus, alter sine angulo. Uterque durissimus nihil à vulgare silice differens. Quomodo interiorem musculi substantiam pervaserint, cum ignorantissimis juxta ignoro. An lapsus bos circa littora silices clunibus intruserit? An ibi generati? Certè rarenter in animalibus silices reperiuntur, quanquam calculi alii in quavis parte animantis & nati sint & inventi, in

musculosa tamen substantia hæctenus non visum fuisse Nauta suspicabatur, ut pondus carni ab Annonæ structore augetur. Alii superstitiosi in omen rem insolitam vertere. Sed nec dolo nec arte ulla impactos carni fuisse silices, tunice indicant seu folliculi quibus inclusi sunt, & sinus carni insculptus ad accuratam silicis magnitudinem, ut Abscessus singularis siliceus nominari possit. Ipsos silices videndi cupidus Musæum Wormianum monstrabit. Memini Joh. Dom. Salam Patavii retulisse mihi calculum in musculo anti in fistula extractum à se esse, ab aliquot annis ibi latentem.

Finit] Tendinosus admodum.

Medius] Sic dictus, tum quod positus est inter majorem & minorem, tum quod magnitudine medio modo se habet.

Obturatores] Ita vocantur quod foramen quod ex osse pubis & Ischii constituitur interne & externe obturent.

Transversimque porrectus] Per cervicem femoris, infra circumagentium quartum.

Inter-

OBTURATOR internus ab internâ circumferentiâ foraminis jam propositi exurgens, sub tendinum quadruplici collectione, carnosum tamen habitu simplex, eandem cum præcedente metam attingit, tutelæ gratiâ per carnosum veluti marsupium transmissus, quod pro singulari geminove, musculo, haud immerito quis agnoscat.

Huic, ut dictum, subjacet femur *Circumagentium* **QUARTUS**, qui ab ossis ilium externo tuberculo, atque appendice ischii, ad posteriora magni rotatoris progreditur.

TIBIA *Extenditur* quatuor musculis, Membranoso, Recto, Vasto item externo, atque interno.

MEMBRANOSUS musculus, à margine ossis Ilium anteriùs exiguo, carnosoque corpore exortus, mox lato undique tendine, ac membranoso femori circumfusus, sub genu tibiæ, fibulæque inseritur.

RECTUS musculus, ab ossis ilium interno tuberculo descendens, lato, validoque tendine patellam includit, & sub ea in tibia terminatur.

VASTUS externus, à mole sic nominatus, descendit à rotatore femoris majore exterius, amplumque tendinem cum priore miscens iisdem finibus coërcetur.

VASTUS internus à cervice, & rotatore femoris minore principium adeptus, membranosoque tendine duobus præcedentibus unitus, sub patella tibiæ interius connectitur.

Subjiciunt extensoribus tibiæ musculis, **CRUREUM** nuncupatum musculum, quod cruri, id est, femori communiter ita dicto, sicuti brachieus musculus brachio, adhæreat. Originem ejus inter duos femoris rotatores constituunt: finem ipsi cum duobus vastis musculis, ob tendinis unionem, eundem assignant.

Obliq; tibiam movet, musculus **SUBPOPLITEUS**, qui à ligamento genuum posterius productus, oblique ad appendicem tibiæ superiorem defertur.

Flectunt

COMMENTARIUS.

Internus] Marsupialis dicitur.

Carnosum marsupium] Carnosa massa est, à lateribus sinûs ossis coxendicis, per quam sursum fertur obturator, orta latere externo velut marsupium efformans.

Geminove] Unicum tantum esse, nec sine laceratione separari posse tradit *Marchette*.

Ad posteriora magni rotatoris progreditur] Supra obturatorem externum. A figura Quadratus dici potest.

Crureum] *Marchette* à loco femoreum dicit.

Originem cruceo constituunt] Anterius à su-

periori ossis femoris parte; descendens femur anterius & à latere investit.

Assignant] Tendines uniti horum musculorum patellam totam continent, & firmant.

Femori circumfusus] Fascia lata dicitur, quia femoris musculos à parte externâ sitos investit.

Subpopliteus] A situ sic dictus observavit semel *Fabr. ab Aquapend.* in utroque poplite geminum popliteum, superiorem & inferiorem invicem contiguos.

A ligamento genuum] Circa tuberculum femoris externum.

Sarto-

Flectunt etiam tibiā, musculus Fascialis five Sartorius, Gracilis item, Seminervosus, Semimembranosus, & Biceps.

FASCIALIS ab offis Ilium appendice anteriore, longo, obliquoque decursu, sub genu ad tibiā interius descendit.

GRACILIS juxta commissuram ossium *pubis* enatus, tendine terei sub præcedente finem assequitur.

SEMINERVOSUS à Coxendice inferius descendens, & per femoris posteriora antrorsum obliquatus, tibiæ interius inseritur.

SEMIMEMBRANOSUS simili principio gaudens tendinem suum internæ Tibiæ posterius infigit.

BICEPS præcedentibus duobus portione longiore in exortu par est: à medio deinde femoris carnosā portione alterā auctus, tendine valido superius in os Fibulæ definit.

Tandem qui pedem particulariter movent musculi, vel ad Tarsum ejus referuntur, vel ad Digitos, & peculiariter ad pollicem.

TARSUM *flectunt* Tibialis anticus, & Peroneus secundus.

TIBIALIS ANTICUS à superiore Tibiæ, Fibulæque appendice sub ligamentum pedis transversum excurrans, in Tarso os pollicis subiectum interius desinit.

PERONEUS SECUNDUS à Fibula carnosō exortu longius productus, in Tarso os, quod minimo digito submissum est, exterius inseritur tendine ferè bifido.

Oblique movet deorsum, & quidem *introrsum* Tibialis musculus posticus, *extrorsum* autem Peroneus primus.

TIBIA-

COMMENTARIUS.

Sartorius] Eò quod tibiā adducat, & alteri superimponat more sartorum, hinc *Marchette* eum potius femoris adductorem quam flexorem appellandum censet.

Gracilis circa commissuram ossium pubis oritur] Ita tamen ut id initium vicinum maximè sit conjunctioni ossium pubis cum Ischio.

Seminervosus] Ita dicitur, quod in medio ferè nervi conditionem assequatur.

Semimembranosus] Quia compositus videtur totus ex membranâ.

Simili principio gaudens] Membranofus primò est, hinc circa medium carnosus, in fine iterum membranofus & tendinosus.

Biceps] Sic dicitur quod duplici principio constet.

Biceps] *Galenus* unicum esse musculum voluit, *Vesalius* duplicem facit, plurimi gemi-

num, & sine & origine distinctum observarunt. Hujus tendonis gratiâ femur sinum oblongum obtinuit lubrico lævique ligamento incrustatum, quo tutius vehatur, & oblique flexus non exorbitet.

Tibialis & peroneus] Ita dicuntur à loco, is enim tibiæ, hic fibulæ apponitur, internè vel externè.

A superiori tibiæ fibulæque appendice] Oritur à superiori parte tibiæ, propè fibulam, & ita descendit tibiæ adhærens.

Peroneus secundus] Aptè anticus dicitur.

Productus] Ita deorsum descendit fibulæ adhærens, usque dum peronæum posticum attigit, hinc per malleoli externi fissuram ad os minimo digito subiectum defertur.

Peroneus primus] Posticus.

TIBIALIS POSTICUS inter Tibiam Fibulamque exortus, juxta malleolum internum, in os Tarfi, quod cubiformi commissum est, inferiùs excurrit.

PERONEUS MUSCULUS PRIMUS à Fibulæ appendice productus, circa malleolum deinceps externum, sub ligamentum pedis, plantamque reflectitur, tarsique os, quod pollicis jungitur, occupat.

Extendunt tarsum pedis **Gastrocnemius**, & musculus **Soleus**. Uterque non mole minus corporis, quam robore actionis insignis, suræ carnosum tuber, quod ventrem nominant, constituere videtur.

GASTROCNEMIUM duplicem vulgò constituunt, quia gemino principio ab interno externoque Femoris inferioris capite sese proferens, tendine prævalido Calci inducitur; quamvis hic sub plantam pedis ad digitorum usque confinia porrectus videatur.

SOLEUS, à figura piscis denominatus, nascitur posterius à Fibula, communemque cum priore, tam nexu, quam insertione tendinem producit. Hic ob crassitiem, & robur præ reliquis tendinibus corporis, *Chorda magna* nomen obtinuit. Ante insertionem in Calcaneum à Tibia nonnihil secedit, graviterque vel fauciatus, vel contusus, perniciæ symptomatum lethale discrimen invenit.

Inter hos extensores conspicitur musculus **PLANTARIS**, qui ab externo femoris inferiore capite exili corpore natus, gracilem deinceps, oblongumque tendinem calci transmittit.

Musculi **DIGITORUM** Motores ipsorum officula extendunt, flectunt, & obliquant.

Exten-

COMMENTARIUS.

Juxta malleolum internum] Hujus fissura tendinem conservat.

Quod cubiformi commissum est.] Aliquando in duos dividitur tendines, ut benè annotat *Marchette*, quorum unus in cymbiforme os, alter in primum cuneiformium definit, hic autem perpetuus est.

A fibulæ appendice productus] Hoc est à parte posticà fibulæ.

Circa malleolum externum] Per fissuram ejus, peronæo antico unitus transit.

Gastrocnemium duplicem vulgò constituunt] Minus aptè, unus enim simplexque est. *Riolanus* cum *Vesalio* aliisque in principiis musculi hujus volunt reperiri officula duo Sesa-moidea, ad id à natura data, ne in directione

cruris musculi alterentur aut lædantur. At quamvis in quibusdam adesse possint, in omnibus tamen neutiquam reperiuntur, ut benè indicat *Marchette*.

Chorda magna] Hic tendo propter calcanei projecturam paulò antè insertionem à tibia abscedit, & cavitatem vacuam efformat, per quam etiam lanii baculo transmissio integra brutorum corpora in macello suspendunt. Hæc cavitas est per quam Achilles funem in Hæctoris pedibus trajecit, ut ad currum religatum circa mœnia Trojæ traheret uti cecinit *Homerus*.

Calci transmittit] Inter gastrocnemium & solæum medius descendit; ad os calcis perveniens dilatatur per pedis plantam supra flexo-

Extensor tertii internodii, à superiore Tibiæ appendice sub ligamentum pedis transversum delatus, quatuor sparsis tendinibus in supremum Digitorum os admittitur.

Secundi internodii extensor in dorso pedis ab ejusdem ligamento emergit, tendinibusque ferè quaternis digitorum ossi secundo prospicit.

Primum internodium tendunt muscoli Interossei, de quibus paulo post.

Pollicem qui particulariter *extendit*, circa medium fibulæ principium nactus sub ligamento pedis transverso ad ossa pollicis terna delabitur: interdum tendine geminato, partim in pollicis internodium tertium, partim in os pollicis subjectum defertur.

Flectunt digitos pedis musculus Perforans, Perforatus, & Lumbricales.

PERFORANS, quem & *Sublimem* vocant, à tibia posterius originem sumit, circa malleolum internum, tibiæ, calcisque ligamentum subiens, in planta pedis quadruplici tendine diremtus ad extremum digitorum internodium pergit.

PERFORATUS, aliàs *Profundus* appellatus, musculus inferius à calce prodit, demissisque tendinibus quatuor, circa finem ad tendinum præcedentis musculi transitum rimâ divisus, secundum digitorum internodium occupat.

LUMBRICALES à perforati, perforantisque musculi tendinibus producti, similes iis, quos in manibus natura gignit, primo digitorum internodio quatuor tendinibus adfiguntur.

Horum flexum promovet *Musculosa carnis portio*, quæ à calcaneo protensa lumbricalium musculorum principiis sese miscet.

Pollicis

COMMENTARIUS.

flexores digitorum, ad primum internodium se extendens.

Extensor tertii internodii] Hic longus dicitur, uti qui est secundi internodii brevis.

A superiori tibiæ appendice] A superiori & anticâ tibiæ parte nervosus oritur, hinc statim carnosus factus descendit inter tibiam & fibulam supra ligamentum membranosum tibiam & fibulam connectens, usque ad pedem, ubi dividitur in tendines quatuor, qui sub ligamento pedis transverso progredientes in tertio digitorum digitorum quatuor internodio excepto pollice terminantur.

Ab ejusdem ligamento] Transverso; carnosum ipsi latumque principium.

Ferè quaternis] Ferè inquit, ut benè *Marchette*, quoniam aliquando tendinem unum, præter dictos Metatarso minimi digiti exhibet.

Musculi interossei] Hos non ita extendere vult *Marchette*, cum extensores secundi tertique internodii non possint agere quin simul primum internodium extendant.

Perforans à tibiâ originem sumit] Propè fibulam.

Perforatus] Principium habet à parte internâ calcis sub plantari.

Musculosa carnis portio] Carnea illa Massa est, in imâ parte pedis quæ vestigium vocatur contenta. Hujus firmandis potius digitis, &

Pollicis proprius flexor à Fibula posterius prodit, viamque perforantis musculi secutus, tertio pollicis ossi robusto tendine inseritur.

Obliquè movent pedis digitos musculi, sub ossibus metatarfi, atque inter illa collocati, adeoque INTEROSSEI dicti, quorum qui situ *externi* sunt, ad primum digitorum internodium desinunt: qui *interni*, ad secundum usque digitorum articulum consurgunt. His musculis simul agentibus, primum, secundumque digitorum os extenditur: agentibus verò singulis, ab internis quidem digiti adducuntur; ab externis autem abducuntur.

Pollex, minimusque digitus, singulares obtinent musculos: ille Abductorem unum, & Adductorem geminum, majorem & minorem: hic Abductorem.

Abductor pollicis à ligamento calcis interiùs ortus, ad primum pollicis internodium abit.

Adductor pollicis major à ligamento ossis metatarfi, quod digitum minimo proximum sustinet, productus, obliquo progressu primum pollicis articulum interiùs accedit.

Minor adductor, situque *Transversalis*, à minimi ferè digiti ligamento, quod primum internodium vincit, exortus, ad primum pollicis os brevi latoque tendine interiùs quoque defertur.

Digitus minimi abductor exterius à Calcaneo producitur, & in externo primi internodii latere metam suam attingit.

COMMENTARIUS.

eorum primis articulationibus inter se colligandis, quam movendis, usum esse putat | *Riolanus*, quin etiam mollis pulvinaris instar tendonibus aliorum musculorum substerni.





T A B U L Æ C A P. XIX. *Declaratio.*

Ostendit hæc Tabula Musculos ad Femoris, Cruris, Pedisque sub-
jecti varios motus à natura productos.

FIG. I.

- A** Musculi Psoas dicti portio major, quem Capitis undecimi figurâ primâ in situ naturali videas. Hic à principio suo separatus, & Iliaco interno Musculo junctus, ad Femur descendit.
- B** Musculus Iliacus internus.
- CC** Musculus Triceps nonnihil detectus, quem proxima figura sub eodem charactere integrum demonstrat.
- D** Musculus Lividus.
- E** Musculus Membranofus circa principium suum Carnoso corpore conspicuus, cui latus deinceps Tendo, à partibus subjectis separatus, continuus conspicitur.
- FF** Musculus Rectus.
- GG** Musculus Vastus externus.
- HH** Musculus Vastus internus.
- II** Musculus Fascialis.
- K** Musculus Tibialis anticus.
- LL** Musculus Peroneus secundus.
- MM** Extensor tertii digitorum Internodii.
- N** Pollicis tertii Internodii Extensor.
- aa** Ossis Ilium appendix antierius detecta.
- b** Ossis Pubis extremum.
- cccc** Tendo Musculi Membranofus.
- dd** Gasterocnemii Musculi portio, crure depresso prominens, quem figura tertia sequens extra situm pendentem exhibet, sub charactere K K.
- e** Ligamentum Membranofusum Tibia & Fibula.
- ffff** Tendines tertium Internodium extendentis Musculi.
- g** Ligamentum Pedis transversum separatum.

FIG. II.

- A** Ossis Ilium interna facies.
- B** Musculi Glutai majoris portio, quem figura sequens à Glutao medio separatum representat.
- CCC** Musculus Triceps.
- DD** Musculi Gasterocnemii, & Solei adhuc conjunctorum portio.
- EE** Tibialis Musculus posticus.
- FF** Peroneus Musculus primus.
- G** Secundi Internodii Extensor in suo situ.
- aaaa** Interossei primi Internodii abductores.

FIG. III.

- A** Glutaeus major separatus, atque ad latus depressus.
- B** Glutaeus medius in suo situ.
- C** Musculus Pyriformis dictus.
- D** Musculus quartus Femur circumagens.

- E** Musculus Obturator internus vocatus, marsupium Carnosum intrans.
- FF** Musculus Gracilis.
- GG** Musculus Seminervosus.
- HH** Semimembranosus, eleganter expressus.
- III** Musculus Biceps.
- KK** Gasterocnemius musculus deorsum reflexus, cujus principii Ossicula duo Sesamoidea adherent.
- LL** Musculus Soleus in suo Situ.
- M** Musculus exiguus Plantaris dictus.
- N** Tendo sub plantam Pedis à calce expansus.
- O** Musculus pollicis abductor.
- P** Musculus abductor minimi digiti.
- Q** Interossei Musculus ad digium pertinens minimus.
- aa** Margo Ossis Ilium.
- b** Marsupium Carnosum.
- cc** Tendo oblongus Musculi plantaris.

FIG. IV.

- A** Ossis Ilium Interna facies.
- B** Musculus Glutaeus minor in suo Situ.
- C** Musculus Glutaeus medius extra situm.
- D** Musculus Pyriformis.
- E** Musculus quartus Femur circumagens.
- F** Musculus Obturator externus.
- G** Musculus Obturator internus.
- H** Marsupium Carnosum.
- I** Musculus Popliteus.
- II** Musculus Perforans.
- K** Tertium pollicis Internodium flectens.
- L** Musculus Perforatus in suo situ.
- M** Abductor minimi digiti.
- N** Pollicis Abductor in suo situ.

FIG. V.

- a** Pollicis Adductor major.
- bb** Pollicis Abductor.
- c** Minimi digiti abductor.
- dddd** Interossei Musculi interni.
- e** Pollicis Adductor minor.

FIG. VI.

- A** Musculus pedis Perforatus, qui secundum Internodium flectit.
- B** Pollicis tertii Internodii flexor.
- C** Musculus Perforans, s. tertii Internodii flexor.
- DD** Portio Musculosa carnis, quæ Lumbricalium Musculorum principii conjuncta.
- eeee** Musculi Lumbricales.
- ffff** Interossei Musculi cum Pollicis, digitique minimi abductoribus.

CAPUT XX.

De Venis, Arteriis, & Nervis partium extremarum.

NE fatiscerent laborum frequentia partes extremæ, non minus per Arterias Venis sociatas vitalis vigor, quam per Nervos spiritus-voluntarii motus auctor, iis suppeditandus erat.

VENÆ, quæ in manum distribuuntur, à communi veluti stirpe originem impetrant. Etenim Vena *Subclavia* thoracis cavitatem egressa *Axillaris venæ* nomen assumit, emissaque prius *scapulari externa*, atque *internâ* venâ, in ramos dirimitur duos eximios, internum, & externum: quorum hic *Cephalicam*, sive *Humerariam*; ille *Basilicam*, seu *Jecorariam* venam producit.

CEPHALICA ab elatiore venæ axillaris parte per humerum, juxta cubitum flectentis musculi externum latius descendens, tenues aliquot furculos Cuti, musculisque præbet. Ad tuberculum autem Cubiti externum delata *tres* frequentius *ramos* diffundit.

Horum *Primus* qui rarior, gracili propagine in Digitorum flexores musculos, Radiique supinatore longum altius dimittitur: adeoque *Profundus cephalica ramus* dictus.

Alter, qui *internus* ejusdem *ramus*, amplior, obliquo ductu sub articulo cubiti, basilicæ interno ramo unitus, venam *Medianam* vulgò, sive *Communem* producit. Ea descendens porrò, postquam Radio venulas aliquot largita, dividitur in duos *ramos* exiliores; quorum is, qui ad Pollicem abit, vena *Cephalica manus* vocatur: alter nominis expers ad Indicem, Mediumque Digitum delabitur.

Tertius cephalicæ ramus, & *Externus*, obliquè per radium ad externam sive posteriorem Cubiti regionem proditur: ubi ramulo basilicæ junctus, Annulari, Minimoque Digito venas exhibet; quarum quæ digitum respicit minimum, *Salvatella manus* appellatur.

BASILICUS venæ Axillaris ramus, postquam *thoracicam superiorem*, & *inferiorem* protulit, brachium ingreditur, venamque constituit in dextro brachio *Jecorariam*, in sinistro *Splenicam* vulgò dictam, aut simpliciter

COMMENTARIUS.

S *Alvatella manus*] Hæc est Siele Arabum, & absque fundamento, ut opere singulari cujus illi, & hodie alii sectionem in sinistra manu contra Melancholicos affectus, febres probarunt. Interdum cum fructu fit, quamvis acutas & tertianas commendant, sed frustra rationes parum sæpè valeant cur faciant.

pliciter *Basilicam sinistram*. Hæc ad glandulas axillarum porrectis furculis, mox in *duos* dispescitur *ramos*; quorum *profundus* arteriæ, nervoque tertii & quarti paris, singulari propagine sociatus, superato Cubiti articulo, geminos iterum in ramulos differtur, *externum* unum à quo Pollex, Index, Mediusque digitus; & *internum* alterum, à quo Annularis, & Minimus venulas nanciscuntur.

Alter basilicæ *ramus Subcutaneus*, ad cubitum descendens, & ipse producit venam duplicem. *Internam*, quæ sub cubiti flexura, dimissâ singulari venâ, quam proximè descendantibus jungit, mox cephalicæ ramo unita medianam promit, & *externam*, quæ ad humeri tuber geminata, majore sobole ad Carpum, Digitumque minimum, minore verò per interiora manus propagatur.

A R T E R I Æ Manus omnes ab arteriæ *Subclavia* ramo Axillari prodeunt, qui per humeri internum latus ramo basilicæ interno conjunctus, postquam *Scapulares*, & *Thoracicas* arterias emisit, musculis item interius Humeri latus occupantibus, furculos aliquot suppeditavit; tum articulo duplicem propaginem transmisit, sub cubiti flexura in *duas* ampliores dividitur arterias; quarum una *exterior* ad carpum juxta Radium fertur, ubi motus ejus à medicis expenditur, sparsoque prius ad posteriora manus ramulo, ligamentum annulare subtervecta, Pollici, Indici, Medioque digito furculos impertitur. *Interior* altera juxta cubitum descendens profundior est, & Medio, Annullari, Minimoque digito ramulos demittit.

N E R V I Manuum à Quinto, Sexto, & Septimo pari Cervicis tum à Primo Secundoque Thoracis, principia ducunt, vario prius nexu conjuncti, quam ad ulteriora progrediantur, licet & in progressu ad extrema usque nonnunquam denuò coalescant. Inde sex vulgò *Nervorum paria* numerantur.

Primum eorum in Deltoiden musculum, brachiique Cutem fertur: parte reliquâ cephalicæ venæ propinquum.

Par secundum crassius est, perque medium brachii anteriùs delatum Bicipitem musculum furculis binis instruit, atque in progressu deinceps Carpi Supinatore externum ramulo donat. Cæterum ad cubiti flexuram

C O M M E N T A R I U S.

[Arteriæ] De Arteriôtomiæ Utilitate & necessitate in affectibus capitis & oculorum calidis, dolore quocunque corporis, aliisque morbis, prolixè agit *Bartholin. Vindic. contra* Hofmann. pag. 132. Ubi Marci Severini, Parai, Alpini, Panaroli, Oribasii, Galeni, Æginetæ, Aëtii, Aëtuarii, Aureliani, Avicennæ, aliorumque Authoritates adducit.

Saphe-

ram perductum in ramum dirimitur *externum*, qui cephalicæ venæ socius ad secundum Pollicis internodium porrigitur; tum *internum* crassiores, qui sub media vena divisus & ipse sobolem exterius ad Carpum extendit, interius verò juxta basilicam delatus nervulos utrinque ad Manus volam diffundit.

Tertium par secundo proximè conjunctum, emissio prius furculo subcutaneo, postquam brachium sive humerum attigit, secundo Cubiti flexori, tum tertii Digitorum internodii flexoribus musculis, & Pollici, Indici, Medioque digito ramulos exterius assignat.

Quartum par amplius, crassiusque cæteris, propè exortum suum venæ Basilicæ, Arteriæ, tertioque Nervorum pari proximum prius Cubiti extensoribus musculis, hinc Cuti quoque, furculum geminum largitur. Circa cubiti autem articulum, ramis duobus ad carpum porrectis, *externo* horum Pollicis interno lateri, tum Indici, Medioque digito propagines exhibet: altero *interno* fecundiore, musculos Carpum & Digitos extendentes trinâ sobole auget: reliquum ejus carpo tribuitur.

Quintum nervorum par, præcedentibus contiguum, ubi musculis ab interno Humeri tuberculo natis ramos obtulit, furculos profert duos; quorum *unus* ad volam Manus porrectus Minimo, Annulari, Medioque digito subvenit. *Alter* in externam Medii, Annularis, Minimique digiti partem excurrit.

Sextum par & in plexu nervorum cervicis ultimum, subcutaneum ferè est. Surculos expromit varios, maximè cum humeri tuber internum accedit; quorum alii supra basilicam sparsi phlebotomis fortè compuncti, vel incisi, dolorum acutissimorum, ac convulsionum molestias afferunt: reliquum nervi sexti paris ad carpum definit.

Illud scire par est, quemadmodum in venis, atque arteriis partium extremarum, ita & nervis earundem, naturam non eandem observare magnitudinem in omnibus, non eundem numerum, ac ductus; quantumvis quod optimum est semper intendat. Neque aliter rem in vasis se habere palam est, quæ ad pedem usque extremum pertingunt.

Iam V E N Æ ad *pedem* universim distributæ ab Iliaco venæ cavæ ramo Crurali communem exortum ducunt.

Prodit enim ab eo primum vena S A P H E N A, seu malleoli interni, longo ductu per femoris ac cruris internam regionem descendens. Diffusis

C O M M E N T A R I U S.

Saphena] Hæc secatur circa malleolum in retentione, ad evacuationem sanguinis copio-
affectibus uteri, præsertim in menstruorum | sius ad uterum & genitales partes vergentis.
Pp Popli-

fufis autem protinus ab initio , & circa medium Femoris Genuque ramis , juxta malleolum internum tandem variis ad Digtos pedis , maximeque Pollicem, furculis deducitur.

Secunda cruralis vena, I S C H I A S dicta , ab eodem exteriori è regione Saphenæ protenditur. Hæc brevior est, & transversim in cutem anteriùs, musculosque Coxendici propinquos excurrit.

Tertia M U S C U L A dicitur, à ramo crurali in musculos descendente producta , quibus geminatâ propagine interiori exteriorisque ramulos exhibet. Imò exortu aliquando verè *duplex* est hæc vena: *externa* una quæ minor, & Rectum, Vastumque externum, tibiam extendentes musculos, accedit; altera major & *interna*, quæ pluribus Femur occupantibus musculis furculos suos impertitur.

Quarta cruralis vena est P O P L I T E A , ab eodem principio profecta ; sed frequentius geminis ramis in progressu sese unientibus constituta. Sic per medium poplitis descendit , sparsis tum supra tum infra furam ramulis, ductuque reliquo ad Calcem, vel externi malleoli cutem definit.

Cæterum productis hisce venis , descendens inter duo femoris capita ramus *Cruralis*, ramum promit duplicem, *internum* nempe , & *externum*. *Internus* Suram constituentibus musculis propagines subministrat, & diffusis circa tibiæ inferiora ad cutem furculis , sub malleolum internum reflexus, ad pollicem usque delabitur. *Externus* præcedente minor, geminâ sobole conspicuus : quarum *prima* Suræ , Digtosque pedis flectentibus musculis præsto est ; ad medium verò Tibiæ delata ramulum *interius* ad Pollicem , Indicem , Mediumque digitum educit ; tum *Exterius* transversum ligamentum transiens , musculis pedum digitos flectentibus sese exhibet. *Altera* externi rami cruralis soboles , postquam in externam posterioremque Tibiæ regionem frequentes furculos disperfit, ad malleolum externum, in pede tandem obliteratur.

Truncus ipse denique *rami cruralis* arteriæ comiti firmiter injunctus, emissio dextrosum sinistrosumque ramo , per plantam pedis furculos extremos digerit.

Valvulas frequentes quemadmodum in venis brachii , ita in hisce pedis produxit divina illa rerum magistra. Similes quidem usu, sanguinemque

C O M M E N T A R I U S .

Poplitea] Hæc cum profundissima sit, & fertim cum *Galenus* in hujus descriptione non videatur, putandum eam secari non possius sit & venam appellet, modò in poplite, se, nec fortassis esse venam popliteam, præmodò circa poplitem, modò ad genu, modò sub

nemque ad extrema remeantem coercentes : nisi quod hic crebrò binæ, proximeque sibi conjunctæ, interpositâ quandoque simplici valvulâ, conspiciantur.

A R T E R I A pedis à *Cruralis arteria* ramo proficiscuntur universæ. Iliacus enim externus arteriæ ramus, sicuti in egressu ex abdomine ad Pudenda, & musculus Iliacus internus propaginem educit : ita egressus jam extra abdomen, cruralisque nomen adeptus, interius promit arteriam **I S C H I A M**, tum **M U S C U L A M** *cruralem externam*, quæ ad externos, anteriùsque femori adhærentes musculos fertur : tum *internam*, quæ Femoris musculis posteriora, atque interiora occupantibus distribuitur.

Supra poplitem constitutus Cruralis Arteriæ ramus in varias digeritur propagines è quibus *tres*, quatuorve minores in pinguedinem, & membranam subditam excurrunt. Ex his observabilis præcipuè **P O P L I T E A**, circa medium Femoris nata, quæ partim in musculos ejus posteriores, partim in suram porrigitur.

Circa poplitem descendens porro Cruralis ramus, arteriam exhibet aliàs **S U R A L E M** dictam; quæ interdum gemina, partim ad articulum, partim suræ musculus gasterocnemium dirigitur.

In ipso denique poplite consistens arteria finditur in *ramum externum*, qui musculos Tibiæ anteriùs adjacentes adit : in alios item duos *posterius*, quorum *unus* Suræ ventrem constituentibus musculis tribuitur ; *alter* transversum ligamentum pedis superans musculis Digitos adducentibus inspergitur.

Descendens per tibiæ posteriora *communis crurum ramus* educto priùs furculo, qui ad pollicem dorsumque pedis porrigitur, tandem tendinibus digitorum pedis occultatus, geminoque ramulo diremptus, horum *interiore* Pollici, Indici, Medioque digito, *exteriore* verò Minimo dispensatur.

N E R V I pedis à tribus inferioribus Lumborum, & quatuor superioribus ossis Sacri paribus profecti, constituto prius plexu, *quatuor* dein-

C O M M E N T A R I U S.

sub genu, adeoque intellexerit fortè venam malleoli, quæ deorsum ad tuberculum tibiæ internum descendit, & conspicua satis revera sub genu est.

Arteria cruralis] Aorta arteria ad ossis sacri initium venam cavam conscendit, & non amplius subjacet. *Quare autem sub Arteria se re-*

condat *cruralis vena* ignorantem. Plempius potuit edocere. Ego nec huic acquiescam. In hac namque flexura majori periculo exponitur vena, quam trunco Arteriæ suffulta, quia jam duriori coxæ corpori incumbit. Putarim igitur anteriores partes generationis officinam, ob calidi indigentiam magnæ Arteriæ viciniam desiderasse, præ-

deinceps *propaginibus* diffunduntur, Earum *prima*, & *tertia*, breviores sunt, atque ultra femoris longitudinem hand feruntur. *Secunda* tibiam quidem accedit, *quarta* verò una instar omnium ad extremos pedum ungues porrigitur.

Prima nervorum propago è superiore plexus parte prodiens, ad Rotatorem Femoris internum descendit, musculoque Tibiæ Fasciali, tum Recto, & Vasto externo ramulos transmittit.

Secunda per inguina cum vena, arteriaque descendens, interiùs cum vena Saphena deorsum ad pedes contendit: quamvis longo hoc itinere tum aliis, tum potissimùm Genu ramum evidentiore tribuat. Reliqua pars musculos Femori interiùs accumbentes accedit sparsis ramis insignibus, & circa genu terminum consequitur.

Tertia quæ à plexu dimittitur propago, per foramen ossis pubis delapsa, Obturatoribus externis, musculisque Penem erigentibus ramulos suggerit. Quod superest in cutem femori inductam, flexoremque Tibiæ musculum primum ac tertium dirigitur.

Quarta ex ossis sacri quatuor paribus conflata, longitudine, crassitie, & siccitate nulli secunda est. Hæc ad posteriora femoris vergens *Sobolem* retrorsum ad natium femorisque cutem educit: *Tres* item alias ad caput musculi Seminervosi, Semimembranosi, & Bicipitis, tibiam flexentium dispergit, ad Tricipitem quoque femoris musculum.

Truncus ipse, furculis aliquot circa Femur demissis, juxta genu Tarfi extensori primo, Plantarique musculo, iterum nervulo prospicit. In ipso denique sinu genuum in *duos ramos* finditur; quorum unus externus, alter internus habetur. *Externus* dum ad fibulam vergit, Malleolum externum, & Cutem variis furculis instruit; ipse verò Tibiæ, Fibulæque ligamentum pervadens cum extensore Digitorum pedis sub transverso ejusdem vinculo, ad digitos ipsos delabitur. *Internus ramus* per Cruris posteriora inter musculos suram constituentes descendens, sub ligamento item pedis per longitudinem plantæ pulchre distributus, singulis pedum digitis nervulum geminum exhibet.

Variat tamen in tanti nervi distinctione haud rarò providus ille opifex, quamvis ubique optimi finis observantissimus. Interdum enim altiùs, & supra medium femur, nervum hunc quarti paris, sive propaginem

COMMENTARIUS.

Sentim quum averse partes carnosiores, hac ob res. Qui optime conjecerit, optimus vates esto.
membranofam compagem censeantur frigidio- Barthol. Vindic.

Sensus

nem quartam, in externum, internumque, ramum separat; à quibus tamen enarratâ jam ferie partibus subditis soboles suas dispensat. Nunquam ad mediam usque tibiam nervum integrum servat; ramis tamen externis, internisque singularibus ad femur, crura, pedesque protensis. Hinc bifariam diremtum sub planta pedis ad singulos digitos nervulis geminatis perducit: quemadmodum in proximæ Tabulæ figura sexta conspici potest.

Extremarum partium, veluti clausulæ summæ sunt UNGUES, inter ossa, cartilagineisque SUBSTANTIÆ conditione medii.

Feruntur ad eorum radices ARTERIÆ, VENÆ, NERVULI: unde & sensus circa ipsos vigor, atque in ipsis vitæ qualiscunque & nutriendi adeo munus evidentissimum.

Digitorum singulis, quemadmodum decenti MAGNITUDE æquantur; sic concinna FIGURA leviter sinuati superiùs aptantur.

VINCULO item circa radices firmati cutique proximè connexi non

COMMENTARIUS.

Sensus circa ipsos vigor] Quia quotidie sine dolore rescamus, quidam sentire negant. Hi inquit Hofmann. Instit. lib. 2. cap. 18. non considerant totos unguis, sed eam partem tantum quæ exstat. Secent igitur illam partem qua carni adhuc hærent & dubitare desinent. An cum Bonamico dicendum est, si accipias solum unguis corpus, quatenus est pars similis non sentit, sed si cum eo quod subjacet sentit omnino. Id vero non est fundo in unum parte, quo mediante cuti digitorum alligatur, ut Columbus vult. Non nervus, qui circa radicem inseritur tendini illi, sed membrana fortassis ex nervo dilatato facta, quæ toti illi substernitur. Sed annon inquit Lindanus hoc est abire à quæstione? quod subtenditur ungui unguis non est, at quæritur an unguis quâ unguis sentiat? non debuit: saltem non aliter ac ossa & fortasse minus; ossa enim nudata sentiunt injurias aëris: unguis quia nudi esse debuere, non debuere etiam has sentire. Et hujus etiam sententiæ Veslingius noster videtur, dum sensus vigorem circa ipsos à nervis istis pendere dicit, non in ipsis.

Nutriendi adeo munus evidentissimum] Nutriuntur autem sanguine ut alie partes secundum trinam dimensionem. Hujus testimonium Lindano dedit Enchusane mulieris fœditas &

negligentia sui inaudita. Ei in pedibus unguis in tantum excreverant, ut ambulare tandem non posset. Medicus vocatus ferrare jubet. Segmina Pater Lindani abstulit secum, & ea servat etiamnum Lindanus, segmentum pollicis duos pollices longum, crassitudine digiti est: circa radices solidum, inde ex multis laminis velut totidem unguibus compaginatam. Segmen digiti medii æque longum ac prius, sed minus crassum, insigniter tamen. Nullum pollice brevius: etiam minimi crassius est crassissimo pollicis ungue. Quodin latum excrevit introrsum cernitur aduncum.

Apprehensionis robur] Quia verò manibus speciatim in apprehendendo serviunt summities unguium, omnino audienda Chirurgo Hippocratis monitio, quæ est in Off. Medic. text. II. Ungues neque supereminere digitos debere, neque infra carnem illorum esse. Nam qui unguis habent longiores & ultra apices digitorum exstantes non possunt apprehendere corpora minora. Qui breviores carnemque non satis tegentes, quicquid tollere volunt, ineptè & invalidè capiunt.

Atque hæc de Unguibus. Pilorum historiam quam Capite XIII. partim ob loci commoditatem, partim & ob materiæ affinitatem, in hunc locum distulimus verbis maximè Sen-

non velamentorum simplicium U s u m præstant ; sed in digitis manuum , apprehensionis robur , rerumque minutarum tractationem , in pedibus

C O M M E N T A R I U S .

guerdii Exercit. 8. exhibebimus , hinc inde quædam ex aliis authoribus inferendo , supervacaneum enim omnino , indecensque censeo , ab aliis benè proposita vel emendare velle novitatis ergò , vel pro suis vendere. Pilus *inquit* Græcè loquentibus *ῥεῖξ* dicitur , voce , ut nonnullis placet , derivata à *ῥεῖξω* meto , ὅτι *ῥεῖσται* , quia demetuntur , refecantur pili. Simili de causâ capitis pili attonsi , ut quidam putant *cirri* dicuntur , voce deducta à *κείρω* *incido , attondeo*. Unde venit etiam vox *κρότον* Atticè *κρόπην* crinem significans. Aliqui verò *Cirros* nominant capillos contortos & crispatos. Cum voce pili cognatam significationem habet vox *Capilli* , qua quandoque generaliter quilibet pili , in quacunque corporis parte orti , significantur. Non negligendum tamen , quod licet hoc vocabulum aliquando tam latè usurpetur , propriè , si originem illius spectemus , eo notari capitis pilos : capillus enim quasi capitis pilus dicitur. Congeries capillorum in viris à frequenti cæsiōe , *Cæsaries* vocatur. *Compti* & curiosius culti capilli , veniunt nomine *Comæ* , deducto à *κομῶν* *curo , curam gero* , quia non sine cura componi solent. Pili longiores , in colla & armos dependentes , *Jubæ* vocantur. Crassi & rigidi , quales dantur in subibus , appellari solent *Setæ*.

Hæc de voce. In re ipsa primo considerandæ veniunt pili Causæ , quarum declarationem ordimur à *Forma* pili , de qua anxie quæritur , an ea anima sit , nec ne ? & quod huic connexum est , an pili verè vivant , nutriantur , & crescant , an vero tantum protrudantur ? Hactenus probabilior videtur sententia , quæ asserit , *Pilos verè & propriè animatos esse* , eos propriè dicta nutritione nutriri , & crescere , non verò tantum protrudi , propter sequentes rationes . *Primo*. Si pili non essent animati , neque propriè nutrirentur , sed protruderentur tantum , consequens foret , quod in canitie , pilorum radices & partes cuti propiores , prius albicante colore imbuerentur , quam ille conspicuus esset in pilorum extremitatibus , & ita illorum partes capiti propiores , jam essent albicantes & canæ , dum partes exte-

res adhuc nigrae sunt. Huic vero contrarium per experientiam constat , quæ ostendit , omnes pilorum partes simul albas & canas fieri.

Secundo. In pueris observatur , capillos flavo colore tinctos , indies successivè nigrescere , quoad omnes partes simul : quod si capilli non crescerent propriè , sed tantum protruderentur , extremæ partes eorum in pueris flavæ semper manerent , usque dum detonderentur ; & solæ partes cuti propiores , nigro afficerentur colore , ut ita in eorum pilis duplex spectaretur color.

Tertio. Idem quoque inde probatur , quod quidam juvenes unica nocte cani redditi memorantur. Teste *Pariano Nobil. Exercit. de subtil. lib. 12. Joanne Riolano cap. de Canitie* aliisque Ex hoc eventu pro dicta opinione elicio tale argumentum. Quod si pili solum protruderentur , nullo modo tale quid fieri potuisset , sed prius auferri debuissent crines alterius coloris.

Quarto. Si pili non nutrirentur propriè , sed protruderentur , absque ulla determinata lege vel mensura semper longiores fierent , quamdiu illis suppeditatur ad radicem idonea materia ; imo quo longiores sunt , eo magis deberent , ratione longitudinis , augeri pili propendentes , quia illorum gravitas juvaret actionem facultatis expellentis. Huic contrarium etiam experientia attestatur manifestissime in superciliis & aliis quibusdam corporis partibus.

Quinto. Idem comprobatur ex fissuris quæ aliquando in capillorum extremitatibus oriuntur , ex nimia pulveris aromatici insperione , vel exsiccatione orta à calamistris : testantur enim Chirurgi , crines ita fissos non excrecere , prius quam ultra fissuram refecentur ; quod si vero crines longiores fierent per protrusionem meram , sine nutritione , æqualiter , & indiscriminatim longiores redderentur , sive ultra fissuram essent abscissi , sive non ; omnes enim causæ eodem se haberent modo.

Idem videtur etiam ostendi posse ex diversitate colorum , quæ apparet in pilis ejusdem animalis , maxime propinquis & vicinis , quod

pedibus autem incessus securitatem promovent. Clarissimo naturæ scopo, ut cum vel in purgamenta quædam ejus fordesque despicias, habeas

COMMENTARIUS.

quod in bestiis frequentius, in hominibus rarius contingit: ita in canibus domesticis videmus pilos variegatos, albos, nigros, flavos &c.

Ex eo quod pili nutriuntur & accrescunt, nutritione & accretione propriè dicta consequitur, pilos *porosos* esse: quia absque poris alimentum pilorum non posset ad partes omnes ferri. Cavitationem sive porositatem præcipue extensam habent in longitudinem, ita ut crescant, eo modo quo junci, & varia graminis genera: quod argui potest ex ipsa pilorum figura. Pilorum porositas & ductus in longitudinem manifeste deprehenditur pilis in suum quibus sutores calceos sunt: hi enim facillime in longitudinem secundum pororum ductum dividuntur, non vero tam facile in transversum; quo simili modo, pororum dispositionem, ligna multo facilius secundum longitudinem finduntur, quam oblique & transverse secantur.

Competit autem pilis anima sola vegetans & quidem non communis totius corporis sed propria, sicque propriè dictæ corporis partes non sunt, videnturque à corpore excrecere eo modo, quo plantæ oriuntur ex terra; ita ut sicut plantæ alimentum trahunt à terra, interrim tamen terræ partes non sunt, sed habent formas suas peculiare, quælibet planta propriam suam animam, qua terra caret; simili modo, licet pili nutrantur à materia, quam à corpore accipiunt, attamen quilibet pilus sibi peculiari animâ vegetante donatus, distincta à forma illius ex quo & in quo pili crescunt.

Sin pili viverent, & informarentur eadem anima, quæ totum informat corpus, tum etiam morerentur, cum reliquæ partes corporis vita privantur. Atqui experientia docet, pilos etiam longo tempore post hominis mortem vivere, nutrirî, & accrescere.

Materia ex qua generantur & constant pili, est humor excrementitius, crassus, terrestris, pinguis, viscidus & glutinosus. Quod ex tali materia impurâ pili oriuntur, inde probatur: quia in tabe laborantibus æque atque in sanis hominibus pili excrecunt: in quibus tamen propter ineptum alimentum corpus labo-

rat & nutrirî nequit. Imò etiam in mortuis, in quibus laudabile nutrimentum confici non potest, in longum etiam tempus pili augentur.

Pilorum materiam esse substantiam crassam & terrestrem, arguitur ex ipsorum robore quod tactus docet, & resistentia qua forfices & novacula hebescent, cum illis inciduntur. Esse materiam pinguem viscidam, & glutinosam, sensus quoque tactus edocet. Tum etiam, si pinguedine destituerentur, projecti in ignem, non ita flammam conciperent & incenderentur, ut jam fieri videmus. Præterea, si corpora plane arida forent, non essent ita flexilia, sed facilius rumperentur.

Causa efficiens, qua natura præcipue in pilorum productione & accretione utitur, eadem est quæ aliorum corporum generationi inservit, scilicet calor, à quo dicta materia elaboratur, præparatur, & ad receptionem animæ pilis propriæ & convenientis apta & idonea redditur.

Finis & usus pilorum varius est, quicquid etiam contra moliatur *Scaliger. Com. in Arist. de hist. plant. & anim. Primus* est, tueri partes, faciunt hoc *Primo* internum calorem continendo & frigoris externi aeris arcendo. In homine hunc usum præcipue præstant capilli calvæ. Hinc causa constat, cur frequentioribus defluxionibus & morbis inde ortis afficiantur, quibus capilli exciderunt, vel alia de causa nimis rari sunt: an verò idem usus & ad barbam extendi possit, ut quidem *Galenus lib. II. de usu part. cap. 14.* suspicatur, dubito, quia mulierum facies mollior & tenerior eodem operimento indigebat, ut optimè monet magnus *Riolan. Antrop. lib. 5. cap. 51. Secundo* resistendo externis, quæ lapsu vel impetu partes læderent: ita capilli calvæ tumentur cranii partesque ipsi conjunctas; superciliarum & palpebrarum pili custodiunt oculum, impediunt ne fordes pulvisculi aliaque in illum incidant.

Secundus est excipere corporis totius superfluos vapores fuliginosos. Natura inquit *Hipp. lib. de Glandulis*, Glandulas & Pilos creat, ambo ejusdem utilitatis gratia. Illas qui-

beas tamen, ubi sapientissimi Architecti nomen pariter prædices, ac nomen, exclamesque cum Panarete

Τὸ πᾶν ἐστὶν αὐτῷ. *Ipsæ est omnia.*

COMMENTARIUS.

quidem ut quod influit excipiant, hos verò ut ex illis oportunitate nacti, producantur & augeantur, quodque in extremas partes expellitur, colligant. Hinc & *Galen. lib. cit.* tum caput tum genas ideò pilis luxuriare credit, & caminum corporis totius Caput vocat *Mundinus*. Spectatur & hic usus optimè in pilis circa pudenda & sub axillis se exhibentibus. Quamvis nec moralem Theodori usum rejicio, qui, referente *Riolano lib. 2. Antrop. cap. 31.* tum pilos mari & foeminae in pube germinare docet, cum naturalis verecundia partes illas occultare jubet.

Tertius est ornare & decorare, & certè Pilos ad ornatum facere, res ipsa docet, calvos enim & depiles deformes solumus aestimare. Marem ornat barba, quam illi ob gravitatem natura concessit, foeminis eam negavit, quas ad suavitatem magis quam gravitatem natura composuit. Egregiè hæc de re inter alios *Sægerus de usu integum. corporis humani Communi dissertatione priore.*

Pars corporis animalis in & ex qua pilus crescit, cutis est. Ordinarie exterior, quæ corpus ambit & tegit: nam præter consuetum naturæ ordinem fuit, quod de *Aristomene Messenio* refert *Valerius Maximus lib. 1. cap. 8.* cujus cor exectum pills refertum invenerunt Athenienses. In cute id unde pilus erumpit, est cutis porus, ita ut pili radix arcte connexa sit cum substantia cutis, & ex ejus poro prodeat: quemlibet tamen porum cutis habere infixam radicem pilosam, non est verisimile. Constat, ex sudoribus egredientibus ex vola manus & planta pedis, in illis partibus poros dari sine pilosa radice; probabile idem in cæteris obtinere partibus: eo magis, quia in calvis sudores è capitis cute prodeunt, ubi pilosa radix observari non potest.

Quantum ad *Magnitudinem* attinet, in homine pili capitis sive capilli, præsertim erum-

pentes è calva, longissimi sunt: cujus ratio petenda est à magnitudine Cerebri quod in homine datur, copioso humore, pilis alimonia suppeditante, & majori agitatione materiæ sursum versus caput in homine.

Duritie & mollietati pilorum ratio pendet, partim à diversitate humoris ex quo pili nutriuntur, partim etiam à varia dispositione cutis & pororum ex quibus in cute pili erumpunt. Ita cholicorum pili crassi & duri sunt, quia ob intensum calorem & siccitatem durius & adustus quasi excrementitius humor in cute relinquitur: & præterea pori cutis in ejusmodi hominibus magni & valde aperti sunt, propter easdem causas: è quibus igitur similes ratione quantitatis, pili prodeunt.

Prima etiam ætate pili Molliores sunt, præsertim capilli. *Primo*, quia tum nutrimur humidioris alimento. *Secundo*, quia cutis ipsa mollior est, & minores pori: procedente vero ætate, quia partes animalium magis exsiccantur, siccius alimentum ipsis suppeditatur, & pori cutis magis aperiuntur, unde igitur & ipsi pili sicciores & duriores efficiuntur.

Ratione *Figure* distinguuntur pili in *Rectos* & *Crispos*. Hujus diversitatis causa etiam querenda in diversitate humorum & pororum. *Recti* pili generantur à majore copia & abundantia humorum: *Crispi* contra, ab intensiore siccitate. Ita enim pili exsiccati pulvere, calamistis, vel alia quacunque causa, statim crispantur, uti etiam videre est in pilis igni expositis. Hinc crispi capilli rarius naturaliter in foeminis quam viris observantur, quia plerumque foeminae humidiores sunt maribus. Sed præter hanc alia quoque causa ejus diversitatis datur, deducenda à pororum diversitate: recti nimirum pili procreantur ob rectos meatus sive poros cutis, unde prodeunt; crispi contra ortum ducunt ex obliquis poris cutis.

TABULÆ CAP. XX. Explicatio.

Hac tandem ultimâ Tabulâ, Venas, Arterias, Nervosque partium extremarum oculis subjicimus. Non de minutis singulorum ramis solliciti: quorum ingens multitudo obscurare grandiores quosque, discentiumque memoriam, tot adjectis characteribus, inutili veluti fasce, onerare poterat. Insigniores itaque delineare satis habuimus: imò hos ipsos, quos annis hactenus exactis in Theatro Academico publicè in cadaveribus ostendere sustinuimus ac debuimus.

FIG. I.

Venas exhibet ad manum sparsas.

A	Ramus Vena Cave Axillaris.
BBB	Vena Cephalica.
CCC	Vena Basilica.
a	Vena Scapularis externa.
b	Ramus Cephalica qui ad Musculum Deltoideum fertur.
cd	Ramuli Cephalica qui ad Flexores Cubiti sparguntur.
e	Ramus Cephalica profundus, qui altius hic exoritur.
ff	Ramus Cephalica internus, Medianam ex parte constituens.
g	Vena Mediana descendens.
h	Vena Cephalica manus.
ii	Ramus Cephalica externus.
a	Vena Salvatella manus.
k	Vena Scapularis interna.
l	Vena Thoracica superior.
m	Vena Thoracica inferior.
nnn	Rami Basilica qui ad extensores Cubiti feruntur.
oo	Ramus Basilica profundus.
p	Rami profundi propago singularis, quæ cum Nervorum quarto pari ad Cubitum extrorsum fertur.
q	Rami profundi Basilica Ramulus externus.
r	Rami profundi Ramulus internus.
s	Ramus Basilica Subcutaneus.
tt	Rami Subcutanei Vena interna, Medianam cum Cephalica producentes.
n	Propago ejus Vena communi se jungens.
x	Rami Basilica Subcutanei Vena externa.
yy	Subcutanei externi Soboles major.
z	Ejusdem Soboles minor.

FIG. II.

Arteriæ conspiciuntur ad Brachium diffusæ.

A	Ramus Arteria axillaris.
a	Arteria Scapularis interna.

b	Arteria Scapularis externa.
c	Arteria Thoracica superior.
d	Arteria Thoracica inferior.
efg	Rami Arteria ad Musculos Humero adjacentes distributi.
h h h	Rami Arteria ad Cubiti articulum sparsi.
B	Ramus Arteria externus in cubito.
C	Ramus Arteria internus.
ii	Propago quæ fertur ad Musculos radio accumbentes.
k	Propago quæ Musculis Ulnam occupantibus proficit.
l m n o	Propagines, quæ ab interno Ramo ad carpum, minimum, annularem, mediumque digitum abeunt.
p p	Propagines, quæ ab externo Ramo ad posteriora Manus feruntur.
q q r s	Propagines ad pollicem, indicem, mediumque digitum pertinentes.

FIG. III.

Nervos designat ad manum sparsos.

4.5.6.7.	Quatuor colli Vertebra.
i.	Vertebra prima Thoracis.
a b c d e	Rami Nervorum quinque, è Vertebrae foraminibus prodeuntes.
ff	Primum par Nervorum à plexu $\times \times$ descendens.
g g	Par secundum.
h h	Par Nervorum tertium.
ii	Par quartum cæteris grandius.
kk	Par Nervorum quintum.
ll	Par sextum, quod est Subcutaneum.

FIG. IV.

Venas continet pedis.

A	Ramus Vena Cave Cruralis.
aaaa	Vena Saphena.
bbb	Rami Saphena per Femoris interiora sparsi.
cc	Vena Iphias dicta.

Q q

ad Vena

- dd** Vena Muscula hic gemina Ramus internus.
ee Vena Muscula externa.
fff Vena Poplitea, ex duplici principio conflata.
gg Vena Cruralis Ramus internus.
hh Vena Cruralis Ramus externus.
i Rami externi propago prima, hic altius cum sequente exorta.
kk Ejusdem Rami propago altera.
ll Reliqua pars Rami cruralis.
m Vena Ischias pedis.

FIG. V.

Arterias completitur pedis.

- AAA** Arteria Cruralis, ab Arteria magna Ramo Iliaco externo producta.
a Arteria Pudenda dicta.
b Arteria qua fertur ad Musculum Iliacum internum.
c Arteria Ischias.
d Arteria Muscula externa.
e Arteria Muscula interna.
ffff Arteria ad Membranam ac pinguedinem sparsa.
gg Arteria Poplitea.
hh Arteria Surales appellata.
ii Ramus Arteria Cruralis anterior.
kk Ramus Cruralis Arteria posterior primus.
ll Ramus ejusdem posterior secundus.

FIG. VI.

Nervos repræsentat pedis.

- 2.3.4.5.** Vertebra Lumborum quatuor.
6.6. Os Sacrum.
A Par Nervorum ad Musculos abdominis transversos pertinens.
BB Primum par Nervorum pedis.

- CC** Secundum par Nervorum pedis.
aaa Ejusdem Ramus, qui Saphenam comitatur.
bbb Rami ejusdem paris reliqui.
DD Tertium par Nervorum pedis.
EEE Quartum par Nervorum pedis, omnium maximum.
c Ramus ejus, qui ad natium, & Femoris cutem abit.
ddd Ramuli in flexores Tibie propagati.
eee Surculi ad cutem Femoris inferius porrecti.
f Ramus plantari Musculo, Tarsoque extensori primo donatus.
gh Rami duo externi ad digitos pedis, & Fibula accumbentes Musculos distributi.
i Ramus internus, qui ad pollicem, indicemque pedis fertur.
kl Rami interni Suralibus Musculis præcipue dicati.
m Residuum Nervi sexti paris, duplici Ramo sub planta pedis ad digitos dispersi.

FIG. VII.

Basilicam Venam apertam ostendit, in qua Valvulæ tres simplices fursum spectantes.

FIG. VIII.

Ramum Venæ Cruralis dissectum profert; ut Valvulæ gemellæ unaque simplex conspiciantur.

FIG. IX. & X.

Portionem exprimunt Nervi quarti paris in minutos Nervos; tanquam filamenta distractam; è quibus mirâ naturæ follertiâ colligatis producitur.







A P P E N D I X

AD

A N A T O M E N
V E S L I N G I A N A M

RECENTIORUM

I N V E N T A
V A R I A

proponens.

THE NEW YORK

MEMORIAL

AND

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE

A P P E N D I C I S

V E S L I N G I A N Æ

P A R S I.

De Osculis & Valvulis Vasorum Meseraicorum, eorumque irradiatione à Lactorum diversa.

Ex Anatome Anatomia Bilhana Jacobi Henr. Pauli.

IAm ab omni ævo de Osculis circa insertionem Venarum Meseraicarum inter se Auctores discreparunt quàm maximè. Digna Quæstio, quæ & hoc loco, ita ferente occasione, incudi reddatur. Estque adeò numerus affirmantium, oscula illa esse aperta, atque in Ventriculum & Intestina pro recipiendo Chylo hiare, non minor, quàm eorum, qui à negativa parte stantes contrarium tuentur. Olim, apud seculum prius; quicunque Anatomici famâ celebres fuerunt, similitudine ab Arboribus desumtâ, Portam trunco, Meseraicas radici, ipsa Intestina terræ comparantes, rem acu se tetigisse arbitrabantur, teste Galeno de Venar. dissect. cap. 1. item 4. U. P. cap. ultimo, & ante illum Aristotele 4. Part. anim. 4. p. m. 625. Cum quibus juvat conferre Bartholom. Cabrol. Observat. 1. pag. 93. cujus sanè non is est absolutè sensus, quem N. Zassius in Append. de circuitu Sanguinis perperam elicit, nempe: Venarum radices succum suum (neque hæc vox ibidem legitur) ex venis ad ampliora vasa sursum vehere; ast, ut præmissis Hippocr. & Galeni rationibus, ex conclusionem inferitur: Venæ Portæ radices in intestinis esse, & in venis & per venas sanguinem fieri, quum & in venis Mesenterii nemo unquam tam oculatus fuit, ut quicquam præter sanguinem viderit. Quamobrem, quum vix aliquis repertus, qui impunè tulerit alienos textus fallaciter allegando corrumpere, & præconcepitis suis accommodare opinionibus, nec sibi licere sciat Zassius immutare verba, præ quàm quod debuisse imitari. Sed ut propius ad rhombum. Limitant alii, atque hæc orificia, non ad Intestinorum usque cavitatem sed ad eorum latera, aut exteriorem tunicam tantum dehiscere docent. Quidam contendunt in puncta definere. Sunt queis placet, non omnes Meseraicas ejusdem conformationis, sed proprias esse, intestinis nutriendis dicatas, hautquaquam ad Hepar trajicientes, verùm in glandulosa quædam corpora definentes, quum ceteræ omnes sursum ad Portam referantur. Id quod etiam Galenus 4. U. P. 19. p. 527. ex Herophili sententia asseruisse videtur. Reald. Columbus l. 6. p. 302. suam unicuique addit membranam, quæ susceptum Chylum egredi prohibeant, quales & in vesica extremis ureteribus sunt appositæ. Quod tamen veritati non esse consentaneum præter Salom. Albertum de valv. membranis pag. 156. & A. Laurentium lib. 4. Hist. Anat. cap. 4. & Quæst.

Quaest. 5. Archangelus Piccolhominus l. 2. Lect. 13. p. 96. dudum commostravit: existimans, crustam illam ex tertiæ coctionis intestinorum excrementis genitam, instar operculi cujusdam ora omnium Venarum Meseraicarum obducere, non secus, ac epidermis in cutem pervenientium cooperit extremitates. Cui ultimo calculum suum adjiciens Bauhinus lib. 1. Theat. Anat. cap. 17. per eam crustam, velut per filtrum tenniozem Chyli portionem transcolari judicat. Si Asellium audiamus, adsunt utrisque, & Meseraicis & Lacteis valvulae, hæc differentiâ: ut illæ foris intrò ferantur, hæc contra intus foras spectent, quas instar minutissimorum marsupiorum, aut concretarum guttularum, stillarumve se animadvertisse scribit cap. 18. Et quod Piccolhominus Meseraicis rubris à crustâ operimentum, Bauhinus filtrum esse voluerunt, id cap. 28. tantum ad Lacteas suas transfert, illasque cap. 19. dicit veras esse venas, quæ ad intestina instar hirudinum hiant, spongiosis capitulis, quæ radicum vicem obtinent, quæ in ipsam intestinorum capacitatem se penetrant, &c. Recentiores, hoc invento confirmati distincta vasa non esse confundenda, nec crudioris Chyli & Sanguinis perfecti mixturem fieri debere; si paterent Meseraicæ, perpetuam fore in intestina hæmorrhagiam, ut in Dysenteria ab erosione evenire solet, identidem occidunt, & huic effato, neglectis ferè osculis, unicè acquiescunt.

His omnibus quanto exactiorem & perspicaciorem fuisse prædicabo Nob. *Bilsum?* qui in balsamo conditis intestinis, quæ sibi servat, tum oculis tum tactui veram vasorum irradicationem & valvulas est exhibiturus, quodque adhuc subtilioris est indaginis, Venas Lacteas angustioris orificii ac ductus esse ceteris.

Commotus ego non tam festivo quam novo hoc acroamate, neque enim operculum esse, aut quæ hodie Roterodami eduntur tam vera credidi, quam quæ ex tripode quondam Delphis in Bœotia responsa dabantur, sciscitatus sum in vivo cane, bene pasto, quid rei esset. Vidi obiter in infimo ventre, canaliculis Lactearum turgescens, tam his, quam reliquis Mesenterii vasis exterius comprehendere undique & promiscuè ambiri Intestina, prout in Tabulis æneis Asellii, Walai, Bartholini, Highmori, eodem fermè typo repræsentantur. Ligavi arteriam, dein venam, & vas aliquod chyli ferum: notavi, hoc & venam pari pacto cis vinculum intumescere, illam ex adverso, quod in circuitu Sanguinis per totum corpus apodicticum est, circa hanc regionem inaniri. Mox aperto intestino, quod chylo subfusco, nec adhucdum sufficienter elaborato redundabat, interius illud spongiosum & mollissimæ substantiæ ~~οειδους~~ se conspectui meo obtulit, colore præditum in superiori parte carneo, in fundo & ad latera dilutiori, magisque ad album vergente. Sparsæ hinc inde erant, præter candicantia quædam filamenta, minutissimæ, & arenis, seu pollini aut floribus farinæ similes glandines, forsan pro valvulis à plerisque habitæ quas qui apte discernat, lynceum esse oportet, aut perspicillum Kircheri microscopicum hic adhibeat, cujus ope quicquid visum effugit penitus planeque se exferit. Et hujusmodi Observationum, jucundissimam legentibus Centuriam D. D. Petrus Borellus, Regis Christianissimi Medicus concinnavit, ac libellis suis de vero Telescopii inventore & Conspectuillis adjunxit. Quarum LXXXV. Anatomica est, & huc ex parte collineat.

Obser-

Observantur, inquiens, *alba corpuscula in sero ac chilo, quæ in urina, non sunt valvule pororum, vesicæ & venarum &c.* Quum jam cultello rugosam in cavitate tunicam, seu potius, ex mente *Cl. Zassii*, villosum mucum, ubi rubicundior appareret, leniter abraderem, sanguis per exigua foraminula confertim prorumpere, & superficie imbuere ocepit, quæ omnia in fundo accidebant parcius. Mortuo autem Subjecto, inde vel guttulam Sanguinis elicere, etiam transversa & profundâ incisurâ incassum enitebar, nec usquam foraminula aderant, quum tamen radendo tam tenuia reddidissim intestina, quàm sunt vespertilionum alæ, atque ut ad suppositam manum ceu cornea tunica pellucerent.

Idem post illa expertus sum in alio vivo itidem cane, sed ad differentiam per biduum non cibato, ac nihil ferè à priori alienum reperi. Poruli non minus referatu faciles erant, quamvis colorum discrimen, uti non comparentibus Lacteis, in reliquis intestinis paulò obscurius, ita in Duodeno, magis notabile esset. Quod tam ad substratum Pancreas, cujus perpetuo madore undiquaque irrigatur hoc intestinum, quàm ad defectum Meseraicarum, quarum nulla huc pertingit, referendum puto. Bilis ibidem, vel ob longam inedia, juxta illud, *fames & mora bilem in nasum conciuunt*, vel præ iracundiâ frendente Cane, vel ut fermentationi, aut secretioni excrementorum à Chylo inferviret, plurimis bullis æstuans, in spumam se attollebat copiosissimam, cui non dispar exemplum *Cl. Wallens in Epistola 1. ad Th. Bartholin. pag. 225.* recenset.

Tertiùm repetitâ sectione, sed pasti iterum, & crudâ bubulâ probè saturati canis, non solum deprehendi, Lacteas propatulo inprimis situ super vulgares Meseraicas incedere, nec adeò tortuosum habere exitum, quàm rubra vasa, verùm etiam, aperto primùm Jejuno, dein Duodeno intestino, quoties à me comprimerentur, toties chyli humorem, candidissimo lacti simillimum, in cavitatem, magis magisque laxatis osculis, tanquam ex spongiâ posse exprimi. Quâ demonstratione simul tollitur dubium quod curiosiss. *Warthonus Adenogr. cap. 8. & 12.* movit, Lacteas non subire Pancreata aut Duodenum, sed, à *Ventriculi fundo ortas, in omento secundùm ejus longitudinem decurrentes*, præterlabi. Nam eadem ratione ex hoc, quâ ex aliis Intestinis, Lacteas procedere, nec Cæcum quidem iis carere, sedulo attendebam, Sanguinis verò ante abrasam interiorem tunicam, quæ & eâ vice ut antea variegata erat, exhibat nihil. Quumque eadem operâ *Cl. D. Pauli Barbette* experimentum tentare vellem, intrusâ in aliquam ex Meseraicis venam fistulâ, adverti inflatum spiritum, sub Intestinis, quorum tunicas penetrare nequaquam poterat, secundùm longitudinem dissipari, inquam gyrum mirificè volvi, ut & aliorsum, unde digressus reverteretur. Cognovi quod res erat: nimirum, rubras istas venas, in ambitu, ubi Intestinis subtenduntur, multos *arcuatos ductus*, à Jejuni principio ad Rectum usque efformare, qui sparsâ de se plurimâ sobole, & rursus inter se quasi peristyliorum compagibus juncti, minimè divaricatis, semperque versus centrum Mesenterii ampliores evadentibus ramis, sub glanduloso corpore in unum sanguinis rivum sive truncum colligebantur. Supra hos arcus autem observavi ad Intestina emissos surculos, vel si quis malit, ex intestinis prodeuntes scaturigines, præterquam quod

densâ pinguedine, quo in loco dictis arcubus inferebantur, infarctæ & absconditæ essent, Lacteis multò minores existere, & longè profundiora habere diverticula. Quæ ut magis clara forent, in gratiam illorum, qui cum *Galeno lib. 1. de Sem. cap. 2. pag. 1256. nulli fidunt Anatomico, priusquam etiam ipsi sunt experti ea, quæ saltem possibile erat in experientiam venire*, curavi singula quomodo apparuerunt sequenti Figurâ delineari, in qua Venæ Meseraicæ vulgares, & Lactææ, cum intestino vivente Subjecto discisso, proponuntur. Arteriæ verò, quæ ubique comitantur & ambiunt venas, ne nimis frequens variorum ductuum multitudo, Sculptori etiam ad exprimendum difficilis, vel falleret vel turbaret spectatorem, hîc studiò sunt omissæ.

Quamquam ergo *Nob. D N. Bilso* lubens concedo, & *avtoritas* monstrat, Lactearum tubulos in progressu, quando Mesenterium attigerunt, angustiores esse ceteris, nunquam tamen planum faciet, orificia illarum, quàm parva etiam sint, æquè coarctari, quum intestinorum capacitatem directâ viâ egressæ, perque exteriorem tunicam expansæ, manifestò dignoscantur ab aliis, Meseraicæ contra, duas inter tunicas, transversis semitis, & capillarium formâ altius insinuatæ, vix conspici possint, quàm paulò ante, ubi cum arcuatis istis ductibus committuntur. Quibus ductibus ego sciens volensque proprium usum non affingo, incertus adhuc, & destitutus, ob angustiam temporis Subjectorumque humanorum defectum, inquirendi occasione, an in Hominis fabricâ, eâdem serie, numero, & formâ reperiantur. Nusquam antea descriptos legi, nisi quod *Dominicus de Marchettis in Anat. cap. 4.* simile quid de Arteriis Mesenterii testetur, *eas in varios ramos diffusas, factâ veluti coronâ, per membranas intestinorum terminari: & in Syntagma Anatomico Joh. Veslingii, edit. Patav. A. 1647. Tab. II. cap. VIII. Figura prima pag. 103. inserta, quàm proximè huic nostræ accedat. Quasi per transfennam illos vidisset Cl. Glissonius Anat. Hepat. cap. 25. pag. 240. ubi de venæ Portæ distributione agit, hæc affert, quæ ad institutum nostrum faciunt. Plures vena capillares ab intestinis profectæ, simulque unite, surculorum unum constituunt. Numerantur autem vulgò hujusmodi vena quatuordecim; licet numerus haut perpetuò certus sit, sed in diversis corporibus variet. Hæ omnes vena tandem concurrentes, ramum mesentericum efficiunt. Haecenus ille. Si quisquam alius, præter ceteros certè Asellius potuisset hos ductus in Iconibus suis adumbrare, quandoquidem, ut Vesalins lib. 5. cap. 6. pag. 617. innuit, in Canibus vasorum per Mesenterium incessum adinvenire promptum est, quod illis macilentius quàm Homini obtigerit Mesenterium. At eosdem in omnibus brutis exstare, quamdiu plura experimenta non conspirant, haut temerè affirmavero: contentus exposuisse, Meseraicas rubras circa Intestina capacitatem suâ Lactæas minimè superare, & in mortuis illarum irradiationem frustra quæri. Hæc tamen, insertionis dicam? an originis vasorum Mesenterii, & colorum in peristromate differentia, tantum apud me valuit, ut mihi prorsus persuaferim, Lactæas extra intestina, seu in ipsis ramulis primùm suas accipere valvulas. Aut enim hâc in parte sibi non constat sæpe laudatus Asellius, aut ita erunt explicanda quæ de valvulis cap. 19. affert, aut quod idem cap. 28. §. 11. statuit de crusta, in quam finiunt, omnino corruet. Ac tum*

Archangelus Piccolhominus, ab illo & Exc. *Rolfinckio lib. 5. Dissert. Anat. cap. 16. pag. 884.* injustè esset oppugnatus. Neque fuit ulla necessitas, ut Lactæ intus in cavitate intestinorum valvulis insignirentur, dummodò Chylus non debeat hîc intercludi, sed jugi transitu quasi per infundibulum egredi, cujus refluxum rugosa illa tunica per se prohibet, qui nec alicujus momenti foret, quum statim extra intestinorum crassitiem plures ordine succedentes valvulæ obsistant. Has autem in evanidis Lactearum vasculis mortuo cadavere, ne ipse Argus, qui ut *Plantus* habet in *Anl. a. III. f. 6. v. 19.*

— oculus totus fuit,


visu assequi poterit, multò minus alius quispiam, qui non tam cernit acutum, demonstrare. Si quid tamen *Bilsius* exhibet, id esse Meseraicar. rubrarum ramulos, ex intestinis prodeuntes, inde conjicio, quod, quæ ostendit vasa, referente *Cl. Bartholino de Hep. def. ad celeb. A. Densingham pag. 32.* exterius ab intestinis resecta sint & detruncata.



EXPLICATIO

Literarum in Figura Vasorum Meseraicorum.

A.	Ventriculus cum venis coronariis.	M.	Corpus Glandulosum Asellii, in centro Mesenterii.
B.	Orificium ejus inferius.	n.	Truncus vena Porta.
C. C.	Intestinum Duodenum apertum.	o. o. o. o.	Rami Meseraicarum vulgariarum in trunculo concurrentes.
D.	Fundus Duodeni, Chylum & Lacteis expressum, quo imbutus est, exhibens.	P. P. P.	Mesenterium expansum.
e. e. e. c.	Æsopæ spongiosum, carneo & albedo colore variegatum.	q. q. & c.	Arcuati ductus sub Intestinis, pinguedine circumfusi.
f.	Foraminula, abrasâ interiori Tunicâ in vivo subiecto conspicua, & sanguine ex Meseraicis rubris seaturientia.	r. r. & c.	Syruculi horum ductuum Intestina perreptantes.
G. G.	Pancreas, insigni in Canibus magnitudine.	f. f. f.	Vena rubra Duodenalis.
H.	Particula Jejunii dissecta.	T.	Vena & Arteria prope Intestinum cœcum.
I. I. & c.	Intestina reliqua Mesenterio connexa.	u. u. & c.	Vena Lactea ex Intestinis passim erumpentes, & ad Glandulas in medio Mesenterii positas abeuntes.
K.	Intestinum Cecum.		
L.	Intestinum Rectum.		



P A R S II.

De Vasis Lacteis.

Ex Casp. Asellii Dissertat. de Lactibus.

CAPUT ASELLII VIII.

Dicendorum propositio, & ordo. Antecepta rei informatio, quæ Ciceroni?

PRæter tria illa vasorum genera Mesenterium peragantium, quæ ad recensum jam duximus, excussimusque, reliquum aliud est genus, quartum, novum, ac ignotum hæctenus, & à me primò, (quod relegatâ omni ambitione dixerim) abhinc fere triennium, hoc est anno adeò 1622. casu magis (ut verum fatear) quàm consilio, aut data in id peculiari opera, observatum. De hoc, pro eo, ac ab initio constituimus, agendum nobis in præsens est. Agetur autem quam fieri potest accuratè, & diligenter, quod & inventi novitas postulat, & vi cogit, quæ novis comitari semper amat, rei ipsius difficultas. Quæ tota, ut simul fiat quam planissima, simul viâ, ac ordine procedat, quem ego rerum tractandarum animam usurpare, atque appellare soleo, præmittam primum tanquam omnium, quæ disputabuntur deinceps sedem, seminarium, ac fundamentum, inventionis illorum historiam, tùm modicè ea attingam, quæ ad absolutam eorundem perceptionem, explicatamque scientiam, & ut Stoicorum verbo utar, comprehensionem oportet habere præcognita, & veluti præscita, quod genus *πρόγνωσις* Aristoteles 1. post. text. 1. & 2. aut *πρόληψις* dicere consuevit, Cicero 1. de Nat. Deor. & alibi. anteceptam, sive anticipatam animo rei informationem reddidit. Demum ad illa veniam, quæ Anatomicæ contemplationis, considerationisque suæ, ac propria, rem totam continent, definiunt, & ad scientiam, cognitionemque adducunt.

HISTORIA VASORUM CHYLI.

CAPUT IX.

Historia primæ vasorum istorum inventionis cum fide narrata. Obiter multa notata ad illa rectè sectione perquirendum.

QUOD igitur ad historiam attinet, res hunc in modum acta est. Canem ad diem Julii 23. ejusdem anni, bene habitum, beneque pastum incidendum vivum sumpteram, amicorum quorundam rogatu, quibus recurrentes nervos videre fortè placuerat. Ea nervorum demonstratione perfunctus cum essem, visum est eodem in cane, eadem operâ diaphragmatis quoque motum observare. Hoc dum conor, & eam in rem abdomen aperio, intestinaque cum ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repentè, eosque, tenuissimos, candi-

candidissimosque, ceu funiculos, per omne mesenterium, & per intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu nervos esse ratus, non magnopere moratus sum. Sed mox falsum me cognovi, dum nervos, qui ad intestina pertinent, distinctos à funiculis illis, & longè diversos esse, ac seorsim præterea ferri, animadverti. Quare rei novitate percussus, hæsi aliquandiu tacitus, cum menti varie occurrerent, quæ inter anatomicos versantur, de venis mesaraicis, & eorum officio plenæ, non litium minùs, quàm verborum, controversiæ. Et fortè fortunâ congruerat, ut paucis ante diebus, quendam de hoc argumento propriè scriptum, à Joanne Costæo libellum evolverem. Ut me collegi experiundi causa, adacto acutissimo scalpello, unum ex illis, & majorem funiculum pertundo. Vix benè ferieram, & confestim liquorem album lactis, aut cremoris instar profilire video. Quo viso, cùm tenere lætitiā non possem, conversus ad eos, qui aderant, ad ALEXANDRUM TADINUM, & SENATOREM SEPTALIUM inprimis, utrumque de amplissimo Medicorum Ordinis Collegio, & cum hæc scriberem tuendæ publicæ sanitati Præfectum, *ὀφθαλμία*, inquam cum Archimede, & simul ad rei tam insolitæ tam jucundum spectaculum invito, ejus novitate ipsos quoque commotos. Verùm eo diu frui non licuit. Expiravit mox inter hæc canis, & unā (dictu mirum) omnis illa tot vasorum series, congeriesque defecta candore suo, defecta succo, inter manus ipsas nostras, ac penè inter oculos ita evanuit, vix ut vestigia sui relinqueret. Eā re permotus, rem iterata sectione experiri statui. Conquisitus ergo canis alius in diem posterum, & nulla interpositā morā die eodem apertus. Porro minimè, ut spes, ita successus fuit. Nullum prorsus, vel minimum album vasculum, quantācunque etiam diligentia perquirenti, in conspectum fese dabat. Et jam abjici animo ceperam, ac cogitare apud me, ne, quæ in cane illo primo se obtulissent mihi, ex illis essent, quæ rarò spectari in Anatome solebat Galen. noster dicere. Verùm in memoriam revocans, siccum, & impastum fuisse canem, quem secandum arripueram, suspicatusque, quod res erat, ne intestinorum inanitas causa fuisset vasorum obliterationis, etiam tertio rem periclitari volui, alio rursus in id comparato cane. Is sectus est ad diem 26. horā circiter sexta postquam cibus illi ad habitus affatim fuerat, & dum ultrò satietas caperet. Nihil fefellit expectatio. Omnia quæ primus luculenter, & ad amussim exhibuit, nisi quod citius etiam, quàm in illo, ac vivo dum, & candor vasorum obsolevit, & ipsa obscurata sunt. Confirmatus gemino hoc experimento, & nihil amplius de re ipsa ambigens, totum me dedi ad perquirendam eam, percipiendamque accuratius. In quā curam ita incubui, nulla ut temere hebdomada, certè nullus mensis abierit, sine viva una, aut altera sectione. Nec verò in canibus tantum, in brutis plurimis aliis factum periculum, in felibus, in agnis, quā lactentibus adhuc, quā herbam jam pascentibus. In vaccis præterea, & porcis, aliisque veritas exquisita. Quin equus etiam huic uni rei emptus, & vivus exenteratus. Hominem vivum, quod tamen Erasistratus olim, & Herophilus non timuere, non incidi (fateor) nec incidam, qui nefas, & piandum mortem cum *Celfo in Proœmio Artis Med.* existimo, præfidem salutis humanæ artem, pestem.

pestem alicui; eamque atrocissimam inferre. Ita nihilominus, idque pro certo statuo, quæ in tot brutis visa mihi sunt, iis fieri nullo modo posse, unus & solus homo, ut deficiatur. Quis enim unquam credat in re tam necessaria plus de bestiis, quàm hominibus naturam, communem omnium parentem, laborasse, & illis matrem, nobis novercam fuisse? In iis, quæ incidere licuit, nunquam spes mihi imposuit. In cunctis rectè antea pastis, & convenienti à pastu horâ apertis, perpetuò vasa ista inveni, si non in mesenterio, aut intestinis, at in pancreate saltem, & quâ venæ portæ illa sociantur. *In quibus brutis maxime perspicuum hoc vasorum genus.* Clarissimè autem semper in iis mesenterii conspexi, quæ adeps nullus obfercit, qualia canum sunt, & felium, & agnorum, atque equorum etiam. Nam in cæteris, quæ adipe circumfluunt, sæpiùs illo, ut sub quo fere delitescunt, divulso tantisper, distractoque, dum compareant, opus est. Tam in his verò, quàm in reliquis, quæ præterea digna memoriâ alia, ut fit, ex aliis usu ac tractatione observata mihi sunt, ea suis in locis posterius reddentur. Hic enim brevem solummodo inventionis istorum vasorum historiam dare libuit, quam verissimam esse, eam in rem testes dare locupletissimos possum, & verò do, quotquot secanti adfuere. Adfuere autem plures semper, ac sæpiùs viri graves cum primis, & cùm cæteræ omnis eruditionis commendatione, ac gloria, tum Medicinæ laude præstantes. Inter eos, quod gloriari liceat, cujus solum, nudumque nomen, ut ad veram omnem laudem, ita ad fidem omnem abunde esse potest, LUDOVICUS SEPTALIUS, Medicorum ævi nostri absque controversia Princeps: & quem libenter ei jungo, ANDREAS TREVISIUS, Serenissimæ Infantis Archiater, nominis fama, & doctrinæ abundantia nulli clarissimorum Medicorum secundus. Nunquam autem non adfuit, quem paulò ante nominavi, & nunc, honoris causâ, iterum nomino, SENATOR SEPTALIUS, non paternis magis, quàm suis artibus clarior. Cui accessit postea in pari assiduitate, ac animadversione QUIRINUS CNOGLERUS AUSTRIUS, domesticus meus, multis mihi nominibus carissimus, & nulli per Italiam celebriorum in literis, & omni scientiarum genere virorum, ignotus.

PRÆNOSCENDA DE HIS VASIS.

CAPUT X.

Prænoscenda ad absolutam horum vasorum perceptionem. Ea duo esse in re presenti, non plura. Notionem nominis, & eorum ὑπαρξιν. ἀεργώσεως ad rerum scientiam necessitas. πᾶσι non est vox Epicuro propria. τὸ ὅν potestate est tota scientia.

PLurimum passim Aristoteles τῇ ἀεργώσῃ sive τῇ ἀεργίᾳ (nec enim ut Cicero I. de Nat. Deor. putat, primo Epicuro hoc nominis debemus) idque merito suo tribuit. Etsi enim nullam scientiæ partem per se illa facit, nec in ejus nomen venit, tantam vim tamen habet, & tanti momenti est, ut cùm omnis ab illa, ceu à fonte scientia manet, tùm sine illa nulla, ne inchoata quidem, & rudis possit existere. πᾶσα διδασκαλία ἢ πᾶσα μάθησις ἀνοήτως ἐν ἀεὶ παρούσῃ γίνεται γνώσεως, ait Aristoteles I. Poster. t. I. Quin Cicero I. de Nat. Deor. longius etiam provectus. Sine

Sine ea, (περὶ αὐτῆς) inquit, nec intelligi quicquam, nec quæri, nec disputari potest. Hæc vero tanta cum sit ejus necessitas, tanta vis, ac potestas, ne nobis quidem, in re ista novorum vasorum, quæ veluti materia ad cognoscendum nobis proponuntur, insuper habenda est.

Verfabitur hæc in duobus tota, in explicanda, evolvendaque nominis ipsorum notione, tum monstranda, testificandaque τῇ ὑπαρξί, quàm existentiam melioris nos vocis inopia cogit appellare. Et si enim præter rem, & materiam scientiæ subjectam 1. *Post. t. 57. & 76.* (τὸ ὑποκείμενον γένεσθαι) ea quoque quæ illi attribuantur (τὸ πᾶν) & principia præterea, quorum vi, & efficientiâ hæc de illo concluduntur (τὸ ἀξιωματικόν) prænosse necesse est, tamen posteriora duo, quòd nihil habent in re præsentī nostra vel præcipuum, vel indigens propriæ animadversionis, ea malumus περιεῖν cum Aristotele, & cogitatione, ac animo fumere, quàm verbo, & voce ponere, hoc est, frustra in nobis notis, & pervulgatis tempus conterere.

Duo autem solum de primo prænosenda proponimus, quod præter summam, quam habent necessitatem, & præcipuam, quam adferunt utilitatem, omnis de re quacunque scientiæ subjecta prænotio, duobus illis absolvitur, & continetur. Ita *Aristoteles 1. Post. tex. 2. & 76.* In omni re, quæ ad cognoscendum subjicitur, & quod sit (ὅτι ἐστίν, seu ut alibi εἰ ἐστίν) & quid significet, τί σημαίνει seu τί ἐστὶ λεγόμενον, præcipere animo, & anticipare oportet, quorum illud ad τὸν ὕποκειντον, hoc ad nominis notionem refertur. Jam *Plato in Cratylō.* verba de re nova, & sensibus antehac incomperta facturum, ne ferendum quidem censuit, nisi prius & esse eam doceret, & suo, ac certo nomine appellaret. Nec *Galen.* noster dissentit, furere eos dicere 6. m. 6. solitus, qui aut nominis omīssa notatione, aut non firmiter præcepto τῷ ὅτι ἐστίν ad reliquum cognitionis ordinem aggredi auderent. Nec injuria id. Nam & à nominis notione *Arist. 1. Sophist. 1.* non parùm sæpè in rei ipsius notitiam provehimur: & τὸ ὅτι omnis cognitionis primum, ac principium *Arist. 1. Eth. 1. & 7.* est; hoc est, ut placet principibus Philosophorum, totum ipsum *Plato apud Gal. 9. de placit. 1.* potestate, vel dimidium saltem totius, aut etiam plus *Arist. 1. Eth. 7.* dimidio. Sed rem ipsam videamus, ab informatione, seu appellatione nominis exoriri.

CAPUT XI.

Data his vasis sua nomina. Eadem explicata, & stabilita consensu, quâ veterum quâ recentiorum. Novis rebus nova nomina quot modis poni possint. Vena albæ Celsi. Vena lactea Arabum. Rhasis rejectus. Vena verbum bonis, & antiquis auctoribus, latissime patet. Ejus etymon. LACTES vox in rebus diversissimis usurpata, ævo, quâ prisco, quâ nostro. In eam rem compluscula adnotata. Plinii vulgata lectio defensa contra Dalechampium. Persio, & Horatio lux. Luporum lactes apud Lampri-dium. Ex Hippocrate Probi locus declaratus. Lactium Etymon non unum. Cicero obiter correctus. Scaliger laudatus. Gaza præter morem suum à Plinio dissidet.

NOVIS rebus nova ponere nomina, & licuit semper, & verò planè necessarium est. Id verò cū fieri posset modis in primis tribus, *Cic. in orat. per.*

in defn. & in Acade. passim. Quint. inst. 8. ut aut ipsi nova, inauditaque condamus, aut ea ex jam conditis, quæ nativa *Cicero in Par.* vocat, transferamus, reperiamusve derivatu, fluxu, adjunctione, aut denique à re simili mutuemur. Postremus modus quòd nobis ponere aliqua, ut cum *Quintiliano ubi sup.* loquar, quod prisca illi, ac rudes homines fecerunt, non perinde fas est, absque omni controversia, cùm melior est cæteris, tùm securior. Hunc igitur sequutus ego vasa hæc aut lacteas, sive albas, venas, aut lactes etiam appellare soleo, nihil impediturus interim, si quis commodius nomen invenerit.

Appello venas albas, & lacteas. Si enim *Celfo lib. 4. cap. 1.* Ureteres, hoc est, urinæ vasa, sive quòd non ruberent, nigricarentve, ut venæ cæteræ, sive quod succum albo proximum veherent venas albas appellare licuit, si *V. Laur. Anat. cap. 4. & quest. 5. Carpum com. 11. fol. 146. Zerb. f. 26.* Arabibus, si auctori *Spur. f. 51. ubi de hepate.* de Anatom. vivorum, venam, quam vulgo ad portam dicunt, in qua ne vestigium quidem ullius alboris unquam cernitur, lacteam venam vocare concessum fuit, eo solum, quod sibi persuaderent, lacteum succum è ventriculo allicere; non video, cur nostris his, quæ & verissimè albent, sive candent potius, & succum continent per omnia lacti simillimum, impertire hoc nomen nequeamus? Nequaquam enim *Rhafi 1. ad Alman. for. cap. de ven. & cap. de hepat.* assentior, qui à venarum genere, ac appellatione omnes rejicit, ac excludit, quæ aut sanguine non circumfluunt, aut de Jecoris gibbo originem non capiunt. A substantiâ, structura, compositione, non ab eo quod continet, cujusque partis ratio petenda est. At hæc in nostris his venis omnia, cum venis cæteris, ita similia sunt, ut eadem possis dicere, si per seipsas spectes, sine succo, quem gerunt inclusum. Ut taceam interim, quòd non secus ac illæ, motu, quo attollunt se subinde, & submittunt arteriæ, sunt destitutæ. Non ea religio veteres in usu hujus nominis habuit, *Hippocratem lib. de car. & 2. Ep. Platonem V. Gal. 6. de pla. 9. de cau. mor. 3. quod an. mores 8. Aristotel. 1. hist. 16. & 17. hist. 3. 3. de par. 5.* qui venarum vocabulo arterias etiam ipsas complecti sunt ausi: non item alios notæ optimæ auctores, qui & venam genitalem *Cels. lib. 3. cap. 4. & lib. 2. cap. 6.* dixere, & venas *Plin. 16. cap. 38.* arborum, venas aquæ, auri, *Cicer. 2. de Nat. Deor. argenti,* venas denique ingenii *Juv. sat. 1.* venas cujusque generis hominum, ætatis, ordinis, & quas non? Adde quod nec *ἰτρικον* huic significationi repugnat. Ex eo quippe dictam venam Grammatici volunt, quòd quippiam per eam veniat, sive quod via *Isid. lib. 11. cap. 1.* quædam sit, per quam aliquid comseat. Græci *φλέβα* vocant *ἀπὸ τῆς φλεβῆν Suid. Pol.* quod est redundare re aliqua, seu plenum esse. Nec enim quicquam horum est, quod non in nostras quoque aptè cadat, & conveniat.

Lactium non idem est apud veteres, & recentiores significatum. Veteres dupliciter ferè usurpant. Plerique, & majoris nominis auctores, pro intestinis gracilibus capiunt. Sic *Plinius lib. 11. cap. 37.* *A ventriculo lactes in homine, & ove, per quas labitur chylus, in cæteris ile.* Quo loco, ut obiter id notem, dupliciter errat *Dalechampius in not. ibid.* & quod idem esse lactes, ac pantices contendit (qua in re panticum, etsi diverso à *Dalechampsio* modo, *Scaliger* quoque ipse falsus est, vix aliàs,

aliàs, aut falli solitus, aut fallere) & quòd è textu *Pliniano* expungit tanquam glossèma, verba illa *in homine, & ove*. Sic *Plautus Pseud. act. 1. sc. 3.* sic *Tutinius apud Non. verb. Lact.* *Plauto* antiquior agninas lactes dixere: & de homine idem *Plautus Curcul. act. 2. sc. 6.* *Venio laxis lactibus*, ac *Pomponius apud Priscian. lib. 6.* *Oro te Basse per lactes tuas*. Glossæ veteres, *Lactes* *λατὰ ἐντερεῖ ἢ ἐρίφων*, id est, *rennia intestina hædorum*. Neque aliud *Persius Satyra 2.* voluit cum *lactes unctas*, id est, *pingues* dixit. Quo respexerit & *Horatius fortassis lib. 1. Sat. 4.* illo versu:

„*Ut canis à corio nunquam absterrebitur uncto.*

Nam corium, *δέρμα* Græcè, capi pro omni corpore membraneo, fatis ex *Aristotele 3. Hist. cap. 3.* mihi acceptum est, qui venarum tunicam hac ipsâ causâ, coreaceam appellavit.

Sunt alii veterum, qui audaciore significato, sed tamen nostris quoque temporibus plerisque linguis familiari, pro eo succo accipiunt, quem persimilem lacti in piscium marium ventriculis cernimus, quemque genitalem succum, seu rorem appellare possumus, imò debemus. In hunc sensum apud *Lampridium in Heliogabalo*. *Luporum* (ineptiunt hîc, qui *Lupos* quadrupedes somniant, *λαῖβερας* intelligit, quos nos *Varolos* dicimus) & apud eundem, *ibid.* ac præterea apud *Suetonium in vita Vitellii*. *Muranarum lactes* legimus, quo loci sermo illi est, de *Vitelli patina*, patinarum maxima omnium, quot fuerunt unquam, sunt, aut erunt, ut ille ait. Addit his duobus significatis *notis ad Plin. 11. cap. 37. Hermolaus*, usurpari interdum eisdem veteribus pro locis, *quæ sub umbilico in lateribus, pubetenus*, *delicata* adèò, *ut ferre plagam nequeant*. Atque hujus rei *Probum* laudat auctorem. Sed ego apud *Probum* locum istum adhuc quæro. Quod si est etiam, nihil tamen me movet, qui jam olim ex *Hipp. 6. aph. 18.* didici, eam esse gracilium intestinorum conditionem, ut omnis in illis *ἀλγιστὴ* sit *θανατῶδης*, id est, *lethalis*. Hæc igitur *Probus* intellexerit, pro ipso loco, quo jacent, per *Metonymiam*, descripto.

Jam recentiores multò etiam magis sunt in re hac *Lactium* quam veteres varii. Alii *Mesenterium* esse *Lactes* volunt, quorum princeps *Gaza* est, qui ubicunque apud *Aristot. 1. Hist. 16. 3. Hist. 4. 4. de part. 4.* *Mesenterium* legitur, *Lactes* interpretatur. *Columbus* sic *lib. 11. Anat. cap. 6.* appellat, quod Græcis, *πάρυρεας* est, sive *πρόδωρεας*. *Carolus Stephanus lib. 1. Anat. 85.* glandulas, quæ passim *Mesenterium* interstinguunt, hoc nomine afficit. Qui *lib. 2. cap. 7.* idem tamen, & cum eo *Com. 8. in Mundin.* *Carpus*, vulgares *Mesaraicas* ita nominari volunt, & sunt fortassis, qui alia quoque omnia sentiant.

Nos, in ista tot significationum varietate ita censemus, inter cætera, ad nullam rem aptius nomen hoc, quam ad venas nostras accommodari. Quid mirum autem, cum infinitæ sint res, ut ait *Aristoteles 1. Sophist. cap. 1.* finita vero nomina, si unum nomen ad plura significanda transferatur? Cur verò ita sentiam, duo inprimis faciunt, *Etymon*, id est, notatio hujus nominis, quam *Etymologiam* quoque, & interpretationem usurpamus; *Cicero* verbiloquium vocat (quod malè vulgò veriloquium legunt.) Deinde veterum in appellandis hoc verbo *intestinis gracilibus* institutum, consilium atque ratio. De *Etymo*. Volunt alii à

labendo sic dictas, quod per eas chylus labatur, quæ notio vocis *Plinio II. Nat. hist. cap. 37. lactes per quas labitur cibus*. videtur placuisse. Alii à lacte deducunt, cujus similitudinem gerant in candore, mollitie, & pinguitudine. Quidam, & meo sensu rectissimè, ab exoleto verbo lacio, quod idem est, ac allicio, derivant. Nulla harum est interpretationum, quæ in nostras istas venas non ad amussim quadret, ac expetat. Nam verissimè, ut suo loco constabit, chylus per eas labitur: verissimè idem ex intestinis ab iis lacitur, hoc est, sorbetur, exhaustiturque; denique non lac ipsum magis simile lacti est, quàm liquor, qui in illis cernitur. Jam veteres quis non facile existimet notissimo loquendi modo usos, quo, quod continet, pro eo, quod continetur, vulgo usurpamus, non aliâ causâ magis donasse hoc nomine intestina gracilia, quàm quòd conferta illa lactescentibus istis venis, ignotis sibi viderent, in agnis præsertim, & hædis, per quorum intestina ea copia ac ubertate videntur fusæ, ac propagatæ, ut tota non nisi ex lactei cujusdam roris velut aspergine consistere videantur. Unde non leviter, meo quidem animo, etsi alio, quàm nos, sensu, maximus, & admirabilissimus *Scaliger apud Aristot. in 1. hist. 16.* primum in agnitis positum hoc nomen suspicatur, & inde ad hominem opinione quadam similitudinis, ut solet, traductum. De recentioribus non est quod multum laboremus. Nihil nostræ sententiæ officiunt, & facile adigi ad concordiam possunt. Qui enim vulgares Mesaraicas Lactes appellant, etsi non ferendum errant errorem, ut dicetur suo & proprio loco, ac tempore, hoc ipso tamen pro nobis sunt. Nimirum enim ideò sic vocandas putant, quod allicere in sese ab intestinis chylum sibi persuadent. At qui eo ipso ostendunt, in nostras venas, quæ verè id muneris obeunt, & non in alias hoc nomen, quàm aptè cadat, & conveniat. Columbo verò, ac Stephano facilè largiemur, dici Lactes posse, quæ illi volunt, hæctenus, si, quà usos veteres diximus, eadem dicendi figurâ, ipsi quoque uti fateantur. Nam & glandulæ Mesenterii, & inprimis Pancreas, adeo Lactibus nostris scatent, ut vel levissimo tractatu, compressuque digitorum, magnam in vivis animalibus, lactei liquoris copiam, velut imbrem profundant. Atque eadem interpretationis benignitate Gaza quoque attolli potest: cum lactibus nostris Mesenterium, nihilo quàm Pancreas minùs, fors magis etiam abundet. Quanquam ille fortassis non debuit à Plinio suo hîc discedere, quem sibi in aliis veluti Cynosuram, quam sequeretur, constituerat. Nam quod Hermolaus in ejus excusationem adfert, Metonymia abusum continentis pro eo, quod continetur, nihil est. Nec enim in Mesenterio, sed à Mesenterio intestina continentur. Sed de nomine tantum est.

CAPUT XII.

Quæsitum de vasorum nostrorum existentia. Primum verò sint nec ne? Esse, monstratum fide sensus, & conclusum ratione. Sensuum veritas, & evidentia præ omni ratione est. In eam rem Aristotelis, & Galeni testimonia. Anatomicus non nisi oculis suis credere debet.

Post explanatam, enodatamque rationem nominis, restat ea videamus, quæ ad τὸ ὄν sive ad τὴν ὕπαρξιν, id est, existentiam attinent. De eâ perquirenda nobis

nobis duo sunt. Primum, *Verè ne detur, & constet in re quantum hoc vasorum genus?* Alterum, *Si detur, vetus inventum sit, an novum?* Diverſa hæc sunt, & genere à se diſjuncta. Nec enim aut ex illo hoc efficitur, ut ſcilicet, ſi ſint, etiam nota antiquioribus Medicis fuerint: aut viciffim ex hoc illud concluditur, ut non ſint, ſi fuerint ignota.

Primum horum minime difficilem habet explicatum, & abunde jam Hiſtoriæ fide probatum *ſup. c. 9.* eſt. Senſu enim eget, ut *Ariſtot. 1. Top. 9.* loquitur, qui id negat, & haud ſcio an pœnâ etiam. Docet oculorum fides, atque conſuetudo plurimas (V. fig. 1. 2. 3. B.) per omnem Meſenterii, abuſque centro ejus, regionem, diſpergi ramulos candentium vaſorum, inde in inteſtina deferri, ad ipſa ſcindi in propagines penè infinitas, his propaginibus undique inteſtina ambiri, ac comprehendì. Docet eadem manifeſtè diſtingui, diſpararique à vaſorum reliquorum ſingulis, cavitatē à nervis, tenuitate tunicarum ab arteriis, à venis candore; ab omnibus ſimul, tum ſucco, quem includunt, qui in nervis nullus, in venis, & arteriis, tota ſubſtantia, & colore diſpar eſt, tum locis per quæ feruntur. Ut enim sæpè tria illa comitantur, attigua iis, aut contigua, ita non rarò ab iis incedunt ſeorſim, & ſola. (fig. 1. 2. 3. litera B.) Denique unum argumentum rem omnem conficit: V E N I, V I D E, quæ duo in ſimili re, hoc eſt, novo invento, ſic olim *Galenus 2. uſ. part. 3. in fine.* juſſit. *Quicumque vult operum naturæ eſſe contemplator, eum propriis oculis credere oportet, & aut ad nos accedere, aut cum aliquo eorum, qui nobiſcum verſati ſunt, verſari, aut ipſum per ſe diligenter exercitari anatomis manu obeundis.*

„ *Quid referemus Lucr. in 4. enim, quod nobis ſenſibus ipſis*

Certiùs eſſe queat, quæis vera, & falſa notamus,

Qui niſi ſint veri, ratio quoque claudicet omnis.

*Invaletudo quadam mentis eſt, inquit Ariſtoteles 8. Phyſic. t. 22. repudiata ſenſuum auctoritate, ac conſtantia, rationem requirere. Et alibi. 3. de gener. an. 10. Senſui magis, quam rationi ſtandum eſt, rationi hætenus fidendum, ſi quæ demonſtrantur, cum iis conſentiant, quæ nobis ſunt à ſenſu indita, & impreſſa. Atque hæc Ariſtoteles. Quid Galenus noſter? Ille verò multò etiam luculentius. Nec enim id ſolùm, quod Ariſtoteles dicit, quàm longiſſimè prævertere 4. Simp. 18. initio. rationis fidei, ſenſuum evidentiam: ſed illa præterea planè inſignia, *Qui ſenſibus anteferunt rationem 2. Simp. 1. eos omni ad demonſtrandum principio deſici. nullam habere poſſe ullius 9. de pl. 1. E. magnarum artium ſcientiam, riſum, ac ludibrium de opt. ſect. cap. 4. omnibus debere. quid multa? ſtupidos eſſe, 2. de motu muſc. 5. ἀναισθητός, Sophiſtas 4. Simp. 8. eſſe, hoc eſt, homines ex fraudibus, & fallaciis compoſitos. Et eſt ne aliquid his amplius? Eſt verò. Plus quàm extremè inſanire, 2. Simp. 6. atque vaticinari. Quin in reiſpâ noſtra, Judicium 2. nat. hum. inquit, circa venarum ſectionem non eget demonſtrationis, ſed ſenſus.**

Quòd ſi omninò ratione tamen agendum ſit, hæc unica inſtar omnium fuerit. Neceſſarium eſt hoc vaſorum genus præter reliqua. Eſt igitur. Conſecutio clara, & notiſſima. Nec enim in neceſſariis deficere natura poteſt, quæ utilitatum omnium, opportunitatumq; provida, affatim, etiam in minùs neceſſariis, ſuppeditat.

tat. Quod præsumitur, id verò vincet consequens omnis disputatio. Ita facilè, & brevi de primo confecta res est.

C A P U T XIII.

Quæsitum alterum, Novum inventum sint necne? Recte vidisse veteres alia chylo, alia sanguini deberi vasa, illa tamen ignorasse. Erasistratum novisse, nec agnovisse. Hippocrates, Plato, Aristoteles, Stoici, Herophilus, ipse Galenus, varieg illustrati, & explicati. Item Pollux, Rhafis, quidam recentiores.

MAjoris operæ, & negotii videri potest, de quo secundo loco quæsitum est. Quis enim facile credat tam expositam sensui rem, tam obviam, ita omnibus ante hunc diem, tamquam sepulta in tenebris esset, latuisse? Accedit, quod in hoc genere, & in hoc negotio, ac pulvere nostro, nihil frequentius, quàm pessimo more, & exemplo novare de veteribus. Quod utinam paucioribus, quam expedit, exemplis testatum posset fieri. Hæc tamen nihil moratus, ita breviter de re hac tota censeo. Non fugisse quidem veteres, vasa alia chylo, alia & diversa sanguini continendo, deferendoque deberi: Ceterum, vera ipsa chyli vasa, hoc est, nostras venas, etsi visas quibusdam eorum, neminem tamen unquam agnovisse. Quæ à me una comprehensione, semel & generatim dicta, sigillatim, & per partes plana sic facio.

Quòd sua quædam & propria chylo vasa tribuerint veteres, docet primum omnium Hippocrates, five quisquis est auctor lib. de Humana natura. sect. 2. ejus. lib. text. 6. Is enim postquam venas omnes, quas crassas appellat, in quatuor diduxisset paria, earum denique omnium divisionem, distributionemque per corpus absolvisset, disertè, quod ipse quoque Galenus in comm. animadvertit, præter eas, alias reperiri dicit, ad deferendum è ventriculo alimentum comparatas. Et eadem habentur lib. de ossium natura, quem Hippocrati omnes attribuunt tanquam genuinum. Et possunt non dissimilia ex lib. de morbo sacro, & de loc. in hom. colligi.

Sequitur Hippocratem Plato. Quidni? imitator ejus 1. us. p. cap. 8. si quis alius, modò Galeno credamus, & perpetuus inventorum omnium æmulus ac confectator lib. contra Julian. cap. 5. Quid igitur ille? Eadem. Audi hæc ejus in edit. Serrani tom. 3. fol. 78. in Ficini fol. 1079. apud Galen. com. in Timæo 16. de Timæo ὁ πῶτος τῶ ἐξ αἵματος, &c. Quando enim expirante, & respirante halitu, ignis simul interior sequitur, per ventrem diffusus, poculenta, & esculenta offendit, liquefacit protinus ista, partitur in minimà, per exitus, quæ progressio patet, tanquam ex fonte quodam educit, in meatus (ὁ κρητὴς, id est, rivus) venarum trajicit, quæcunque exhaustit, atque per corpus quasi vallem, venarum fluenta deducit. Vides manifesto exitus, per quos traducitur cibus, ut è fonte, ex alvo, in rivus venarum, à rivis ipsis, id est venis, per quos, ut per canales in totum corpus confluit, distinctos.

Atqui idem multò clarius alio mox, eodem in Timæo apud Serran. fol. 80. loco, repetit, quò à rivisimenti per totum corpus pertinentibus (ὡς ποταμοὶ τῶ σώματος vocat) distin-

distinguit, dividitque non jam exitus (*ἔξοδος*) sed venas expletas iis, quæ è ventre efferuntur.

Platoni Aristotelem jungere libet, magistro discipulum. Ipse quoque consentit, & Mesenterii, seu chyli venas palàm à venis sanguinis separat, ac secernit. *Tendunt 4. de part. 4.* inquit, *ab intestinis in venam magnam & aortam.* Ecce tendunt in illas, non sunt ab illis. Rursus: *Per eas in venas è ventre tanquam per radices pervadit alimentum.* Non potuit apertius. Ait tanquam radices cibum de ventre ad venas deferre, ab his porrò venis cibum illum in alimentum, id est sanguinem mutari, & in omnes totius partes, ad eas nutriendum dispergi, ac dissipari.

Eadem quæ *Hippocratis, Platonis, & Aristotelis*, Stoicorum quoque apud *Ciceronem 2. de Nat. Deor.* fuit sententia. Quadruplices enim illi alimenti vias faciebant, prorsus inter se distinctas, alias à medio intestino (sic Mesenterium Cicero vocat) ad portas jecoris ductas, directasque, per quas permanet succus à reliquo cibo in ventre, ac intestinis secretus: alias inde pertinentes, per quas cadat cibus à jecore delapsus: alias, per quas versus in sanguinem ad partes easdem jecoris vicissim confluat, & in cavam venam confundatur: postremas denique ipsam venam cavam, per quam ad cor perlatus idem sanguis in totum corpus ei nutriendo dividatur. Ubi notandum illud inprimis est, priores illas vias, ne venarum quidem nomine eos dignatos.

Jam *Herophilus 4. us. p. 19.* antiquus medicus, & cui tantum *Galen. lib. de dissect. vulva. cap. 5.* in Anatome tribuit, ut ad exquisitissimam ejus cognitionem pervenisse dicat; quemque *Tertullianus com. de an.* ut hominis naturam cognosceret, septingenta cadavera incidisse scriptum reliquit, duplex in Mesenterio venarum genus, ut suprà etiam diximus, constituit, alias tendentes versus jecoris portas, cujus manus sint; alias proprias intestinis ipsis alendis, haudquaquam ad hepar trajicientes, sed in glandulosa quædam corpora finientes.

Cum quo è recentiorum numero multis, *Vasæo, Paræo*, aliis, ac forte *Galen.* ipsi convenit. Quin affirmat idem *4. us. p. 19. Galen.* suo quoque tempore non defuisse, qui mirarentur, si audirent, per quas venas priùs distributio ad hepar facta esset, per easdem rursus benignum sanguinem recurrere. Atque ad hos omnes aggregari possunt, quotquot vulgatas Mesaraicas soli ducendo, comportandoque ad hepar chylo, dicatas contendunt. E quorum numero inter Græcos Pollux est, in *Onom.* qui Mesenterium definit *ὑπὲρ τροφῶν ἀναπέμποντα εἰς τὴν ἥπαρ*, id est, membranam cibum transmittentem ad hepar: inter Arabes Rhafis, 1. ad *Almansor. cap. de Venis & hep.* qui ea ipsa causa, ne venas quidem esse concedit, sed canales tantum nominat. Inter recentiores *Theophilus lib. 2. cap. 10.* Protospatharius, *Stephanus fol. 129 & 177.* *Benedictus lib. 2. Anat.* & alii plures apud *Costæum* libello proprio. *Laurent. 4. Anat. quest. 5.* *Mercatum 1. part. 4. class. 3. art. 5.*

Jam verò, quod secundo loco dixi, neminem horum agnovisse vera chyli vasa, hoc est, venas nostras, id multò facilius etiam ad probandum est. Constat siquidem ex iis, quæ dicta sunt, plerosque eorum à vasis communibus illa sua derivare. Hippocratem à vena cava, Aristotelem ab eadem, & præterea ab aorta. Herophilum, Rhafin, & quicum eo sunt, ab ea, quæ ad portas dicitur; alios ut

Stoicos,

Stoicos, etsi sui generis ductus, sive vias constituere videntur, quales tamen sint, aut quæ iis origo, ne verbo quidem attingere. Quo ita explicato, ruat necesse est eorum opinio, qui saltem Rhasi non ignota fuisse existimant, eò quòd à venarum numero illas, quæ chylo operantur, excluderit. Certissimum enim est, quas à venarum genere rejecit, eas non alias fuisse, quam quæ ad portas veteribus fuerunt indigitatæ. Quæ Rhasis sententia, præter alia, hoc vel maximo urgetur incommodo, quod semel constituto, soli chylo ferendo vacare portæ venas, nullo modo doceri potest, quibus venis intestinorum, & aliorum, quæ iis vicina sunt, viscerum nutritioni succurratur, cùm à cava nullas prorsus pertinere ad illa vincat autopsia. Quæ autem de Lactea Arabum vena quidam adferunt, scire licet, neque illam à portæ venis aliam fuisse ab ipsis habitam, qui Lacteam non alia causa dixere, quam, quòd falsâ quadam veri opinione, lacteum è ventriculo, ac intestinis ad se pellicere succum sunt arbitrati.

Denique nec minus verum illud est, quod addidi, visa quibusdam eorum fuisse, nec tamen cognita. Erasistratum enim, & ejus assecclas intelligo, quem vidisse nostras venas, & suis ostendisse, ex duobus Galeni locis manifestum mihi est; quorum alter *libro cap. 5. an sanguis*, &c. alter 7. *Anatom. adm. cap. ult. in fin.* legitur. Ex utroque enim liquet, ad probandum solum Spiritum in arteriis attineri, confluere autem post sanguinem, vel aliam naturam quamcunque, experimento hoc Anatomico usum esse, quòd in hoedis nuper lactatis, si venter imus, & interior membrana dividantur, initio, simul scilicet ac nudatum mesenterium fuerit, arteriæ *αγγεία*, id est, aëreæ, mox plenæ lacte conspiciantur. Vidit igitur omnino Lactea hæc vasa, nec agnovit tamen, quippe quæ pro arteriis, deceptus veri quâdam inani similitudine, habuerit. Ex quibus omnibus satis, opinor, patet, ignorata fuisse hæctenus vasa, quæ primi invenisse profiteamur.

CAPUT XIV.

Ex occasione quaestiuncula duæ. Prima. Quæ causa ut tam diu latuerint? Triplicem videri. Excusati veteres, non Galenus, qui videtur nosse omnino debuisse. Secunda. Cur ita repente oblitterentur, & exolecant. Post plures causas allatas, res in medio relicta.

Videri jam poterat ad exitum Prænotationis omne negotium perductum, nisi velut in limite occurrerent, quæ sisterent adhuc, & morarentur. Quærunt enim plerique, *Qui fieri tandem potuerit, ut tam diu latuerit vasorum istud genus, veteribus præsertim, eo usque in sectionibus deditis, nihil ut ad diligentiam nobis fecisse reliqui videantur?* Hæc quaestio omnino amolienda est, cùm præsertim comitem aliam trahat longè obscurissimam, & maximè arduam: *Quonam modo tam repente vasa illa exolecant, & oblitterentur?*

I. Igitur ignorationis veterum causam si quis petat, eam ego puto non diffculter ex *Aristotele 3. Hist. 1.* posse colligi, bonorum omnium nobis auctore, ut de Hipp. dicebat Galen. Hic enim perquirens, cur venarum ratio, natura, origo, ita philosophorum veterum cognitionem fugisset? causam inter cæteras reddit,

reddit, quòd in jugulatis animalibus examen earum instituerint. *In his enim,* inquit, *quod effuso sanguine languescant, & collabantur, naturà principaliorum venarum abolitâ, pleraque occultari, & obscurari necesse est.* Quare ipse in strangulatis potius perpendendas, explorandasque præcipit. Simile quid nos dicere possumus, evenisse illis, de quibus agimus, ignorationem hanc, quod non in vivis, sed demortuis animalibus anatomes suas instituerint, in quibus has venas experientia docet ita confestim vanescere, ut omnem aspectum etiam attentissimum fallant, atque effugiant. Potest etiam fieri, ut viva secuerint, sed non suo tempore, aut scilicet absolutâ jam perfectâque, aut nedum tentatâ, inchoataque chyli distributione atque ad hepar appulsu. Forte illud quoque iis imposuerit, quod me quoque primo intuitu induxit, & nervorum implicationes arbitrati sunt, quæ erant Lactium. Quæ causa (aut ego vehementer decipior,) recentiorum quibusdam fraudi fuit, qui nescio miram quàm in Mesenterio ac intestinis congeriem, & tantum non infinitatem plurimorum, eorumque insignium nervorum vidisse autumant; cùm *Galen. 6. Anat. 6.* vix exiguos, imò plane exiguos eis tribuat.

Ac pro aliis quidem hæc dici possunt. De Galeno autem quid cogitem, prorsus ignoro. Qui enim sectiones vivas amplius sexcentas dederit, ut ipse quidem gloriatur, & plurima 3. *Fac. nat. 4.* animalia à pastu tam sæpe inciderit, ei fieri ne possè putandum est, ut nunquam sese venæ illæ in conspectum dederint? ut nunquam eas obvias habuerit, imò nunquam pervestigarit, cum præsertim exquirendæ totius rei maximam illi causam Erasistratus, de quo supra, præbuisset? Contrà quem ita frigide ille 7. *Anat. adm. cap. ult.* disputat, ac perplexè, ut judicare vix possis, quid ajat, negetve, & detne illi, quod in experimentum sumit, an abnuat? Certè quidem nihil adfert, quo meritò illum convincat. Id quod facile viderit, quicumque locum illum totum sedendo, quod ajunt, perlegerit, expenderitque. In promptu enim est, & à quolibet inspicì potest. At facillima ei palma erat futura, si exploratæ ipsi venæ illæ fuissent, quas perperam arteriarum in loco Erasistratus habuerat.

2. *Cur verò in mortuis, aut morientibus etiam, ita repente exhausto, qui in eis est, succo, obliterentur vena ista, ac sensum exolescentes destituant,* quemadmodum supra cap. 9. in exemplo canis dixi? id in iis, qui fato suo, aut vi morbi pereunt, non magnopere fortassis mirandum sit, quod in illis constet, gestiones omnes, functionesque nutrientis animæ, quæ naturales medicis dicuntur, & inter quas nec minima illa chyli est confectio, ac distributo, exoletæ jacent, & cum ipsis veluti emoriuntur. Aut cur idem iis quoque usu veniat, qui vel sectione viva citrà morbum, vel alias violentè occumbunt, ejus rei rationem malim ab alio quovis discere, quàm ipse temere quicquam tam obscura in re decernere. Est enim, ut de rebus cæteris plerisque, ita de hac longè verissimum illud, apud *Ciceronem 3. de Natur. Deor.* Cottæ multò esse facilius dicere, quid non sentias, aut quare falsum sit quippiam, quàm quid sentias, aut quare verum aliquid putes. 1. Suspiscatus sum aliquando eò istud evenire, quod lacteo illo humore in auras mox abeunte sui tenuitate dissipatoque concidant, collabanturque

Perexiles venulæ, & ita sensum frustrentur. Quam in sententiam idèò veneram, quod legisse apud *Galen.* 3. *Fac. Nat.* 13. memineram, roris tenuissimi instar rapi in Mesaraicas, quidquid esset in omni chylo subtilissimum. Sed coëgit me res ipsa mutare sententiam. Cùm enim periclitandi gratiâ, perruptâ cultello unâ ex majoribus illis venis, liquorem, qui inde promanarat, in cochleare collegissem, animadverti non horas modo, sed diem etiam solito cum candore durasse.

2. Quare aliò animum divisi, & cogitare cæpi, ne idèò forsitan id fieret, quod, qui in venis illis stabulatur succus, is ad hepar mox diriperetur, tractu illius valido, sive etiam impulsu venarum, tum violento præterea motu, quo tunc animal agitur; novus verò alius nullus in locum ejus reponeretur, & sic venis perexiguis periret, quod videndas antea præstitisset. 3. Alius quidam, nec indoctus, & mihi peramicus, existimavit simile quid esse hic ei, quod pulmonibus quoque videmus usu venire. Nam & illos, quoad vita steterit, plurimo sanguine circumfluere; mortuo animali omni repente defici, vanescente illo, velut in spongia, in visceris raritatibus. Etenim & Mesenterium, inquiebat ille, rarissimæ texturæ est, (unde Mesaræi quoque nomen Gal. auctore, invenit) & glandulæ, quæ plurimæ in eo cernuntur, facile possunt diditum in venas succum in sese combibere, quo illæ privatæ, necessario se sui tenuitate sensui subducant.

Quas sententias proponere volui, non quod probarem omnino, sed ut sic, dato veluti signo, aut posita in medio palma, quod ajunt, meliores aliorum elicerem, *Horat. in Arte.*

„ — *functus vice cotis, acutum*

„ *Reddere quæ ferrum valet, exsors ipsa secandi.*

Sed de prægnoscendis ad horum vasorum Anatomicam perceptionem, quæ dicenda erant, hunc habeant terminum.

ANATOME HORUM VASORUM.

CAPUT XV.

Transitum ad ea, quæ Anatomies propria. Quid ea nobis? Tribus eam rebus absolvi.

Quarum prima historia partis. Quæ quatuor quavis in parte perpendit. Aristoteles in his omnibus Galeno quoque.

ULTIMA nos ad se vocat laboris nostri pars, sed præcipua, & longè maxima, vasorum nostrorum Anatome. Intelligo autem Anatomen, non quod nomen primâ ipsâ sui notione præfert, artificiosam partium corporis nostri sectionem: sed illud, cui præcipuè significando Sapientum consilio, traductum paululum, immutatumque à nativo suo significato, positum datumque est; habitum putâ, seu scientiam, si ita mavis, quæ sectione adjuta, quicquid propriè inest in quaque parte, eamque complet, & absolvit, via, ac ratione perquirat, aperit, explicat. Sunt ea, quæ in parte quavis ita spectantur, tria omnino, etsi paucis planè, aut, si verum amamus, nemini adhuc observata satis, & perspecta. Ex his primum *Structura* est, quâ condita pars quæque, seu fabricata, quam *Galennus* sectio-

sectionem 2. ad Glau. lib. 1. de loc. aff. 1. Aristot. lib. de hist. anim. Historiam. Cicero 1. de Nat. Deor. partis descriptionem appellat: alterum *Actio seu functio*, gestiove, quam ea ex se promit: postremum *Usus*, quem ad ritè obeundum affert. Horum enim trium notitia Galen. ubi suprà. omnem, ut ipse loquitur, naturæ membri *ἐνταξία*, id est, peritiam, definivit. Nec in omni Aristotelis de lib. de hist. de partib. de gener. animalibus, tam varia, & multiplici disputatione, quicquam reperire est, quod non ad horum trium aliquod referatur. Videamus breviter in re nostra præsentī singula, & ante omnia Historiam.

Huic enim principem esse præ reliquis locum, idem Gal. 1. de loca 8. Anat. adm. 1. ex eo docet, quod *vel functionem ipsa ostendit, vel ratiocinationes ad ejus inventionem exhibet.* Et idem quoque Aristot. sentit, 1. Hist. 6. cujus hæc sunt: *Præcedere oportere, si methodo tractande sint partes animalium, historiam singularum.* Hinc enim patere quibus de rebus, & ex quibus effici demonstrationes debeant. Et alibi 1. de par. 1: *Debere Physicum, non secus, ac Astronomum, primum, ea intueri, quæ apparent in animantium genere, partesque singulas explorare: deinde verò quamobrem ita hæc sint, causas reddere.* Explicat autem Historia ex eodem Galeno naturam membri. 1. ad Glau. 1. Natura autem intelligitur, cum hæc quatuor perspecta fuerint, id est, Substantia partis 9. Anat. adm. 1. 1. de loc. 1. (quam & substantiæ proprietatem appellat, 4. us. par. 12. 6. de placit. 8. 1. Fac. Nat. 6. 3. de Symt. caus. 1.) Temperies ejusdem, Quæ temperiem consequuntur, Quæ accidunt 1. us. p. 9. id est, Conformatio, Magnitudo, Numerus, & Situs. Quæ omnia nos quoque singillatim in his venis nostris perpedemus.

LACTIUM SEU VENARUM LACTEARUM

Historia, five Fabrica, & Structura.

CAPUT XVI.

Perperditur horum vasorum Substantia. Sunt è genere venarum. Sunt partes compositæ, & dissimilares, non sunt similes & simplices. De Galeni & Aristotelis hac in re sententia cum cura inquisitum. Fuchsi, Silvii, Fallopi explosa. Partes componentes venarum tres, Membrana, Fibra, Caro. Aristoteles iterum explicatus: notatus Capiuaccius, rursus Fallopius, & cum eo Vesalius.

Substantia horum vasorum absque controversia venæ est, seu venosa, ut Anatomici loqui malunt (tab. 1. 2. 3. B. 4. N.) Cum venis enim, & cætera, unum succum si demas qui per eas perlabitur, habere eadem, iam suprà diximus. Illud hic quæstionem habet, diu jactatam illam quidem, nunquam tamen satis explicatam: *Substantia ista simplex sit, & uniusmodi tota, an composita: & diversis è partibus concreta?* Ego posterius amplector, qui diu jam, nihil moratus quædam Galeni in contrarium loca, 6. de plac. 2. 1. Fac. Nat. 6. de dif. mor. 3. (quibus non ex suo, sed veterum sensu agere eum, perspicuè ostendit loquendi modus, & forma, quæ plerisque eorum utitur, *Similares dicuntur, similes appellantur, &c.*) Omnem venam,

nam, ut alibi docui pluribus, dissimilarem, eodem cum Galeno statuo. Qui primum compositis manifestè annumerat, & partes etiam quæ componunt recenset. *de ineq. intemp. cap. 2. 10. Meth. 11.* Deinde organa corporis humani passim *de diff. morb. 4. 2. us. p. 19. 16. us. p. 1. 1. Meth. 6.* appellat; imò & organicas partes *4. us. part. 16. 17.* (ne quis argutari cum Fuchſio & Sylvio possit, aliud esse ὄργανον, aliud ὁργανικὸν μέρος.) Sunt autem opposita, & adversa planè parti similari, & simplici non magis composita *8. de plac. 4.* quàm ὄργανον *1. de elem. 9.* ac *de differ. morbo. 3. de opt. constit. 2. 8. de plac. 4. ὁργανικὸν μέρος:* & ex *Aristotele 2. de par. 2.* omne ὁργανικόν, etiam dissimilare est, ac compositum, & vicissim. Quod totidem verbis quoad compositionem etiam *Galen. de differ. morb. cap. 2.* affirmat. Tertiò ea illis tribuit, quæ non possunt tribui, nisi parti dissimilari, ac compositæ *ibid. cap. 3. & 4.* cujuscumodi sunt, edere perfectam functionem *1. Meth. 6. de diff. morb. 7.* tentari per se morbis in compositione, figura, meatibus *de differ. morb. 4.* tenere suam figuram, & magnitudinem etiam extrà omnem compositionem *de differ. morb. 3.*

Quibus addi potest coronidis loco, ratio nunquam soluta, nunquam solvenda, & quam effugere conati sunt multi, *Cardan. 1. contr. Fuchſ. in sua Meth. & in com. de diff. morb. Fall. lib. de part. simil. fol. 124.* nullus effugit. *Non qualibet pars vena est vena, nomine, ac definitione. Ergo dissimilans pars vena est, & composita.* Hæc enim ipsissima est dissimilans partis apud *Aristotelem 1. Hist. 1. & Galenum lib. de Anat. viv. Spur. f. 56. 1. Meth. 6. 8. de plac. cap. 4.* definitio. Nam quod post omnes respondet *Fallopins ubi supra.* esse quamlibet partem venæ venam, si venam sumas pro substantia venosa, ex qua formatur organum, non si pro organo ex eo formata, id est, sanguinis conceptaculo, id verò vanissimum commentum est, neque hujus fieri debet, τὸ δὲ διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐκφυγῆσαι.

Primum hæc ipsa substantia & natura venæ est, esse organum distribuendi sanguinis *Galen. 1. us. part. 16. de differ. morb. 7.* vel esse sanguinis conceptaculum *Aristot. 3. Hist. 19. 3. de part. 5.* Deinde substantia, ex qua conflatur vena organum, nequaquam vena est, sed venæ materia. Quomodo igitur dicetur pars ejus quælibet vena? Sed nimirum faciendum, quod Chirurgo, Fallopio fuit, ut in desperato ulcere tergeret linteo, quæ sanare non posset.

Porro, cum partes dissimilares dupliciter ita dicantur ex *Aristotele 2. de part. 1.* vel causa solius figuræ, etsi unâ solâ consent parte similari (quo modo alibi idem *Aristotel. 2. de anim. t. 8.* figuram securis ait ipsam esse securis substantiam) vel præterea ratione substantiæ ex pluribus similaribus conditæ. Venæ nostræ, ut & cæteræ, utroque modo dissimilares sunt. Nam & figurâ suâ ac propriâ sunt præditæ, quod nemo negat; & prætereà ex pluribus similaribus conflata *Galen. 10. Meth. ult. habentur, Anatomes, hoc est, ipsius sensus testimonio.* Sunt autem partes istæ venam componentes tres omnino *de ineq. intemp. cap. 2. 2. de Temper. 3. 10. Meth. ult. fibræ, membranæ, & super istas caro.*

Membrana una iis, & simplex est, qualis reliquis etiam venis *6. us. part. 11.* ad arteriarum discrimen. Una dico, si eam spectes, quæ ipsis peculiaris est, ac propria. Nam, quæ extra hepar feruntur per Mesenterium ad intestina, aliam infu-

insuper ab eodem Mesenterio sibi adsciscunt, non secùs, ac Mesaraicæ vulgatæ. 7. *Anat.* 5. Atque hùc Aristoteles, opinor, respexit 3. *Hist.* 3. cum venam dixit membrana & cute constare, intellectâ membranæ nomine exteriori hac, cutis interiore, & propriâ. Sed & *Galen.* 6. *Anat.* 11. notat Anatomicos veteres interiorem, & peculiarem membranam venæ tunicam propriè, exteriorem hanc, & quæ istam ambit, membranam simpliciter nuncupasse. Capivaccius *Meth. Anat.* f. 61. in 4. existimat adscititiam hanc membranam Galen. spectasse, cum partem dissimilarem venam appellavit. Qua in re quantum ratio illum fugerit, & quàm longè à Galeni mente abierit, ex jam dictis planum est.

Fibras intelligimus, non quales in animalium quorundam sanguine reperiuntur, quas *Aristot.* 3. *Hist.* 6. 2. de part. 4. describit, & post eum *Galenus lib. Quod animi mores* 7. 2. de elem. 2. etiam proponit: sed quas in genere substantiæ partium similarium idem *Galen.* 1. de Semine 10. connumerat, ex semine primum constitutas. Has venis omnibus negare videtur *Fallopian lib. observat. fol.* 78. & ei, quod mireris, suffragatur tandem *Vesalius in examine observ. Fallopii*, qui in magno suo opere, non solum eas descripsit quàm accuratissimè, sed etiam picturâ expressit. Quorum rationes ad recensum ducemus, cum agemus de venarum nostrarum usu. Eò enim pertinent. Nos, ut in cæteris venis omnibus, cum *Galen* 3. *Fac. Nat.* 11. ita in his quoque agnoscimus; easque omnium generum, rectas, transversas, obliquas, omnes in una illa venæ propria tunica, perquam tenui licet, & subtili collocatas, seu ut *Galen.* 10. *Meth. ult.* loquitur araneosis quibusdam extensionibus aptas inter se, & nexas, ita tamen, ut rectis & transversis obliquæ sint pauciores.

Caro fibris circumjecta est, & tunicæ seu membranæ adnascitur, quæque inter illa sunt spacia implet & infarcit. *Gal.* 10. *Meth. ult.* Est autem caro hæc ex eo carnis genere, quod innominatum *Galen.* dicit *ibid.* & è quo singularum particularum substantiæ moles completur, quæ & perire, & regigni potest.

CAPUT XVII.

*Explicata Tenperies, & quæ eam consequuntur. Joubertus obiter perstrictus.
Galenus explicatus.*

IN explicanda venarum nostrarum Temperie nihil est cur multi simus. Absque dubio frigidæ sunt (docet id earum color, de quo mox: docet experts sanguinis omnis natura, & præter, ac ante hæc omnia, prima ex semine constitutio. Quippe frigida pars omnis *σπερματικὴ*, quicquid *In Paradoxis* turbet Joubertus, & qui ab eo sunt. Qua de re alibi Deo præsentè) & quidem venis vulgatis frigidiores; quod illæ contactu sanguinis, qui chylo citrà controversiam calidior est, incalescunt, & tantum non ad medium temperamenti statum *Galen.* 1. de Temper. ult. veniunt. Id quod *Galen.* sibi voluit *ibid.* cum venam cute calidiorē dixit, quem locum frustra vexant, quibus id unum propositum, ne quicquam sani unquam Galenus dixisse videatur. Sunt etiam siccæ, sed hæcte-

nus, ut quantò, teste *Galeno 5. Meth. 7. 1. de Temp. 9.* venæ vulgatæ arteriis, tanto propè venis ipsis siccæ sint minùs. Si tamen inter se comparentur partes, ex quibus componuntur, membrana, fibra, & caro, frigidiore duæ priores, calidior caro censenda fuerit.

Consequitur hanc Temperiem primùm albor, qui etiam remoto ab eis succo, major est, quam in venis cæteris. Sunt enim venæ omnes exangues, & albæ, quemadmodum cunctæ partes, quibus ex semine est origo. Sequitur item materiæ, naturæquæ tenuitas, ac subtilitas ubique insignis illa quidem, sed in hepatis ipso viscere multo etiam insignior. Comitantur præterea teneritas, levitas, raritas hætenùs, ut quantò vena portæ, cavâ, tantò venis meseraicis, quæ à portâ communiter dicta derivantur, laxiores, rariores, leviores videantur. Nec plura hic observare est, & horum ipsorum pleraque ad ea, quæ accidunt, referri quoque possunt.

CAPUT XVIII.

Ex iis, quæ accidunt examinata. 1. Conformatio. 2. Magnitudo: etsi minores portæ ramis, apparent tamen plenius. 3. Numerus. Valvule in his vasis. Pro Columbo adversus Archangelum strenuè propugnatum, cum cautione tamen addita.

IN iis, quæ accidunt cuique parti, prima occurrit Conformatio, quæ in Figura, Asperitate, & Lævitate, demum in Cavis, & Meatibus cernitur.

1. Figurâ venæ hæ nostræ tereti sunt, & oblongâ (tab. 1. 2. 3. 4.) communi ipsis cum venis cæteris, & arteriis etiam.

Sunt præterea Læves, in extima superficie præsertim. Nam interior, ob fibrarum, quem diximus, implexum, textumque, ad inæquabilitatem quandam, & tanquam asperitatem accedere videtur non contemnendo usu, ut suo loco aperiemus.

Cavæ quoque sunt, & meatus suos habent, atque canales in fistulæ modum (cum qua non ineptè comparari possunt) etsi per angustos, præcipuè qua ad intestina pertinent, & per hepar incedunt. In his illud admiratione dignum, quod pluribus valvulis, sive ostiolis interstincti sunt, sive intercisi, quas ego valvulas, sæpius vanescente jam chylo, instar minutissimorum veluti marsupiorum, aut concretarum guttularum, stillarumve, dependere ex illis, non modo, quâ comitantur intestinis, sed etiam in reliquo ductu animadverti. Quæ res facit, ut quas, extrema ora, unicuique meseraicarum alterius, & vulgati generis, quâ in intestina finiunt, *Columbus Anat. lib. 6. cap. 1.* apposuit, rejiciendas temere nequaquam existimem: hac tamen inter utrasque constituta dissimilitudine, & differentia, ut illæ Columbi foris intrò ferantur, nostræ contra intus foras spectent. In qua sententia eò confirmor magis, quo acrius illas, quàm validiùs oppugnari *lect. 13. lib. 2.* ab *Archangelo* intelligo. Ait ille: In punctum venæ illæ desinunt. Puncto autem, quæ valvula adfigi potest? Addit, si dentur hæ valvulæ, fore ut nec sanguis ad alenda intestina egredi è venis illis possit, nec depurgari per illas, & depleri noxiis humoribus corpus. Tandem cur non sunt, inquit, additæ venis etiam

etiam partium singularum, ne semel haustum alimentum remeet ab illis, & refundatur; Nihil prorsus, si quid ego modo judico, hæc argumenta conficiunt. Folia farfari, ait ille. Primum, quæro ego ex Archangelo, si in punctum finiunt illæ venæ, quomodo cavæ sunt? quomodo chylum accipiunt? Si hæc possunt, imo si hæc habent, quid impedit habere etiam valvulam? Quod secundo loco contradicit, Columbum quidem rectè premit, qui & ferre ab intestinis venas illas, & ad eadem deferre existimat. Nobis nihil negotii exhibet, qui solum posterius illis tribuimus. Sic enim rectè simul sanguis, & humoris recrementa transponi per eas in intestina possunt, & valvula tamen foris intro spectante arceri, ne regrediantur, aut regurgitent. Nec tertia ratio melior est, deterior etiam, & ἀσύγκλωστα κλώθει. Primum enim quis certiores nos fecit illarum partium venulæ valvulas nullas adesse? Quin tu Archangele, gallinæ fili albæ, cui obire plusquam lynceis oculis quæcunque vis, quâvis horâ licet, id protinus nos doces. Deinde scit natura, etsi à nullo docta, & artificiosè tamen ambulans, quibus locis opus appositis valvulis, quibus non. Denique per fidem tuam, quid iis Archangele tibi usus est, qui partes omnes nutriri vis τῇ ἀξιότητι. Possent dici plura. Sed *Arist. 3. de part. 3.* σώσεις τὸ τὰς αἰθέρας τῶν λόγων λίαν ἐξετάζειν, & vere *Galenus 1. de art. 9.* τὰ ἐλάττω ἐλιδία κατὰ φρονεῖν μᾶλλον, ἢ ἐλήγχεσθαι προσήκει.

2. Quoad quantitatem perpetuæ, & sibi continentes sunt omnes, nihil usquam abjunctum in iis, aut dejectum. Nempe omnes partes sunt trunci unius, non secus, ac venæ alteræ, & etiam arteriæ, ut jam olim *Aristot. 2. de part.* advertit. Magnitudinem tamen æqualem non habent, aliis majoribus, aliis minoribus (tab. 2. 3. B. 4. N,) ut solet. Si tamen cum iis compares, quæ à porta, sive truncum, sive ramos spectes, non parùm ab illis magnitudine vincuntur.

Illud observabile, quòd etsi minores, in intestinis tamen longe plenius, quàm illæ apparent (ibid. G. H.) Quod ego puto in chyli, sive copiam, quâ turgent, sive potius candorem referendum. Est enim candidi, sive albi, in primis visum commovere, ac percutere. Copiam autem illam simul cum candore sæpe observavi plurimum augeri, utrinque intestinis, dum chylo adhuc tument, sursum deorsum compressis. Duplo enim ferè, quàm antea, & majores sic, & candidiores cernebantur.

3. Ut verò magnitudine faciliè superantur à vulgatis, ita vicissim numero non parum illas excedunt, adeò ut prope altero tanto plures videantur. Quippe non solum eas comitantur, ubicunque sunt: sed pluribus locis, ubi illarum nulla cernitur, spatium inter mediis (tab. 1. 2. 3. B.) ipsæ nihilominus, & copiosis furculis veluti fruticant.

CAPUT XIX.

Dictum distinctè de harum venarum situ (συμβίσις.) Considerata illarum tum Positio (ἦσις,) tum communio cum partibus cæteris (κοινωνία.) In hac seorsum. Origo, Finis, Informatio, Progressus. An poris forata? Videri. Non tamen ἀνατομικῶς cum arteriis. Principium fecori, an Pancreati debeant? An vena sint sui generis? Fugis jejuni intestini inanitatis vera causa. Galenus hic refutatus, & ex occasione Fallopius. Crusta intestinorum. Ventriculus his venis caret.

SItus nomine (συμβίσις Græcè) duo Galen. de diff. mor. 4. 1. de loc. aff. 1. complectitur, ἦσις, quam cum Cicerone 2. de Nat. Deor. positionem, seu positum cum Celso lib. 8. Gellius posituram 4. Noct. Attic. 1. dicere ausus est, & κοινωνία, quam communionem, seu communitatem reddere possumus.

Positionem simpliciter si spectes, in ventre inferiori, quemadmodum ipsa quoque quæ à portis jecoris nomen invenit, venæ istæ sitæ sunt, ita ut nullibi illas extrà eum, sicuti nec eas quæ à porta proficiscuntur, sit invenire. Sin compares ad Mesaraicas vulgares, sic, quemadmodum arteriæ magis, quàm illæ Galen. 16. usq. part. 11. quod majoris sint momenti; ita, eadem causâ, istæ magis, quàm vasa nostra, in profundo sunt abditæ. Unde non paucis locis videntur transcendere vulgatas, & super illas incedere. (tab. 1. 2. 3. B.) An verò quod de vulgatis Galenus de dissect. venar. cap. 2. jungi eas per poros, quos vocant, arteriis, ut spiritu ab iis augeantur, id in has quoque nostras conveniat, ejus nihil adhuc observavi. Putem tamen, saltem quâ junctim cum arteriis ferri videntur, eorum participes, aut potius non expertes, quod rei natura postulare illos videatur. Occultas autem illas ἀνατομικῶς cum arteriis, quas idem Gal. 16. usq. part. 11. & 12. suis venis tribuit, & quorum beneficio fieri ait, ut ab illis in has sanguis transfumatur, ac ultro citroque commeat, in nostris non agnosco, solo albo humore semper confertis.

Communio tria comprehendit, principium, finem, & intermedium utrinque ab illo ad hunc progressum. Cum triplici enim partium genere intercedere communio & confociatio parti cuilibet potest, cum iis, à quibus ducit originem, cum iis in quas finit, cum iis, per quas progreditur.

De Origine horum vasorum (intelligo autem semper originem, seu dispensationis, seu eam quam Hippoc. appellat radicationis, ριζώσις) nihil quod firmiter adhuc dicam habeo, nisi illud generatim, ibi necessario esse hoc originis principium, ubi truncus sit, sive earum stipes, aut caudex. At hic ubi sit loci, mihi adhuc incertum est, etsi, ut comperire possem, nihil non hactenus feci. Possit quis non inepte fortassis à Pancreate earum originem petere, quod ibi in unum omnes coire, indeque tum deorsum tum sursum ad hepar porrigi apparent (tab. 1. & 2. C.) Maxima sanè glandula est Pancreas; & colore istis venis haud absimili. Tum venæ ipsæ hæ, nescio quid ibi habent præcipui, propriique miris anfractibus, gyris, flexibus, toto ejus corpore intextæ, & quibusdam veluti sive cancellis, sive reticulis, ut in transfennis solet, aliæ in alias impeditæ, ac implicatæ, quemadmodum plenius mox dicetur.

Adde,

[Adde, quod majoris momenti est, duos ramos, interdum plures, qui ab eo seorsum ad ipsum usque hepatis fissum ascendunt (tab. 2. M. N.) in nullum unum, qui mihi quidem cognitus adhuc sit, coalescentes. In contrarium tamen facit, quod omnino videntur in jecoris gratiam extitisse cujus manus sunt, ut de suis Mesaraicis *Galen. 5. de loc. 7.* dicebat; cui denique materiam subministrant, ab eo in omne corpus dividendam, non secus, ac in foetu vena umbilicalis, quam constat plane jecoris esse germen, & propaginem. Sed hæc in medio relinquuntur.]

Faciliori negotio, ni fallor, illud expediri potest, quo quæritur; An, posito, originem à jecore ducere, sui generis venæ sint, an portæ quædam *δορυφύσεις*, sive *ἐκδορυφύσεις* ad eum modum, quo umbilicalis ex veriori sententia. Omnino enim rectius est prius, sui generis esse venas. Nam & cum porta, utrinque latera ejus stipantes, à Pancreate, ad hepatis sima usque, diversæ semper, & distinctæ ab ejus trunco incedunt: (tab. 3. & 4. M. N.) & inde in hepar receptæ, per ejus carnes, nullo prorsus cum eadem porta commercio, nulla confusione, dissipantur, absumenturque (tab. 4. N. O.) ut in equi jecinore non obscurè observare memini.]

Finis horum vasorum ibi est, ubi & insertio. Inferuntur in omnia intestina, etiam duodenum, ad discrimen vulgatarum, nulla interim penitus ex eis, vel minima, ad ventriculum delatâ. Plurimæ in gracilia insistant, præsertim in jejunum, quod Hilam, sive Hiram *Varronem 4. de lingua Latina.* dixisse existimant. Quæ præter succi in eo tenuitatem, nondum, (ut in fluxus sui principio) spissati fatis, coactique, una & vera causa est, cur id vacuum semper cibo, & inane diffecantibus offeratur. Nam quam aliam *Galen. 5. us. p. 3.* aliique proponunt, jecoris scil. vicinam, ea quem locum habere possit nullus video. Ut enim loco vicinum ei jecur sit, nihil tamen ab eo, ut nec à cæteris intestinis, nisi per Mesenterium, & quæ in eo sunt, Lactes potest accipere. At hæc, si non longiori, pari utique, ac gracilium cæterorum tractu diffusæ sunt ab hepate, & remotæ. Quid quod æquè, aut magis etiam propinquum est hepati duodenum, in quo tamen inanitas illa nequaquam cernitur. Qui verò *Galen. ibid.* acumen quoque, & acrimoniam affluentis in intestini ejus tunicam, bilis, incitantem ad ea excernenda, quæ in ipsum illabuntur, pro causa advocant, minus etiam ferendi sunt. Nec enim unquam, nisi perfecta prorsus chyli distributione, cum scilicet depellendæ, detergendæque cibi reliquiæ sunt, in intestina bilis excidit, dum incorrupta sanitate corpus est, nec à statu suo motum. In quo hic perpetuus est ordo, ut primum percoquatur in chylum cibus, mox dividatur in hepar, ibi vertat in sanguinem secretus ab excrementis, demum sanguis per universum corpus didatur, & in suum locum excrementa quæque decedant.

Atque hæc ipsa ratio eadem operâ *Fallopîi in observ.* quoque, & *Archangeli lect. 20. lib. 2.* commentum evertit, qui volunt bilem ab hepate, per declivem, ac proprium ductum, ad jejunum depelli quidem, etiam cum chylo adhuc operantur intestina, sed aditu prohibitam, occluso scilicet à chylo meatu, qui in jejunum pertusus est, ad vesiculam biliarium, quasi refutatam, se referre.

Sabini quod volunt, somniant. Libet verò præterea quærere ex ipsis, cum nulla valvula ad porum biliarium (χολόδοχος) obftet, & jejunum semper inane sit, quemadmodum in vesiculam potius repellatur, quàm in intestinum se proluat, & chylum colore, & quod pejus est, viru suo inquinet, ac contamine? Cur item in foetu, qui nunquam edit, cur in iis, qui perierunt inedia, in quorum intestinis nihil est, quod bilem retrudat, vesicula tamen turgens bile cernatur? Certè hæc jugulum petunt huic somnio, & quidem sine missione. Sed de iis fusius agere non est hujus loci.

Modus insertionis is ipse est, quem Galenus suis Mesaraicis, deceptus, dedit. Hæ enim illæ sunt veræ venæ quæ ad intestina instar hirudinum hiant, spongiosis capitulis; quæ radicum vicem obtinent; quæ in ipsam intestinorum capacitatem sese penetrant. Etsi, ut nihil dissimulem, multis locis expandi quoque per ipsa apparent. Desinunt verò in crustam, quâ interior intestinorum gracilium tunica oblinitur, rugosam, & villosam serico non dissimilem, cui ex tertie coctionis excrementis procreationis suæ origo est, quæque primum excoriata in dysenteria ex alvo excidit, ut jam aliis est observatum.

Progressus earum, quantum mihi cognoscere datum fuit hætenus, hic est. Ab intestinis (hunc enim progressum sumo, ut mihi notiozem) per Mesenterium (tab. 1. 2.) obliquo ductu, duas inter ejus tunicas, partim seorsum à vasis reliquis, partim cum illis unâ, modo recto ductu, modo eadem transcendentibus, & veluti decussantes, per plures glandulas, ad diremptus ramorum præsertim collocatas, in Panctas usque perf. runtur. In Pancreate variè cancellorum (tab. 1. & 2. L.) in modum, vel si ita mavis, specie retium, aut capreolorum, implexæ sibi mutuò, & corpore confusæ, in plurimos, eosque inexplicabiles gyros, anfractusque hæc illac, ferè ut in labyrinthis, aut mæandris intorquentur. Ab eo rursus majoribus jam ramis, per portæ latera, quam quibusdam locis corollæ instar, sive annuli incingunt (tab. 3. R.) ambiuntque, missis quandoque etiam ad cavam propaginis (tab. 3. M.) in jecoris cava subeunt. Inde illatæ in hepar ipsum, & discissæ in minutissimas fibras, veluti quædam capillamenta (tab. 4. M. O.) in ejus carnem quaquaversum, tamdiu disperguntur, disseminanturque, dum prorsus obliterentur. Atque historia, & descriptio harum partium hæc est.

LACTIUM, SEU VENARUM LACTEARUM ACTIO.

CAPUT XX.

Actio partis antecedit usum. Quid ea nobis in re præsentit? Quotuplex? Agendum de ea Anatomico quàm diligentissimè, & cur?

Sequitur Historiam, seu Structuram 2. us. part. 7. actio, & Usum præcedit 6. us. part. 12. 2. Anat. 2. Ut enim sine Historia Actionem cognoscere non est, ita nec Usum sine Actione 2. us. part. 7. Ejus naturam, vim, varietatem definiendo, dividendoque aperire atque explanare, nec fert instituti nostri ratio, &

& res est longior, difficiliorque, quàm ut paucis tota transigi possit. Egimus de re utilissima, & haud scio an unquam satis explicara, alibi. Nunc id dicere sufficit: Actionem partis intelligere nos cum *Galeno* 6. de plac. 1. 1. de loc. 1. 17. *us. part.* 1. *κίνησις δεξιῆς καὶ αὐτῆς*, motionem efficientem, id est, efficienter à parte ipsa profectam, non ab alio: (id enim verè agere dicitur, quod ex se ipso motum 1. de loc. 1. obtinet) cæterum non id solum, sed cum hoc addito, ut sit naturæ conjuncta, quod vulgò dicunt esse secundum naturam. Quæ enim talis non est, ut immoderatus arteriarum motus, quem pulsus vocant, vitiosus crurum incessus, & similia, affectio, quàm actio 6. de plac. 1. censenda est. De hac diligenter cum primis agendum nobis. Ut enim rectè *Galenus* 8. de plac. 1. in essentiam cujuslibet instrumenti deducimur, non tam ex fabrica, quam ex actione. Et sine actione, inquit *Aristoteles* 6. Meth. 7. nulla pars rectè definitur. Unde, quæ actione privata est pars, nisi *ὑπερβολικῶς* 1. Pol. 1. pars non appellatur.

CAPUT XXII.

De propria Lactearum actione. Eam esse distributionem chyli ad jecur. Hanc componi ex tractu, & pulsu. Qualis uterque motus, & quæ utriusque causæ principes, instrumentales? *Ἀξέδδσις* & *ἀνάδδσις* quid differant? Trahentium duplex genus, item pellentium. Tractum, qui fiat successione ad vacuum, nullum esse. Calor an instrumentum tractus? *Hippocrates*, auctor Finitionum Medicarum, alii, explicati. *Avicenna* laudatus. *ὑπερβολικῶς* quidam obiter perstrictus.

Actio propria venarum nostrarum absque omni dubitatione chyli distributio est, & quidem distributio ad jecur. Quæ ut notat *Galenus* 2. Fac. natur. 6. *ἀνάδδσις* quibusdam dicitur, ad discrimen ejus distributionis, quâ in totum sanguis describitur, quàm iidem *Ἀξέδδσις* nominare malunt. Est distributio. Quidni? Vasa enim sunt. Omnia autem vasa 4. *us. part.* 17. distributionis instrumenta sunt. Sic venæ sanguinem distribuunt 1. *us. part.* 16. 4. *us. part.* 17. de differ. morb. 7. *Hipp. de locis in hom.* arteriæ sanguinem 6. de plac. 8. cum spiritu vitali permixtum; nervi animale spiritum. de dissect. nerv. cap. 8. 7. de plac. 3. 5. *us. part.* 9. 7. *us. part.* 14. Est distributio chyli ad jecur. Docet hoc sensus, qui chylo scatere deprehendit; & ad jecur rectâ ferri. Docet ratio, quod, ubi chylus nullus conficitur, ut in foetu, ibi hæ venæ non cernuntur, quia ociantur. Sed quid est hæc distributio? Nihil aliud, quàm compositus ex tractu 2. Fac. nat. 7. & pulsu motus. Trahere venas has ostendit earum cum intestinis commissio. Nec id minùs ex valvulis, quæ affixæ iis sunt, perspicuum est.

Hiare enim ad intestina hirudinum more, ac esse radicum instar, jam diximus. Et hoc *Galen.* 1. sag. cap. 10. 4. *us. part.* 2. suis tribuit, quas falso ille deducendo chylo præfecerat. Quin *Hippocrates* lib. de carnib. & apud *Gal.* 1. Fac. nat. omnem distributionem simpliciter tractu fieri docuit. Sed & pellere, sive trasmittere, ex eodem *Galeno* 2. Fac. nat. 7. 4. de tuend. in fin. intelligere est. Et vincit idem ratio, quod absque omni controversia chylus ille redundat in iis, ac superfluit.

Est autem iste genius cuiusque partis, ea vis, nihil redundans, nihil supervacuum unquam, ut toleret 3. *Fac. nat.* 11. 12. sed quantum conniti viribus, ac robore potest, spernat à sese, & amolitur, & pellat. Nec obstat dictis, quod intestina pellere dicuntur in Mesaraicas 6. *de loc.* 3. 6. *de plac.* 8. & jecur per eas trahere, iisque tanquam manibus uti. 5. *de loc.* 7. Quid enim prohibet, quominus simul omnia ista consistant? Exemplo juxta, & argumento œsophagus esse potest, quem trahere, & pellere, quis negare audeat, nisi idem sensum quoque neget? Et tamen non ipse minùs ventriculi, quàm jecoris Mesaraicæ venæ, manus appellatur, depulsumque à lingua accipere in se succum dicitur. Atque hinc illud Galeni 2. *Fac. natur.* 7. est, *ventriculi expressionem* (tu adde intestinorum) *distributioni chyli principium præstare, reliquum progressum, tum venarum contractionem, tum partis, ad quam mittitur, tractum perficere.* Quo circa recte, meo animo, *Jacobus de partibus* 1. 1. *doctr.* 5. *sum.* 5. *cap.* 1. quadruplicem ex Avicenna motum ponit, quo chylus ad jecur promoveatur, impulsionem intestinorum, tractum Mesaraicarum, impulsus earundem, & tractum hepatis.

Porro cum duplex sit apud *Aristotelem* 7. *Phys.* *cap.* 10. trahentium omnium, & pellentium genus, unum, quod motum trahit, aut pellit, aliud, quod immotum, & quiescens; sanè si sensus testimonio standum sit, posterioris utique generis tractus hic, & pulsus nostrarum venarum videri poterit. Sin ratio quoque in partem vocetur, consulaturque è structurâ earum deprompta, fortè nec prior, etsi nobis perobscurus, denegandus iis fuerit, de qua re mox in usu dicturus sum.

Quomodo autem, & à qua causâ fiunt duo motus isti? De tractu antiqua est controversia, & multis ultro citroque rationibus agitata. Ut omittam Epicuri sententiam (quam apud *Galen.* 1. *Fac. nat.* 14. & apud *Lucretium lib. de Natura* 6. etsi à Galeno discrepantem aliquantulum, legere unusquisque per se potest) Galenus cum duplicem tractum statuisset 3. *Fac. nat.* 14. & 15. alium qui successione ad id, quod vacuatur, alium qui qualitatis, ut ipse loquitur convenientia fieret; cumque graviter Erasistratum reprehendisset, qui priore digestionem alimenti perpetrari contenderet, ipse posteriorem amplectitur. Rectissimè. Etsi in eo non parum peccat, aut certè valdè populariter loquitur, cum successione ad id quod vacuatur, cum scilicet, ut quidque cesserit aliud illico subsequitur, tractus speciem putat constitui. Nam profectò, si verum quærimus, & rem totam limamus subtiliùs, atque ad libellam philosophicam exigimus, tantum abest, ut id, quod succedit ei, quod vacuatum, inaniumve est, trahi possit dici, ut ne cogitari quidem facile id queat. Quis enim, aut vacuum trahere sine irrisu affirmet, aut, ab hoc si discedat, aliam hujus tractus causam manifestâ sine vanitate comminiscatur? Verùm non est nostrum ista *καὶ μίτρον* hic profequi, quæ vel ad finem spectant, quem propositum sibi habet id, quod trahit; vel certè dotès quædam sunt, seu conditiones in eo, quod trahitur, quibus aut tracturo se commendet, aut ad agendum necessitate quadam compellat.

Efficientem enim, seu conficientem tractus nostri causam quærimus. De qua, ut breve faciam & præcidam, ita sentio, duplicem esse, principem aliam, seu principalem; aliam ut instrumentum. Illa facultas est, ut fusè Galenus toto primo

primo libro de Facultatibus Naturalibus demonstrat. Instrumentum fibræ sunt rectæ, quibus venas has cum cæteris intertexti superiùs jam diximus. His verò, si quis ex *Galeno* 3. *Fac. Nat.* 13. calorem quoque adscribere, & veluti succenturiare voluerit, tum insitum ipsarum venarum, tum circumstantium partium, id me non illibente fecerit. Video enim nec *Hippocratem* lib. de carnibus. ab ea sententia esse alienum, qui *venus postquam incaluerint, è ventre, quod tenuissimum est trahere* jam olim scriptum reliquit. Cum quo auctor quoque *Isagog. fol. 44. F.* Finit. medicarum consentit, dum digestionem definit *alimenti in totum corpus attractionem, quam naturalis calor molitur.* Auctor item libri de *Spur. fol. 63. H.* Utilitate respirationis, qui glandulas per Mesenterium sparsas, in causis caloris succum ab intestinis trahentis, connumerat. Quin ipsum hepar ideò trahere vult, quia calidum sit, & spongiosum. Quod verò de tractu dictum est, idem suo quodam modo de pulsu dicendum fuerit. Nam & hic, ut à principe causa, à vi expultrice peragitur; ut ab instrumento, à fibris transversis.

Erat mihi animus quædam adjicere his, veluti coronidem, de posteriore tractus genere, qui sit quiescente quod trahit. Negat enim hunc dari Neophytus quidam è Mexico *δοκασίω φθ*, eoque nomine erroris dicam Aristoteli impingit. Verum & longior necessario, quam pro instituto, erat disputatio, & paucis absolvi non poterat, homo ex eorum genere, qui cum primos *Terentius Eunuchus*. se esse omnium rerum velint, nec sint, & tamen, non omnium scientiarum modo, sed jurium quoque, & morum dictaturam ad sese revocent, alios præ se omnes, & ipsum adeò Aristotelem esse scœnum oportere putant. Quare satius visum est, integram rem servare, & alibi suis ex virtutibus philosophum tam capitalem ornare, qui etiam, pro eo, qui est in ipso, sale, ipsam hanc Lactearum nostrarum inventionis laudem, si qua est modo, in se, & socienos suos transmovere est conatus, semper alienus, nunquam suus, & in hac ipsa in Aristotelem de tractu invectiva Plagiarius.

CAPUT XXVI.

Ufus partis ab actione, quibus differat? Galenus à contradictione vindicatus. Ufus qui, qua actione, præstantior? Actionis perfectio duo in parte requirit, non plura. Partium organi actionem edentis quadruplex varietas. Partes singule Lactearum quemadmodum ad actionem conspirent, Fibra, Caro Membrana. De venarum fibris consutata Fallopii opinio.

ANtequam de primo Lactearum usu decernamus, quem usum diximus propriè, & simpliciter, statuenda nobis differentia est, qua ab actione ille sejungitur. Ea *Galeno* 1. de loc. aff. 1. auctore in hoc posita est, quod ille partibus adest semper, etiam ociosis, & cessantibus: hæc nisi negociosis, & agentibus nunquam. Rectè. Est enim nihil aliud usus, quam quod vulgò *αχρησία* 17. *us. part. cap. 1.* appellatur, id est, ad utendum quædam aptitudo, actio autem semper *κίνησις* est, id est, efficiens motio modo quo suprà jam explicatum est. Oritur vero ex hac alia differentia, quæ est, quòd idem usus, etsi parte, in qua inest, non

secus, quàm actio ipsa, naturâ, & dignitate prior est, ut præclare *Galenus* contrà *Epicurum* 1. *us. part. cap. 2.* & *Asclepiadem* disputat, actione tamen his omnibus modis est posterior. Quomodo enim posterior ea non sit, in quam totus refertur: cujus inprimis gratia membris à natura est datus, atque inginitus: quâ tanquam regulâ, & normâ 1. *us. part. 8. & 9.* omnis cùm illius, tum partis ipsius perfectio judicatur?

Quod si quando *Galenus* dixit 11. *us. part. 13.* tempore quidem, seu ut ipse loquitur, τῇ ᾗ ἔσται posteriorem actione, dignitate verò priorem, præstantioremque Usum illum, nihil id nobis officit. Nequaquam, cum hæc ita dixit, intellexit usum, de quo nos hic agimus, qui ad actionem comparatur, sed actionis ipsius finem, id est, usum, qui ab actione partis toti corpori accedit. Et meritò actioni suæ hunc usum anteposit, non eâ solùm causâ, quia in eum actio, ut in finem fertur, eoque indepto cessât: (est autem finis naturâ suâ iis semper, quæ fiunt ejus gratiâ, præstabilior:) sed illâ etiam, quod latius ipse multo, quàm ista patet, & ad plura pertinet, non unam partem, sed universum corpus complexus.

Hoc verò ita explicato, constitutoque, actionis perfectione partis omnem cùm usum, tum *ὅφειον* judicari, æstimarique: & repetito præterea, ex jam dictis, propriam, & præcipuam Lactearum functionem in chyli versari distributione, minimè difficile, opinor, fuerit, de omni earum tum usu, tum *ὅφειον* pronunciare. Nimirum duo, non plura, actionis omnis perfectio, in debito illi membro requirit, alterum, ut singulæ ejus particulæ, alterum ut quæ in eo, & in illis insunt omnia, ad colendum, efficiendumque munus suum, tanquam collatis in commune viribus, conspirent, ac consentiant.

His enim ceu limitibus rem hanc 1. *us. part. 8. 9. & 10.* totam jam olim *Galenus*, naturâ duce, definivit, & illud præterea, partem cui adsunt ista, eâ esse absolutione, perfectioneque, ut si vel tantillum ejus, aut perimere, aut commutare conère, totam ipsam tollas, aut pervertas. An igitur habent ista omnia Lactæ nostræ? Habent vero, nec id cuiquam obscurum esse potest, aut dubium, quisquis diligentius aliquando de iis consideraverit. At de illis quidem, quæ insunt in ipsis, mox videbimus; de partium verò singularum è quibus conditæ constant concentu, consensione, concordia, quâ, ut continuata quadam cognatione, conspirent in suam functionem, inde æstimari poterit.

Partium organi, inquit *Galenus* 1. *us. part. 10. 4. us. part. 12. 7. us. part. 12. de differ. mor. 6.* unam & certam ex se actionem promentis, aliæ sunt in ipsa actionis causâ (partes principes has alibi vocat,) aliæ ita se habent, ut fine iis non fiat actio: aliæ faciunt, ut earum ope melius fiat: aliæ denique ad harum omnium spectant conservationem. Nulla harum, quod mireris in tanta paucitate (tres enim omnino sunt) Lacteis nostris deest. Vis causam distributionis principem? Ecce tibi fibras rectas, & transversas. Vis alias? en fibras obliquas, Carnem, Membranas.

De fibris non me fugit, quod etiam supra monui, eas venis *Vesalium* omninò negare: Fallopium, etsi admitit, (quamvis ægre id quoque) nihil tamen prorsus eorum, quæ nos, iis tribuere. Sed esse rectas, transversasque his venis nostris, ut

& aliis, principis partis vicem, facile ratio vincit. Nam nec partem ullam aliam similem illis reperire in corpore est, quæ una est, & præcipua principis partis 4. *us. part. 13.* prærogativa. Et jam ante ostensum est, rectas tractui transversas pullui præesse. At enim tractu, & pulsu, omne, quantum est, distributionis munus perficitur. Accedit *Galen* 3. *Fac. nat.* 8. 5. *us. part. 11.* 14. *us. part. ult.* auctoritas, qui *commune* id ait *naturalibus omnibus instrumentis*, ut non nisi fibrarum ministerio, beneficioque moveant: tum arteriis, quarum (quod quidem hanc ad rem pertinet) eadem planè est, quæ venarum, ratio, perspicuè fibras, quibus transmittant, 6. *us. part. 13.* attribuit.

Quibus omnibus fit, ut facilè seorsim à Fallopio sentiam. Quid enim contra ille? Vult ad solam *δυσπάρθειαν* datas venis, ne rumpantur à violentis sanguinis cursibus, extentâ illarum ope in omnes partes venæ tunicâ. Trahere autem, aut pellere duplici argumento negat. *Altero à structura eorum petito.* Quia ita, inquit, latent in membrana, ut potestate, quàm actu ineffe videantur; tum ita intertextæ sunt, & in sese mutuo implicatæ innexæque, ut moveri nullo modo possint. *Altero à sensu,* Quia nec contractio in illis, nec dilatatio cernitur. At cerni debebat, si traherent, pellerentque, exemplo gulæ, uteri, aliorum. Atque ex his illud tandem concludit, tractum illum earum, & pulsum, quia fiat illis quietis, non nisi æquivocè ita dici posse. Nolo hic illud negare, ad *δυσπάρθειαν* etiam facere. Illud aio, quas contrà tractum, pulsumque istarum fibrarum adfert rationes, minimè mihi videri militare. Etenim fibræ istæ, etsi non ita conspicuæ sunt, tamen conspiciuntur, & verè, ac reipsa sunt, nequaquam potestate tantum. Id quod fateri ipse Fallopius cogitur, modo constare sibi velit. Quomodo enim earum ope extendi membrana potest, si non sunt? Illud de motu sensui conspicuo *μυδὴν πρὸς ἑπ.* Non omnium fibrarum, sed carnosarum tantum, quales in gula sunt, ut ipse fatetur Fallopius, proprium est manifesto, & perspicuo cum motu trahere, aut pellere. Nec de textura quod dicit, quicquam cogit. Cordis quoque fibræ variè, & multipliciter intertextæ sunt, an ideò moveri earum operâ cor definit? Jam quod eum tractum, qui fit, parte non motâ, ex Averroe, ut inquit, æquivocè tantum tractum esse affirmat, in eo, ut nihil hic dicam aliud, aperte *Aristoteli* contradicit, cujus hæc sunt 7. *Phys. t. 10.* τὸ δ' ἔδεν ἀσφέρει, κινούμεν τὸ ἐλκεῖν, ἢ μὴ οὖν ἐλκεν. *Cum sit tractus, nihil refert, quiescat, id, quod trahit, an moveatur.* Atque de fibris rectius simul, ac transversis ita res est. Quid de fibris obliquis, de carne, membranis? Illarum quoque singulæ, quod suum est, agunt.

Fibræ obliquæ ad meliorem distributionem faciunt. Vetant præcipitare chylum ad jecur, dum contendunt se vicissim, & explicant. Eædem ejusdem præparationi serviunt, qualem quidem explicavimus. Nam inter moras castigatur. Privatam quoque partis coctionem promovent, cum elabi non sinunt, quod semel suæ nutritioni, suisque necessitatibus illa seposuit.

Caro fibrarum spaciis interfusa, vice causæ est sine qua non. Quippe explens, quæ inter illas inanitatis; tum ipsas jungens, ac uniens simul, spacium eis præbet contrahendi se, laxandique; simul contractioni opitulatur, quam disjunctæ à sese, & divulsæ, quomodo rectè obirent? Eidem præparatio chyli debetur, & propè

propè tota. Nam, & carnis cujusque partis proprium est coquere, quod in ea est: & fibris, ac membranis ipsa calore præstat, ut jam ostendimus.

Membrana, quæ venis propria est, tutelæ in primis, ac custodiæ comparata est, non carnis modò, & fibrarum, sed & coërciti, conclusivæ intrà illas succi. Id quoque adfert commodum, omnibus membranis commune, ut cum distendi promptè, & rursus contrahi apta nata sit, sine periculo, nunc minorem, nunc multò majorem chyli copiam admittat, prout res scilicet, & usus, ac necessitas postulant. Membrana ascititia, & exterior, qua vestitæ extrà jecur venæ istæ sunt, ad custodiam ipsa quoque refertur. Data ideo est, sicut venis cæteris quoque, 7. *Anat.* 5. ut longo illo, quod est ab hepate ad intestina, itinere, tutò eas deducat, fulciat, & cum Mesenterio, ac vicinis partibus colliget. Eo quoque prodest, quòd sensum eis præbet, quo extra hepar constitutis, non minimum ad provisum, propulsumque noxiorum, ac molestorum illis erat opus.

C A P U T XXVII.

Ex iis, quæ insunt, Temperies quid Lactearum actioni accommodet? quid item, quæ consequuntur, albor, levitas, tenuitas, & raritas tunicarum, fibrarum durities? Temperies frigida, & sicca robur parit, & constantiam in primis tribuit. Albor materiam necessitatem sequitur, fors etiam levitas.

NON fatis est, ut diximus, si partium organi singularum, suas quæque, ad promovendam illius actionem, vires intendat, ac conferat: oportet hoc amplius, ut ea quoque, quæ in parte qualibet insunt, Temperies puta, Quæ consequuntur, Quæ accidunt, mutuas eandem in rem operas tradant. Hæc enim illa sunt, inquit *Galenus* 1. *us. part.* 9. per quæ & agit pars quælibet, quod debet, & præstat, quæ agentis sunt ex usu. Et ista igitur nobis videnda sunt.

Ac in Temperie quidem non est quod diu immoremur. Sive enim ipsamet facultas illa est, sive facultatis primum, & proximum instrumentum, quantam ad omnem actionem vim habeat, ignorari nullo modo potest. Per Temperiem, inquit idem *Galenus* 1. *us. part. ibid.* quæ propria substantia est cujusque partis, magna ex parte organum quodvis suam actionem nancisci invenies, si ratione, & suis ponderibus rem examines. Et sanè, frigiditas, & siccitas, ut, cujus proprium est contendere 3. *Simpl. de terra Samia, & passim.* partes, & adducere, & in unum cogere, tum iisdem præstare stabilitatem 9. *Meth.* 17. *H.* ac firmitudinem, non potest non plurimum, præter cætera, & fibrarum augere robur, & ad omnem actionis constantiam proficere. Scitum illud est plus posse vires junctas, & unitas. Sed refertur in primis ad privatam nutritionem ejus vis, quæ actio est, ut ostendimus, singulis partibus communis. Temperies enim ista est, ait *Galenus* 1. *Facult. nat. cap.* 3. qua pars quælibet tum familiaria sibi allicit, complectitur, coquit: tum aliena expellit, atque à se segregat.

Inter ea, quæ consequuntur, eminent, & præcipuam animadversionem requirunt, Tenuitas, & Raritas, quæ in tunicis istarum venarum cernitur, quæ in
jecur

jecur se inferunt pōtiffimum, sed & extrā jecur. Utrobique usum præbent non contemnendum. In hepate in causā sunt, ut & citiùs in ipsum, & pluribus modis chylus transsumatur, quem usum *Galenus* 6. *us. part.* 10. suis quoque Mesaraicis tribuit, etsi falso. Extra jecur id præstant, ut faciliùs, ejus beneficio, in corpora ipsis substrata, quicquid inest chylo cœnosæ humiditatis, ut *Hippoc. lib. de Glandulis*. loquitur, deponatur, & sic quod reliquum ejus est, purius, defæcatiùsque ad hepar perveniat.

Non eadem in cæteris hujus generis dignitas, & explicatus habent faciliores.

Fibrarum illa mediocris durities, quæ frigidæ, 1. *de præsaq. expuls. cap.* 4. & siccæ partj, & ex lenta materia conditæ, assidet tantum non necessariò, quem habeat usum notius est quam ut pluribus dici debeat.

Album earum, sive ut Plautus albitudo, ut Varro albor, nihil habet ad usum peculiare Nempè materiæ, ex qua conditæ primùm venæ istæ sunt, id est feminis, necessitatem sequitur, ut in cæteris omnibus partibus, quibus origo ex illo est.

Simile de lævitate est, si *Galen.* 2. *progen.* 21. modo fides est. Et ipsa enim materiæ comitatur, ubi æqualiter scil. percocta à natura fuerit, ita ut nulla pars ejus effugerit vim, ac facultatem. Si tamen ex his quoque usum omninò velis, non decuit per lævia viscera intestina, & jecur, venas nisi læves, & æquabiles undique perducere.

CAPUT XXVIII.

Quæ accidunt Lacteis, quos ex se usus in actionis commodum promant? 1. *Figura.* 2. *Asperitas.* 3. *Cava, & Meatus.* 4. *Valvula in meatibus.* 5. *Angustia.* 6. *Continuitas.* 7. *Numerus, & Magnitudo.* 8. *Situs.* 9. *Insertio.* 10. *Modus insertionis.* 11. *Crusta quæ in intestinis.* 12. *Adeps.* 13. *& glandula, quæ in Mesenterio.* *Hippocrati lux.* τὸ τελευγώδες quid? *Fallopj meatus oleaginosi.* *Bolus, seu buccæa dulcis.*

AD partis integritatem, plenamque & perfectam absolutionem non necessaria minus sunt *Quæ illi accidunt*, & communi Compositionis nomine à Medicis comprehenduntur, quàm aut ipsa Temperies, aut quæ Temperiem consequuntur. Nimirum non per illa, quam per hæc feciùs, aut agunt partes id ipsum, quod agere aptæ natæ sunt, aut ad suos, & necessarios usus, opportunitatesque instruuntur. Organum apprehensionis manus sunt. Quæ actionem tam insignem, tam homini necessariam, & tantum non propriam moliuntur? Per conformationem, respondent, post *Hippoc. de integrit.* 1. 20. *Aristotel.* 4. *part.* 10. & *Galen.* 1. *us. part.* 5. 9. 10. Nisi sic divisa esset in digitos, nisi digiti ita distincti articulis, ita sibi invicem oppositi, nil complecteretur, nil teneret. Chylum, ut ad rem nostram veniamus, distribuunt Lactææ. Quemadmodum peragitur distributio ista? A fibris per Temperiem suam, sed, ne vacillet quid aut claudicet, titubetve, præter cætera, imò suprà cætera, præstante suos usus, & tanquam operas, reliquâ totius venæ compositione. Et hos ergo Usus explicare oportet, qui soli

adhuc ex iis supersunt, quos propriè, & simpliciter partis Usus diximus. Fiet id hoc capite, & ordine ipso illo, quem suprà quæ Lacteis accidunt, in Historia, tenuimus. Nam quot sint, & qualia, quam varia item, & multiplicia, satis jam ibi dictum, declaratumque est.

1. Figura n habent Lactææ teretem, & oblongam, quia ad remotam partem distribui succum, quem vehunt, oportebat. Est enim, suprà cæteras omnes, eiusmodi distributioni, figura accommodatissima *de differ. morb. 3.* quâ, & ideo Vasorum reliqua omnia genera, arteriæ, puta venæ, nervi sunt donata.

2. De Lævitate, quæ in extima tunica, jam egimus. Inæqualitas verò illa, & veluti asperitas interior, ad chyli moram nonnihil facit, & per eam ad meliorem quandam, qualiscunque ea sit, præparationem. Quo enim quid moram trahit in parte diutius, eò coquitur ab ea rectius, & felicius, ut illud non male huc poetæ conveniat, *Habent parvæ commoda magna moræ.*

3. Cavis suis, & veluti meatibus destitutæ si essent, ne distributio quidem chyli ulla esset. Hinc fieri adeò videmus, ut occlusis, obstructisque his ceu canaliculis, aboleatur quoque continuo, ac pereat ipsa distributio. Et rectè *Galen. de differ. morb. 7.* *ἀνάσσει vena functio est, non quὰ corpus illa est, sed quὰ meatum habet.* Præcipuus hic usus est. Sed eum alius excipit, nec ipse levis, quod in iis meatibus tanquam *ὡφύλακῃ*, id est, in custodia, chylus non continetur modo, sed incorruptus etiam, ac integer præstat, conservaturque. Ut enim extra venas effusus sanguis in quamcunque partem, uno *Aristot. 4. Hist. 19.* excepto corde, concrescit mox, putrescitque; ita chylo quoque usu venit, si ex vasis suis alio, quàm in hepar excidat. Scilicet vim quandam, nec mediocrem habet locus, conservandi, quod collocatum in eo est, ut docet philosophus *4. Phys. t. 15.*

4. Valvularum, quas obditas meatibus intus foràs diximus, unus idemque hic, qui cæteris omnibus in partibus, quibus adsident illæ, usus est, impedire scilicet, ne quod semel haustum est materiæ, inani, atque irritò labore, remect vicissim, ac restagnet in partem, unde haustum est id. Quod adeo exactè hîc præstant, ut nec digitorum compressu, nec alio nisu ullo retrò cogere unquam, semel conceptum in iis liquorem, etsi varie id conatus, potuerim.

5. Perangustæ sunt in hepate, & ad intestina. Utrobique, ut quam fieri potest in minutissimas partes divisus, distractusque chylus, illinc trahitur, hîc alteretur commodius minima quaque sui parte, à vi hepatis contactus *V. Gal. 4. us. part. 7. Avicen. 1. 1. doct. 4. cap. 2.*

6. Continuæ sunt omnes, & partes unius, seorsim nulla usquam, quod, ut rectè *Aristot. de venis 2. de p. 9.* animadvertit, nisi suæ origini continuæ tenderent succum, quem vehunt, conservare illæsum, inviolatumque nequaquam possent. Quippe profluens ab origine calor, is demum est, qui fovens, tutansque succum, facit, ne aut concreascit inutiliter, aut etiam putrescat.

7. Plurimæ sunt, fusæ per omnia intestina, eæque parvæ: non una aliqua, & ampla. Primum ne crassæ, & inutiles chyli partes, simul cum inutilibus temerè in eas subeant. Deinde ne quid succi utilis eas præterlabatur, & si quid illius *Galen. 4. us. part. 17. auct. lib. de anat. vivor. quâ de intestinis.* unum earum, aut alterum

alterum ordinem subterfugiat, id comprehendatur in aliis. *Tum* ut citissime quidem *Galen. ibid.* quemadmodum oportebat, non tamen confertim, & tumultuariè fiat distributio. *Denique*, ut ne continuo cibo ingerendo *ibid. &c. 18.* vacare cogamur, quod si esset, hominem *ἀμυτον* faceret, raptim, & abundè, quod ingestum ejus est, per viam amplam exhausto. Numero Mesaraicas vulgares multum, ac multum superant. Non injuria. Plus multo chyli ad totius providentiam jecori, quàm sanguinis intestinis in privatam nutritionem, debetur. Plurimæ ad gracilia, pauciores aut ferè nullæ, ad crassâ pertinent. Id quoque rectè. Illa nempe distributioni, ista excretioni in primis serviunt. Illa succi alibilis, ista fæcum, & purgamentorum inutilium sunt receptacula.

8. Locum imo in ventre obtinuerunt. Culinæ enim corporis, & nutrimenti officinæ, cujus ibi sedes est, famulari eas oportebat, bajulorum 4. *us. part. 2.* instar, qui triticum ex agris, ad communem aliquem urbis locum, seu furnum, coquendum ibi, mitigandumque in panem deferunt.

Quod venis, & arteriis minùs in abdito sitæ, & magis in propatulo sunt, id vasorum illorum dignitati tributum est. 16. *us. part. 11.* Ut enim necessitate nihil fortassis, ita dignitate minime parum illis utrisque concedunt, sive succum spectes, quem dispensant, sive munus etiam officii, quod per se, & prima ratione, in solius jecoris gratiam comparatum videtur. Consuevit autem natura semper quod dignius est, ei de tutiori quoque, ac digniori loco providere. *Galenus 1. us. part. 17. 2. us. part. 3.*

9. Inferuntur in intestina omnes, nulla in ventriculum, nec minima quidem Ratio. *Quia*, ut rectè *Galen.* etsi sibi parum in hac re constans (nam ventriculo quoque suas Mesaraicas alibi addicit, etsi pauciores) digestionis organum 4. *us. part. 1. & 17.* est ventriculus, non distributionis. Fieri nullo modo poterat, cum agant necessitate naturæ quicquid agunt, quin crudum, & rudem adhuc chylum, si ad ventrem etiam pertinerent, direptum ex eo, ad hepar traducerent, non sine ingenti œconomix totius corporis confusione, & irreparabili coctionum succedentium detrimento, quarum nulli redintegrare datur, quod peccavit quæ præcessit.

10. Ad intestina nisi hiarent oscillis suis, hirudinum instar, sicut diximus, nec trahere possent ad se chylum; & promiscuè pellentibus in ea intestinis, non chylus magis, quàm, quæ mixta ipsi sunt recrementa, atque reliquix confecti cibi, ad hepar per ipsas concederent, nunquam ibi sanguinis specie rectè exornanda. Quod probè *Gal.* vidit, & ideò suis quoque Mesaraicis, eum, quem verè nostris damus, insertionis modum adscripsit, ut suprâ, laudatis ipsius in eam rem locis docuimus.

11. A Crusta oblinente gracilia intestina, in quam finiunt, duplex commodum illis accedit. *Primum*, vicem tanquam operimenti exhibet oscillis earum, ad interiorum intestinorum capacitatem hiantibus, ne oblitteratis illis, occæcatisve à sordibus chyli aut pereat distributio, abolescaturque, aut frustretur saltem, ac interpelletur. *Deinde* veluti pro filtro est, per quod sensim, & ceu guttatim chylus ad eadem oscilla, sugendus ab iis, appellit sese atque insinuat.

12. Adeps, præterquam quod usum præbet ceu mollis strati, cui incumbant, calorem quoque earum fovet, quo sic ejus ope tùm tractio ipsa, tùm præparatio felicius absolvatur.

13. Ad eandem caloris rem Glandulæ quoque faciunt, ut jam olim observatum *Spur. f. 63.* auctori libri de utilitate respir. Præstant eædem istis venis, illos quoque usus, quos præstare cæteris Mesaraicis vasis diximus ex communi sententia, quierant, instar propugnaculi firmare eas, quâ dividuntur, & in divortia varie abeunt, fulcire in reliquo progressu, ac tutò deducere. Qui usus earum, ut non sunt contemnendi, ita meo judicio maximus, & Pancreatis præcipuè (si tamen hoc non principii magis, quam simplicis glandulæ subit vicem, de quo supra dubitavimus) ille est, quem facile candor illarum insignis, & substantiæ ipse modus arguunt, cænosiozem, crudiozem & pinguiorem chyli partem sese corrivare, ac combibere (modo non dissimili, quo in fætu jecur, seu placenta uteri nuncupata, quod in materno sanguine fœculentum est, exhaurit in sese, & absorbet) quò sic, quod restat illius, purius, liquidiusque ad hepar, in sanguinis ibi formam induendum, subeat, & permanet. Atque hoc omninò illud esse mihi persuadeo, quod *Hippoc. lib. de glandulis.* dixit ὅτι τελευτάδεια, ἐκεί η̃ ἀδένεις. Hoc enim τελευτάδεις nihil aliud mihi est, quàm chyli illa, quam dixi, cænosior, & impurior portio. Quos enim *Fallopins de venis observ. 3.* ponit in sima hepatis meatus, qui in Glandulas, & Pancreas inde porrecti, oleaginosum quandam succum flavum, & subamarum in illas eructent, deponantque, mihi videre nondum contigit. Et quod de succi amarore dicitur, id satis Pancreatis caro convincit falsi, ita palato grata, ut inde vulgo etiam nomen invenerit, Dulcis boli, seu Dulcis buccæ, ut quidem Carpus annotavit.

Usus plures tam Philosopho quam Medico accedentes ex Venarum harum cognitione ex Authore ipso petere licet.


Scripserunt & post Asellium de vasis Lacteis varii, præcipuè Rolsinkius in Dissert. Anatomis, Meibius in Fundam. Medicis.

Notandum, in his quæ ex Asellio adduximus errorem eum occurrere, quod ad Hepar vasa Lactea excurrere tradat, hoc enim quod Venam Porta corollæ instar cingere, sicque ad hepar pergere docet, Lymphæ ductus sunt tempore Aselli ignoti.

EXPLICATIO.

Ventriculum, Intestina, & Mesenterium, cum Vasis Mesaraicis quatuor generum per illa hinc inde distributis, exhibet.

A Vena Mesaraica vulgata, Porta rami, cum Arteriis mesaraicis.	F Intestinum duodenum.
B Vena Lactæx discurrentes per mesenterium ad intestina.	G Jejunum intestinum.
C Mesenterii portionem: unâ etiam Nervorum Mesaraicorum per eam distributionem signat.	H Ileum intestinum.
D Ventriculi fundus.	I Vena & Arteria fundum ventriculi perreptans.
E Inferius Ventriculi orificium πύλωρ & vocatum.	K Omenti pars.
	L πρυγγία & portiuncula: in quam Vena lactæa, inter se implexa insinuantur, formâ capreolorum.



P A R S III.

De Labyrintho Ductûs Roriferi.

Ex Anatome Anatomia Bilsiana Jacobi Henr. Pauli.

CAPUT Anatomiaë BILSIANÆ VI.

*De Labyrintho Ductûs Roriferi, collatis invicem Nob. D.N. BILSII, cum nostrâ,
& Descriptione & Figurâ.*

Uterius antequam progrediar, illud admonere non importunum arbitror, *Buenium* interpretem Speciminum *Bilsi*, in usu vocis Labyrinthi nimis facilem fuisse, & hanc nomenclaturam potius à re subintelligenda aberrare. Si prescè cum *Bilso* loqui, & vocabulo, magis cum Belgico *Wronz* conveniente, gyrorum & anfractuum in ductu Rorifero circulum exprimere studeamus, Spiræ nomen aptissimè posset surrogari, quod propriè, quicquid in orbem convolvitur, & *Servio* teste 2. *Aneid. v. 217.* volubilitatem funium denotat, deque Serpentibus dum in spiras se colligunt, etiam usurpatur. Sed quia aliis hanc appellationem retinere placuit, neque nos ipsam taxabimus. In rem verò præsentem ut veniamus, quædam nobis ex *Nobiliss. Bilsi* Epistolica Dissertatione repetenda erunt, ubi pag. 22. missis ceteris ramis, quibus à glanduloso Mesenterii Receptaculo totum corpus inferius superiusque instaurari perhibet, maximum (aliàs Chyliferum nuncupatum) prosequuturus, describit illum perforato Diaphragmate perreptare Pleuram, & circa V. aut VI. Thoracis vertebam ad claviculas insurgere, à superiori porrò costâ, canali quodam trans pectoris glandulas (quo in loco alteri, desuper à Receptaculo, ut vocat, tortuoso, dextram versus decurrenti ramo conjungitur) ad Pericardium plurimis tubulis pertingere, aliaque appendice, inferius propè Pulmones, Asperæ arteriæ duas glandulas invadere, supra Cavam autem, in quam se aperit, circa venæ axillaris & jugularium origines, instar Labyrinthi contorqueri, atque illud tortuosum Receptaculum efficere, ac protrusis ad colli glandulas duobus tubulis (quorum dexter in tres, sinister in duos canales dividitur) demùm in glandulas salivales, lacrymales, & pituitarias influere ac terminari. Et hæc quidem ita se habere, geminis Figuris, quarum altera exsiccata vasa, altera eorum naturalem in Molosso situm ob oculos ponit, universo Orbi voluit esse manifestarium. Retulit mihi Vir fidei plenus, in arte secandi peritissimus, D. D. *Henricus Moinichenius*, S. R. M. Medicus Aulicus, tanti facere *Bilsum* posteriorem Tabulam Ductûs Roriferi, ut si quis illum convenerit, de mæandris hisce rectè institui cupiens, nil aliud responsi auferat, quàm consulendam esse hanc Figuram, in quâ nihil desideretur, quæque sit omnibus suis partibus perfectissima. Sine affectu dicam quod sentio, Cisternam cum tubulo ejusque furculis & accumbentibus glandulis liter. C. C. D. & N°. I. I. 2. notatis, inguina versus, eleganter magnoque artificio esse expressam, reliqua, circa

circa venam jugularem, & Caput versus, non tam spectatorem obtutu in uno Circulo defixum, quàm in dubio suspensum tenere, & plurima desiderari. De quibus ut unusquisque facere queat arbitria, ipsam Tabulam, quâ parte in controversiam venit, hîc subjungimus.

Hanc ergo Tabulam si quis attentius intueatur, quomodo mihi Collum à Thorace, & Thoracem ab infimo ventre distinguere, aut ductûs Roriferi terminum, aut saltem cum aliis partibus connexionem ostendere possit non video. Omnia hîc sunt perversa & quæ ad meliorem informationem meritò adesse debuissent, v. g. Aspera arteria, cum ejusdem glandulis, Pulmones cum Pericardio, ceu quarum partium in Descriptione suâ meminit *Bilsius*, planè sunt omissa. Pictori equidem imputarem, quum nunquam effigies adeò exactè ad vivum exprimentur, quin ipsi auctores multa in iis desiderent: Sed consulto hæc facta esse apparet, tam pulchrè Intestina distorta, & sursum attracta, insertionem Rami (G) in glandulas thoracicas adoperiunt, sicut laxior pellis circa maxillam relicta, progressum furculi (K) versus superiora contegit. Quod a. ductus Roriferus (A. B.) uno & continuo canali usque ad gyros ejus procedat, neque venam axillarem subire significetur, inventoris & conjecturæ & ingenio adscribo, qui hæc ita adornavit, ut suum inventum tantò mirabilius redderet, quod cum arteriis venisque familiaritatem colere negat, atque ut Roris, ab intimis ad exteriora distributionem, in Figurâ commodius demonstraret, quæ in vivo animali vix ac ne vix quidem deprehenditur. Nulla insuper vasorum Lymphaticorum propè axillares ab artubus prodeuntium fit mentio, & nescio quam obrem alter pedum à scapulâ aut tergo sit avulsus, & dextrorsum inclinatus, si Thorax anticâ non posticâ parte dissectus fuit. Neque etiam vel verbulo indicatur, an in sinistro tantum, an in utroque simul latere ejusmodi Labyrinthus existat. Quin ipse investigandi modus reticetur, ut facilius sit centum Gangis ora, vel ostia septemplex Nili Istrique, quàm tortuosos istos ductus ex Tabulæ hujus præscripto invenire.

Absit tamen, propter unum alterumve errorem animadversum, quod tot tantorum Virorum non vana testimonia verum esse comprobarunt, cum *Cl. D. van Horne* pro figmento reputaverim. Tentare negotium malui, quàm temere quæ nunquam experiri conatus eram, rejicere. Spes quidem initiò erat, mihi ad istud exsequendum, admotâ sectioni manu, fore subsidio quod famigeratissimus *D. Franc. de le Boe Sylvius Disp. Med. de Vas. Lymphat. Th. 14.* suspicatus esset, divaricationes reticulatas trunci ductûs Thoracici, pro contorto *Bilsi* mæandro esse habendas, ab insigni Anatomico *Ol. Rudbeckio Tab. 2. Fig. 4. lit. Z.* jam ante decennium delineatas. At enim, quum illa me, licet sedulo præcordia excutientem frustraretur; novitati nihilominus inhians, num qui furculi in superiorem colli glandulam abirent, quærere constituebam; ex inspectâ subinde *Bilsi* Tabulâ, eos inter Oesophagum & venam jugularem, ut videbatur, dextram, ad insertionem properare, certior factus. Et ecce musculis in dextro latere non festinatâ diligentia aliquantulum secundum fibrarum ductum divisus, infra asperam arteriam non procul à nervis recurrentibus, furculus quidam pinguedine obductus

obductus conspicuo splendore prominebat. Qui dum injecto vinculo desuper intumesceret, occasionem præbuit, ut aliâ atque aliâ ligaturâ illum persequendo, ex glandula maxillari oblongâ, turgidâ, in confinio ossis Thyroidis, originem capere cognoverim. Exploraturus postea sinistrum quoque latus, glandulam istam, & Parotides, & reliquas circumjacentes glandulas conspiciebam quidem per omnia oppositis similes, sed prodeuntis exinde canalis, qui tum disparuerat, indagine, alii tempori reservare tenebar, factumque paucis interpositis diebus, ut magis clarum, & ulterius se diffundentem offenderim. Neque interea ex hoc Labyrintho me evasisse clamare poteram, nisi sæpius celebratâ sectione rem hanc ita absolvissim, ut de ea non dubium superesset amplius. Quid multis? totos eecem mihi ab Amicis illum in finem suppeditatos. Canes ἀνέτηκον, ac quoties vascula hæc producerem (produxi autem semper) toties Parenti meo carissimo SIMONI PAULLI, & semel D. D. BARTHOLINO, Præceptori meo observantissimo, quem ad hunc actum intra privatos parietes invitaveram, tantò majori cum voluptate demonstravi, quantò ipsis gratius esse intelligebam, quod me Filium ac Discipulum in Anatomicis aliquid pro virili conantem spectarent. Qui quum mihi sint instar omnium, non lubet alios, quotquot præsentibus fuerunt, nominatim adhibere testes. Verùm Figuris certat *Nob. Bilsius*, atque ad Tabulas suas provocat, quibus Præclarissimum *D. van Horne*, sed dispari congressu lacecessit, siquidem Ductus novus Chyliferus, quem hic Vir summæ industriæ inter primos divulgavit, Thoracem egressus, ultra jugulum non ascendit, & per se considerandus venit: estque *Bilsi* Receptaculum tortuosum cum suis gyris, anfractibus, tubulis, ramis, furculis, nihil aliud, quàm Lymphaticorum jugularium ex superioribus glandulis ad axillares, & quidem utrinque, propagines, in quibus Natura pro varietate Subjectorum, eo modo ut in manuum pedumque venis, mirificè ludit, quæque & mihi diverso tempore aliter atque aliter se obtulere. Ut plurimum tamen hunc servarunt ordinem, ut ex Glandulâ illâ oblongâ maxillari, quæ Parotidi conglobatæ & glandulæ thyroidæ *Warthoni*, circa laryngis sedem interjacet, instar vasorum spermaticorum *ἡ ἐπιδιδυμίδων*, testibus incumbentium, solitarius canalis, sed tribus vel IV. interdum ramulis, qui sæpe eum alio ramo, ex minori glandulâ, quæ Carotidi arteriæ & Venæ jugulari internæ, sed non semper adjacet, concurrunt. Is canalis deinde Oesophagum, cui infernitur, deferens, jugulari externæ se associat, & sub illâ incedens, modò transit, modò præterit duo alia lymphatica, quæ ex glandulis Cervicalibus in medio colli proficiscentia mutuò se amplectuntur atque invicem stringunt, & multas ramificationes, minimè verò, nisi mente fingatur, perfectum Circulum efformant. Sit itaque hic famosus ille Labyrinthus, & inextricabilis error. Omnes autem istæ vasorum propagines, ubi furculum Jugularis externæ (cui quoque exigua subinde apponitur glandula) ad musculos mastoideos abeuntem, attigerunt & superarunt, in communem præcipitantur alveum, ampullæ similem, ventre amplo & quasi inflato, ut à *Bilsi* haut absurdè Receptaculum vocari meruerit. Ex hoc tandem geminæ rursus appendices extenduntur, quarum una propè fistulam Asperæ arteriæ, quo in loco Carotides è trun-

è trunco affurgunt, venam axillarem; altera paullò distans, Jugularem externam intrat. Quibus etiam aliud vas Lymphaticum, quod hæcenus ex artubus derivarunt, ex glandulis subaxillaribus supervenit, ita ut plurimarum insertionum: inferiùs ductûs Thoracici; à latere, vasorum axillarium; ac desuper, Lymphaticorum jugularium; quin & ex Thymo orientium (quò etiam ramum in *Bilfsiana Tabula lit. H.* signatum, referendum esse arbitror) fiat concursus. Et potui sanè in cunctos hosce rivos, comprimendo vehementius Axillarem & Cavam venam, circa illorum orificia sanguinem adigere, licèt statim à repugnantibus valvularum nodis longiùs subsequi prohiberetur. Equidem & alii de principio ac ingressu horum vasorum nonnihil se observasse dicent, sed veram connexionem, nemo adhucdum, quod sciam, publico asseruit. Neque enim ad Thoracem pertinent, neque humorem suum ad circumferentiam movent. Desuper veniunt, deorsum tendunt, & in jugulo terminantur. Nec inexpertus ista jam divinavero, *ἀναὰ β' εἰς δ' ας.* Unde & nostræ huic narrationi consentaneam observationum Tabulam fidelibus oculis subjicere visum fuit. Quam inter & priorem *Bilfsianam* ut magis elucesceret, quod intercedit discrimen, in sinistro latere præparata vasa, quantum licuit, exhibentur. Quibus volupe est, faciant, si velint, periculum utrinque. Haut vereor ne reprehendar, dum res ipsa pro me loquetur: & quantum *Nobiliss. Bilso* competat adoreæ, vel me tacente judicabunt & dignoscent periti.

CAPUT VII.

De Lymphaticorum Jugularium administratione.

LAudem profectò & gratiam apud omnes iniisset *Nob. Bilsius* haut postremam, sibi que majorem etiam conciliasset fidem, si processum inveniendi atque eruendi experimenta sua exactius tradidisset. Quippe, ut aliorum interest, ut intelligant quæ scimus: ita eorum quæ scimus, ut ita tradantur, quemadmodum sciri debent. Pariter nec in Anatomicis sufficit, quicquam posse coràm demonstrari, verùm etiam Scriptis ac Dissertationibus nostris alterum ita erudiri oportet, ut & ipse ostensurus sit aliis, quod notum, quàm occultum esse præstat. Quapropter ut opus hoc insuetis foret facilius, & malè credulis verisimilius videretur, Lymphatica jugularia administrandi modum, quem hîc consignabimus, minimè negligendum fuisse duxi. Atque is, ne pluribus abutar verbis, sequenti ordine institui potest.

Aperito animal vivum, non strangulatum, ne aut fractâ gulâ, aut glandulis circa laryngem vel laqueo compressis, vel loco motis, vasa ibidem quærenda lædantur. Quâ verò post pastum horâ id fiat, parum refert, neque impedit Subjectum esse adhuc jejunum. Observavi tamen iterum ac sæpius, ad investiganda Lymphatica, inprimis conducere, quod liberaliter potitaverit, unde magis turgeant, & contrà, si lacteas lustraturi sumus, solam escam præbendam esse, potum omnino nullum. Initium autem secandi facies, ab infimo

ventre, uno impetu medium Sternon cultello diffindens; venamque Cavam & Arteriam magnam in Thorace ligabis, eâdem prorsus ratione, quam supra cap. III. fufius declaravimus. Mox pellem in jugulo & collo, maxillâ inferiore tenus bene separato, ubi inter pinguedinem in superficie notabis Lymphaticorum tenerrimas propagines, Parotidibus, & reliquis glandulis huc & illuc superstratas, quarum nobis Doctiff. Nic. Stenonis *Observ. de Gland. Oris* §. 40. & 41. descriptionem dedit. His missis, ad Sternon rediens, particulam illius superiorem, adhuc cohærentem, porrò secernito, & utrinque à primâ costâ, (nam bruta claviculis carent) musculorum principia præcido, ut jugulares & axillares venæ cum ascendente cavâ denudentur. Sublato hinc Thymo, & postquam Lymphatica ex artubus, vel veriùs ex glandulis subaxillaribus emergentia vinculo circumdediti, perges in dividendis musculis Sternohyoideis, quos ab Arteria aspera liberatos, ad capitis latera reclinare consuevi. Adjacentem hisce Sternothyroideum poteris deinde evellere, vel magis sursum versùs separare, ut recurrentes nervi cum arteriâ Carotide tibi in conspectum veniant. Tum quæres super Oesophagum canalem lymphaticum solitariè incedentem, & confestim, ubi illum habebis, acu triangulari incurvâ subtùs intrusâ, comprehendes, & filo sericeo simplici vice constringes, ut nullo negotio resolvere, & quoties lubet remittere queas. Nam & in hoc Labyrintho detegendo arcanum usurpabis, quod olim Ariadne Thesèo communicaverat, *ut caca regeret filo vestigia*. Atque ita procedes cum omnibus quotquot occurrent ramis, quorum insertionem tantò citius meliusque deprehendes, quantò propius venæ Jugulari externæ, sed versus truncum illorum, facta erit ligatura. Fallitur hac in parte *Bilfius*, dum ligaturas contendit miris anfractibus & mæandris semper fallere; nec certam inde cognitionem concludi. Præterquam enim quod motus liquorum iis sistitur, haut parùm conducunt ut anfractus istos & mæandros invicem distinguere, & ubi concurrant dispicere, multò sit facilius. Quum jam intercepta vasa post parvam moram satis intumuere, manu sinistrâ Scapulæ suppositâ, collum paulisper attolles, inque eo reliquos musculos transversim incidens, in posticâ parte, circa quartam vel V. vertebam sitas glandulas, quas cervicales antea nominabam, & inde proficiscentia lymphatica rimaberis, peritè ac solerter inter præparandum membranas tractando, quæ refrigerato cadavere, plerumque adeò contrahuntur, ut sæpiculè subjecta vasa sine laceratione divelli nequeant. Unde & idonea eligenda tempestas, siquidem nimis sævam & frigidam, propter pinguedinis & fibrarum in membranis subitam congelationem, ineptissimam esse comperi ad hujusmodi dissectionem, longam & operosam, quæque industrium ac laboris patientem requirit Anatomicum. Postea, ut illorum furculorum omnium in communem & ampullæ similem alveum conspectior fiat introitus, singula relaxabis vincula, & reflexâ nonnihil Jugulari externâ, duos cernes prope Thoracem splendidos tubulos, unâ ab origine pendentes. Quibus filo coarctatis, desuper proruens Lympha statim ampullam hanc extendit, eamque tumescere facit. Hinc porrò duplicem explorabis tubulorum istorum insertionem, quæ sanguine ex compressâ Cava & Axillari venâ immisô, rubore notabilis ipso clarissimè

mè patefcit. Denique, ut omne abfolvas, folitarius canalis, à glandulâ maxillari oblongâ propè Laryngem defcendens, quique nervos recurrentes comitatur, tibi erit profequendus, idque femper novo injecto & fuperaddito vinculo, donec metam, & ramulos dicti canalis ex hâc glandulâ prodeuntes, optato curfu contigeris. Fieri autem non poteft, ut in uno atque eodem Subjecto & dextrum & finiftrum latus excutias, ob cauffam cuivis obviam, fed in alterutro fubfiftas, aut duos fimul Canes in promptu habeas, neceffe eft. Aliàs idem utrinque peragendum: facietque crebrior ufus, ut forfan hâc noftrâ præftantiorẽ methodum aliquando excogitent artifices, quum nulla adminiftratio Anatomica certis legibus fe adstringi patiatur.

CAPUT VIII.

De Lymphaticorum Jugularium utilitate.

QUODNAM aliis in partibus Lymphatica habeant officium, & qualem contineant humorem, non eft ut denuò feorfum perluftramus, quum pridem Vir Clariff. G. Segerus, Amicus nofter vetus, in Differt. de materia Lymphæ Bartholinianæ Artic. I. diffidentes variorum fententias, videlicet *Bartholini, Riolani, Rudbeckij, Bogdani, Gliffonii, Kyperi, Pecqueti, Schenckij, Rolfinckij, Horftii, Warthoni*, ex Scriptis illorum eruditiffimis in unum fasciculum colligendo, & nuper Excell. D. Sylvius *Disput. de Vasis Lymphatic.* huic rei abundè fatisfecerint.

In jugulo & collo fita effe potiffimùm cenfeo. I. Ut pro irrigandâ Afperâ arteriâ, quia cartilagines ab affiduâ aëris reciprocatione facilè exficcantur, unctuofo humori, quo ejus tunicæ perfunduntur, materiam fufferant, & vicinas partes ad motum reddant aptiores. Hôc enim in Febribus ardentibus & Anginâ ob calidam intemperiem abfumto liquore, non tantum molefta fit deglutitio, fed etiam ipfâ vox ftridula, feu ut Medici volunt, clangofa effe incipit, & fpiritus difficillimè trahitur, licèt principiò nullum vel in Thorace vel Pulmonibus exiftat vitium. Quin quod eandem ob cauffam, æftuantem fanguinem incendi, & mufculorum inflammationem in his affectibus magis exacerbari non abfonum videatur, inprimis fi quæ à pofticâ parte prodeunt Lymphatica fimul exhauriantur. Cui rei non exiguam lucem affert *Hippocratis præfagium, lib. Prognof. fect. 2. pag. 12.* Quod tum diuturnius fit Anginæ malum, quum non folùm fauces, fed cervicem quoque rubor occupat. Ex quibus verbis *Galenus 4. de Loc. aff. 4. T. 4. p. 93.* conjecturam facit: Omnes affectus qui huic loco accidunt, fi fpirationem quoquo modo reddant deteriore, ab Hippocrate *κρωγγας*, i. e. Anginas nominari.

II. Ut aquam limpida, certos in fines, à primo inventore & vindice Lymphaticorum feliciffimo *Bartholino cap. 4. Vaf. Lymph.* propofitos, *five ad fanguinem alioquin craffiorẽ nonnihil diluendũ, five calidiorẽ temperandũ, five ad fanguinis concoctionem promovendam* Cordi apportent. Ordiri quippe humoris hujus distributionem & decurfum à fupernis partibus, fufficienter in præcedentibus

est expositum, quicquid reclamet *Nob. Bilsius*, qui vel negligit valvulas, vel comprimendo violentius, ita præter naturam canales dilatat, ut amplitudine suâ valvularum corpuscula demum superent. Ceterum, quis spondebit Catarrhorum materiam, quam per Laryngis vasa & tunicam sudare celeb. *Schneiderus* in operoso de Catarrhis Opere lib. 3. cap. 5. & lib. 5. poster. cap. 3. multorum auctorum unanimi consensu probavit, magnam partem per hos ductus non descendere? quæ postmodum in jugulari & axillari venâ Sanguini permista, & ad Cordis dextrum Ventriculum per adscendentem Cavam deducta, indeque ad Pulmones translata, quum pro alimento apponi nequeat, & copiosior quàm quod satis est affluerit, multorum morborum in Thorace fomentum fiat. Unde vehementissima sæpe concitatur Tussis, ac plerumque Tabem, Phthisin, & Peripneumoniam præcedit ejusmodi destillatio, quæ si tenuis atque acris fuerit, ulcerat & exedit Pulmonis parenchyma, quod *Marcelli Malphigii* Professoris Bononiensis diligentia indagavit, esse aggregatum quid ex levissimis & tenuissimis membranis, quæ extensa & sinuata penè infinitas vesiculas orbiculares & sinuosas efformant, veluti in apum favis alveolos ab extensa cerâ in parietes conspiciamus. Sin viscida sit & crassior, diuque retineatur in bronchiis, scretum, raucitatem, Asthma, & Orthopnæam inducit, nec rarò progressu temporis in calculos & grandinem gypseam concrevit. Si in latera Thoracis, & costas succingentem membranam, exterius vel interius defluat, utramque Pleuritidem generare, aut si magno cum impetu ruat, Catarrhum suffocativum immittere creditur, ut nonnunquam planè obmutescamus, & propter vicinos recurrentes nervos, quorum actio in locis hisce pro re nata impeditur, voce privemur. Potest hinc ratio reddi, quare de improvisò suppresso sudore, aut collo à frigore non defenso, statim Catarrhus subsequatur: cur pariter in Favis & Achoribus puerorum, è quibus perpetuò promanat ichor, glandulæ colli insigniter intumescant ac doleant, & præprimis cur Strumæ quæ hic contingunt, modò crescant, modò minuantur, modò à parte ad partem transferantur, tandemque evanescant. *Tubercula ad aures*, scribit *Hippocrates* *Coac. Prenot. 204. Sect. 2. p. 136.* emolliunt sive (ut *Ludov. Duretus* in *Comment. ad d. l. cap. 4. §. 6.* τὸ λυπώσκειν vertit) equant, tussicula & πτωλισμῶν procedentes. Cujus memorabile exemplum in quodam adolescente vidit & annotavit *Carol. Piso* *Sect. 2. P. 1. de morb. Capit. extern.* ab eluvie ferôsâ pag. 54. Tumor namque non tantum partes in ambitu auriculæ obsidebat, sed per Cervicem Jugulumque in homoplatas & pectus medium usque descendens, in prodigiosam excreverat molem: qui tamen brevi subsedit atque delituit. Causam verò interrogati haut facilius nos expediemus, quàm si horum accidentium, & generatio & solutio ad Lymphatica Jugularia referatur. Sed adscribi etiam his vasis potest, quod iis obstructis, humor aquosus, aut inter cutem & pericranium, aut inter ipsum Cranium collectus effundatur, à quo ὁ ὄγκος φάλον, infantibus maximè familiaris morbus excitetur, & caput totum intumescat.

III. Ardua restat Quæstio, de potu in Pulmones transfuso, cujus exiguum, per rimulam Asperæ arteriæ, & tanquam juxta parietem illabi *Hippocrates* lib. de Corda

Corde sect. 3. p. 50. docet, quoniam Epiglottis, operculum exactum, ne transferit quidem ampliorem potum; idque indicio aquæ, cœruleo colore aut minio tinctæ, si valdè sitienti animali bibenda detur, jugulumque referatum, simili colore infectum sit, amplius confirmat. Eidemque *Galenus lib. 8. de placit. Hippocr. cap. 15. pag. 1075.* suffragatur, & *Platonem* excusat, quod nuspiam ab illo dictum, in Pulmonem per arteriam potionem totam deferri. Neque enim per mediam fistulam influere, sed per asperæ arteriæ tunicam, irroratione quadam inspergi, neque ullum omnino dum delabitur sensum efficere, testatur. His præmissis, expendant mecum qui iudicio pollent, numnam probabilis sit hæc conjectura, quod Lymphatica jugularia (quum asperæ arteriæ cavitas non par sit, aut non patiatur ob molestiam quam inde percipit) ad hoc munus haut ineptè concurrant? Bibere expetimus, quando ingens sitis fauces nostras urget, tandiu donec guttur quasi imbre permaduerit, ut aliquid in Pulmones refrigerandos abeat, nec unico haustu contenti sumus. Ratum utique est, fitim, quæ est frigidi atque humidi appetitus, non à solo Ventriculo, sed à Pulmonibus quoque progigni. Hinc quibus aut calidiores contigère, aut præ æstu, aut nimio motu in cantu & vociferationibus incaluerunt pulmones, bibacissimi sunt, ut & in proverbium abierit, *Cantores amare humores*, nec mirum, qui quotidie altercantur, agyrtas, rabulas, & qui vocem venalem habent, communiter esse siticulosos, quoniam ipsis ab emissio jugi spiritu cartilaginee fiunt sicciores. Qui etiam pro exsiccando cerebro Tabaci fumo utuntur, frequenti cerevisiæ ingurgitatione fauces suas proluant necesse est. Ne de Medicamentis pectoralibus dicam, qualia sunt: Decocta, Syrupi, Eclegmata, Trochisci, & cetera bechica, quibus impacta materia lubricari & expelli debet, quod retroacta per tussim sputamina uberrius evincunt, nil proficientia, si in ventriculum subito præcipitentur; sic, qui citissimâ egent instauratione, modico vini haustu citissimè reficiuntur. Quod non eveniret, nisi vinum, de quo illud, quod vulgò *Euripidi* tribuunt:

Οἷον ποτόν πνεύμονος ἀλφειῶν,

Vinum penetrans pulmonum meatus,

multo præditum spiritu, actutum è gula in glandulas, & porò in ductus aquotios Jugulares posset permeare. Estque adeo huc accersendus *Aphorismus Hippocrat. 9. sect. 2.* *Ἡ γὰρ πόσις ἔστιν ἡρεστέρα τῷ σίτῳ. Facilius est potu refici quam cibo.* Præterea non semel audiui ex Nutricibus lactantibus, se reapse inter hauriendum percipisse, quomodo potus ad humeros defluerit. Quin quod plurima adsint exempla, multos, qui vel inter currendum, vel statim post cursum potitarunt, è vestigio exanimatos fuisse, dum frigidus potus, ad ipsam quasi Cordis arcem affectans viam, nativum calorem, alioquin à ventilatione Pulmonum penè exhaustum, momentò suffocavit. In quibus casibus frustra poros ignotos, aut alia quærimus diverticula. Magnum habet argumentum, quod hi ductus, quos Natura ad recipiendum humidum perquam artificiosè figuravit, altiori situ Oesophago incumbentes, utrumque Asperæ arteriæ latus cingant sepiantque.

De haustulis v. purgantibus negamus quam quidam hîc afferunt consequentiam, quum non exferant vires suas catharticas, multò minùs separentur, nisi sumto à calore nostro mutationis initio, postquam in Ventriculum jam pervenêre. Nam linimentorum, quæ Umbilico ad evacuandum applicantur, & illorum, quæ ex odore purgant, alia est ratio.

IV. In promptu etiam est, ut hoc colophonis loco addam, *si ex cervice D. Pauli quum eam persecutor gladio percussisset, Lactis unda fluxerit*, quod Chrysostomus & Ambrosius referunt, non fuisse adeò mirabile; sed quum amputato capite, Lymphatica hæc Jugularia splendido liquore (quem forsan quod clarius esset, pro Lacte adstantes habuerunt) continuò scaturierint, ex quo sanguis grumescens non amplius profiliret, portentum simile apparuisse. Causarum nempe ignoratio, ut est apud Ciceronem 2. de Divin. in re nova mirationem fecit, quas dum aliæ experientia alias juvant, intento digito nunc possumus monstrare. Verùm & hîc nobis Bartholinus noster, doctorum Virorum Coryphæus, facem præluxit, qui de Lact. Thor. cap. 13. & in Spicileg. 1. cap. 6. & veritatem hujus Historiæ, & naturales vias pressius inquisivit.

EXPOSITIO

Literarum Tabulæ DUCTUS RORIFERI Nobilissimi DN. LUDOVICI de BILS.

A.	Ductus Roriferus à Cisterna usque ad ejus gyros & anfractus.	5.	Infima Colli glandula.
B.	Divisio vel fissura, qua in Ductu Rorifero cernitur circa 5. aut 6. Thoracis vertebra.	N.	Oesophagus.
C.C.D. & 1. 1. 2.	Vide textum nostrum præced. Cap. VI.	O.	Vena jugularis.
E.	Receptaculum tortuosum, quod Ductus Roriferus super surculis vena jugularis ex Cava conficit.	P.	Surculus vena jugularis.
3.	Pars Cava sub Receptaculo tortuoso.	Q.	Surculus Rami Axillaris.
F.	Gyri quos Ductus Roriferus circa receptaculum tortuosum exhibet.	R.	Truncus arteria magna.
G.	Ductus Roriferi Ramus ex Receptaculo tortuoso glandulas thoracica versus subsidens.	S. T.	Arteria magna in Ramos Ischiaticos divisiones, quæ hîc in dimiatatâ Tabulâ non conspiciuntur.
4.	Glandula thoracis.	V.	Intestina distorta.
H.	Ramus qui subter Gyros Ductus Roriferi ex eo in glandulas thoracicas coit.	W.	Rami mesenterici Vena porta, ut & arteria cœliaca.
I.	Ramus Ductus Roriferi supremam colli glandulam versus ascendens.	X.	Vena Rorifera antehac dicta Lactea.
K.	Surculus Rami I. superiora versus tendens.	Y.Y.Y.	Glandula insignis in principio mesenterii, quam Aëllius vocat Pancreas, cum glandulis reliquis.
L.	Ejusdem Rami infimam colli glandulam versus ascendens.	Z.	Tubuli ex glandulis Meseraicis Cisternam versus.
M.	Rami L. separatio.	6.	Intestinum Duodenum abscissum.
		7.	Intestinum Rectum abscissum.
		8. 8.	Renes, inferius in Abdomine siti, & hîc omissi.
		9.	Pars Hepatis cava cum suis lobis.
		10.	Folliculus felleus.
		11.	Pars Pulmonis.
		12.	Vertebra cum costis.



TABULA NOVA

Lymphaticorum Jugularium Correctior.

A. A.	Musculi Sternohioides à Sterno & Aspera arteria separati.	P.	Communis alveus ampulla similis.
B.	Cartilago Thyroidis s. Scutiformis.	q. q.	Geminae appendices, quarum altera venam Axillarem, altera Jugularem exter- nam intrat.
C.	Aspera Arteria fistula.	r. r. r.	Lymphatica axillaria.
D. D.	Oesophagus.	f f. f.	Ductus Thoracicus Pecqueti & Hornii, in in sinistro latere ex Receptaculo Chyli ascendens.
E. E.	Musculi colli transversim incisi.	T. T.	Costae superiores.
F. F.	Musculi cervicis flectentes sub Oesophago.	V. V.	Sternon, bipartitò divisum.
G.	Vena Cava ascendens, & regio Thymi.	1.	Parotis Conglobata inferior.
H. H. H.	Vena axillares.	2.	Glandula parva exterius supra fauces sita.
I. I. & C.	Jugulares externae extra situm.	3.	Glandula Maxillaris rotunda.
K. K.	Surculus Jugularis externa ad cervicem tendens.	4.	Glandula Maxillaris oblonga.
L. L. & C.	Jugulares internae, quae arteriam Caroti- dem, & Nervum recurrentem utrinque comitantur.	5.	Glandula Minor, quandoque deficiens.
m. m.	Canalis Lymphaticorum Jugularium soli- tarius, à gland. maxillari oblonga ve- niens, & Oesophago ex parte instratus extra situm.	6.	Glandula Carnea Thyroidea Warthoni.
n. n. o. o.	Duo vasa Lymphatica ex glandulis cervi- calibus proficiscientia.	7.	Glandula Cervicales racematim compa- cta.
		8.	Glandula Colli, nonnunquam Jugulari ex- terna, sed rarius appositae.
		9.	Glandula Subaxillaris.







P A R S IV.

De Ductu Chylifero.

Ex Historia Anatomica de Lacteis Thoracicis Thomæ Bartholini.

C A P U T I.

Prefatio, & summa tractandorum.

Alimenta in ore prævia per dentes masticatione præparari primum, omnibus est in confesso: eadem masticata per œsophagum in ventriculi capacitatem detrudi, nemo est qui ambigat. In ventriculo concoqui, & in chylum lacti similitimum mutari, humido diluente, acore incidente, & calore fundente, ab aliis fusè est probatum, & alibi à nobis. Factus autem hac coctione chylus quia in ventriculo, qui solo nutritur sanguine, morari non debet, & in totum corpus est distribuendus, ex ventriculo deferri debet, ut termino à quo, ad partes quæ in sanguinem transmutent, ut terminum ad quem, per vias in omni motu necessarias. Et de his distributionis chyli viis ferram controversiarum duxere omni ævo Anatomici, ut tot sensus numeremus, quot capita. Quidam enim immediate ex ventriculo ad terminum seu organum sanguificationis progredi existimarunt; aliis per pylorum in intestina ejusque vasa protrudi fuit visum. Paucis nos in singulorum veritatem inquiremus, omissis in præsentī quæ de termino ad quem dici diffusa oratione possent.

C A P U T II.

Chylum non ferri immediate ex ventriculo ad organum sanguificationis.

Qui ex ventriculo statim abripi chylum, omissis intestinis, crediderunt, varias sibi vias elegerunt. *Galenus lib. 4. Us. Part. cap. 1.* perniciofa pelli infernè tradidit, reliquum verò omne, quod fuerit natura utile, utilius adhuc ab ipso ventriculo redditum, *venis* quæ tum ad ipsum ventriculum, tum ad intestina perveniunt, distribui. Ubi utramque traductionem ad hepar admittit & immediatam & mediatam. *Aquapendens lib. de Ventr.* consentit, sed de chylo tantum tenuiore, *venasque gastricas* expressius nominat. *Carolus Piso in Præf. lib. de seros Colluv.*, *Gastricas* eadem eligit, *Epiploicas*, ut & *vas breve*, per quæ ad lienem chylum deducit. Sed suspectæ sunt omnes hæ venæ, quia Sanguinis sunt non chyli vehicula. In gastricis quoque valvulam locavit natura, quæ nihil ad lienem per ramum splenicum admittit. Vas autem breve, quando lieni inseritur, desert potius acidum ex liene succum, sæpius tamen ex ramo splenico oritur, liene præterito. *Pisonis* sententia falsâ nititur suppositione, quum lien nec chylum recipiat, nec arteriosum sanguinem conficiat, sicut alibi probatum à nobis. Aquo-
fiori verò chylo *Galenī* & *Aquapendentis*, commodiores infra vias assignabimus.

Poros ventriculi & hepatis vel lienis vicini porositates tenuiorem chylum

exfugere verosimile judicarunt *Gassendus* & *Veslingius*, aliusque *Italus*, qui hujus rei titulum divulgavit; Sed me repugnante, quum communis hæc fuliginum sit via, angustioresque sint pori quam pro chyli substantia. Nec ullum hujus ventriculi raritatis indicium in Anatome vivorum deprehendimus, taceo eadem via patere & sanguini ex gastricis & Epiploicis, multo tenuioribus, exitum. Quis denique prohiberet, quo minus alibi quam ad hepar, quam lienem diverteret, siquidem ex *Hipp. lib. de alim.* ἐν ῥοῖα μία, ἐν πνεύματι μία, ἐν παντί πάντα.

Per *distinctum vasorum genus* peculiare derivat ad lienem *Cl. Conringius lib. de Gen. Sang. cap. 6.* aliquando dētegendum, sed solum potulentum chylum non expectata pylori apertione. Variis opinionem argumentis eruditè probat, de quibus in *Reformata Anatome* nuper egimus. Nam suppositione tali nituntur, quam ipse postmodum pro candore suo damnavit. Pylorum enim nondum concocto alimento crassiore aperiri, chylumque per intestina distribui, quotidie in sectionibus animalium hominumque experimur. Et ad vias ignotas confugere infra Anatomici est dignitatem, ubi apparent manifestæ; In minori certè adhæfione lienis, nunquam hujusmodi vias invenimus, quanquam post pastum potumque fuerint suffocati. Jamque summum Virum in aliam propendere sententiam certo indicio suspicor.

C A P U T III.

Chylo vehendo nec Cholidochum, nec Pancreas, nec Mesaraicas vulgares esse destinatas.

AD intestina qui Chylum transire concedunt, quod multorum fuit placitum, illudque verissimum, illa vasa admittere debent, quæ seu in mesenterio, seu intestinis primis conspiciuntur. In primis intestinis seu duodeno occurrit Cholidochus porus, & ductus Pancreatis Virsungianus. Cholidochum, seu Chylo-dochum amat *Gassendus in App. de Nutrit. Anim.* destinatum ob situs commoditatem, non tam egerendæ cholerae, quam ingerendo chylo. Verum enimverò, trajectio chyli in nonnullis fit animalibus, cholidochis destitutis. Imò valvula adest in exitu meatus, vel potius obliquus ductus ingressum prohibens, vetansque in distributione hac nutritium succum excrementis misceri. Præterea observatur in mesenterio distributus chylus satis copiosè, & terminum finesque cholidochi præterisse. Nihili est Riolani in *Anthrop. Nov.* necessitas, obstructis tenuibus & mesenterio; nam ex istis obstructionibus potius mors sequetur & atrophia, imò in volvulo, ubi circa cœcum fit obstructio, experientia *N. Fontani*, vel ipsum cœcum obstruit Ileum observante *Hildano*, vel planè *Ileon* convolvitur, ut in dissectis vidit *Panarolus*, cur cita mors sequitur? Cur nulla per Cholidochum chyli tractio? Abscessus autem in mesenterio & colo, uxorem Mengacii strangulavit apud *Lal. à Fonte in Conf.* In ductu Virsungiano valvula obstat, sive interior intestini tunica valvulae æmula, quæ ne stylum quidem ex intestino admittit, nisi accedente vi, multo minus seu bilem ex cholidochi vicinia, ut contra me suspicatur *Higlmorus lib. 1. Anat. Disq. part. 2. cap. 8.* sive chylum, quod

quod experimento, me iudice, impossibili, inductus *J. Bachius de Cord. sect. 2. cap. 3.* defendit. De qua opinione videnda *Anatome nostra Reformata.*

In Mesenterio hæcenus nota occurrunt tria vasorum genera, nervi, arteriæ & venæ. *Nervi* nullos meruerunt calculos, quia sensui tantum dicati sunt & obscuro motui, adhæc exiles sunt in mesenterio, absque humiditate, nec cavi. *Arterias mesaraicas* exfugere chylum distribuendum voluerunt *Galenus lib. 4. 26. part. cap. 17.* sed modicum tantum, *Varolius lib. 5. Anat. cap. 4.* *Spigelius*, sed in sano tantum statu. Cæterum quanquam *Erasistratus* in hædis lactantibus viderit arterias lacte turgidas, arteriæ tamen non fuerunt, sed venæ lacteæ per nebulam ipsi observatæ. In arteriis enim chylus visus nunquam, nec eo munere defungi debent, si quidem ex certis simis Circulationis demonstrationibus nutritium sanguinem intestinis advehunt, nihil revehunt sive ad cor sive lienem. Igitur in *Venis Mesaraicis* acquieverunt jam à *Galen*i temporibus ferè omnes, qui & ipsi, difficultatibus hinc inde obfiti, in varias sententias scinduntur. Quidam eas dividunt, ut aliæ sanguinem, chylum aliæ vehant. In tempore alii discrimen ponunt, ut alio tempore sanguinem, chylum alio deducant. Sunt tandem qui eodem tempore easdem & sanguinem perferre, & revehere chylum credant, quemadmodum in fluminibus contrarias subinde ferri aquas observamus. Sed nulli ex illis Naturæ institutum unquam sunt assequuti. Nos tantum credimus, quantum manibus palpamus, oculisque videmus. At in venis mesaraicis nunquam visus fuit chylus, sive dilutus, sive purus, sed constans semper & in omnibus sanguis. Revehendi vero ex hepate sanguinis officio, miserè exciderunt venæ, siquidem & ligaturæ in vivis & valvularum situs demonstrent per eas reduci sanguinis reliquias ad hepar, nihilque remeare. Nec cum *Riolano* credimus, necessitatis tempore in omnimodâ obstructione lactearum, hac chylum perferri. Cessabit potius, ut dictum, nutritio, & atrophîa marcescet animal. Et quid ad chylosum intestinorum fluxum reponet? *Harvejo* autem oculatissimo in Anatomicis condonare non possumus antiquum errorem, quum opus non sit vasa confundere, quæ distinxit natura, sciamusque diversum esse vasorum umbilicalium usum in embryone & adulto, nec denique mesaraicas venas chylo impleri videamus, si aliunde influxus impediatur.

CAPUT IV.

Compendiosa Lactearum Asellii Historia.

HActenus per inanes aliorum conjecturas ivimus, qui revera operam luserunt, quod seposito sensu naturam ad rationis normam examinarint. In quo luto adhuc hæreremus, nisi quartum in mesenterio vasorum genus *Cassp. Asellii* Anatomici Ticinensis felicitas A. 1622. nobis detexisset, quod *venas lacteas à coloris splendore nominavit*, quibus universum hoc distributionis chyli negocium natura demandavit. Docet profecto ocularis inspectio, venas sui generis quam plurimas per mesenterium sparsas lacteo chylo turgere in vivorum animalium

juxta & strangulorum post pastum sectione, ipsisque hominibus, quod cum *Tulpio, Veslingio, Folio, Gassendo, Highmore*, nos Hafniæ non semel demonstravimus. Religio sit tam manifestæ experientiae fidem denegare. Progressus Lactearum ab omnibus intestinis, etiam cæco, frequentius tamen à tenuibus & copiosissimæ ad jejunum, unde ad glandulam mesenterii mediam perductæ instar capreolorum vitium implicantur, indeque partim ad Hepar cum porta variis insertionibus abeunt recta, partim ad Emulgentes, partim ad Cavam, quemadmodum post *Asellium Walens*, & omnes oculati observarunt, ut chylum hac semita incedere dubitare amplius non liceat, quod adhibita quoque ligaturâ in vivis certius depræhendes. Distincta autem esse à *mesaraicis venis* vasa, humor contentus indicat, qui vel constans manet post mortem, vel distributione finita dispareret, relicta tantum fibrillarum specie. Nec arterias esse, simplex tunica permittit, quies & candidus succus. Neque cum *nervis* esse confundenda, cavitas probat & ramorum multitudo. Tandem neque *adipem* esse aut adiposæ materiæ receptacula, quod dubium *Gassendus* movit, vel hinc patet, quod accedente cadaveris frigiditate densarentur potius, quam disparerent. Chylum autem proximam pinguedinis materiam esse, *Hippocrati Folioque* adhuc non concedimus, ob rationes in *Anatome Reformata* à nobis allatas, laudatasque à *Riolano*, præter morem hic nobis amico.

CAPUT V.

Novum Pecqueti Lactearum complementum in hominibus à nobis observatum.

STetit hic observantium industria, & confectum distribuendi chyli pensum malé creduli existimarunt. *Asellio* tantum debuisse visi sumus, ut nihil ultra de Lacteis scrutaremur, nisi quorum ipse duxisset lineas & signasset. In Pancreas terminari sive mediam glandulam ratum fuit, & angustis abdominis circumscribi. Excitatae mentes difficultates viderunt, de ramorum inter Pancreas Heparque exilitate, diversasque sed ignotas adhuc vias præfagi futurorum divinarunt. *Asellius Tab. III. lit. T.* originem mesenterii designavit, sed eandem si prosequutus fuisset ulterius spinam versus, plura invenisset. Cæterum hanc curæ laudem & inventionis, reliquit posteris. *Hippocrates* quoque, eumque sequuti *Martianus* & *Cassellus*, chylum ex mesenterio ad mammas detrudi plurimis conjecturis suspicati sunt, sed vias nominarunt nullas præter incognitas & corporis porositates. Nuper verò æternâ nominis sui famâ venarum lactearum Terminum auxit produxitque *Joannes Pecquetus* Diepæus, Medicus Parisiensis, editis Experimentis novis Anatomicis, quibus incognita hæctenus chyli vasa detexit, & publico asseruit Parisiis 1651, trium annorum observatione, quod tamen tribus sectionibus, imò minoribus, aliis videre dabitur. In his duo primus adinvenit in ovibus, canibus aliisque animalibus vivis post pastum quarta circiter hora dissectis. Primum, à Mesenterio seu venis *Asellii* lacteis jam notis, prodire sub iisdem *Receptaculum* quoddam chyli, in quod per varios lacteos ex mesenterio deri-

derivatur omnis chylus. *Deinde*, ex eodem Receptaculo sursum per thoracem ad subclavias serpere alios *ductus chyliferos*. Utrumque, tot seculis inauditum, casus aperuit nihil tale cogitanti, sed circa cordis motum in vivis occupato: Exemptis enim visceribus, copiaque cruoris abstersâ, in conspectum felici augurio prodire lacteus liquor & candicantes Thoracis ductus, quos ulterius deinde inquirens, circa diaphragma & mesenterium originem deprehendit. Mirum profectò rem manifestam omnium hætenus oculis se subduxisse etiam illorum qui vano supercilio ultimum se Anatomix complementum addidisse gloriantur. Nos verò facilem meremur veniam, qui naturam quotidie ad nova sollicitamus, nec tamen assèquuturos ingenuè fatemur. Unde *Pecqueto* gratiam referimus, quod hæc prætervisa infelicitati nostræ potius tribuat *cap. 1. p. 3.* quam incuriæ. Monitus per Epistolam à fratre Cl. V. *Erasmo Bartholino* Medico & Mathematico insigni, qui Blæsi experimenti veritatem comprobaverat, anxie Pecquetianis observationibus inhiavi, novæque rei sollicitudine excitatus, cum primum libri copia mihi facta fuit, diligenter cum *M. Michaelæ Lysero*, amico meo & in Anatomicis optimè versato, inquisivi in vivo cane quarta post pastum largiorem hora, reperique pleraque ab ipso observata & icone expressâ. Putabam autem, siquidem in tanto vivi animalis motu & extremo torturæ conatu, citius pereant vasa lactea, & ego aliàs in hominibus strangulatis observaverim lacteas venas superstitas, successurum quoque experimentum, si vel animal post pastum aliquot interjectis horis celeri chordâ strangularetur, vel homo cruci destinatus post largius jentaculum suffocatus aperiretur, quia tum thoracis motu cessante inhibita respiratione eodem situ permanent humiditates distributæ, nec à dolore secantis facile moventur. Meditato consilio optatus eventus adspiravit, plurimisque in canibus factis experimentis, humana tandem cadavera ex voto publico, Serenissimo Rege FRIDERICO III. clementer annuente, rotæ alioquin & perpetuæ cruci adjudicata beneque pasta, nacti, in singula accuratius tam in publico Theatro Anatomico solenni demonstratione, quam privata opera, tanto majori studio inquisivimus, quod primi hæc in homine tentaverimus. Primum cadaver infanticidæ fuit, furis alterum, illud macilentum vixque ossibus hærens, hoc obœsum planeque omnibus numeris sanum. Utrumque quinque ante interceptum spiritum horis cibo vinoque fuit ad satietatem repletum, in primo lacteas mesentericas & thoracicas chylo repletas invenimus, in altero verò ne chyli in vasis illis vestigium usquam visum, nec tamen spe frustrati aut exspectatione; comparebant enim in mesenterio glandulæ lombares, & in thorace ductus chylo destinati, quos ea facilitate eruimus quo superiores loco nobis & modo tot ante in animalium sectione experimentis factis ad unguem cognito. In primo glandulas plenas tres lombares loco Receptaculi Pecquetiani, monstravimus publicè, & thoracicarum lactearum in axillarem sinistram insertionem externam triplici ramulo conspicuam. In altero maxima cura nostra occupabatur, visis glandulis iisdem, in interna insertionem lactearum thoracicarum, quam cum valvula, explicatâ axillari egregiè vidimus, adhibito folle aliisque cultri adminiculis. De fide nostrâ & sinceritate nemo candidus dubitet.

Nunquam publico imposuimus aut verba dedimus. Non defuturos tamen scio quos vel invidia vel contemptus transversos rapiet. Sed apage hanc hominum nationem, lex habet comperendinationem, ipsi experiantur si possint, sin minus nostra vestigia sequantur, & desinant malè agere & audire. Interea si actionem falsi instituunt, tabulas pro me habeo & testes, maximos minimos, omniumque ordinum spectatores honoratissimos, qui demonstrantibus nobis secantibusque publice privatim adfuerunt, inprimis Illustrem & Magnificum Heroem, Dn. *Christianum Thomaum* de Stougaard, Equitem Auratum, Ser. Reg. Cancellarium Magnum, & Academiæ literatorumque Conservatorem per benignum, aliosque Generosos nobilissimosque Viros, quos rei novitas & in me favor solitus ad hoc naturæ spectaculum invitaverat, nunquam non hoc nomine laudandos, nec non Medicos quamplures Excellentissimos & Anatomicarum rerum peritissimos, *Jacobum Fabricium*, *Olaum Wormium*, *Simonem Pauli*, *Paulum Mothium*, *Henricum Fuiren*, *Jacobum Finckium*, aliosque Professores Regios, & lectissimorum studioforum splendidam coronam. Quisquis tot tantisque nominibus fidem detrahit, ipse in æternum cassà sint fide. Diversam autem in homine & brutis observavimus vasorum novorum fabricam, & in brutis quoque pro specierum individuorumque diversitate, quemadmodum accuratius & methodo solitâ in sequentibus sumus explicaturi, ad hominem præsertim digressuri, quia inventor primus bruta sola cultro Anatomico subjecit, & observationes suas obscuris adedò verborum sententiarumque flosculis exornavit, ut lectores repetita lectione, dubios semper demittat.

CAPUT VI.

Anatomica Glandularum lactearum lumbarium Historia.

Primum quod sub mesenterio nuper inventum diximus, quia ex lacteis venis mesentericis chylum recipit, tanquam in Cisterna, *Receptaculum* vocat *Pecquetus*, subinde lacteos latices, *chyli stagnum*, *chyli penus*, *vesicam* &c. Sed hæc in brutis solis nomenclaturæ obtinent, quibus manifestior quam homini cavitas. Vesica tamen non ita commoda est, quia nutritium succum, non excrementum continet. Cl. *Johan. Hornius*, Anatomicus Leydenfis *sacci lactei* nomine dignabatur, quum necdum viso Pecqueto simile quid in mesenterio canis ipsi occurrisset. Nos communi appellatione *Glandulas lacteas lumbares* vocabimus, quia tales revera in homine nobis visæ & brutorum parum hinc abludunt.

Situs, Infra centrum mesenterii, quod subinde alteri exactè superponitur, sub cæliaca & emulgentibus, circa lumbares vertebrae inter earundem musculos *ψόας*, media ferè regione inter renes & capsulas atrabilarias, quas uti & renes subinde tangit vel immediato contactu vel missis ramis. Non prorsus medium lumborum locum servat, sed subinde ad dextrum deflectit, plerumque ad sinistrum in brutis juxta cavam descendantem, prope renem sinistrum, interdum ad utrumque latus inter musculos lumbares sub cava. Superior glandula in
homine

homine dextrum eligit, statim sub appendicum diaphragmatis exortu, reliquæ inferiores cum Receptaculo brutorum parem situm occupant.

Profundior situs & ad tutelam spectat, & calorem ob vicinas arterias, & ad faciliorem chyli expressionem. Anteriori enim parte mesenterium instat, ad latus vel postica parte vertebræ, à quibus in angustias compellitur, ut tanquam in situla butyrum vel aqua superposito pondere chylus exprimatur. Quam pressionem juvare credit *Pecquetus* Appendices Diaphragmatis vicinas illi subjectas, quæ distendi nequeunt in respiratione, quin & ipsum Receptaculum distendant, adeoque contentum chylum propellant. Has vices glandula humana superior justius commodiusque experitur, quam appendices septi arctius involvunt & complectuntur. Meo judicio muscoli lumbares suas quoque huc operas conferunt.

Substantia variat. In brutis nonnunquam est membranosa, sed tenuis ex peritonæo apparetque prima fronte viscida pituita concreta, aut pinguedo. Ad tactum mollis est, & glabra, digitisque pressa lubrica est & flaccida, indicatque intus contineri humiditatem. Interius, si vel cultro vel digitis rumpatur, apparet inter duas membranas cavitas quædam chylo repleta vel fero, quo educto manifestius conspicitur nunc duos digitos capiens, nunc unicum, nunc vix sensibili cavitate, repletum viscido & coagulato lacte. In hominibus prorsus diversa substantia. Glandulosa enim est & solida instar aliarum glandularum mesenterii, venulis lacteis quasi irrigata, chyli tamen per minimos anfractus capax. Cur verò canibus cavitas sit excavata magis quam hominibus, dicere non possum, nisi in voracitatem illorum causa sit referenda.

Numerus. Unicum est brutis, ut respondeat glandulæ majori mesenterii, unicæque cavitas. Observavimus tamen & in cane duplex, utrinque unum, oblongius inter musculos lumbares & vertebrae situm, in quo dextrum ad thoracem mittebat tumidum ramum, sinistrum ad glandulam mesenterii, quod tamen cum dextro ramulos communicabat. In hominibus tres glandulas notavi, duas majores invicem superpositas, sed mutuis ramulis lacteis conjunctas, inter cavam descendentem & aortam in angulo, quem emulgentes cum cava faciunt. Tertia superior diaphragmati vicinior, ejusque principio nerveo sub appendice immersa. Credo tamen varium esse in variis numerum, siquidem in quodam homine plures in mesenterio comparebant glandulæ quam in aliis hactenus à me dissectis, ut etiam quamplures aortam ad Ilia usque comitarentur.

Magnitudo. In brutis à diaphragmate ad tertiam lumborum vertebrae nonnunquam protenditur, latum, ut impleat spaciū inter lumbares musculos, ad renes ejusque capsulas extensum. Nonnunquam minus, & curiosè invenientum. Interior verò cavitas non est adeò ampla, sed ad digitos duos, vel unum vel medium capiendos accommodata. In hominibus, quia plures glandulæ, singulæ trium transversorum digitorum æquant longitudinem.

Figura. Externa inæqualis in brutis, glabra tamen Ovale nobis depingit *Pecquetus*, sive pyramidalem; Sed ea figura apparet tantum reclinatis ad latera intestinis; quæ quum trahant quoque secum sequax Receptaculum, istam figuram

ram extorquent. Formæ enim est compressæ in situ suo relictum. Subinde tamen & nobis oblongiori forma apparuit. In hominibus vel rotundæ sunt glandulæ, vel oblongiores.

Color. Candidus est & lacti simillimus, qui non perit facile cum vita, sed constans est, sive ob duplicem tunicam in brutis, quæ quasi lacte coagulato imbuta vestigium sui non facilè obliterat; sive ob nativum glandularum candorem, & contentum humorem lacteum. Interdum tamen difficilius discernitur ob pinguedinem adjacentem in obœsis, & chylum aquosiorum. Notavimus quoque in homine altero, alteram glandulam candidam fuisse, alteram obscurioris coloris instar carnis, vitio quodam quantum ex corpore minus sano colligere potuimus, contracti.

Connexio. Postica parte adhæret vertebris lumbaribus. Antica mesenterio per ramusculos lacteos, qui chylum ad hanc cisternam derivant, eos videbis, si reclinato mesenterio cum intestinis ad sinistram latus, intuearis diligenter. An autem penetrent in cavitatem ejus, sive substantiam, quanquam oculis discernere nequeamus, dubitari non debet, quia chylum admittit, quemadmodum nec manifesta sunt ostia lactearum in mesenterio. In his truncis lactearum juxta Receptaculum notat in Explicatione fig. I. *Pecquetus*, ampliorem tunicam valvulas indicare, quæ refluxum chylum inhibeant. *Ad latera* glandulis seu capsulis atrabiliaris, & renibus apponitur, sive immediatè, ut in canibus nonnullis, ita tamen, ut cultro separari facilè possit, sive mediatè per ramulos lacteos. Manifestius id in homine observavimus. Spargebant glandulæ lacteæ novæ ramulos ad pancreatis partem duodeno subjectam, emulgentem venam sinistram transcendentem, alios quoque ad arteriam emulgentem dextram. Quin imò invicem glandulæ ramulos lacteos mittebant, superior rotunda ad inferiores, hæc rursus & sibi communicatos ductus largiebantur & vicinis locis, quemadmodum sequenti figura expressimus. Mirum observavimus in cane quodam satis magno & sano septima post pastum horâ aperto, ductus lacteis simillimos, sed modo lacte modo sero pellucidos à mesenterio sive Receptaculo novo serpere partim sursum ad hepar cum porta, modo ad renes per emulgentes, modò inferiora versus secundum cavæ descendentes ad Ilia tractum, cui insertebantur & media membranula jungebantur, donec vesicæ alveus conspectum interciperet ulteriorem, qui vinculo levi intercepti inferiora versus tuebantur, versus mesenterium verò inaniebantur, ut suspicio nobis stupentibus nata sit peculiare hoc esse vasorum genus sero destinatum, de quo judicium in alias observationes distulimus. Perscripsit ad me Leydâ *Johan. van Horne* duos tantum lacteos ramos versus divaricationem Aortæ prope crurales sparsos à se observatos. *Superius* autem prope diaphragma ex Receptaculo seu glandulis lacteis prodeunt rami lactei thoracici, de quibus postea sumus acturi.

CAPUT VIII.

Uſus glandularum novarum.

CAeterum quia ſtulta eſt gloria niſi utile eſt quod facimus, maximos novi Receptaculi ſeu glandularum lactearum *Uſus* depromam, quantum in-
viſæ rei novitas permiferit.

I. Auctus homo numero partium hætenus imperfectus, vel nobis non ad unguem perſpectus. Perfectior Anatome reddita, & functiones clarius elucent.

II. Preſſior Uſus glandularum lactearum eſt, ut ex lacteis meſenterii venis chylum excipiant aliquem, eundem nonnihil præparent beneficio calidorum vaſorum vicinorum, arteriæ venæque, & breviter præparatum ad thoracicas, aliasque partes protrudant. Contineri ibi chylum ſenſus docet, illumque reci-
pere ex lacteis meſaraicis, preſſione illarum innotefcit, ſurſum denique promo-
vere ramificatio lactearum exinde prodeuntium facit fidem, imò compreſſo meſenterio & vulneratis lacteis in thorace vel ligatis, vel digito adactis, chylus illac vel prodit vel in tumorem tollit vicinum meſenterio locum. Adhæc in lactei liquoris defectu, talis humiditas ſeroſa in illis reperitur, qualis in glandulis conſpicitur.

III. Serum à chylo in levi illa præparatione & expulſionis conatu ſeparatum in adjacentes vel *renes* exprimunt, vel *Emulgentes arterias* quibus ramos mittunt, vel *capsulas atrabilarias* ſero melancholico deſtinatas, vel denique per *Peritonæi* duplicaturam, in qua morantur.

CAPUT IX.

Plurima inventi novi commoda.

Hincque ratio multorum affectuum in corpore humano reddi facilis poteſt, quos hætenus vel ignorare coacti ſumus, vel longè per ambages repetere.

I. Maniſeſtum jam eſt & certa breviffimaque via inventa eſt, qua potatores, qui cum Promacho congios vini vel quatuor hauriunt, vel cum Boneſo, qui bibit quantum hominum nemo, non ut vivant nati ſunt, ſed ut bibant, citiſſimè & copioſè mejant. Longior enim vulgata via per hepar, cor, arterias, emul-
gentes, renes, ureteres, veſicam, & quanquam in breviori invenienda deſudent *Aquapendens* per hepar ex ventriculi venis gaſtricis, & *Piſo Conringiusque* per lie-
nem; tamen ille inventâ circulatione ſine ſuo excidit, hi verò vias conceptas ex ingenio monſtrare non poſſunt ad ſenſum.

II. In Diabete legitima potus talis per veſicam redditur qualis fuit aſſumptus, idque brevi interpoſitâ morâ. Docet id *Galenus* paſſim, *Trallianus*, *Aetius* aliique & teſtatur experientia. *Amarus Luſitanus Cent. 2. Cur. 94.* Romani cujuſdam me-
minit, qui vini meracioris potui indulgens in diâbeten lapſus eſt, & quicquid bibiſſet, ſtatim & quale ſumpſiſſet, per urinam reddiderit. *Saxonia part. 2. Præſ.*

Aaa

Præſ.

Pract. cap. 34. vidit Nobilem Venetum, qui in prandio per aliquot annos biberat triginta quatuor phialas vini, citò tamen omnia excreverit. *Trincavellius lib. 10.*
Prax. cap. 12. quendam scribit febre maligna laborantem, cum nihil biberet, nisi aquam gelidam, in Diabeten incidisse, ut potus omninò immutatus redderetur, fervans eundem colorem, consistentiam, saporem atque odorem. *Zacut. Lusitanus lib. 2.*
Prax. Adm. Obs. 71. narrat de quodam meracioris vini potu nimium indulgente, parvo tempore plures ingentesque calices exsicasse, sed quicquid bibisset, illicò odore, sapore, colore inalteratum minxisse, &c, quod omnem fidem superat, intra horæ spacium 20. libras aquæ ebibentem, eundem potum qualem hauserat, limpidissimum per urinam excrevisse. *Salmuth Cent. 2. Observ. 95.* virum novit, qui vino Neustadiano se crebrius ingurgitans, illud per urinam crudum planè in substantia, colore & odore (sed gustare se noluisse) rejiceret. Patavii mihi referebat *Benedictus Sylvaticus* summus Practicus, vidisse se mejentem vinum rubrum eo colore & odore, quo hauserat. Externa nolo exempla, quia in meipso nuper sum expertus in calculosis insultibus, qui me per vices carnificis instar (ut cum *Erasmo* conquerar) torquent, potum exigua mensura vinum Rhenanum, tanquam diureticum, brevi post clarissimum in matula prodiisse, colore & substantia persimile, taleque per aliquot dies immutatum mansisse. Laborent quantum velint Practici in renum intemperie, viarum laxitate, attractricis vel retentricis imbecillitate, nunquam tamen se expedient, nisi breves has vias habuerint perspectas, per quas sine substantiæ mutatione aut sanguinis miscelâ, cito meatu transeunt assumpta.

III. Jam demum assequimur, unde in quibusdam lac seu chylus cum urina sit redditus. Vidit *Nicolaus Florentinus Serm. 5. tr. 10. cap. 21.* in castro Itri juvenem trigenarium, qui omni die mejebat urinam multam, in qua residebat sicut lac coagulatum album, ad quantitatem medii urinalis, præter substantiam urinæ, quæ illi supereminebat. *Schenckius* refert animadversum fuisse à Petro Sphererio, Polonum quendam exulceratione (ut putabant) renum laborantem in Nosocomio S. S. subinde urinam lactis instar albam & crassam reddidisse, sæpius à se visam. Ne verò hanc lacteam materiam de pure interpreteris, prodeat *Felix Platerus*, qui *lib. 3. Observ. p. m. 836.* in se ipso expertus est longo tempore sine noxâ ullâ aut incommodo urinam lacteam, quæ quiescens nonnihil materiam albam lactis crassioris instar in fundo, cochlearis unius vel duorum mensurâ deponebat. De uxore D. Du Bourlabé, quæ cum urinis quid mejebat, lacteum, & referens albore, æqualitate & levitate verum pus sine Nephritidis suspicione, contra seniorum Medicorum decretum statuit *Ballonius lib. 2. Consil. Med. 39.* forte latentem subesse mesenterii abscessum, urinæ lacteæ causam, quod à mente nostra parvo distat intervallo. Alia quæ de urina alba producuntur ab *Actuario lib. 1. Pract. Urin. cap. 2.* & *Theophilo*, quanquam ad rem nostram trahi possent, dato studio prætervehor.

IV. Promptum nobis videre, cur nephriticos exhibita remedia lithontriptica statim subinde sublevent, vel quo modo Venerem stimulantia, legumina, &c. brevi mora & sine impedimento viarum ad arterias emulgentes deveniant & sper-

spermaticas, quia in consueto & hætenus recepto itinere longiore, virtus alioquin remedium facile hebesceret.

V. Nec amplius dubitamus, cur hausta Diuretica in urinis odorem & colorem imprimant, ut de Terebinthinâ, Cassiâ, Junipero, aliisque notum. In quam rem elegans extat apud *Actuarium lib. 1. de Jud. Urin. cap. 20.* historia servi ejusdem, qui sumpto, heri jussu, trochisco amaro oxymelle mixto, quem morosus æger & delicatulus averfabatur, in itinere nigrum mejebat metu mortis, nisi medicamenti hausti memoria recurrisset.

VI. Quomodo, & qua via expedita, cum cibis deglutita multa, simul per urinas sint reddita, nemo est qui non divinare possit. Virginis Venetæ historia apud *Alexandrum Benedictum, Schenkium lib. 3. Obs. 9. Sanctorium lib. 14. Meth. Vit. Err. cap. 11. Paræum lib. 24. cap. 19.* aliosque extat consignata, quæ acum crinalem quatuor digitos longam deglutiverat, eandemque citra noxam post biennium ex vesica calculosâ materiâ involutam cum urina reddidit. Torquent se in viis indagandis *Claudinus in Resp. Med. 40. Langius in Epist. p. 745. Sanctorius l. d.* sed quascunque elegerint, & longæ erunt & à vulnere nunquam immunes. Nostra autem perbrevis, nec ita periculosa. Idem de aliis esto judicium. Nihil mictione pilorum tritius. Periodicam observavit *Tulpius lib. 2. Obs. cap. 52.* in filio Consulis Hornani, cui quolibet XIV. die mictus pilorum æquantium digitum integrum per 4. dies supervenit cum insigni urinæ difficultate. Ejus magnitudinis & vidit *Nic. Florentinus*. Fasciculos pilorum ex vesica excretos fœminæ habuit *Schenckius*. Pilos palmi longitudine crassos & duros instar setarum porci excretos vidit *Zacutus lib. 2. Prax. Adm. Obs. 63.* Disputat quidem *Hildanus in Obs. ad Horstium* omnes fieri ex humoribus, sed irritò de singulis conatu, quum veri pili & cum cibis assumpti ab assatis humoribus facile discernantur. Miraculo vicina videntur, nisi nostræ viæ nuper repertæ ad partes vocentur, quæ passim apud alios leguntur per urinam rejecta, nempe apii radices, teste *Julio Alexandrino*, fungi apud *Nic. Florentinum*, muscæ, referente *Zacuto lib. 2. Prax. Adm. Obs. 101.* Semen anisi post pastum sumptum, & carbones, & grana alkekengi, notante *Hildano in Obs.* Paleæ hordeaceæ, apud *Plutarchum lib. 8. Symp. probl. 9.* & olus integrum in cœna à virgine Amstelodamense comestum, quod nuper ibidem *Johan. van Horne* Anatomicus Leydenfis observavit.

VII. Patet præterea nobis jam oculatioribus, cur hydrops interdum hausto potu statim distendat ventrem, quod in amico meo intimo non ita pridem observavi, nempe ob peritonæi tunicam, cui glandulæ lacteæ immerse latent, impletam. Nec difficile explicatu est, quomodo per diuretica Hydrops sæpe terminetur, perque urinas solvatur.

VIII. Denique unde atrophiam partium, præsertim thoracicarum, quæ ex glandulis lacteis chylum sugunt. Premitur subinde Receptaculum lacteum & ἡ δὲ χυλὴ chyli remoratur, obstruitur, & inflammationes aliosque tumores patitur. Vidimus id in cadavere humano, in quo ad atrophiam omnia, excepto hepate sano, vergebant, flaccidis pulmonibus & marmoris instar variegatis, bubonibus in inguine, gangrænâ in pede & aliis pessimi habitus indiciiis. Sana erat altera

glandula lactea, rubra altera quasi inflammata & phlegmonodes. Unde hepar quidem sanum & multæ mesaraicæ lacteæ, at thoracicæ lacteæ non ita plenæ aut tumentes chylo. Plura de inventi novi utilitatibus in aliam differo occasionem, ut ex immensa segete stipulam relinquam.

CAPUT X.

Lacteos ramos ad uterum quoque derivari.


Distributionem ramorum lacteorum ex glandulis hisce novis lacteis in abdomine, supra pertexuimus. An autem ad uterum quoque deriventur, in prægnantibus fieri debet experimentum. Dubitare non ausim, quia *Hippocrates lib. de Natura pueri*, lac in uterum confluere monuit, nempe succum alimentorum candidum, (qui exprimitur quoque ad mammas,) ad embryonis nutritionem, eumque attrahi in utero per os embryonis. Sententiam Magni Coi, hæcenus derelictam, nuper defendendam suscepit *Guil. Harvejus de Gener. Animal. Exerc. 57.* quia 1. in ore pulli in ovo aqua reperitur. 2. In ventriculis & ingluvie, & intestinis primis similis materia, & instar lactis coagulati visitur. 3. Excrementa in crassioribus intestinis in utero adsunt. Meconium vocant Anatomici, quod in nuper natis quotidie observamus. 4. Prope anum stercora in pullis circa XVII. diem, eademque ante partum in secundinas egesta sunt. 5. Bile & urinâ utraque vesica scatet. 6. Infans in uteri cervice hærens, & nuper natus vehementer admoto digito fugit, & ægrè fugendi consuetudinem adultior dediscit. Verosimile igitur diu assuetum hoc modo nutriri. 7. Addo, observasse *Cartesium*, vitulum necdum exclusum gramen in collo digiti longitudine habuisse. 8. Adhæc vagitus subinde auditur uterinus, qui ore clauso difficiliter editur. Talem in nondum natis annotarunt *Libavius*, *Albertus Magnus*, *Livius lib. 24. Weinrichius de Monstr. cap. 26.* *Fincelius*, *Causinus lib. 3.* *Hier. §. 2.* *Sennertus lib. 4. Prax. part. 2. sect. 5. cap. 8.* *Cl. Salmasius in Resp. ad Beverovicium*, *Huisfeldius* noster in *Hist. Christiani secundi Regis*, & nos bina hujus in patria nuper habuimus exempla. Sed urgentiora hujus distributionis indicia subministrat lac seu chylus ex utero profluens. *Laurentius lib. 2. Anat. quest. 10.* testatur se vidisse quamplurimas puerperas per uterum & vesicam maximam lactis copiam excrevisse. Quod ille ad consensum uteri cum mammis refert, ego facilius ad communes hos ductus lacteos, siquidem memini me quoque in mulieribus gravidis instante partu lacti simillimam materiam, substantia, colore, consistentia ex utero fluentem observasse, & id imminentis partus certum habent indicium obstetrices. *Zacutus l. 2. Prax. Adm. Obs. 143.* notat in femina molam gestante, 20. diebus per uterum velut per perennem fontem, tantam aquæ sero lactis simillimæ copiam emanasse, ut iudicio ejus quotidie, quinque aut sex libræ profluerent, sine dolore, ardore, pruritu aut acredine ulla. Non rarò quoque medicamenta assumpta ad uterum illæsa perveniunt brevissimo hoc tractu. De croco *Johan. Heurnius lib. 2. Meth. ad Prax. cap. 14.* quod raptim uterum petat, adeò ut cum quædam

quædam excludere fœtum non posset, dato croco, prodierit fœtus croco tinctus. *Henricus ab Heer Obs. Spad.* 14. refert, se uxori gregarii militis in difficili partu crocum cum aliis exhibuisse, & dimidio quadrante citius puerum enixam esse croceo colore tinctum, ut aliquot post menses color non evanuerit.

CAPUT XI.

Lactearum ad thoracem propagines.

Lactearum per abdomen dispersiones strictim vidimus. Ulterius jam in thorace sunt perfequendæ. *Asellius* quidem venarum lactearum auctor primus Cap. XIX, nusquam illas extra abdomen admittit, quemadmodum nec ipsas quæ à Porta proficiscuntur, alibi inveniri. Quod cum illo hætenus credidimus. Sed idem *Pecquetus* sua observatione aliud nos docuit, & ipsi observavimus hoc ordine:

A superna Receptaculi parte statim sub diaphragmate prodeunt in canibus nonnullis duo rami tumidiusculi, sæpius in quibusdam unicus tantum crassiorque, quemadmodum & in ovibus, spinæ mediæ incumbentes. In homine totidem rami lactei exsurgunt, quot glandulæ novæ, qui per mediam spinam diaphragma penetrant, & circa primam lumborum vertebra duo junguntur, mutua insertionem, circa duodecimam dorsi alius ramus ex secunda glandula emergens paulo supra priorum insertionem intrat, prope undecimam verò dorsi vertebra tertius visitur à tertia glandula ortus, exinde solitarius ramus per dorsi medium ad aortæ & venæ  latus inter utrumque sub œsophago, cui, ut & illi firmiter membranulis suis necitur, adscendit. Veli distributionem à supernis partibus placeat ordiri, circa undecimam dorsi vertebra solitarius ductus lacteus dividitur in duos ramos, quorum sinister ad sinistram recta descendit ad glandulas lacteas, dexter infra ad duodecimam vertebra in totidem ramos iterum distribuitur, quorum dexter pari pacto in vertebra lumbari prima bifariam secatur, unusque ramulus ad elatiorem glandulam rotundam descendit, alter ad oblongiores. In canibus nonnullis, duo, ut diximus, à Receptaculo prodeunt rami candidi, quorum sinistrum supra diaphragma *ampullam* vocat *Pecquetus* tumidiorem dextro, dextrum vero *alveum* nuncupat in expl. fig. 1. quanquam p. 14. utrumque *ampullascentem alveum* appellet sinistrorsum vergentem. Ambo in spina dorsi recumbentes, quando adfunt, regionem diaphragmatis permeant, & sensim angustati sursum vergunt distincto tramite ad vertebra undecimam, ubi transverso ramo invicem junguntur, qualis nexus quoque ad vertebra dorsi decimam occurrit, sive ad robur sive humoris commercium. Fluctuantis modo ita bifidi incedunt ad vertebra septimam, sextam & quintam, ubi tres hujusmodi rami transversi iterum visuntur, parallelas lineas inter se copulantes, donec ad vertebra quartam pervenerint, ubi paulatim à spina media declinare incipiunt, prius tamen junguntur & mutuis osculis coeunt. Ita quidem in omnibus depingit & describit canibus *Pecquetus*,

quod & nos in cane vidimus, sed sæpius unicus ramus à diaphragmate occurrit sine fociis in cilibus recta sursum repere, juxta Diaphragma tamen tumidior & amplior, ut credam naturam in singulis variare, nec certam hujus distributionis rationem determinari posse.

Sunt toto hoc itinere *candicantes* ob succum lacteum contentum, quem digito sursum adigimus, vel ex apertis exprimimus sua sponte quoque proruentem. Subinde tamen instar hyatidum pellucet seroso humore turgentes. Interdum chylo absente apparent quidem sed difficiliter separantur. Fistula autem indita facile discernuntur. Ligati intumescunt inferiora versus, & si digito adigas non reduces humorem contentum, imò si inferiora lædas subsistet liquor lacteus inter valvulas superiores. *Valvulas* enim habent depictas à *Pecqueto* fig. 1. impediētes chyli descensum, humoris consistentia & ligaturâ potius de foris conspicuas, quam oculis, quippe in apertis difficiliter patent ob vasorum subtilitatem. Eas valvulas videmus quoque indita fistula, quæ Spiritum seu flatum non potest deorsum pellere. *Tenuis* valde lactearum harum substantia, ut, nisi summâ adhibitâ cautione, facillimè lædantur, & evacuato liquore, dispareant vel ægrè noscantur. *Exiles* sunt in thorace, versus diaphragma crassiores, ubi apparent glandularum specie, interdum vel digitum crassæ. *Connectuntur* inferius ut dictum Receptaculo vel glandulis lacteis, postica parte spinæ dorsi, antica œsophago, ad quem & ramulos mittunt, ad latera venæ sine pari & aortæ arteriæ arctius per membranulas pleuræ nectuntur, nullum tamen ramum ad illam mittit, nec debuit, quia chylus per arterias ad partes nutriendas deferri non debet, quæ solo sanguine arterioso nutriuntur. Alia autem in venis ratio. Nam observavit Cl. *Conringius*, ad hanc observationem à me invitatus, ramulos varios in cavam venam sparsos, ut data ad me Epistola testatur. *Superius* claviculis, ut post dicitur.

C A P U T XII.

Lactearum thoracicarum in axillarem sinistram insertio.

INsertio jam thoracicarum lactearum inquirenda. A tertia dorsi vertebra, vel quintâ, ubi recedunt à spina dorsi, per cujus medium toto hoc itinere serpēbant, paulatim ad sinistram deflectunt, & sursum sub œsophago, aortaque serpunt, & sub arteria subclavia & thymiglandulis, ad claviculam sinistram procedunt. Diverfus hic est *Pecquetus*, qui à tertia dorsi spina, in duos ramos diffindi scribit pingitque, quorum sinister ad claviculam sinistram tendat, dexter ad dextram. Sed invento vero pictor aliquid addidisse videtur vel inventoris conjectura. Enimverò utrinque diffindi observare non potuimus, sive in brutis sive homine, nisi aliter in Gallia, aliter in Dania ludat natura; Sed semper tantum à tertia vertebra sinistrorsum deflectere, sicut in humana figura exprimi curavimus. Folle in inferioribus indito nullum à dextris vestigium vasis comparuit, nec quidquam huic simile visus potuit explorare. Neque aliter fieri posse existimo, quod in homine diligenter, pluribus etiam oculis investigaturus, depre-

deprehendi, quia ad spinæ dorsi ortum juxta jugulum in dextris statim axillaris vena à cava oritur cordis basi vicina, in sinistris verò longior est protensio ut videatur natura huic insertioni commodum locum designasse. Utrunque quidem ligatum hoc vas per multos dies servatum à se visumque refert Vir profundæ eruditionis *Adrianus Auzotius*, quemadmodum fratri meo *Erasmo Bartholino*, antea laudato, confessus est. Sed fide mea apud magnum Auzotium omnesque exciderim si dextram insertiorem in ullo cadavere observaverim. Ludit scæpe natura, & in unico subjecto illi forsan revelavit, quod nobis infinita denegarunt.

Solitarius igitur ramus sinister sub œsophago, thymo, & arteria thoracica, & clavicula sinistra, ad axillarem venam sinistram tendit, idque interdum simplici ramo, interdum triplici, nonnunquam numerosiori divisione per exigua foramina vel unicum si unica sit insertio, statim ubi externa Jugularis vena in axillarem se infundit. Observavi & statim sub internæ jugularis progressu ingressum, incumbereque glandulis exiguis in muscutorum colli intercapedine. Ubi unica tantum est insertio simplicis rami, observavimus in homine & canibus foramen esse oblongius, & valvulam mitralem tenerrimæ texturæ in axillaris cavitate foramini suprapositam, quæ inhibet regressum chyli sanguinisque ad inferiora & adscensum ejusdem ad artus, quia cor tantum respicit, & postica parte obvertitur axillari.

Non observatæ sunt lacteæ ulterius sive ad caput tendere, quia in jugulari adstat valvula, sive ad artus tam propter valvulas venarum brachii quam perpetuum sanguinis decursum, unde nec ullus chylus ad illas partes ferri pressione innotuit. Singulare est quod in cane quodam septima post pastum horâ dissecto vidimus, ad pedes anteriores serosa quædam vasa, quemadmodum in abdomine, venas pedis comitari utrinque, pellucida instar illorum quæ in thorace & abdomine aliàs observavimus, quorum neque ingressum neque egressum potuimus tum distinguere, sed vinculo intercepta tuebant versus ipsos artus.

CAPUT XIII.

Lactearum Thoracicarum Usus.

U *Sus* lactearum thoracicarum idem, qui mesaraicarum, si terminum à quo & ad quem distinxeris. Nempe novæ chylum vehunt ex glandulis lacteis novis seu Receptaculo mesenterii, ad subclavias. Mesaraicæ verò lacteæ ab intestinis deferunt chylum, sive ad hepar, sive Receptaculum. Chylum vehere patet, quia continent chylum manifestè in dissecis diffluentem, & ligatura testatur. Eundem subclaviis venis infundi insertio docet, quò etiam exillat liquor lacteus, flatusque perrumpi, si vinculum laxes, ut quandoque firculi venæ cavæ exinde liveant, & thoracis cavitas candore inficiatur. Aliàs visum nonnunquam lac ex venis brachii sectis produsse. Sæpius in sanguine per Venæ sectionem exhausto, alioquin bono, vidi serum lactis instar. Puellæ Hafniensî suppressione mensium laboranti paucis abhinc annis suasi saphænæ sectionem consueti menstruorum tempore, intermedio verò cubiti. Posterius consilium antequam
exle-

exsequeretur puella, lac, solitas delicias hausit. Unde loco feri in sanguine lac conspiciebam, quod quidem pro putrido sanguine interpretabar primum, mox sententiam mutavi, quum nihil gravius experta puella optimè convaluerit. Nam lacteus color sanguini admixtus puri similimus, calidi nativi extinctionem signat, mortemque præsentem minatur, ut, præter alios, annotat *Fr. Joel lib. 4. Prax. sect. 5.* & recte monet *Actuarius lib. 1. de Caus. Ur. cap. 15.* ratione compertum esse, sanguinem ad album colorem vergere, quum de colore suo transmutatur legibus naturæ alteratus, atque transversus, quod ex lacte, secundum *Galenî* doctrinam, & semine confirmatur. Ita in cacochymicis & scorbuticis non semel in misso sanguine serum lacteum vidi, & à se quoque visum persæpe in hac urbe narravit Vir summus *Olaus Worm* patriæ nostræ & orbis ornamentum. Mirum est, & pro fabula vel miraculo hætenus à multis æstimatum, quod Annales quidam Ecclesiastici referunt, ex *S. Paulli* sub Neronis dominatu decollati collo lactis undam profluxisse. Narratio auctores habet quamplurimos, præcipuè verò *Acta* Sanctorum Nerei & Achillei, *S. Ambrosii Serm. 68.* *Jo. Chrysostomum*, quorum verba affert *Baronius ad Ann. Chr. 69. §. 11.* approbatque. Si vera est historia, inventis lacteis thoracis facile viam modumque inveniemus. Axillares rami, seu potius insertio lactearum in axillares ampliata fuit & solito majoribus ostiis hiabat. Alii non lac sincerum, sed fontes tres aquarum concedunt manasse dulcium, qui adhuc inter Ostiensem Ardentinamque viam conspiciuntur, & nomen dedere & Ecclesiæ & Monasterio, de quibus videndi *Blondus lib. 3. Instaur. Rom. Onuphrius Panninus de Basil. Roman. Schottus part. 2. Itin. Ital.* aliique. Addunt vero narrationis auctores nonnulli, abscissum quoque caput ter Jesu nomen inclamasse. Si quidem aqua fluxit, sciendum & ex axillaribus per lacteas thoracicas serum subinde à nobis prodire, visum, quo & abdominis vasa & thoracis, aliàs lactea, turgerebant: Virum autem sanctum longa captivitate, & plurimis itineribus & perpeffis malis debilitatum serosi sanguinis & chyli proventum cumulasse. Quod si & caput abscissum nomen Jesu inclamavit, eadem hic ratio fuit, quæ in illo homine apud *Fr. Verulamium Hist. Vit. & Mort. art. 15. §. 32.* qui eo supplicii genere apud Anglos versus Proditores recepto evisceratus, postquam cor avulsam penitus esset & in carnificis manu, tria aut quatuor verba precum auditus est proferre.

Ex Receptaculo seu glandulis lacteis novis mesenterii prodire chylum in thoracis venis contentum variis indiciis demonstrari potest. Nam 1. Non à superioribus derivatur, quippe stricto & compresso collo, & artubus nihil præter sanguinem prodit. 2. Si comprimamus abdomen, turgere vasa thoracis videmus, & ad subclavias deduci liquorem. Quod etiam apparet, si diffindamus vasa, ab inferioribus serpere sursum. 3. Valvulæ sursum spectantes ejusdem cursus viam nobis monstrant. 4. Quin injecto paulò infra claviculas vel in medio thoracis, vinculo, à ligatura sursum flaccescunt, versus inferiora tument. 5. Denique qualis chylus est in glandulis seu Receptaculo, talis quoque in lacteis thoracis conspicitur, sive candidus, sive serosus, & vidimus alternare has vices subitoque expulso chylo, intumuisse thoracicas fero in glandulis antea contento.

Ex subclaviis autem quorsum abeat chylus, si quæras, certum habebis responsum, non caput, aut artus petere, ob rationes supra allatas, sed ad cor cum decurrente per circulationem sanguine deduci, ut in cruorem transmutetur, quemadmodum ex parte voluit *Aristoteles*. Varia id experimenta docuerunt inventorem primum *Pecquetum*, cap. 2. signata. 1. Refecti vivi canis corde & adhærentibus, absterfo cruore, albicans liquor intra venæ cavæ fistulam, circa dextri ventriculi sedem, effluebat. 2. Venam cavam à diaphragmate ad jugulum aperuit, ubi apparuit liquor hic fluens, expurgatus à sanguinis mixtura. 3. A ramis usque subclaviis ad pericardium intra venam subsidebat candidus liquor, planè similis lacteo in Mesenterio. 4. Aliud experimentum nos *Hafniæ* sæpius fecimus folle & fistula excavata, quam levi foramine facto, in lacteam thoracicam infra claviculas inferuimus, spiritumque & aquam sufflatu immisimus. In tumorem dictum factum attollebantur non hæc tantum vasa axillarem versus, sed & axillaris pars prope cor, mox auricula dextra, & ipse cordis ventriculus dexter, tum ipsi pulmones per tumidam flatu & aqua venam arteriosam. Quicumque hujus rei periculum est facturum, me sponse, spe nunquam excidet, nisi tenuis valde thoracicarum tunica læsa & collapsa foramen factum obliteret.

CAPUT XIV.

Earundem in Praxi Medica Utilitates.

EX Ufu primo lactearum varia in Praxi phænomena explicabo, de quibus inventor primus vel non cogitavit, vel neglexit, quæque hæcenus Medicos ambiguos suspenderunt.

I. Vim restaurativam cum medicamentis, alimentis, cordialibus lacteæ hæ thoracicæ recipiunt vel ex ventriculo per glandulas lacteas, vel œsophago, statimque ad Cor deferunt. Hinc citissimè adeò cordialia, vini potus, acetum & alia hujus census vires reficiunt, & subinde inter sumptum cibum sedatur fames roburque naturæ accedit, ob ramum lacteum œsophago conterminum, & lactearum reliquarum ad cor brevem com meatum. Adhæc potiones vulnerariæ vel pectorales mora brevissima & tutissima via pervadunt ad cor & pulmones, quum per longas venarum ambages non ita facta tecta perferantur. Deleteria quoque & venena eâdem celeritate cor petunt *συρρογοίαν* destruunt, & spiritus inficiunt.

Herm. Conringius Professor Helmstadiensis celeberrimus, sententiam de novo hoc usu à me per literas rogatus, multum dubitat. Primo enim æquè expeditam & brevem viam videri in cor ex hepate aut vena cava abdominis; & omninò ante illam connexionem ramulos spargi in cavam qua parte cordi est propinquior. Secundo in illâ thoracicâ lacteâ nihil reperiri nisi aliquot à pastu horis: ut proinde chylus ex cibo crassiore confectus videatur per hunc meatum deduci, qui non sit adeò facilis & idoneus ad restaurandas corporis vires. Tertiò, vires corporis sitas potius in illo animali igne, quem pinguisimis sanguinis

partibus ali fortassis haud vanis argumentis probavit Vir idem summus libro de *Animali igne*.

Certè, ut amicè Magno amico respondeam, per ramulos lacteos cavæ insertos ab ipso primum observatos, eadem brevitate deferri chylum & resciri vires, planè est manifestum. Cæterum dispar omninò in cava per hepar vergente est ratio, nec ita brevis aut tuta via, per hepatis enim parenchyma & dispersas venulas moram trahit, & virtus cordialium vel imminuitur vel ad plures dispergitur. Cava autem abdominis nihil à lacteis, vel perexiguum fugit, circa arteriosum sanguinem revertentem ferè occupata. In thoracicâ lacteâ statim à pastu subtilioris cibi chylum reperiri certum est; sin deficiat interdum, subito transeunti ad cor imputabimus. Id quoque visus sum mihi in cadavere humano sano nuper videre. Benè aliquot horis ante strangulationem fuerat pastum, & circa tempus exsequutionis iusto liberalius vinum propinatum. At in aperto cadavere neque lacteæ venæ usquam conspicuæ, neque thoracicæ chylo ullo scatebant, & tamen cor petiisse vinum certum est, ex intrepido animo mortem contemnente & sero bilioso ex mammariis effluente. An crassius vel tenuior chylus hac solum vergat vel uterque infra dispiciemus. Denique vires animalis ignis pingui sanguine ali, dubium non est, quod eruditè evicit more suo Vir laudatus & nobis similia in mentem venerunt libr. De *Luce Animalium*; sed res eodem recidit, quia sanguis pinguior à chylo pinguescit, de cuius viis nunc disputamus.

II. Variorum affectuum generationem facilem & expeditam nuper inventæ lacteæ thoracicæ propalant.

1. Consensus ventriculi cum corde jam est manifestus, hætenus satis controversus, nec ad nervos amplius, obscuras vias, & alia effugia confugiemus, quia patent manifestæ.
2. Syncopalis febris ex humore crudo hinc trahit exortum, quam *Galenus 12. Meth. Med. cap. 3.* ab oris ventriculi deducit offensione.
3. Palpitationes cordis post cibum copiosum, vel à sero copioso ex potibus exinde dependent. De aliis videndus *Piso*, ut & de Hydroke thoracis.
4. Pulsuum mutationes cibo sumpto, qui dignosci à Medico prudenti idcirco non debent. Imò pulsus interceptio in ἀσφυξία, obstructis his thoracicis inducitur, unde sanguis, copiosus alioquin, humore necessario dilui nequit, sed concrefcit. Hinc vidit *Guido Patinus* Medicus Parisiensis summæ eruditionis ingenique, & saluberrimæ Facultatis ibidem Decanus meritissimus, Lutetiæ Virum diutius ἀσφυξία laborantem, in cuius cadavere dissecto cordis magna vasa sanguine concreto erant repleta. Sæpius id quoque observavi in subito de mortuis cadaveribus, passim à me dissectis. *Panarelus Pentec. 1. Obs. 31.* in febre ardentissima mortuo vidit Romæ cor torrefactum pyri tosti instar absque ulla pericardii aqua. Unde febricitantes & potu indigent, & eundem appetunt. Iisdem lacteis obstructis sine dubio animi deliquio occubuit Robertus de Marca apud *Smetium lib. 10. Miscell.* cujus ventriculi cordis coagulato sanguine scatebant. Et passim talia occurrunt exempla.

5. Mors inopinata copioso cibo ingesto, qui quidem per devia hepatis pervadere ea non potuit celeritate. *Platerus lib. 3. Obs. p. m. 652.* refert hydropicam quandam evacuata aqua, avidè cibum præter modum sumpsisse, unde vomitu & cardialgia superveniente subito fit extincta.
6. Gibbositate quacunque, ubi vel ad exteriora ut in *κυσσῶσι*, vel ad interiora ut in *λόρδῶσι*, vel ad latera, ut in *σκολίωσι*, vertebræ dorsī torquentur, depravantur quoque lactei thoracici, & premuntur, unde corporis atrophia, dejecta appetentia, & vomitus. Videnda exempla apud *Galenum* variis locis, *Hildanum Cent. 5. Obs. 65.* aliosque.

CAPUT XVIII.

Ad mammas an thoracica lactea perveniant ?

NOn prorsus impossibile videtur ad lactis in mammis distributionem vicinas has thoracicas conferre aliquid. *Marinum libr. 4. Anatom.* quem *Galenus* in Epitomen contraxit, uti testatur *lib. de Libris propriis cap. 3.* de Vasis Mammarum, quibus lac continetur, scribentem, si nobis fata servassent, lucem forsan instituto huic scenerassent. Fuerunt quidem qui in hominis thorace lacteos ad mammas ramos derivatos, sibi affirmarint visos; sed vereor ne nervi descendentes eos deceperint. Sunt indicia quamplurima, quæ cum *Hippocrate lib. de Nat. Pueri*, persuadeant chylum seu lac ad mammas protrudi, de quibus quid olim senserim, in *Anatome Reformata* dixi. Nutrices sanè ipsæ fatentur mammas infantibus præbituræ, lac quasi ex scapulis (ubi thoracicæ lacteæ inferuntur) descendere non sine doloris sensu, caventque sedulo ne sumpto cibo statim uberibus admoveatur, ob metum inconcocti alimenti assumendi. Præterea quam plurima in cibus sumpta cum chylo lacteo ad mammas mulierum observata sunt deferri. In quam rem *Martianus* exempla à se visa Romæ signavit. Uxor Cementarii Romani, assumpto purgante, post horam puellæ anniculæ mammam porrexit, quam lactabat, unde tam fortiter statim vel brevi interpositâ morâ purgata est, ut de superpurgatione lethali dubitatum sit. Mater verò nullam medicaminis vim est experta. Idem notat de capra muliere Elaterio sumpto *Hippocrates in Epid. & de aliis lactibus Theophrastus, Dioscorides, Varro, Massarias, &c.* Teste *Aristotele 7. Histor. Anat. cap. 11.* pili poculo hausti ex mammis quandoque excernuntur sive pressis sponte, sive cum lacte. Narrat idem *Martianus* filium Domitiæ de Grifonibus menstruum sæpius cum stercore excrevisse furfures, quum panem furfuraceum comederet nutrix. Extractus quoque fuit Romæ è papilla lactantis furculus cichorii, quem priori coena comederat mulier. Denique Pamphiliæ uxori Melphi cum purgationis gratia *lib. VI.* lactis potasset, citissimè in mammas fluxit, quæ tumidæ maximum dolorem inferebant, Si de viis quæramus, ipsi ambigunt. *Hippocrates lib. de Nat. Pueri* venas nominat ad mammas & uterum delatas; sed quales illæ sint, non exponit. *Martianus Annot. in lib. de Carnib.* cæcos quosdam ductus lactis ad mammas & à mammis approbat.

P. Castellus lib. 2. Emet. cap. 59. à ventriculo materiam lactis ad mammas ferri suspi-
catur, vel per vias adhuc incognitas, vel per porositates in corporibus raris.
Veslingius in Syntagm. ult. necdum perspectas vias vaporibus lacteis condonat.
Joh. Dan. Horstius Manud. ad Med. p. 1. cap. 1. sect. 2. n. 4. audacter venas lacteas
& rubras in mammis distinguit. *J. C. Benedictus lib. 4. Epist. Med. 5.* Hippocra-
tem quidem tuetur, sed in consensu mammarum cum utero acquiescit. Nihil
promptius quam per lacteas thoracicas novas rem hanc controversam compone-
re. Vicinæ illæ sunt mammariis & thoracicis vasis, ramulosque passim diffun-
dunt. In femina prægnante vel lactante, post partum dissecta, facile erit expe-
rimentum.

In Viro non ita promptum est observare, nisi papillas lacte habeat tumentes,
quod rarum quidem, aliquando tamen, & in pueris, observatum. Nuper Ana-
tomix nostræ subjectus fur per mammarias effundebat ex thorace serum bilio-
sum. Anastomosis certè vasorum Epigastricorum cum mammariis, adeò decan-
tata Anatomicis, tam est oculis rara, ut sæpius deesse quam aesse deprehende-
rim. Et quid illa in tanto lactis proventu posset? Vidit quidem *Riolanus* Anato-
micus emeritus *lib. 3. Anthr. cap. 3.* in puerpera recenter enixa Mammariam in-
ternam & Epigastricam, crassitie & mole calami scriptorii pares: sed sanguini vel
diutius retento vel ad motum tardiori id imputandum, vel conatibus puerperæ,
siquidem & reliqua vasa sanguinea circa uterum eo tempore valde distenduntur,
ut ad vivum depingit *Beslerius Tab. 3. Vier. Mul.* Quin idem *Riolanus* in Præter-
missis, varicofas easdem observavit in Viro Marchiensi cum *D. Matthieu* Collega,
secundum longitudinem ventris à thorace ad pubem. Diligentissimus *Higmo-
rus lib. 2. Disq. Anat. p. 1. cap. 3.* in dissectione canis gravidæ ac viventis observa-
vit, quum venam sine pari, in quam se exonerant intercostales, aperuisset,
lacteum quendam humorem sanguine mixtum ab intercostalibus effluxisse,
eiusdem prorsus naturæ cum illo in mammis tunc existente, quem humorem ab
Arteriis Thoracicis & Mammariis accepisse suspicatur. Credo tamen ramum ex
lacteis thoracicis, venæ sine pari insertum, chyli partem infudisse, quandoqui-
dem in canibus aliisque animalibus ex intercostalibus aut thoracicis arteriis ad
mammas in abdomine fitas rarior transitus. Quidquid sit, feminas canes tam
prægnantes quam lactantes in hunc usum conquisi, quibus, dato studio, finita
hac dissertatione occupabor.

Negat *Pecquetus* vias lacteas ad mammam ferri, Rationes addit *Anzotius*
Doctissimus, quod non facile se prodat via, ob situm vasorum lacteorum in
brutis. Sed contrarium verius videtur, quum mammæ viciniores sint in brutis
abdomini, secus quam in homine, qui partus suos attollit, ut censuit *Aristoteles*.
Unde in canibus à nobis sectis quamplurimis, innumeras in abdomine vidimus
lacteas, exiles in thorace, & sine dubio illas in hædis lactantibus *Erasistratus* ibi
observavit. Homini ferè soli cur mammæ in pectore, brutis verò plerisque in
abdomine, causas adducit *Galenus 7. Us. Part. cap. 22.* & alias alii. *R. Abba* dixit,
Deum mulieribus ubera è regione cordis posuisse, ut cordatus & prudens evadat
puer, utque è matris corde fugat, unde intellectum consequatur: *R. Jehuda,*
ne

ne mulierum pudenda puer videre cogeretur; *R. Matthana* verone in loco fordido sugeret, sicut ex Rabbinorum traditione refert *Buxtorfius Syn. Jud. cap. 3.* Ego facili conjecturâ adderem, si vera esset *Hippocratis* suppositio, chylum in mammis humanis crudiorē, cordis vicinum calorem desiderasse, qui quidem in ventriculo canum aliorumque est robustior, nec ita externis injuriis patens ob spinam in prono gressu eminentem, quod innuerat ante *Galenus* cap. dicto extremo. Ad alterum *Auzoti* argumentum, & raram experientiam, in re parum ab simili respondeat *Castellus lib. 2. Emet. cap. 59. p. 180.* Nam problema hoc in utramque partem ventilari potest. Audio *Rothomagi* editum nuper opusculum *Giffarti* de substantia seu materia lactis, in quo lac negatur esse chylus per vas *Pecquetianum* adductus, at quibus rationibus aut experimentis novis, ignorare cogor, donec ad nos libellum Bibliopolæ pertulerint.

CAPUT XIX.

Cur hætenus nova vasa lactea latuerint?

Tantum de Novis ductibus lacteis in mentem hætenus nobis venit, experientiam sequutis & rationem. Quod si impofterum vel plura vel ab his diversa diffecantium culter detexerit, publicè profiteamur & condicimus vel addituros nos libenter vel mutatueros modestè quidquid vel desideratum fuerit vel peccatum. Hanc legem nobis posuimus, quam Naturæ reverentia sancivit.

Coronidis loco duo superaddimus, 1. Cur hætenus tam illustria naturæ vasa oculis lynceos Anatomicorum effugerint. 2. Qua administratione seu *επιχειρησις* inventa jam, ab aliis faciliè videri & demonstrari possint. Varia sunt quæ pro neglecta hætenus observatione prætendi possunt. Inprimis Naturam invidiam culpamus, quod seculo huic quam prioribus cunctis magis faverit. Effascinat illa nobis oculos, ne maximè patentia subinde videamus. Oculorum mentisque hic est defectus certo divinæ vindictæ indicio, qui mundum tradidit disputationibus suis, ut non inveniatur veritatem, nec ullus sit librorum finis, lectioque multa humanam vitam occupet, *Eccles. XII. 12.* Venas lacteas omnes ex pancreate ad hepar ferri siquidem pro certo habuimus, ulteriori investigatione superfedimus. Tantumque *Galeni* apud omnes valuit auctoritas, ut solo hepatis omnem chylum in sanguinem convertendi munus consensu communi sit delatum. Huc accessit situs novorum vasorum profundior, ad quem difficile observantium oculi manusque pervenerunt. In thorace certè profundo nihil tale quis unquam quæsisisset, præsertim quum omnis opera circa motum cordis & sanguinis ibidem defudarit. Non dubium est sæpius hujusmodi canales visos, sed vel pro nervis habitos, vel venulis inanitis, vel adipe, vel membranulis. Thoracici enim nervos mentiuntur, quos æmula similitudine referunt, vel certe fibras, ubi liquor lacteus expressus fuit. Utrinque per latera vertebræ dorsæ descendunt sexti paris nervi, quos jam demum à thoracis lacteis distinguere didicimus duplici notâ, 1. quod illi ad latera serpant, terminenturque in diaphragma

vel ejus appendices; hæ verò vel mediæ in spina incedant vel proximè inter sexti paris nervum & spinam alterutro latere, per diaphragma ad abdomen subiectasque glandulas lacteas descendant ulterius. 2. Quod discissi illi vel ligati, nec liquorem ullum profundant, nec ut thoracicæ lacteæ, intumescant. Quibus addi potest & utriusque vasis origo seu insertio. A cerebro nervi producuntur, lacteæ ex abdomine in axillarem terminantur. Sæpe quoque adipis species nos fefellit. In vacca nuper pasta diligenter in thoracicas lacteas ejusque fibras inquisivi, sed adeò pinguedini immersæ latebant, ut præter fibrillas nihil comparuerit, summo labore distinguendas. Glandulæ autem lacteæ novæ seu Receptaculum tam glandularum mesenterii hætenus notarum quam adipis nomine facilè imposuerunt scrutatoribus. Quod verò *Pecqueto*, mortalium felicissimo, invisa omnibus seculis patuerint, munus esse fortunæ cum incio ludentis, ingenua confessione ipse *cap. 2.* profitetur.

CAPUT XX.

Anatomica Vasorum novorum Administratio.

EXemplo *Galen*i Administrationem novorum vasorum Anatomicam paucis trademus, illorum in gratiam quibus ea necdum vidisse licuit. Cadaver seu humanum seu brutorum quarta quinta vel septima hora post pastum ligatum vel strangulatum rudi manu aperito, & remoto sternone cum annexo mediantino, valida manu pulmones alterutrius lateris cum adhærentibus visceribus in oppositum latus reflectito, ut dorsi abdita in conspectum prodeant. Mox conspicua sub aortam & œsophagum in medio spinæ dorsi vel circa medium, vasa candida five ductus sero relucens scalpello à vicinis cautè separato, & vinculo subtili five sub axillari vena, five in medio thoracis ligato. Alio vinculo reliqua cordis vasa intercipienda infra supraque, ob ruituri sanguinis metum. Postea abdomen diffinde, & visis in mesenterio lacteis, insertionemque in hepar, universum mesenterium cum intestinis ad latus alterutrum revolvito, ut glandulas lacteas novas seu Receptaculum in situ suo & connexionem cum mesenterio intuearis inter musculos lumbares & renes inque Cæliacæ arteriæ & descendens cavæ confinio juxta Emulgentes. Hinc intestina ab infimis exordio facto separa & cum ventriculo, hepate, liene ex abdomine elimina, nudo si placuerit mesenterio cum glandula media & pancreate, relicto. Videbis glandulas novas candicantes & ad tactum molles, chyloque vel sero turgidas, quæ si non compareant, renes eleva, sub quibus solet pars illarum delitescere. Tum, ut adscendentes furculos lacteos contempleris, diaphragma per partes discinde & à vertebra accuratè libera, unaque aortam arteriam, venam cavam, & œsophagum cum visceribus thoracis vel exiit vel caput versus supra scapulam dextram reclinato, & totum vasis lactei ductum in dorso observabis circa diaphragmatis regionem tumidiorem, circa quintam vertebra dorsi ad sinistram claviculam serpentem. Denique axillarem venam sinistram remota costa prima & clavicula sinistra denudato,

jugu-

jugularemque externam vicinam. In utraque utriusque lateris vinculo injecto versus caput & artus sanguinem remorare. Nullo negotio insertionem lacteorum thoracicum invenies, sique de fibrillis visis dubitas, fistulâ in thoracis supra vinculum adige vel aquam vel spiritum, vel vinculum laxa digitoque chylum sursum propelle. Quibus visis aperta axillari inter ligaturas, abstersoque cruore, valvulam quære vel foraminula quæ chylum vel serum vel spiritum ex thoracis pressis vel inflatis manifestè admittunt. Reliqua exercitatio frequens docebit. Quanquam enim in tota Anatome nulla difficilior occurrat administratio, facilius tamen intento digito hæc monstratur, quam describitur. Falluntur, qui non visis acquiescunt, aut auditis credunt. Democriti spelunca & secessus intrandus, ubi Deos inveniet sector. Non habemus ista odorifera, nec emptorem decipimus nihil inventurum cum intraverit, præter illa quæ in fronte suspensa sunt.

Confer Ductum Chyliferum Joannis van Horne, Experimenta Anatomica J. Pecqueti, J. Riolani Epistolæ, Observationes de Venis Lacteis Caroli le Noble, &c.

P A R S V.

De Vasis Lymphaticis.

Ex Diss. Anat. de Vasis Lymph. Bartholini.

C A P U T Authoris II.

Series & occasio Novi Inventi.

TOti in eo eramus ut Lactea ex abdomine ad *subclavias* per thoracem discurrentia accuratius scrutaremur, qua occasione non solum bruta sub cultri examen vocavimus, sed & humana cadavera, in quibus primi hos lacteos thoracicos ductus invenimus & publico scripto illustravimus. Dum v: circa brutorum Anatomen versatur diligens industria, ecce quod non quærebamus, ultrò se obtulit. Observavimus quidem sæpè in canibus dissectis ex hepate aquosos ductus prodeuntes, sed qui pro lacteis eos habuimus, ulteriori cogitatione superfedimus, de aliis securi. At quum xxviii. Febr. ad solita exercitia Anatomica deflecterem adscito in operis societatem Cl. v. *M. Michaelæ Lysero*, cui inventionis hujus laudem, si quam meremur, communem volo, canem satis magnum sanumque nec pinguedine nimia molestum septem post pastum horis aperuimus, ut quomodo lactei thoracis ductus longiori distributionis mora se haberent, penitus animadverteremus. Ventriculus cibo adhuc plenus. In mesenterio candicantes chylo venæ apparuerunt, sicut in thorace, more hæctenus servato. In hepar cum Porta inferebantur plurima vasa tumentia, non chylo quidem, sed aqueo liquore per tunicas translucente. Similes aquosi ductus plurimi visebantur portam transcendere annuli instar, & inefrius cavæ descendentem truncum undi-

undique amplexari, vergere supra emulgentes ad capsulam atrabiliarium, infra v. comitari cavam ad ramos Iliacos ad pelvim usque ubi vesica delitescit. Ligati aliquo loco tumebant inferiora versus, supra mesenterium versus inaniebantur, unde & rami lactei circa diaphragma ante candicantes simili aqua implebantur, lacte protruso, & ex Receptaculo prodiens lacuna, supra diaphragma, valdè tumida, sero distenta apparebat. Thoracica prope axillares ob vinculum lactea. Sed, quod stuporem iniecit, quum axillarem juxta pedes anteriores separatam ligaremus, apparuere iidem ductus aquosi antea nobis in abdomine visi, tumentes splendentesque hyatidum instar axillari venæ superstrati, qui ligati pedem versus impleti manserunt, in dextro quoque latere per omnia similes, quibus læsis aqua versus pectoris anteriora effundebatur limpidissima. Miraculo vicina res nobis visa, quia insolita, nec satis unicæque experientia, quanquam clarissima, fidebam. Variare enim subjecta, & ludere subinde naturam, nec facile semel visis acquiescendum, ubi omnium seculorum repugnat fama. An peculiare esset vasorum genus aquæ destinatum ambigua suspitione ventilabamus ultrò citroque, aut unde provenirent, quoque abirent, an peracta concoctione vel ea adhuc perdurante aqua vel his secerneretur vel reciperetur, ancipiti conjunctura hærebram. Judicium igitur in alias experientias differre in re nova necessarium duxi.

Inter has cogitationes sollicitis canis minor commodè offertur. Hunc septima hora post largum pastum, ne tot martyria frustra exerceremus, chorda celeriter strangulatum evisceravimus, nullaque interposita mora reliquis omnibus missis ad artus progressi & hepar, aquosa hæc vasa similem modum observavimus, hic variis cum porta annulis connexa, inque ejus quasi tunicam immersa; ibi cum axillari ramo quoque instar hederæ cohærentia. Repetita inde sæpius in aliis canibus sectione sive jejunis, sive cibo repletis, nihil diversum invenimus, cœpitque constantior animus perpetuam in hoc invento naturæ legem admirari. Et quo certiores & crederemus nos & alii viderent, nec lactantibus gravidisque canibus pepercimus. In lactantibus circa Iliacos ramos iidem aquosi ductus, & in axillaribus visi splendescere. In gravidis quoque venas comitabantur vasa splendida, præsertim in abdominis fundo juxta Iliacum & portæ ramum frequentia, imò in vesicula fellis cum venis copiosè externa perreptabant. In utrisque per axillarem progredientia vasa aquea levi incisione aperuimus. Limpidæ aquæ effluxus sequutus, qua occasione fistulam indidimus, ut quo humor ille vergeret, sicque oculis pateret novitati inhiantibus. Immisso per fistulam spiritu movebatur cava prope cor, ipsumque cor, in obversa v. parte propè extremos artus, nullum motum animadvertimus, sine dubio ob valvulæ impedimentum. Quod ut porrò pateret, in alio cane fecimus experimentum. In pede anteriore alterius lateris conspicuos hos ductus tumidiores inflavimus, vidimusque attolli jugularem externam & axillarem. Inde ligatis jugulari & axillari ramo ob ruituri sanguinis metum, absterfoque cruore aperuimus jugularem axillaremque. Aperuit se illico foramen seu ingressus aquosi ductus sub majori valvula jugularis, circa jugularis ingressum in axillarem, cui tenuis valvula obtendebatur, modo à flatu im-

missio

misso elevata, modo remissa. Perculit invisâ rei novitas animum, & communicato consilio favere multi & applaudere.

CAPUT III.

Vasa Lymphatica in hepate.

CÆterum, nisi scrupulis omnibus per sectiones ademptis, necdum assensum Observationi novæ sponendi. Jam olim didiceram, à recepta communi Eruditorum sententiâ non esse recedendum, nisi prægnans causa suaferit, & inevitabilis oculorum fides. Sunt qui sine ulteriori deliberatione semel visa in sententiam trahant, ut novitatis laudem primi indipiscantur. Alios ne centies quidem observata ostenta à veteribus dogmatis divellunt. Errant utrique nisi erro ego. Non facilè receptis Præceptorum dictatis nuncium remiserim, sed si pro novis pugnet Natura ipsa, huic me libenter subjecerim, novæ veritati ex æquo addictus. Nec enim natura adhuc universa patet, multum restat, plusque restabit. Igitur hepar occurrit querulum, cui cum Anatomicis hætenus quantum potui, precium statui sat magnum, jam verò officio demandato miserè videtur excidisse. Pugnavi pro ejus dignitate in Historia Lacteorum Thoracicorum contra Pecquetum, divisique cum corde imperium in opere sanguificationis, partim antiquitatis reverentia, partim rationibus quibusdam, partim denique lactearum Venarum experientia. Enimverò lacteas venas in hepar ferri observarunt *Asellius*, *Wallens*, *Higlmorus*. In orbe pisce idipsum visus sum mihi olim videre. Vero a. simile judicavi, si venæ chylum hepati infundant, ad sanguinis generationem omnino conferre operas suas hepar. De insertionē igitur Lactearum in hepar majus volvitur negotium, sæpius à supra laudatis viris observata & descripta. Monstravi eam per læpe in canibus evisceratis, ea facie qua depicta visitur in iconibus *Asellii* & *Higlmori*, nec fibrillas solas esse, ex humore contento probavi. Unde quum pellucido liquore splenderent, nec aliud vas cognitum adhuc esset aut illis aut nobis, tamdiu pro lacteis venditavi, donec nomen sequutura experientia mutaret. Exinde dubitare cœpi, visis aquosis ductibus in artubus, illis similibus, an diversi sint prope hepar à lacteis. Sexta hora post pastum nulli lactei, soli aquosi juxta hepar resplendent in strangulatis canibus, quibus etiam ligatis nullus humoris aquei motus observatur, quia nullus tractus vitâ cessante. Nodum igitur istum sectio viva solvet quarta post pastum hora, ut vel chylum ibi vel aquam videamus. Si chylum, vel cum lacteis deinde disparentibus aquosi ductus comitantur, vel chylo ad hepar protracto, succedet serum, quemadmodum per thoracicas lacteas chylus serumque ad cor fertur, tumque ab inferioribus inferentur aquosi ductus & in glandulam mediam, ex qua ad hepar, & in Receptaculum, ex quo ad cor. Si sero tumidas venas deprehenderimus, mutanda erit sententia, renunciandum hepatis, dicendumque erit, aquam ex hepate ad Receptaculum commeare; lacteasque hætenus ad hepar deferri visas nihil esse præter ductus aquosos.

Ne inter ambiguas conjecturas diutius vacillantes in incerto luto hæreremus, vivam canis anatomen advocavimus quatuor horis ante pasci. Aperto abdomine vivo statim hepar velut ad aruspicinam consulimus, vidimusque ductus nostros novos annulatim Portam amplexantes, & quinque septemve ramulis hepar ingredientibus, eosque ad vesiculam fellis pariter dispersos, neutiquam candidos, sed more aliorum in artubus & abdominis recessibus à nobis visorum, translucentes limpidâ aquâ. Inter omnes insignis ramus erat bifurcatus unus ad hepar recto tramite progrediens, nec alterius lacteæ apparebat vestigium ullum, licet in mesenterio adhuc candicantes lacteæ conspicerentur. Ratus autem ob operationis tarditatem, oblato impedimento, effluxisse chylum lacteum, & successisse illius in locum aquam, vel lacteas disparuisse, vinculo jussi venam Portæ cum vasis his lymphaticis prope hepar constingere, ut, intercepto meatu patulo, aquæ cursum observarem manifestius. Ecce intumuerunt lymphaticæ hepar versus satis evidente sentu, præsertim animali sub tortura inspirante, non ita expirante. Portæ vena tumida emerfit prope intestina, vacua verò qua hepar spectabat ex necessariis Circulationis legibus, quia sanguis portæ hepatis solet inferri. Lymphaticæ, cum porta mesenterii anfractibus immerse, tantum abest in tumorem elevatae sint, ut conspectum nostrum planè fugerint. Hinc certum indicium deprompsimus venas lymphaticas, pro lacteis hætenus reputatas, ex hepate liquorem exportare, nihil hac via inferre, quod de lacteis antea credidimus. Et quacunque hora aperiatur animal, apparebunt spectantibus eadem facie, accurately discrimine à lacteis in mesenterio discernuntur, eodem tempore conspicuis, quod illa candida planè, nostra aquei coloris. Nec possumus exilitati causam obscurioris coloris imputare, siquidem venulae lacteæ in mesenterio multo sunt minores, aquosæ contra juxta hepar crassiores, hæ tamen suum servant semper colorem, illæ tempore distributionis candicant. Et omninò notandum lymphatica hæc vasa semper magis esse conspicua circa hepar, quam artus, quia hic sæpe pinguedine occultantur, quæ nobis non rarò conspectum illorum ademit. Monendi sunt igitur quicumque hæc vasa sunt investigaturi, ut canes eligant macilentos, venaticos, vixque ossibus hærentes, & si in pinguiusculo cane non semper offendant, ne falsi dicam nobis scribant, exemplo nostro sæpius sectiones iterent, in primis sexta, septima, octava, decima, &c. horis post sumptum cibum, vel planè in jejunis, quanquam & vestigia apparebunt in nuper pascis.

CAPUT V.

Methodica Vasorum Lymphaticorum Descriptio.

QUO nomine signanda sint vasa nuper à nobis detecta, non facilè ipse dixerò. Fuere qui *serosa vasa* indiderint, quod serum contineant. Non potui acquiescere huic nomenclaturæ. Serum enim, ut infra patebit, ab aqua hac limpida diversum est, & serum alia sibi in corpore receptacula elegit, supra signata. Ureteres sero ex renibus ad vesicam deferendo destinati, ab his prorsus differunt, sub-

substantia, colore, contentis, & distributione. Ureterum enim tunicæ crassiores, color candidus quidem sed non transparens, contentum serum nunquam in ductu sistitur, denique distributio varia sive terminum à quo, renes, sive ad quem, vesicam consideres. Si igitur cavitatem oblongam spectemus liquori continendo aptam, & *vasis* appellationem latam & *vena* pressiores merentur. A contenti liquoris condicione, seu limpida aqua & lymphæ, dicenda vasa seu *lymphatica* seu *aquosa*, prout cuique libido fuerit. Si denique externum splendorem illustrem, hyatidibus æmulum contempleris, nescio quid causæ subsit, cur non *vasa ChrySTALLINA* condigno meritis titulo nominentur. Nos nulli nomenclaturæ adstricti, sine discrimine & his & illis appellationibus dignabimur, donec commodiora alii monuerint.

Exortus Lymphaticorum vasorum est ab extremis partibus seu artubus, & visceribus hepate nempe, ex quo cum ramis portæ prodeunt, vesicula fellis, &c. Qua parte v. ex artubus prodeant, an à venarum extremis, vel musculis, necdum oculus assequi potuit, ob vasorum subtilitatem. Conjecturæ si quis locus, à partibus nutritis debent emergere, ob usum postea asserendum, quanquam nec à venis capillaribus impossibilis sit exortus. Qui in nervis circulationem admittunt, nullam commodiorem hac viam invenient, quippe subtilissimos spiritus in splendidam aquam resolvi quotidiano in alembicis experimento constat, tumque ex nervorum summis particulis progredierentur.

Insertio duplex. Alia inferiorum valorum, superiorum alia. Distinguimus hæc experientiam sequuti. Latè enim disseminantur, & truncum cum artubus suo ambitu involvunt. Vasa aquosa infra septum medium enata inseruntur in Receptaculum chyli seu glandulas novas chyli, quo tanquam in alveum limpida suam lympham effundunt, ut porro recto ad Cor tramite per thoracicas lacteas deducatur. Quæ verò supra diaphragma ex artubus trahunt originem, in Jugularem externam sive axillaris concursum ingrediuntur. Unde truncum nullum habent, sed ex partibus diversis hinc inde veluti rivuli salientesque fontes separatis originibus ad fluvios duos tendunt, glandulam nempe mediam lacteam & axillarem venam, ut in communem cordis oceanum pleno gurgite exundent.

Substantia, est tenuissima pellicula pellucida, instar telæ aranæ subtilis, ut levissimo vulnere & tactu rumpatur. Hinc est quod effusa limpida aqua statim dispareat, quia applicantur membranulæ illius venis subiectis, ut discerni nequeant etiam à Lynceo. Non memini tenuiorem in corpore partem, si piæ in cerebro matrem excipias, quam æmula substantia refert. Sicut per piæ meningem transparent cerebri gyri, colorque levi offensa dilacerari aptam, sic per nostra vasa fragilia liquor contentus cernitur. Hinc aquosarum venarum

Color est hyatidum, crystalli instar resplendens, quamdiu liquore suo repletæ sunt. Inanitæ non videntur. Lactææ evacuatae fibrillas visu conspicuas relinquunt, nostræ cum liquore in auras videntur evanescere, ut præter venas sanguifluas nihil compareat. Quæ causa est, quod hætenus in cadaveribus observatæ à nemine fuerint.

Figura vasorum Lymphaticorum interna cava est, venarum aliarum more,

externa variat. Maxima pars annulari forma venas ambiunt, hederæque instar amplectuntur, per tenuissima filamenta illis alligata & connexa. Quædam recta prope hepar, & in axillaribus. Exprimunt egregiè fluminum anfractuosa alveos, quibus per apertos campos sinuoso tramite currunt errantque.

Valvula tenerrimæ texturæ ingressui in axillarem supra præponitur, quæ regressuræ aquæ obstat. Eaque sola observari potest. Non dubito quin alibi quoque venis aquosis apponantur valvulæ, si quidem ne flatum admittunt versus extrema immissum, ob tunicæ tamen subtilem contextum cultro Anatomico separari non possunt.

Magnitudinem, quanquam in subjectis pro animalium diversitate variet, in singulis tamen accuratè demetiri nescias. Pars enim latet, & conspectum fugit. Quas invenimus cognitasque habemus, exiles sunt & angustæ, styli mediocris crassitiem admittentes. Vinculo tamen interceptæ ingrossantur & impletæ distenduntur. Prope hepar crassiores, quia sanguis in illo copiosior. Quod verò magnitudini vasorum deest, supplet.

Numerus, qui in abdomine iniri vix potest. Iliacum ramum plurima ambiunt. Mesenterium ingredientia augentur. Ex hepate quinque vel septem ut plurimum ramuli in portæ amplexibus exeunt. In anterioribus prope axillarem unicus ferè utrinque ramus conspicitur.

Situs & Progressus lymphaticorum vasorum, ut nihil ad perfectum historiæ nostræ ordinem desideres, iste est: In superioribus artubus ad latus venæ brachialis sursum repunt cum vena ipsa cruenta, cui firmiter annectuntur, perguntque cum eadem ad axillarem, in quam exiguo osculo patent valvulâ munito. A cruribus eodem modo permulta adscendunt, socia venæ cruralis & Iliacæ, quam ambiunt modò arctè modo laxè, circulatorum instar, progrediunturque ad mesenterium, ibidemque cum portæ ramis in glandulas inferuntur, via oculis haud satis conspicua. Ab hepate quoque & vesicula fellis ejusdem portæ societate per eandem viam decurrunt.

CAPUT VI.

Humor in Vasis Lymphaticis contentus, ejusque motus.

Contentum liquorem expendamus. Venæ cruorem vehunt & arteriæ. Lactææ chylum. Ureteres serum. In nostris vasis lymphaticis planè diversus liquor & colore & consistentia detinetur. Liquor inquam limpidissimus, sine coloris tinctura, sine odore, aquæ purissimæ persimilis, qui per tunicæ subtilitatem crystalli instar transpareat. Ita est profectò, microcosmus cum majori mundo de perfectione certat, nec in aquarum varietate ulla parte cedit. Sunt aquæ in Oceano salæ, sunt & in fluviis fontibusque puræ & saporis expertes odorisque, splendidiore vitro, quibus Najades & Ephydrides, Nymphæ purissimæ præsidebant. Nolumus has extra nos sollicitare. Nymphas corporibus nostris claudimus, & Najades in venis lymphaticis, si superstitionis esse liceret, veneremur.

Serum

Serum falsedine notum & vesica excipit, & pori corporis excludunt. Reliqui ichores Medicis celebrati vel sanguinis sunt crudi, vel corrupti. Nostri aqua limpidissima, sui generis, nec corrupto sanguini ortum debet, nec crudo, siquidem in omnibus & ferè semper per naturam venas nostras novas percurrit. Negat quidem *Galenus* terram usquam videri per se solam in corpore nostro congregatam, aut usquam aquam, sed ichores esse quosdam, factos ex mixture elementi aquei & ignei: Cæterum venia dignus est, quod hæc cum aliis exinde inventis, ignoraverit. In cunabulis tumolvebatur res Anatomica, nunc quotidie adolescit. Nec planè erravit. Aquæ enim nostræ igneus calor à corpore vivente imprimitur. Quod addit, neque hos ichores semper solos, sed sæpe auctos crassamento terreo seu sæculento, vel dubitare cœgit de aliis necdum visis, vel de consuetis ichoribus explicandum.

Non leve dubium hinc emergit, *Unde limpida hæc aqua per canales nostros novos deportata, derivetur?* Quantum ex humorum cursu naturali à nobis observato, & vasorum lymphaticorum progressu conjicere possumus, à partibus nutriendis sive hepate, vesicula felle, sive artubus extremis provenit. Hinc non absque veri specie dixeris, à singularum partium privata concoctione aquam separari peculiaribus vasis expurgandam. Inest enim ut alimentis, ita sanguini aquæ elementum, quo diluitur, quod separari in concoctione partium necessario debuit, quia in substantiam earum non cedit. Aqua certè quo purior, tanto ad alendum magis inepta, quam *Oribasius* in Collectaneis non alere, sed vehiculum tantummodo alimenti esse, ex *Hippocrate* & cæteris præstantissimis Medicis probat; ob eamque causam nec posse vitalem facultatem roborare. Pisces quidem apud *Rondeletium* in vasis vitreis aqua plenis, nutriti fuere & toto triennio vivere. Si credimus *Alberto Magno* Melancholicus quidam per plures hebdomadas, sola aqua vitam sustentabat. Alia puella in Hispania per plures annos, solo aquæ usu, inedia toleravit, teste *Rhodiginio*. Sed notandum aquas has puras non fuisse, verum mixtas, quales in usum nostrum trahuntur, de quibus, an nutrant, disputant Eruditi. Abstinendum verò exempla passim decantata, meritò sunt suspecta, quanquam & hujus ratio reddi posset ex insito principio, si hoc ageremus. De aqua res est certissima. Unde in Hydropicis, sero abundantibus, nullam concoctionem Medici aut sperant, aut expectant, sed nulla interposita concoctione expurgant. Quid ex lymphâ nostra, sero simpliciore, conficeret facultas partium concoctrix? Optimo potius consilio pro illa expurganda constructis vasis sollicita fuit Natura. Ne puram dubites, fontium excute generationem. Per subterraneos cuniculos marina aqua variis anfractibus percolatur, admixtasque salis partes velut per cribrum deponit, salitque demum dulcissima lymphâ. Paria in animantibus molitur. Cum sanguine arterioso ad partes nutriendas per arteriarum fistulas immixta aqua, sed non ita à cruoris contagio libera, defertur, hinc utili alimento à partibus separato & attracto, sola aqua linquitur per singulares ductus ad mare iterum aliquod emanatura. Sola igitur percolatione aquosus liquor depuratur & secernitur in statu naturæ benè se habente. Quo discrimine ichorum productionem ab hac linea separo, quos

Aristoteles à sanguine deducit, aut nondum concocto, aut in serum per corruptionem reducto, de quibus, ichore nempe miti & acri Collectanea *C. Hofmanni* evolvenda. Nostra à benè concocto cruore exstillat, nec per corruptionem secreta, nisi corruptionem vocemus, sanguinis in partium nutrimentum appositionem. Ea quia continua esse debet, ob continuam absumptorum necessitatem, inde omni ferè tempore venæ lymphaticæ conspicuæ munere suo defunguntur. Ancipites enim & dubii an pro variis chyli distribuendi momentis, vel apparent nobis hæ venæ vel occultarentur, animalia & pasta & jejuna evisceravimus, modò quartà post sumptum cibum horà, modò sextâ, septimâ, & sic porrò, nec defuisse animadvertimus, magis tamen copiosiusque conspicuas in jejunis & longius à primis ciborum horis remotis.

Quæret novarum rerum curiosus, quo tandem *cursum dirigat lympa*, vel in quam corporis partem liquorem limpidum effundant descripta à nobis & nuper inventa vasa? Verbo me expediam. In cor tanquam oceanum limpidas undas exonerant. Ex axillari cum sanguine refluxo cor petere, duplici experimento nobis persuasimus. 1. Ligaturâ. Vinculo enim in artubus anterioribus restricta vasa, versus axillarem venam & cor ipsum, flaccida apparuerunt, at versus extrema artuum conspicuo tumore eminebant. 2. Folle. Aperto ramo lymphatico fistulam immisimus, & adacto oris spiritu dictum factum axillaris cum corde appenso leviter movebatur. Ex inferioribus quoque circa Iliacos ramos ligata vasa, magis conspicua, inaniebantur qua parte mesenterium spectabant, tumebant verò qua artus adverso situ respiciebant. Quod & de hepatis vasis supra annotatum. Ex mesenterio ad Receptaculum chyli juncto studio omnia inferiora ruere, id indicium habeo, quod illis inanitis & evanescentibus, Receptaculum splendente lympa, non chylo, turgeat. Quin ipsæ lacteæ thoracicæ expulso chylo, acceptaque à Receptaculo lympa, more lymphaticorum vasorum resplendent aqua plenæ, quam exsilire videbis, si levi vulnere pertundantur. Ex his demum thoracis eadem viæ rectitudine Cordi transmittitur, qua antea chylus.

C A P U T VII.

Usus Vasorum Lymphaticorum.

U*Sus* venarum Lymphaticarum esse potest, 1. Ut nutriendas partes onere inutilis sibi aquæ levent. 2. Ut aquam aliis partibus certos in fines apponent, inprimis cordi, sive ad sanguinem alioquin crassiolem nonnihil diluendum, sive caldiorem temperandum, sive ad sanguinis concoctionem promovendam. Interea & chylum in mesenterio & lacteis ductibus fluxilem reddunt, quia aqua in vasis suis prope hepar & Iliacum copiosè redundat in chyli distributione. Forasan extrahitur continuata aquæ circulatione, quidquid adhuc utile esse posset, velut crebris destillationibus, amandaturque tandem, ne Sisyphi saxum volvamus, sero permista lympa sive ad renes, sive corporis habitum. 3. Multorum in corpore accidentium causam reddant expeditiorem. Aueta aquæ hujus copia

in venis lymphaticis; sicut in scorbuticis & Melancholicis, sudores copiosi erumpunt, totoque sæpe corpore diffuunt. Eadem in Venæ sectione cum sanguine excernitur, & in pelvi separatur, vulnus enim lancettæ ad hæc quoque vasa venis imposita penetrat. Transudat illa ad pericardium & varia in corpore molitur pro vario statu seu sano seu morbo. Quis spondebit non ad renes quoque partem illius ob viciniam deduci immediate. Illustrem planè in hydropis generatione nobis usum præstant. Quantum mente assequor, obstructis venis Lymphaticis, quando liquor tenuis à partibus non separatur, oritur Anasarca vel Leucophlegmatia, vel quando impedito per has transitu, ad venas ire cogitur, Ascitidem excitant, vel quando ob tenuitatem tunicæ à copia vel liquoris acrimonia vel incumbenibus gravioribus rumpuntur corrumpunturque in cavitates vicinas seu abdomen seu thoracem effluit aqua, maximi morbi causa. In inflammationibus calida totius temperie assantur facilè & exsiccantur, unde æstuat ob humiditatis hujus defectum ebulliens sanguis, & ad febres ardentes producendas operam conferunt infelicem. In cachecticis & hydropicis sæpe ex partibus expressa aqua hæc limpida vesiculis excipitur. In porcorum mesenterio frequentes has vesiculas observavit *Platerus*, referente *Schenckio*. Idem ex *Joanne Aicholtzio* de femina hydropica narrat à se dissecta, aquam in abdomine nullam compa-ruisse, sed intestina, una cum reliquis visceribus, angusto spacio contenta apparuisse, ipsum verò abdomen à cute ad peritonæum quasi alba pinguedine duntaxat contextum videbatur, vesiculis crebrioribus, majoribus minoribusque aqua limpida refertis, invicem cohærentibus. Easdem vesiculas splendidas in capræ sylvestris hepate frequentes notavi.

An humor in articulis hinc derivetur, inquirendum. Si affirmantes invenerim, ad motus quoque necessitatem hæc aqua nostra conferet. Certè artus, ubi frequentia hæc vasa, à motu perpetuo cursitantium canum & lassantur multum & exsiccantur, nisi à liquore hujus modi obliniantur. Alias novarum venarum utilitates, & commoda ad communem mortalium salutem, aliis relinquo accuratiori judicio pensanda. Nobis invenisse satis fuit, & aliis non invidemus accessionis qualiscunque gloriam. Quin majora incrementa & progressus sit habiturum cum ætate inventum novum, nulli ambigimus, si ingenii & diligentiae sua census huc contulerint Anatomici, quos publicè ad naturæ istud miraculum quanto possim opere invito, ea lege, ne vel nondum visa condemnent, vel observata spernant. Optimè *Tullius*: In re nova atque admirabili, investigato, si potes, si nullam reperies causam, illud tamen exploratum habeto, nihil potuisse fieri sine causa, eumque errorem, quem tibi rei novitas attulerit, naturæ ratione depellito.

Tractarunt & hanc materiam post Bartholinum, G. Segernus, Rudbeek, Rolsinkius in Dissert. Anat. Riolanus variis tractat. contra Bartholinum, Mœbius in Fundamentis Medicis, Fr. Sylvius in Disput. Medicis, aliisque.

Curiosæ quia sunt Figuræ à Cl. *Rudbeek* exhibitæ, duas priores hîc apponemus, reliquarum, specialium magis, contemplationem desideranti Authorem ipsum commendantes.

P A R S VI.

De Valvulâ Coli.

Ex Observ. 21. Cent. 3. N. Tulpii.

Est hæc valvula, non tantum (ut videtur indicare exterior apparatus) annulus villosus, absolvens integrum circulum: qui animatus instar orificii ventriculi, urgente necessitate, sese vel aperit, vel claudit. Sed talis potius circulus: ex quo dependet membrana, ita conformata, ut præter animæ vim, cuicumque viventi parti insitam, etiam figuræ beneficio, apta sit occludere Ilei intestini egressum. Ante quem pendet, instar cortinæ, vel veli alicujus laxioris.

Si quid enim excretorum ab Ileo affluit, attollit se; concedens illis liberum transitum. At cessante affluxu concidit ilicò; impediens expressè, ne quid revertatur iterum, à colo, aut cæco, ad Ileum. Planè adinstar nostratium Cata-ractarum, quarum repagula spontè non minùs aperiuntur, quàm clauduntur. Quarumque bipatentes Januæ ita conformantur: ut tantum pateant refluxui, cedendo; quantum renituntur fluxui, obluendo.

Imò, quò quid validiùs hanc valvulam premit, eò reprimat ipsa potentiùs. Tam arctè subinde occlusa: ut ne tenuissimum quidem transmiserit spiritum. Nisi fortè robur, ac stabilimen ipsius, vel à morbo, vel ab humidâ aliquâ intemperie flaccescat. Velut id aliquandò perspicuè à nobis observatum, in muliere hydropicâ, cui præ nimio madore, uti reliqua exta, sic quoque acquisiverat hæc valvula tantam mollietatem: ut vix potuerit manibus tractari: nedum illud officium corpori facere, cui ipsam destinaverat sollicita ac provida natura.

Pendula autem hujus valvulæ membrana, ut crassâ ac duplex est: sic quoque apparet oblonga, lata, & si extendatur, semicircularis. Sed latitudo ipsi admodum dispar est. Etenim quâ Ileon respicit, diffundit se laxè, adæquans fermè duos digitos transversos. Sed quò longior hinc recessus; eò utique arctatur pressus. Adeò, ut circa intestini medium (eò usque enim excurrit) vel prorsus oblitteretur, & desinat in membraneum illum ambitum, qui intrinsecus determinat intestinum colon à cæco. Ex quâ inæquali latitudine, sequitur necessariò semicircularis illa forma, quam proponit valvula, arte extenta. Ut exprimit fideliter minor figura.

Membrana verò hæc, adnectitur superius villoso illi circulo, qui colon finit. Sed subtus firmatur, vel potius detinetur validè (quod tamen non patebit nisi sagaci investigatori) à duabus exilibus membranulis, prodeuntibus utrimque ex latere illius orificii, per quod tenuia intestina sese exonerant in laxiora. Quorum vinculorum usus est, impedire, ne valvula faciliè vacillet. Alligant quippe ipsam Ileo ne sejugata, ob multiformes corporis agitationes, vel divellatur continenter, vel distracta aliquatenus, excidat protinus suis sedibus.

Sed inferior Valvulæ pars fluctuat liberè, quò se expeditiùs cum attollat, tum depri-

deprimat. In quo consistit totum officium, quod corpori humano præstat volubilis hæc pars. Cujus, adducto fræno, nisi coërceretur cottidiana stercoreis regurgitatio, erumperet necessariò quolibet momento per os abominanda ventris cloaca, confpurcatâ indefinenter illâ parte, quâ divinitatis suæ semina aliis communicat anima rationalis.

Quippe ita à Natura comparatum est, ut licet à superioribus partibus oriantur intestina tenuia, descendant tamen propterea non rectâ deorsum, sed expellant excrementa sua sursum, ob sinuosâ intestinorum volumina. Præcipuè verò circa locum hujus valvulæ, sine cujus impedimento reverteretur stercois facilè ad os. Gravia namque natura sua feruntur deorsum, maximè in via lubrica, ac declivi: quibus accedit, quod intestina tendant continenter deorsum, per motum peristalticum. Cujus naturam descripturus Galenus, asserit satis distinctè, ciborum delationem per intestina fieri, intestinis circa ipsos sese contrahentibus. *Comment. 5. lib. Epid. 6. cap. 37.*

Quem naturalem intestinorum motum promovent tam serio, cum septum transversum, tum muscoli Abdomini incumbentes: ut inclinata coli fistula, vix ulla excreta, ab Ileo sibi tradita, foret retinendo, nisi nutanti, ac pronæ ipsorum revolutioni providè obviam ivisset interpositum hujus valvulæ obstaculum.

O fortunatos aulicos, si tali contra relapsum custodiâ firmaretur fluxa ipsorum potentia. Non deciderent certè tam facilè à summis ad ima. Neque momentanea intervalla attollerent dejicerentque tam frequenter idem lubricæ dignitatis fastigium, fiduciamque alienâ vi innixam.

Vis invenire insigne hoc industriæ naturæ artificium? exscinde transversè, ex intestinis stercore etiamnum repletis, utramque cùm Ilei tum coli extremitatem. Et conspicias, in ejus medio, valvulam commemoratam. Potissimùm verò si infuderis aquam, per abscisam Ilei partem quam liberè transibit quicquid liquoris illi obtuleris.

At illam quam infundes per colon sistet ilicò valvula. Quam propiùs quò conspicias, divide scalpello coli tunicas, ab aquâ etiamnum distentas. Et factò initio, à loco Ileo opposito, deducere paulatim ad ipsam valvulam. Quâ vel minimùm elevatâ, effluet ilico quicquid liquoris fuit remorata. Velut fategimus adumbrare in majore figurâ. In quâ accuratè delineatur pendula valvulæ membrana.

Cujus crassitiem; latitudinem; nexum cum intestino colo; ac fibrosâ vincula, quibus utrimque Ileo subtus adligatur, siquidem lubet attentè considerare, penetrabis proculdubio in absconditam hujus arcani naturam. Et non poteris non celebrare divinam providentiam, & eximia illa sapientiæ monumenta, quæ in nobis profusissime constituit Deus. *Plura vide loco citato.*

P A R S VII.

De Vasis Lienis.

Ex Disq. Anat. Highmori lib. 1. part. 3. cap. 2.

Vasa quæ Lienî inferuntur variè ab Anatomicis recensentur. Vulgaris illorum descriptio hæc est. A Venâ Portæ ramus insignis, splenicus dictus, transversim missus, ad Lienis cavam tendit: ibi in plurimos ramos divisus, in substantiam ejus, fibrarum instar, absumitur, præter duos, Vas breve scilicet, quod aliquando in fundum ventriculi, aliquando in superius ejus orificium inferitur; quo succus melancholicus eructatur ad ciendum appetitum: Alter, scilicet Hæmorrhoidalis, ad anum abit. Arteriæ itidem frequenti serie, lienî implicitæ, ortum ducunt à cœliacâ, quintuplò plures quam venæ; ideoque (inquit Spigelius) credibile est materiam copiosiore in arteriis, quam in venis contineri in schirris & aliis affectibus lienis; & propterea sæpius per arterias, quam venas expurgari. Nervos etiam à sexto pari accepit, qui lienis potiùs tunicæ inferuntur, in substantiam verò non penetrant, consensu Vesalii, Bauhini, Spigelii ac penè omnium.

Sed Vasa hæc nullibi rectè descripta ab Anatomicis unquam invenire potui, si fas sit Autopsiæ credere. Quæ igitur sæpè experimentis crebris confirmata in præsentia multorum virorum insignium, amicorum nostrorum observavimus, breviter expediam.

Arteria ex cœliacâ, satis magna, enata transversim per inferiorem Omenti membranam se distendit. In medio itinere bifurcata, alter ramus ad lienis partem elatiorem in homine & in cane ut Tab. VII. fig. 1. & 2. h. m. & Tab. VI. i. i. Alter ad demissiorem profertur, qui in varios divisi furculos, in substantiam ejus inferuntur. In Vaccis, ovibus, & damis non est divisa, sed tota in partem ejus inferiorem implantatur; quia partibus superioribus fortiter ventriculo alligatur. Cùm verò utrinque substantiam ejus intrârunt, variè per eam in plurimas ramorum soboles diffunduntur, ut in bovis liene [fig. 1. Tab. VII. a. a. a.] videre licet. Venas nullas habet in bove, damis, ovibus, &c. sed Ramus Splenicus cum ad lienis sedem inferiorem pervenerit, quamprimum penè tunicam ejus penetraverit, in porosam lienis substantiam statim Tab. VII. fig. 1. e. e. e. desinit; quæ in illam, variis foraminulis pertusam, sanguinem effundit, unde in Portam reducitur, Tab. VII. fig. 1. c. c. c. In humano verò liene, paulò altiùs in substantiam ejus unâ cum arteriæ furculis penetrant, nec tam manifestim perforantur, ut in bove, quibus foraminulis sanguinem à substantiâ lienis recipiunt. Nullo modo tam variis anfractibus cum arteriis implicantur; nec ut in hepate venæ portæ & cavæ propagines disseminantur, & inoculantur; sed plexus illi, & inoculationes quæ in liene conspiciuntur, à fibris invicem contextis oriuntur.

Fibræ hæc ab Anatomicis pro venis habitæ, quasi rami splenici essent propagines,

nes, sunt revera filamenta tenuia, valida, nullam cavitatem habentia, nec à ramo splenico, sive arteriâ originem ducentia, sed variè inter se complicatæ fibræ, quasi retia multa complicata, & connexa fuerint; utrinque tunicæ lateribus firmiter adnectuntur; ex quâ principium ducere videntur, circa quas fibras parenchyma lienis, carnosa quædam substantia leviter undique circumvoluta, adhæret, interjectis ubivis foraminibus plurimis; quæ cancellos, seu vacua illa spatia, quæ retium chordis interjacent, referunt, seu foraminula illa inania in spongiâ, aut pumice exprimunt: & fibræ parenchymate vestitæ, [Tab. VII. fig. 1. G. G. G. G. filis retium, seu partibus continuis pumicis, aut spongiæ appositè satis adsimulantur. Mirificè inter se contextuntur, adeò ut hac in parte Natura artem suam maximè ostentare videatur; & opus tam mirandum ex industriâ confecit, ut fabulosas illorum opiniones convellat, qui membrum esse otiosum, & nullius usus affirmant.

Sed utinam ita tibi (Benevole Lector) hæc ante oculos ponere potuerim, quemadmodum si præfens essem, levique admodum operâ in lienis sectione tibi monstrarem. Maximè, cum tot fabulæ de Lienis officiis, ac venis, & inosculacionibus cum arteriis; de variis plexibus, ante hæc à cæteris dissectionis professoribus sint effectæ. Quorum alii perperam ossitanterque Lienis fabricam aggredientes, & quæ hæc vasorum sit distributio, & situs non observantes, nescio quos plexus venarum ementiuntur. Alii Sectionem aversati in cathedris sedentes, sibi quæ ipsi mirificè placentes, Promethei instar, sibi imaginatione hominem fingunt, atque hinc Medicos tam diu latuit Lienis cognitio. Sed quorsum devehor? ad metam propositam rursus contendamus.

Venæ omnes quæ à Liene ducuntur in Porcis, Damis, Ovibus, Canibus, Equis aliisque animalibus, conspicuas Valvulas in illis habent à Liene spectantes, quæ Rami splenici ductum à Portâ ad Lienem penitus obstruunt. In Bove, damis, & ovibus quia unica est vena, unica duntaxat apponitur valvula. [Tab. VII. fig. 1. b.] in cane & aliis ubi venæ plures sunt, unicuique valvula affigitur, [Tab. VI. a. a. a. a.] venis etiam quæ ex hoc ramo ventriculo, & omento offeruntur, (seu potius quæ in hunc ramum inhiant) appositæ sunt valvulæ [Tab. VI. d. a. g. a. l. a. a. a.] quæ omnes ad ramum splenicum aperiuntur, & in illum sanguinem refundunt. In humano verò Liene non licuit mihi tam plana demonstratio, cum ob membranarum tenuitatem, & in corporibus emortuis omnium decidentiam, & conniventiam, illas à venæ tunicis discernere haud potuerim. Sed sanguinis fluxum in omnibus eundem esse, vel hoc, tam in vivis brutorum dissectionibus, quam emortuis hominum cadaveribus, sæpius repetitum experimentum probare potest. Aperto ramo splenico in medio ejus, inter lienem & Portam ductu, si versus lienem, ramum digito compresseris, ab insisto vulnere, parum & languidè, à portâ, tam in vivis, quam emortuis sanguis effluit, si verò digitum tollas, & ad alteram partem sectionis rami splenici, versus Portam venam coarctes, violenter & affatim à Liene effluit, imò per illud vulnus totam sanguinis massam in vivis brevi temporis spatio irruere videbis, in emortuis omnis qui in liene & Aortâ ad cor usque fluxui aptus est, per vulnus hoc facile effluet.


Antequam verò ad Lienis portas pervenerunt vasa, insignis inter arteriæ & venæ ramum superiorem anastomosis invenitur, cujus officium ab Anatomicis oscitanter nimis designatum, mihi non placet; tale ego assignarem: cum tot arteriæ lienī offerantur, multò plures quam hepatis (quod ideo fieri existimamus, quia arteriæ illæ ducuntur, non solum ad usum privatum, ad ejus solummodò nutritionem, sed ad publicum etiam, excrementi scilicet evacuationem, ideoque plures ad illum tendere debuere) necesse fuerat talem adesse inoculationem cum vena, ut pars aliqua sanguinis, priusquam lienem ingrediatur, venæ emandetur, ne lien nimia ejus oppressus quantitate, obrueretur, & ab officio impediretur. Neque verò antea hæc inoculatio fieri debuit: sed ad portas penè lienis sanguis unà cum melancholiâ deduci oportet, ut à facultate Lienis attractrice solummodò pars sanguinis melancholica introducatur; reliqua purior & sincerior pars, ne quantitate lienem opprimat, per anastomasin hanc, venæ splenicæ, quæ ad Portam, atque indè ad Hepar desert, emandatur.

EXPLICATIO TABULÆ IV

Ex Messè Aurèâ, & speciatim Exercitatione Anatomicâ de Vasis
Serosis OLAI RUDBEEK,

Ad Paginam hujus Appendicis 391. pertinentis.

A.	Ventriculus canis.	cccc.	Vena lactea inter intestina & pancreas glandulosum.
B.	Pylorus.	ddd.	Vena lactea pancreas hoc egredientes & vesicula chyli inserta.
C. C.	Duodenum.	aa. eeeee.	Ductuum hepaticorum extra hepar origo.
D. D. D.	Jejunum.	fff.	Eorum ad Glandulam m. & ab illa in vesiculam Chyli progressus.
E. E. E.	Ileum.	gg.	Rami duo ductus cholidoci.
F.	Cæcum.	k.	Hujus ductus in duodenum insertio.
G. G.	Colon.	iiii.	Vena meseraica,
H.	Principium Intestini recti.	m.	Glandula sub Porta sita ductus hepaticos recipiens.
I. I. I. I.	Quinque lobi Hepatis.	nn.	Unus horum ductuum vesicam fellis perreptans sapissimè visus.
K.	Vesicula Fellis.	ooo.	Vena porta in hepar ramificationes.
L. L.	Renes.	rrr.	Ductus hepatici qui (arctissimè vena cava adherentes) vesiculam Chyli ingressi sunt.
M. M.	Vena emulgentes.	tt.	Vena cystica.
N. N.	Vena cava.	ppppp.	Valvularum in hisce ductibus sedes.
O.	Vena porta.		
R.	Vesica chyli.		
S. S.	Mesenterium.		
T. T.	Pars Mesenterii fracta ut ligatura ductuum Hepaticorum commodè institui potuisset.		
â â.	Pancreas glandulosum, in medio Mesenterii.		
bb.	Pancreas carnosum duodeno annexum & Ventriculo substratum.		



EXPLICATIO TABULÆ V.

Ex eâdem Exercitatione RUDBECKII.

FIG. I.

- A.* Cor à sinistra parte.
B B. Pulmones in dextrum reflexi.
C C. Vena cava.
D. Vena axillaris dextra.
E. Vena axillaris sinistra.
F. Pars ejusdem aperta ut in conspectum veniret vena chyliфера insertio.
G. Sternum, punctis solis delineatum.
H. Vena jugularis sinistra.
I I. Arteria aorta.
K K. Vesicula Chyli.
L. Ramuli vena cava hepatici.
a a. Vena emulgentes.
b b. Vena lumbares.
d d. Vena crurales.
e e e e. Vasa serosa quæ sub intestino recto ad vesiculam Chyli tendunt.
fffff. Glandula ad crurales venas sita.
g g g. Harum Glandularum vasa serosa vesiculam prospicientia.
h h h. Ejusdem generis vasa, inter abdominis Musculos progredientia, quæ similiter vesiculam Chyli ingrediuntur.
i i i i. Vena lactea inter Pancreas glandulosum & vesiculam chyli repentes.
k k k. Pancreas Glandulosum.
l l l. Vena lactea mesenterii inter pancreas & intestina.
m m. Ductus Chyliferus.
n. Ejus in Venam axillarem insertio.
o. Glandula sterni.

- p p.* Harum ductus serosus ramo chyliifero inbians.
q. Ramulus hujus ad costas progrediens.
r r. Glandula Cordis.
s s. Harum Glandularum vas serosum, quod sub Corde ductui chyliifero inseritur.

FIG. II.

- t.* Ostendit bifurcationem ductus Chyliferi sub Corde, ut plerumque illam inveni.

FIG. III.


- x.* Vena axillaris cum jugulari sinistra. *y.*
u. Ductus Chyliferi triplex insertio.

FIG. IV.

- z.* Ramificatio varia ductus chyliferi, ut ter in animalibus repertus est.

FIG. V.

- x x.* Oesophagus.
β. Glandula ipsi adjuncta.
γ γ. Vas serosum inde ortum trahens & ductui insertum
δ δ. Ductus Chyliferus.



EXPLICATIO FIGURARUM

TABULÆ VI.

FIG. I.

Ex ductu Chylifero Joan. van Horne.

Ubi Chyli ductus proponitur.

- a a a. Vena & arteria Mesaraica.
 b b b. Vena lactea per Mesenterium disseminata.
 C C. Glandula Mesenterii maxima, Atellio quoque Pancreas dicta.
 d d. Duo rami insignes per medium ramum conjuncti, à dicta glandula ad Renalem pergentes.
 F. Glandula reni sinistro superjacens.
 g g g. Anfractus, gyri, plexusque quamplurimi arteria magna trunco incumbentes.
 H H. Ductus Chyliferus novus per Thoracis longitudinem ascendens.
 i i. Ejusdem bifurcatio intra quartam & sextam Thoracis vertebra.
 K. Portio ductus Chyliferi œsophago incumbens, ubi Cor superavit.
 L. Ductus insertio in jugularem sinistram.
 M. Ejusdem ingressus in Axillaris principium seu subclaviam.
 N. Vena cava portio supra Cor.
 O O. Ejusdem vena sinistra bifurcatio.
 P P. Oesophagus. Q. Cor.
 R R. Pulmones. S. Aspera arteria.
 T T T. Arteria aorta descendens.
 V V V. Diaphragmatis discissi portiones.
 X. Ventriculi corpus ad latus positum.
 Y. Intestini recti portio à suo loco remota.
 Z. Ren sinister cum vena & arteria emulgente.
 z. Venula transiens glandulam renalem, & ad lumborum musculos terminans.
 ß ß. Ramuli intercostales ab aorta derivati.
 ð ð ð. Intestini jejuni pars.
 é é. Hepatis lobus Ventriculo incumbens.

FIG. II.

Ex Bartholino de Vasis Lymphaticis.

Ubi Lymphæ ductus exhibentur.

- A. Cor in suo situ.
 B. Vena cava ex corde adscendens.
 C C. Axillaris vena. d. Oesophagus.
 e e. Jugulares venæ. F F. Pulmones utrinque.
 G G G G G. Hepatis lobus. h. Vescicula felleis.
 i. Vena lactea Thoracica axillari sinistra inserta.
 K. Arteria aorta ex corde egrediens.
 L. Ventriculus.
 m m m m. Intestina ad sinistram reflexa.
 N N. Renes.
 o o o o o. Pinguedo, quam Vasa Lymphatica penetrant, sub qua etiam prope Emulgentes Receptaculum situm est, & hic inde lactea glandula.

- p. Arteria Iliaca. q. Vena cava descendens.
 r. Ureteres circa pelvim vesica abscissi.
 s s. Pedes anteriores denudati.
 t t. Vena Porta. u u. Emulgentes Vena.

Reliqui ductus subtiles, venas ambientes & comitantes, literis ob exilitatem non signati, Vasa Lymphatica nova designant. Per axillarem venam C dextram simplex ramus, per sinistram bifurcatus, in angulum jugularis e e inseritur. Ex hepatis lobis G G G G G G varii annuli & rami Lymphatici Portam t transcendunt, & se in pinguedinem o o immergunt. Exilis quoque ramulus Lymphaticus ex vesicula felleis h eandem portam t petit, nonnunquam plures. Ambiant he vena Lymphatica Arteriam Iliacam p & Venam cavam q variis gyris, annulisque, ad sinistram latus arteria oblongiori ramo, hic inde Anastomosibus inter se juncta, qua per pinguedinem o o o in Receptaculum, seu glandulas lacteas, se effundunt omnes.

FIG. III.

Ex Disquisit. Anat. Highmori, pag. 62.

Ubi Canis Lien ac Vasa depinguntur.

- A. Vena porta. B. Ramus splenicus.
 C C. Lien canis in suo loco.
 D. Ramus Arteria Cœliacæ Splenicus.
 E E. Ventriculi fundus.
 a a a. Venarum à Liene prodeuntium apertio, ut valvula ostendantur.
 b b. Gastrica arteria sinistra.
 c c. Vas breve Arteriosum.
 d. Vena gastrica minor. e. Arteria gastr. major.
 f f. Ramus gastroepiplois sinister reversus ad Ventriculum.
 g g. Vena gastrica major.
 h h h. Vasa in fundo Ventriculi dispersa.
 i i i. Arteria furculi lieni deligati.
 k k. Arteria Epiplois sinistra.
 l l. Vena ejusdem nominis ejus socia, cum valvula dilucidata.
 m m. Epiplois postica Venalis.
 n n. Vena in pancreas disseminata.
 o o. Vena Mesenterica. p. Vas breve venosum.
 q. Vena gastroepiplois reflexa.

FIG. IV.

Ex Observ. Tulp. pag. 222.

Quâ Valvula Intestinalis exhibetur.

- a. Ileum intestinum. b. Cæcum. c c c. Colon.
 d d d d. Valvula pendula. e. Ilei ingressus.
 ff. Colon divisum. g g. Interior Coli status.
 h h. Valvula elevata. i. Ilei initium.
 k k k. Circulus. l. Nexus cum ileo.

PARS

Fig. III.




Fig. IV.




Fig. II.





Fig. I.



P A R S VIII.

De Pancreate.

C A P U T I.

*De Ductu ejus Vrsungiano.**Ex Disq. Anat. Highmori lib. 1. part. 2. pag. 42.*

Pancreas quasi quid totum carnosum, corpus est informe, laxum, glandulosum & magnum, ad primam lumborum vertebra situm, quod posteriori ventriculi parti, ejusque fundo, Duodeno, venæ Portæ, Renibus, & ad Hepatis usque ac Lienis sedes diffusum, quatuor digitos longum Tab. IV. fig. 2. A. A. B. B. In hominibus minùs quam in canibus rubet, in quibus ad figuram semilunarem vergit. Fig. 1. A. A. B. B. In medio album est, quod ipsius est parenchyma; per quod *ductus* quidam membranofus insignis, totum ejus corpus oblique perrepat, utrinque plurimos ramulos usque ad extremam ejus superficiem dispergens. Tab. IV. fig. 1. & 2. a. a. a. a. Qui more cæterorum vasorum versus extrema ubique divagantes, deficiunt & obliterantur. Cujus orificium ad dextrum Pancreatis terminum amplo hiatu, in aliquibus animalibus in intestinum, in aliis in meatum cholidochum aperitur. In canibus enim in intestinum Jejunum, à meatus biliaris ingressu, per spatium duorum digitorum transversorum infra inseritur. Tab. IV. fig. 1. a. 2. f. In vaccis à meatus biliaris ingressu penè spithamos duos distat fig. 3. C. In hominibus verò, sicuti & in ovibus, in meatum biliarem inhiat; in ovibus per spatium trium digitorum transversorum ab ipsius meatus biliaris insertione in intestinum implantatur. Fig. 4. D. E. in hominibus autem in meatum etiam biliarem, sed prope ejus ingressum in duodeni finem terminatur. Fig. 2. c. a. In his, quibus in intestinum Jejunum implantatur, in intestini cavitatem, eodem modo quo meatus biliaris, inter binas ejus tunicas ducitur. Fig. 1. 2. & circa exitum, tunica intestini interior eminentiâ quâdam instar umbilici corrugatur. Fig. 1. f. ut foramen meatus cholidoci. e. In vaccis ductus hic magnus est, & facillè digitum minorem admittit; si infletur, pollicem penè æquat. In canibus, ovibus, hominibus, & aliis stilum facile recipit, & ureteribus magnitudine non multum cedit. Quando in meatum biliarem inseritur, neque inter tunicas ejus decurrit, neque valvula ulla adstat; sed bilis in illum facillè remeare poterit; licet Bartholinus (illusterrimi Bartholini filius non minus insignis) valvulam in exitu posuisse videtur: Nullam verò vel stilo, vel sectione, vel inflatione explorare potuimus: sed immisâ fistulâ totum ab intestino, vel meatu biliari, usque ad extremitates capillares inflatione distentum reperimus. Si autem tunicam intestini interiori valvulam esse velit, non multum contendemus, ejus vicem supplere facillè conce-

concedemus. In illo humor conspicuus nullus invenitur, licet in vivis dissectionibus filo statim ad intestinum connectatur. Bartholinus bilem in illo ordinariâ naturæ lege contineri dicit, quia stilum immissum tali plerumque colore inficiat; Et illum bile plenum, Venetiis in diarrhæa biliosâ inventum fuisse ab amico ejus, narrat. Cùm in meatum biliarem inhiat, ut in hominibus, facîle in dissectione contingere potest, ut partium commotione bilis à meatu biliari in illum refluat, uti nobis in dissectione sæpius accidisse observavimus. Atque hinc tinctura illa flava in ductus hujus parietibus nasci poterit: Quod verò in diarrhæâ biliosâ humore tali plenus inventus fuerit, si non eodem errore accidisset; illud fieri dicamus, quia totum venosum genus infectum fuerat, totaque massa sanguinis biliosâ facta, ut in ejusmodi affectibus contingit; natura per omnes vias humoris vitiosi expulsionem molitur, atque sic per ductum hunc etiam bilem expurgare conatur.



Ramus splenicus & arteriæ coeliacæ ramus in ejus parte elatiore ad Lienem transcentes, ramulos quosdam in illud immittunt. Tab. IV. fig. 1. & 2. k. k. k. l. l. l. Surculi item nervorum sexti paris ad ventriculum & Duodenum migrantes, quemadmodum & meatus biliaris, in dextro ejus termino percurrunt. Ab arteriâ splenicâ ramuli quidam sparguntur, quibus alimentum & spiritus recipit: Venas item ad reducendum superfluum sanguinem à ramo splenico & mesaraicis obtinuit; Ab utrisque etiam humores melancholici deponi possunt.



TABULÆ VII.
Quæ est IV. HIGHMORI
EXPLICATIO.

Figura prima canis Pancreas ac mesenterium ostendit; secunda humanum cum ductu novo.

A.A. 1. 2.	Pancreatis partem superiorem integram refert.	L. 1.	Vena Porta.
B.B. 1. 2.	Inferiorem ejus partem dissectam, ut ductus appareat, monstrat.	e. 1.	Exitus meatus biliaris in cavitatem intestini.
a.a.a. 1. 2.	Ejusdem ductus propagines per totum illius corpus dispersas indicat.	f. 1.	Exitus ductus Pancreatis.
b.b. 1. 2.	Meatus biliaris in Fejunum ducens.	M. 2.	Curva portio.
c. 2.	Insertio hujus ductus in meatum biliarum.	N. 2.	Pars hepatis dissecta.
d.d. 1. 2.	Meatus Hepaticus ab hepate descendens, & cum altero à vesicula bilis congressus.	1. 1. 1.	Meatus biliaris inter binas tunicas intestini progressum indicat.
C.C. 1. 2.	Intestinum Fejunum.	2. 1.	Idem de ductu pancreatis explicatur.
D.D. 1. 2.	Vesicula bilis.	g.g. 1. 2.	Ramus splenicus ad lienem ducens.
A. 1.	Fejunum apertum, quo melius ductus hujus, ac meatus biliaris insertiones in illud conspiciantur.	h.h. 1. 2.	Arteria coeliaca ramus lienem petens.
F.F. 1.	Lobi Hepatis canini: Et humani pars.	i.i. 1. 2.	Anastomasis horum vasorum.
G.G. 1.	Ventriculus subversus.	k.k. 1. 2.	Surculi à ramo splenico in pancreas immissi.
H. 1.	Duodenum intestinum.	l.l.l. 2.	Surculi ab arteria splenica ad idem distributi.
I.I. 1.	Lien caninus.	l.l.l. 1.	Vena lienem caninum à splenico ramo ingredientes.
K. 1.	Mesenterium.	m.m. 1.	Arteria eidem designata.
		o.o.o. 1.	Vasa in ventriculi fundum inserta.
		p.p.p.p. 1.	Vena lactea in mesenterio.
		q.q.q. 1.	Vena mesaraica.
		r.r.r. 1.	Arteria mesaraica.
		f.f.f. 1.	Intestina tenuia.



EXPLICATIO FIGURÆ I. IV. & V.

TABULÆ VIII.

FIG. I.

Ex Highmoro pag. 62. quæ est fig. I. Tab. VI.

Lienem bovis monstrat, qui ob magnitudinem felicius partes hujus visceris interiores à nullis adhuc rectè descriptas explicat.

- A. A.** Substantia Lienis ejus tunicâ propria tecta.
B. Vena porta portio.
C. Ejus Ramus sinister, seu Ramus Splenicus.
D. Ramus hic propè Lienem apertus ut Valvula ostendatur.
E. E. Lienis tunica dissecta & inversa, ut vasorum & fibrarum progressus ac plexus melius ostendantur.
F. F. F. Arteria Splenica portio, qua totam Lienis substantiam percurrrens, in illam
a. a. a. Surculos suos dispensat.
G. G. Fibra quædam nervosa mirè complicata, inter quas Arteria surculi excurrunt,

- & quibus Parenchyma Lienis affixum adhaesctur.*
b. Valvula in ramo Splenico, extrorsum versus portam spectans.
c. c. c. Foramina quadam in termino rami Splenici à Lienis substantia ducentia conspicua.
d. d. d. Nervi per latera arteria Splenica percurrentes.
e. e. e. Rami Splenici terminus ad portas penè Lienis deficientes.

FIG. IV. & V.

Ductus Pancreatici insertio in Ariete & Bove ostenditur.

- A. A. 3. 4.** Intestinum Fejunum.
B. B. 3. 4. Meatus Biliaris insertionem monstrat.
C. 3. Ductus Pancreatici implantationem in Fejunum ostendit in vaccis.
D. 4. Ductus ejusdem in meatum biliarum ovium inhiationem demonstrat.

Fig. II. et III.








Fig. I.

Fig. V.

Fig. IV.



CAPUT II.

De Liquore ejus.

*Exercitatio Anatomica de Succo Pancreatici Naturâ & Usu
Regneri de Graef.*

§. 1. **C**UM superiorum seculorum mores inter se conféro, summam mihi admirationem movet ingens eorum diversitas: seculis enim primis, teste *Galeno lib. 2. de Anat. admin.* tanto fervore, tantaque diligentia Medici Anatomicen coluerunt, ut domi à parentibus ab ipsa pueritia in ea exercerentur.

§. 2. Postea verò cum Ars Asclepiadum familia excidisset, atque multis successibus in deterius sensim vergeret, quin multi pro lubitu multos morbos fingerent, eorumque causas sæpius falsas, quam veras, non sine decumbentium clade, excogitarent, opus fuit commentariis, quæ speculationem ejus adhuc integram conservarent, labentemque sustinerent.

§. 3. Anatome enim (*Montano* dicente) Alphabetum medicinæ est: quo, tanquam medicinæ fundamento, neglecto, reliquum etiam ædificium necesse est corruat, cum absque eo nec partes, nec partium functiones, neque proinde earundem læsiones cognosci aut discerni possint.

§. 4. Quidquid igitur omni ævo vere utile accessit ad Medicinam perficiendam, illustrandamque, id fere omne uni debetur Anatome; quæ licet subinde aliquem invenerit egregium virum (plurimi namque priscis temporibus videntur eam Anatomix partem diligentius excoluisse, quæ musculorum notitiam tradit, & parùm commodi, idque raro, solet exhibere, illam vero neglexisse, quæ præcipua est ac utilissima, maximeque necessaria, quæque versatur circa interiora corporis viscera;) numquam tamen tot habuit sui cultores eximios, quam nupero & imprimis hoc nostro sæculo, præ cæteris præcedentibus omnibus multifariorum inventorum numero ac præstantiâ foelicissimo.

§. 5. Nam, ut aliarum Disciplinarum incrementa fileam, tulit hoc ævum summos atque utilium inventorum excellentiâ clarissimos Anatomicos.

§. 6. Inter illos autem, qui sordibus ac fœtoribus subjectorum secandorum minime perterriti laudabiles in Anatome successus habuerunt, postremum locum non meretur *Gaspar Asellius* Ticinensis Anatomicus; qui hætenus incognitos in mesenterio *Ductus* observavit, quos *Lacteorum* nomine jam ante annos quadraginta duos publici juris fecit.

§. 7. Quoniam verò immaturâ morte sublatus est, alia plura huic negotio ex æquo explanando necessaria ulterius eruere ac reip. manifestare non potuit, sed idem opus aliis absolvendum relinquit.

§. 8. Successerunt enim plures in hoc opere, donec post annos multos tandem *Ductu Thoracico* è tenebris educto, constaret omnibus, quonam hæc vasa omnia tenderent, ac contentum humorem deferrent.

§. 9. Ne

§. 9. Ne autem omnes minutias referam, silentio præterire non possum egregium de *Circulari Sanguinis Motu* inventum, à nunquam satis laudando *Guill. Harveo*, Angliæ regis Archiatro, ante 36. annos primum in lucem productum: quod licet plures invenerit mox adversarios, tantum tamen mendacio & calumniis præstitit veritatis studium, ut jam vix aliquem ostendas amplius egregium Medicum, qui de hujus sanguinis motus certitudine dubitet: ita tempore aliquo semper opus est ad petulantium hominum quibusvis inventis bonis contradicentium nebulas discutiendas.

§. 10. Excitati sunt memoratorum, aliorumque excellentium Anatomicorum exemplo plures ingenio & manu præstantes Viri, unde ante annos circiter duodecim in lucem quoque producta sunt tandem à *Thomâ Bartholino* Dano, vel *Olao Rudbekio* Sueco, utroque Anatomico insigni, *Vasa Lymphatica* per universum corpus distributa, & hæcenus incognita.

§. 11. Observati quoque sunt ante paucos annos à *Thomâ Warton* Anglo *Ductus salivales* inferiores, uti postmodum anno 1661. à *Nicolao Stenonio* Dano, amico meo integerrimo, superiores: Hujus autem industriâ producta sunt in lucem alia quoque *Vasa in Nares atque Os* hiantia; ut taceam plura alia, quæ uti spero, brevi toti litteratorum orbi patefaciet.

§. 12. Hujus vestigia premens memini me ante aliquod tempus observasse in porco, pressâ *Glandulosâ faucium tunicâ*, per innumeros tunc apparentes poros, humorem satis crassum, viscidumque produisse, à quo tempore existimavi materiam illam viscidam, quæ screatu vel alia compressione faucium excernitur, ex hisce ductibus maximâ sui parte provenire.

§. 13. Non præter eundem autem silentio (quis enim omnium & singulorum inventa memorare posset?) *Joh. Georg. Wirsungus* Bavarus Anatomicus excellentissimus, qui ante annos duos & viginti Patavii primò in subiecto humano reperit & in reip. medicæ bonum, æri incisum, publici juris fecit, *Ductum per universum Pancreas* minoribus ramis dispersum, & in tenue intestinum hiantem: A quo plura potuissèmus sperare, nisi ab invidis nefariè in ædibus suis eo forsàn nomine fuisset sclopeto interemptus.

§. 14. Occasionem inventori suggessit curiositas *Mauritii Hofmanni* Phil. & Medic. Doctor. ac Professoris Altdorffini clarissimi, qui ædibus & manu ductione prælaudati *Wirsungii* tunc temporis utebatur.

§. 15. Cum vero tam proditoriè interemptus non potuerit egregius vir *Ductus* à se tam feliciter inventi usum investigare, plures, ut reip. inservirent, in pulvere illo defudarunt; in quo quia etiam aliquid operæ impendi, atque tandem qualis humor per ipsum deferatur, experientiâ multiplici, Deo benedicente, inveni, operæ pretium me facturum existimavi, si post præmissam ipsius partis descriptionem, mox expensas aliorum de hoc succo opiniones atque sententias, qualem quâque methodo ipsum ego offenderim omnibus patefacerem, hinc & usum ejus verum indagarem.

§. 16. *Pancreatis* vocabulum quod attinet compositum videtur ex *πᾶν* omne & *κρέας* caro, ac si dicere voluissent viscus hoc plane carnosum esse; quæ tamen

appellatio minime conveniens est, cum non sit corpus carnosum, sed glandulosum.

§. 17. Eodem nomine *Afellus*, & nonnulli ejus sectatores, mediam quoque Mesenterii Glandulam indigitantes, ut pro unâ, eademque haberentur confunderenturque partes diversæ, ansam dederunt.

§. 18. Situm est maxima sui parte Pancreas in hypochondrio sinistro atque circa primam lumborum vertebra Peritonœi membranæ, quâ investitur, firmiter annectitur.

§. 19. Quantitas Pancreatis in sanis modica est, & ad viscera reliqua comparata magnitudine plurimis eorum cedit. Si tamen cum aliis glandulis in homine adulto conferatur, omnes facile superat. Longitudinis & latitudinis pro diversorum valetudinis respectu non una observatur dimensio. Ab hepatis regione ad lienis usque confinia pertingit. *Longitudine* ut plurimum est quinque aut septem digitorum transversorum, quem terminum cum bene valet in hominibus vix excedit. *Latitudo* maxima duos fere cum semisse; *Craffiti*es circiter unum digitum transversum continet. Pondus in homine uncias quinque, in equo uncias undecim habere *Waronus* notavit.

§. 20. Communicat 1. cum Corde per Arteriarum coeliacarum ramum, à quo reliquarum partium more sanguinem perfectum accipit.

§. 21. Communicat 2. cum Hepate per Venæ portæ ramum insignem, atque ad ipsum amandat sanguinem à sui nutritione vel succi sui generatione superfluum.

§. 22. Communicat 3. cum Cerebro per Nervos sexti paris, excipiendo hac viâ à cerebro spiritus animales.

§. 23. Communicat 4. cum tenui Intestino per *Ductum* proprium in universum Pancreas secundum longitudinem per mediam ejus substantiam versus lienem tendentem, & à se quidem *Pancreaticum* & à primo inventore *Wirsungianum* dictum, quatuor circiter digitis transversis sub pyloro in hominibus cum ductu bilario, concurrentem & in tenuis intestini cavitatem apertum.

§. 24. In sua insertionem hic *Ductus* plerumque simplex in hominibus occurrit, (memini tamen me eum in subjectis humanis bis duplicem offendisse) in canibus autem quorum sectionem ad succum explorandum plus quam trigesies institui, aliisque brutis sæpius eum geminum observavi, & in variis naturæ lusum notavi.

§. 25. Idem hic *Ductus* membranofus tenuis & satis firmus existit, in laterales ramos majores hinc & minores divisus, & in omnes singulasque Pancreas constituentes glandulas distributus.

§. 26. Solet ut plurimum *Ductus* ille in hominibus intestino proximus, præter parvos, maximum & longissimum, alium satis grandem ac breviorum in parte sui inferiore ramum ostentare.

§. 27. Ubi *Ductus* ille immediate in Duodenum Intestinum exitum habet, quod in canibus, porcis, vitulis, aliisque animalibus plurimis observavi, ibi interior Intestini tunica prominet umbilici fere ad instar corrugata.

§. 28. Nulla

§. 28. Nulla in toto ductu valvula reperitur, ut nec in ejus insertionem ad Ductum biliarium, ubi laxior & quasi rugosus existit, unde difficilius stylum admittit, quam Ductus Biliaris amplior.

§. 29. Atque pauca hæc de Pancreatis fabricâ dicta sufficiant. Hoc autem inutile nemo facile dicet, qui novit Deum & Naturam nihil facere frustra.

§. 30. Usus itaque quod attinet Pancreatis, tanti equidem is neutiquam à veteribus habitus, atque hodie fuit: quapropter de eo variæ authorum sententiæ occurrunt: *alii* autem tantum pulvinaris instar ventriculo substerni, & distributioni vasorum inservire existimant; *alii* chylum ex intestinismittere; *alii* recrementum chyli purgare; *alii* esse quasi vesiculam biliarium lienis; *alii* partem hanc ad excrementitii cujusdam humoris secretionem formatam esse; *alii* tandem in pancreate humorem corpori utilem ac necessarium secerni.

§. 31. *Prima* opinio quæ partem hanc pulvinaris adinstar ventriculo substerni, & distributioni venarum atque arteriarum dicatam esse existimat, Veteribus adscribi potest, ut & *Vesalio* qui de humani corporis fabrica *lib. 5. cap. 4.* de Omento hoc satis affirmat, cum ait: *in homine corpus hoc*, de pancreate loquitur, *magis album quam rubrum cernitur, vena portæ, arteriarum & nervorum ramis imbiattensum, ut illorum divaricatio, inferiore membrana omenti duntaxat suffulta, reddatur securior; utque ventriculo etiam instar substerniculi ac pulvinaris subjiciatur.* Quoniam vero glandularum veram notitiam non habuerunt, Veteribus vitio vertendum minime est quod ulteriorem pancreatis usum non tradiderint.

§. 32. *Secunda* opinio *Baccio & Folio* tribuitur, qui arciter defendunt per Ductum Pancreatis transire Chylum ex intestino ad Hepar & Lienem; cujus contrarium ex sequentibus ipsa luce meridiana patebit clarius: cum nihil admittatur ex intestino in hunc Ductum, sed tantum emittatur per ipsum ad intestina succus.

§. 33. *Tertia* opinio *Johanni Veslingio* adscribitur, quoniam in Syntagmate Anatomico *cap. 4.* de Pancreate sic loquitur: *usus hujus canalis obscurus non est, nam cum acrem quandam fellicque non dissimilem succum exhibeat, palam est, excrementum tale per coctionem ulteriorem à chylo separatum allici intra hunc atque in duodenum intestinum expurgari:* quam opinionem quoque sequuntur *Afellius, Licetus, Riollanus*, &c. verum & huic sententiæ contradicit experientia, quâ constat nulla vasa lactea tendere ad hoc viscus glandulosum, quod forsan habuerunt nominati Authores Afellium secuti pro glandulâ mesenterii mediâ, in quam venæ lacteæ intrant.

§. 34. *Quarta* opinio *Bartholini* est, quod clare patet ex Anatomia ejus *cap. 13.* de Pancreate: naturaliter per ejus Ductum expurgari bilem existimat, vultque esse vesiculam biliarium Lienis, adeo ut quem usum præstat hæc Jecori, eundem credat hunc Ductum præstare Lienis: quam sententiam refutat ipsa Anatomie, cum nulla sint vasa Pancreatis & Lienis communia, per quæ aliquid feratur ad Ductum Pancreaticum.

§. 35. *Quinta* opinio *Wartono* tribuitur, qui in tractatu suo de Glandulis *cap. 13.* Pancreas arbitratur ad excrementitii cujusdam humoris secretionem, ejusque ad intestina expurgationem formatum esse.

§. 36. *Sexta opinio partim Gothofrido Mæbio tribuitur, qui in Fundamentis Medicinæ Physiologicis cap. 12. de usu Intestinelorum sic loquitur: hic autem Succus recrementitius (pancreaticus scilicet) quum chylo simul cum bile in duodeno admisceatur, extra omne dubium ejus fermentationem ulterius juvat, ac promovet: si enim purum putum excrementum, ac nullius usus esset, natura canalem istum ad intestina inferiora, in quibus inutilia scybala hospitantur, non ad superiora, ubi chylus in ventriculo inchoatus expoliri debet, derivasset.*

§. 37. Partim clarissimo Præsidi meo Francisco de le Boe Sylvio assignatur, qui nihil ab intestino per hunc Ductum in Pancreas, nullum excrementum in Pancreate secretum per eundem ad intestinum, sed humorem laudabilem ex sanguine & spiritibus animalibus in ipso præparatum & quidem subacidum per ipsum deferri & alimentis admisceri existimat; qui præterea Glandulas plerasque in Conglobatas & Conglomeratas distinxit.

§. 38. *Conglobatae glandulae ipsi dicuntur, quæ ex una quasi continuata substantia, & æqualem superficiem habente constituuntur; quales in mesenterio & lumbis plurimæ occurrunt, ut & in locis aliis, v. g. inguinibus, collo, &c.*

§. 39. *Conglomeratas vero vocat illas, quæ ex pluribus glandulis minoribus simul junctis conflantur, quales sunt, quæ non tantum Pancreas, sed etiam Salivales glandulas & Thymum constituunt.*

§. 40. A glandulâ Thymo ante aliquot menses, cum in sectione vitulorum versarer (in quibus admodum magna reperitur hæc glandula, ac, quod notatu dignum est, semper postquam in lucem editi sunt sensim minuitur, etiam in aliis animalibus omnibus) reperi ductum satis magnum humore lymphatico repletum, quem aliquamdiu persecutus sum, sed quia propter agitationem inter denudandum sensim effluebat ejus liquor, ductus evanuit antequam ad ejus exitum perveneram, unde ulteriorem ejus investigationem in aliud tempus differre coactus fui.

§. 41. Hæc glandularum distinctio sequenti etiam experimento confirmatur, nam ablata, quâ tam conglomeratæ, quam conglobatæ investiantur, tunica sive membranâ, immittatur tum per Ductum Pancreaticum & Salivarem, item per singularum glandularum arterias, liquor aliquis & quidem ope Syringæ una cum variis tubulis ipsi affigendis à me ad motum sanguinis circularem per minimos etiam musculos, vasorum diversitatem demonstrandum excogitatæ; observabuntur glandulæ conglomeratæ à se invicem recedere, non item conglobatæ.

§. 42. Memini, quod plus est, me aliquando, accedente levi artificio, glandulosam Pancreatis substantiam eousque separasse, ut non nisi singularum ejus glandularum conglomeratarum pars interior remaneret una cum vasorum extremitatibus, quibus abundat hoc viscus.

§. 43. Differunt præterea quo ad substantiam hæc glandulæ, quoniam sepiissime in glandularum conglobatarum medio cavitatem reperi, non autem in conglomeratis; quod à Nicolao Stenone, Anatomico insigni notatum vidi in nuper editis observationibus Anatomicis, ubi agit de glandulis conglobatis, cujus verba

verba hæc sunt: *exterius enim globosæ, interius non quidem pelvi quâdam cavata sunt, separationem tamen rite si aggressus fueris, inter protuberantia undique labra, rimam invenies, quâ egrediuntur unâ cum membrana quadam lymphatici evehentes radices.*

§. 44. Non tantum substantiæ suæ connexionis ratione differunt illæ glandulæ, sed insuper vasis peculiaribus: Nam Conglobatæ vasis donatæ sunt lymphaticis, quæ omnia versus & ad communem Ductum Thoracicum dictum, sive volvulum ejus superiorem, propellunt liquorem in se præparatum, vel aliunde acceptum.

§. 45. Conglomeratæ autem in peculiare cavitates suum liquorem immediate deponunt, & Salivales quidem in Oris cavitatem, Pancreaticæ verò in tenue Intestinum.

§. 46. Hæc cum animo attento observasset celeberrimus meus Præses, cognosceretque nihil forte ad Intestina deferri, nisi quod deglutitum per ventriculū eò propellitur, aut per Ductum Biliarium, Pancreaticumve eò amandatur; & considerasset insuper non tantum in Febribus Intermittentibus urgeri sæpe ægros variis molestiis in regione lumbari, frigori, ardore, lancinationibus, nausea, vomitu tam Pituitæ insipidæ & nonnumquam acidæ, quam Bilis tum amaræ, tum amaro acidæ, &c. Sed in aliis quoque morbis ad Hypochondriacam affectionem ab ipso relatis, v. g. scorbuto, suffocatione uterina dicta, cholera morbo, ventris torminibus & hinc consequentibus infantium aphthis, &c. ructus, humoresque acidos assurgere, conclusit Succum Pancreaticum naturâ suâ esse subacidum, à Spiritibus nempe animalibus præsertim temperatum.

§. 47. Judicabat enim Bilem, cum amara sit, & hæcenus acido adversa, humori acido ortum dare non posse; ut nec Salivam, in sanis semper insipidam, ideoque aciditatem sæpe tam notabilem, ægrisque tam gravem à Succo Pancreatico debere deduci.

§. 48. Quoniam vero audiebam eundem hæc & similia sæpe docentem, atque eadem per fœlicem satis praxim in nosocomio confirmari videbam, ejus sententiam amplexus sum, atque in Collegiis tam publicis, quam privatis ab eodem Præside meo una cum aliis sæpius ad rei veritatem ulterius indagandam excitatus, manum operi admovi, & licet non semel de successu fœlici desperarem, tandem tamen Deo cœptis & votis benigne annuente, quod valde optaveram, modum colligendi Succum Pancreaticum jam ante menses circiter 16. reperi, quem nunc historice, prout in opere illo gradatim ascendi describam.

§. 49. Primum ergo à me factum in hunc finem in cane vivo experimentum fuit ligatura superioris Pancreatis partis una cum intestino tenui constrictæ; sperabam enim me post aliquot horas Ductum succo suo tumidum reperturum, sed frustra: An quia impedito simul sanguinis ad Pancreas motu, Succus ex ipso secretio fuit impedita?

§. 50. Secundum experimentum fuit quoque (vitatis vasis sanguineis) ligatura circa Ductus ipsius insertionem in tenue Intestinum; sed itidem frustra: An quia aliquæ glandulæ tunc simul erant læsæ, ut per illos effluere poterit succus?

§. 51. Tertium experimentum fuit per duos afferes in medio quam extremis eminentiores, atque Intestino tenui ad ductus egressum applicatos, & arcteligos: unde post aliquot horas aperto denuo abdomine prius leniter confuto Ductum reperiri Succo claro & lymphido tumidum, quamvis nec inde educi, nec gustari tunc satis potuerit.

§. 52. Hoc successu magis animatus quartum institui experimentum, aperiendo secundum sui longitudinem Intestinum duodenum, mox applicando Ductus Pancreatici orificio angustioris oris vitrum, quod phialam vocant, deinde dictum intestinum arctissime ligando circa hujus vitri collum, ita ut orificium vitri directe exitui Ductus Pancreatici responderet, sperans me hac ratione satis bonam succi Pancreatici partem gustu dignoscendam collecturum, at iterum frustra: an quia conclusus in vitro aer locum denegabat Succo Pancreatico affluenti?

§. 53. Quintum idcirco experimentum institui cum vitro leniter perforato, quale exhibet Figura I. Tab. II. foramen ad litteram B ostentans. Hujus igitur ope horis circiter quinque post sui applicationem reperi vitrum liquore amaro & sub flavo plus quam semi plenum. An quia bilis aliquid propter non mundatum prius intestinum Succo Pancreatico se admiscuerat?

§. 54. Quapropter post multas sollicitas & anxias mentis meae vexationes tandem ad septimum perveni experimentum expectationi meae omnibus modis satisfaciens, cujus accuratam descriptionem in Curiosorum gratiam hic exhibebo.

§. 55. Sumendum igitur longi colli vitrum quale in Tab. II. depictum habetur sub littera A. in cujus ventris parte superiore foramen exile B. perterebrandum, quod aer in eo conclusus cedat Succo Pancreatico allabenti. Hujus vitri collum coronetur nodoso funiculo C. notato vel alia re quavis, cujus beneficio commodius intestino confui queat.

§. 56. Præterea calamus tenuis & longus Anatum sylvestrium littera D. notatus circa partem sui ampliorem chartâ cocto amylo prius humefacta eousque obvolvatur, ut vitri orificio H. intrusus illud oppleat, ne ad calami latera vel bilis vel sanguis penetrans Succum quæsitum inquinet. Calamus ille vitro affigitur ob Ductus Pancreatici vitri collum non admittentis angustiam.

§. 57. Mox epistomium ligneum ad eam conficiatur crassitiem, ut angustius calami orificium K. impleat, cui alligatum sit filum L. & postea styli beneficio in calami partem ampliorem F. versus angustiores K. eousque protrudatur, ut aliquantulum per orificium calami angustius promineat, ibique tam firmiter hæreat, ut ad calami D. in Ductum pancreaticum intrusionem sponte non retrocedat, atque tunc nec pituitâ, nec crustâ intestini pannea obturetur, ipseque Ductus calami acumine lædatur. Sed nec tam firmiter calamo impellendum est dictum epistomium, quin fili beneficio retrahi queat.

§. 58. Hæc omnia simul, ut dictum, adornata habes in Tab. II. Figura II. Quo facto capiendus canis, cui per horas 15. aut 20. nullum est datum alimentum; præferendus autem molossus junior, quippe qui præ aliis canibus omnibus viscera habet magna, multumque Pancreatici Succo, & vitam trahit diutius, minusque parit in secundo molestiæ.

§. 59. Jeju-

§. 59. Jejunum canem fumendum dixi, ne ob turgentia ab alimentis cum ventriculo intestina impediatur clausura abdominis post affixum vitrum.

§. 60. Tali ergo cani post obturatum vinculis os, ne mordendo noceat, & extensa, ligataque supra mensam crura, sub larynge per apertam cutim & remotos musculos longos collum flectentes, transmissio sub aspera arteria stylo, duarum ipsius cartilaginum pars anterior exsecanda, quo per patens hoc orificium perficiatur respiratio, sublata omni voce.

§. 61. Hoc facto abdomen aperiatur, mox extractum per vulnus Intestinum proxime sub pyloro ligetur, ut & infra Ductus Pancreatici exitum, ne quid opus hoc nostrum turbet vel impediat.

§. 62. Deinde inter utramque ligaturam in longum findatur Intestinum in parte sui externâ & à mesenterio liberâ; mox mundatis spongiâ pituitâ, bile, aliisque ibi repertis, observetur Ductus Pancreaticus, qui duobus fere transversis digitis sub Ductus Bilarii exitu, & eodem pene spatio, supra connexionem Intestini cum Pancreatis parte descendente occurrit in canibus, in quem blande immittenda extremitas calami epistomio clausi, unâ cum affixo vitro, quod mediante funiculo nodoso C. per filum duplicatum acui inditum Intestino est assuendum, ut calamus in Ductu Pancreatico permaneat, nec ab Intestino vitrum secedat, atque tunc demum abdomen ita filo duplicato consuatur, ut extra ejus cavitatem vitrum propendeat, ut videre est in Tab. III. Fig. II. cui tandem pars vesicæ exsiccatae N. circa vitri collum per funiculum ita vincienda, ut vitrum undequaque tegat, ne sanguis vel Bilis affluens per vitri foramen B. intrare possit. Quibus ita perfectis epistomium ex calamo propendens è vitri foramine B. per filum L. retrahatur.

§. 63. Hoc instrumentum semper sufficiet, quando unus tantum est in Intestinum Ductus Pancreatici exitus; si verò plures, & quidem in loco superiori sint, quod jam quater vel quinquies præter meam expectationem accidit; aliud insuper instrumentum requiritur, quo claudi possint exitus cæteri; quem in finem instrumentum Tab. II. Figura III. notatum excogitavi, utpote magis huic negotio conveniens, quam illud, de quo actum §. 51. Habet autem duas tabulas ex ebore confectas A A. in quarum extremitatibus sunt foramina B B B B. illæ tabellæ inter ventriculum & affixum vitrum intestini lateribus mesenterio connexis utrinque ita applicentur, ut intermedium intestinum manu arcte comprimi queat, donec stylus acutus, hinc & cylindri C C. per dicta foramina transmittantur, & per cochleas D D. intestinum ita coarctetur, ut nihil ex dictis Pancreatis Ductibus, si qui sint, effluere possit.

§. 64. Applicato hoc instrumento abdomen filo duplicato ita consuendum; ut dictum §. 62. Atque ab hoc experimento argumenta peti possunt ac debent ad probandas Succo Pancreatici qualitates, quantitatemque singulis horis ad tenue Intestinum confluentis.

§. 65. Qualitates ejus quod attinet, non semper modo eodem illas se habere docent functiones ab ipso pendentes non raro vitiatæ, ac idem evincit Experientia mea; reperi namque ipsum semel acidum gratissimum, aliquando

do pene insipidum, nonnunquam austerum, sæpius falsum, sæpissime acido falsum.

§. 66. Experientiæ hujus meæ testem assiduam cito *Nicolaum van der Sprongh*, Commilitonem meum charissimum; nec non austeri & acido falsi saporis Præsidem meum in æternum honorandum, ut & Collegii nostri Practici in nosocomio Consodales plurimos; ejusdem autem austeritatis effectum notabilem tunc simul observatum vide infra §. 189.

§. 67. Ex tam diverso quo ad saporem observato Succo Pancreatico dubitare cœpi, an quemadmodum inferius probabo fieri in glandulis conglobatis omnibus, ita etiam in conglomeratis, puta pancreaticis & salivaribus, secundum omnes qualitates sibi consimilis secernatur liquor, & ut illa dubitatione liberarer eodem tempore in eodem bruto, primò in vitulo, postea in cane majori instrumentum Tab. II. Fig. II. depictum applicui tum Salivari superiori, tum Pancreatico Ductui, verum notabilem semper reperi in prædictis liquoribus diversitatem.

§. 68. Saliva enim magis temperata est, & ut plurimum insipida; Succus vero Pancreaticus minus temperatus occurrit & saporis valde diversi, uti hoc §. 65. fatis superque descripsimus.

§. 69. In glandulis vero conglobatis eundem, sibi que similem humorem fecerni, excernique probatur non solum per glandularum illarum substantiam ubique consimilem, sed etiam per vias, in quas idem exoneratur, desinentes scilicet, quantum mihi videre licuit, in Ductum chyloferum thoracicum; dum ex glandulis conglomeratis effunditur liquor in peculiare cavitates.

§. 70. Diversus cum sit glandularum diversarum Succus, merito quæritur, quem usum quivis habeat? an utilis, an vero inutilis sit?

§. 71. Glandularum conglobatarum liquor cum omnis in ductum thoracicum feratur, ibique admisceatur chylo, præcipuæ alimentorum ore assumptorum parti, atque cum ipso pergat & excernatur in venam jugularem, subclaviamve sinistram, & inde necessario cum sanguine descendente confusus transeat per dextram cordis auriculam in dextrum ejusdem ventriculum, non video quo nomine dici possit excrementitius ac inutilis; quia excrementitii humores ita fecernuntur à sanguine, ut secundum naturæ ordinem ipsi non amplius permisceantur, sed in totum è corpore excernantur, quod clare patet in urina, quæ in renibus à massa sanguinea secernitur & inde per ureteres in vesicam deducitur, unde post aliquam moram ad voluntatis dictamen per meatum urinarium in totum è corpore excluditur, & nunquam in corpus denuo reducitur.

§. 72. Sic glandularum conglomeratarum Succus per ductus peculiare in varias corporis cavitates effunditur, ubi humoribus aliis corpori alendo necessariis permiscetur, ideoque pro excrementitio ac inutili minime est habendus.

§. 73. Sic saliva in glandulis conglomeratis maxillaribus superioribus ac inferioribus secreta, per ductus suos salivares dictos in oris cavitatem deferitur, ubi cum assumptis alimentis miscetur aut extra assumptionis alimentorum tempus conti-

continuo deglutita in ventriculo cum chylo confunditur; quod sane indecens foret, si ipsa inutilis aut excrementitia existeret.

§. 74. Eadem fere ratione Succus Pancreaticus quatuor circiter transversis sub pyloro digitis continuo in Intestinum duodenum effunditur, atque ibi cum alimentis in ventriculo fermentatis miscetur, ac cum iisdem motu intestinorum peristaltico deorsum propulsus, pars aliqua, si non omnis, una cum parte ipsorum puriore ac liquidiore propellitur in venas lacteas, hinc in Cisternam, unde per ductum thoracicum & sic porro ad dextrum cordis ventriculum penetrat.

§. 75. Accidit huic Succo Pancreatico satis magna copia ad intestinum tenue continuo delato (memini enim me ex uno cane septem aut octo horarum spatio dimidium unciam, sex dragmas, imò ex maioribus canibus unciam integram colligere) ut cum bile similiter continuo ad duplam vel triplam fere quantitatem (quantum mihi haecenus in canibus observare licuit, in vitulis autem nunquam tam exacte prænominatos humores quam in canibus mensuravi) eo delata ibi effervescat.

§. 76. Effervescentiam excitari ex Succu Pancreatici aciditate & Bilis sale volatili abundantis concursu, tanto liberius asserere audeo, quia haecenus neminem offendi, qui vel unicum proferre potuerit exemplum spiritus acidi cum sale lixivo concurrentis absque contingente effervescentia satis manifesta, dummodo sublata sint omnia impedimenta.

§. 77. In Bile lixivum salem contineri norunt omnes, qui primis labris salutarunt chymiam, & post plerarumque partium humidarum evaporationem in faecibus remanentibus salem invenerunt.

§. 78. Succum Pancreaticum acidum in se continere patet ex memorato meo experimento; quod in gratiam eorum, qui veritatis sunt amantes ac scrutatores iterare ac demonstrare non detrectabo.

§. 79. In hominibus similiter aciditatem in se habere Succum Pancreaticum non tantum ex consimili fere omnium viscerum & contentorum in brutis & hominibus natura concluditur, sed insuper ex aliis observatis deducitur.

§. 80. Nam hoc evincunt acidi ructus extra tempus assumptorum quorumvis acidorum, & hypochondriis subinde primo tensis, aut post rugitus in abdomine primo observatos mox sursum per os erumpentes.

§. 81. Huc quoque faciunt miri ac pene inexplicabiles motus & agitationes circa regionem lumbarem, ipsumque adeo utriusque ductus bilarii & Pancreatici in tenue Intestinum exitum à quibusdam ægris subinde observati, quos imprimis sentiunt post graves animi affectus, iram præsertim, terrorem aut moerorem.

§. 82. Bilis autem cum acido effervescentiam, eamque blandam observavi aliquando in bile caninâ phialæ conclusâ ex affusa tertia circiter parte spiritus nitri, idque postquam in Solis radiis tantisper vitrum servassem.

§. 83. Postquam igitur ex præmissis experimentis atque ratiocinationibus argui puto effervescentiam in tenui intestino perpetuam fieri, videndum qualis illa tum in ægris, tum in sanis contingat.

§. 84. Illam sanitatis tempore admodum blandam contingere propterea puto, quia nullus ejus tunc est sensus, qualis non raro in agris observatur, vel distensionibus, vel lancinationibus, & torminibus, vel frigore vel calore valde molestus; uti nuper adhuc in nepte mea clarissime cognoscere potui, quæ referebat mihi se aliquando per septimanam integram sentire ebullitionem frigidissimam in latere dextro eo in loco ubi Intestinum duodenum situm est, eamque postea mutari in calidissimam aliquando per duas septimanas & diutius durantum.

§. 85. Quod si, quemadmodum diximus, contingat semper aliqua in tenui intestino ex confluxu bilis & Succii pancreatici effervescencia: quærat aliquis, in quem finem, usumque illa fiat? illi facilius fiet satis, ubi prius immutationes, quæ in aliis effervescentiis observantur, diligenter consideravit. Hanc ob causam igitur præmittemus nonnullas effervescencias, ut iis quantum possibile perspèctis, magis innotescat, quæ in tenui intestino contingere solet effervescencia.

§. 86. Quotquot chalybis limaturam cum spiritu vitrioli, aut oleo sulphuris per campanam parato, sed addita sufficienti quantitate aquæ, confuderunt, observare quoque potuerunt ex istorum quodammodo sibi contrariorum concursu excitari effervescenciam, cujus ope partes chalybis laudabilis junguntur spiritui acido, dum cæteræ pro scoriis habendæ partim fundum petunt, partim instar spumæ liquori innatant.

§. 87. Puto autem partes chalybis puriores & exactius mixtas idcirco jungi acido liquori, quia majorem habent cum ipso affinitatem, & ab ipso se solvi patiuntur, non autem cæteras impuriore & laxius inter se mixtas, siue sint eæ magis terreæ & ideo fundum petant, siue sint nimis oleosæ & ideo supernatent.

§. 88. Eadem major vel minor acidorum cum solvendis affinitas patet magis, si in eodem liquore plura metalla successive immittantur, & prius quidem illa, quæ minorem, posterius vero, quæ majorem cum ipso affinitatem habent.

§. 89. Sic quando in aquam fortem immittitur argentum & tam diu in ipsa detinetur, donec universum fuerit solutum, quod cum comite effervescencia absolvitur, hinc solutioni prædictæ cuprum imponitur, deseret argentum aqua fortis, & novam cum cupro inchoabit effervescenciam, dum sensim neglectum ab aqua forti argentum fundum petet; quæ mutatio præcipitationis nomine venit apud Chymicos. Quod si postea huic cupri solutioni ferrum injicias, idem omnino eveniet ac sensim ad fundum præcipitabitur cuprum. Quod si rursus ferri solutioni lixivium quodvis vel tartarivostii vel cinerum clavellatorum aliorumque affundas, longe arctius se illi soli conjunget spiritus acidus, quam prioribus corporibus metallicis & vix unquam se ab ipso patietur separari.

§. 90. Ratio unionis hujus arctioris petenda est à spiritu acido magis puro, hoc est minus mixto, & idcirco cum sale lixivo eodem fixo & hætenus quoque puriore, minusve mixto arctius sese jungente, quam cum sale eodem, sed minus puro, hoc est magis mixto.

§. 91. Hujus ejusdem affinitatis majoris ratione oleum tartari per deliquium paratum (quod aliud nihil est quam tartari sal per aëris humiditatem aqueam solutum) quando vitriolo in aqua itidem soluto affunditur, spiritui acido in vitriolo existen-

existenti sejungit, dum pars ejusdem sulphurea, utpote minorem cum aciditate affinitatem habens, paulatim secedit & fundum petit.

§. 92. Quibus ita præmissis, consideremus quænam alimentis in ventriculo per sui fermentationem accidunt & quænam iisdem, præsertim in tenui intestino, post absolutam nominatam fermentationem contingant, ut aliquid quam vulgo solet magis certum magisque probabile concludamus.

§. 93. Aperto una cum intestinis ventriculo, quando absoluta fermentatione ad intestina propelli solent alimenta, notabilem inter intestinorum ac ventriculi contenta mutationem observavi: nam ea quæ in ventriculo erant, consistentiam habebant crassiorem, viscidiorumque, & pro alimentorum, aliorumque assumptorum diversitate colorem diversum & minus sæpe albicantem. Quæ vero per intestina ferebantur consistentiam habebant fluidiorem minusque viscidam & magis albicantem.

§. 94. Hæc autem mutatio aliunde non potest peti quam à Bile, Succoque Pancreatico, quoniam illi humores soli quantitate notabili affluunt ad tenuis Intestini partem summam, & alimentis admiscuntur.

§. 95. Hanc opinionem nostram confirmat utriusque prædicti liquoris examen: nam Bilis sale volatili & oleo abundans vim habet incidendi, attenuandi, fluidumque præstandi omnia, quibus admiscetur. Hujus effati mei testes voco vel solos pictores, qui hunc in finem coloribus suis immiscunt bilem.

§. 96. Succus vero Pancreaticus spiritu subacido prægnans, uti ex superioribus experimentis constat, alimentorum visciditatem itidem solvendo ipsorum fluiditatem auget.

§. 97. Colorem albicantem in parte alimentorum fluidiore tunc observabilem quod attinet, illum à Succu Pancreatici aciditate vel ideo deducendum puto, quia multa alia sale lixivo & oleo abundantia notamus ad acidorum affusionem albescere.

§. 98. Sic Sulphuri vulgari in quovis lixivio soluto & rubenti quamprimum acetum vel vinum acidiusculum affunditur, rubellus ille color ita immutatur, ut lacti simillimus fiat, quare etiam lac sulphuris à Chymicis nominatur.

§. 99. Sed occurret forsân aliquis, cui vetera duntaxat sapiunt & nova for-
dent, qui quoniam nihil in Hippocrate, Galeno, Avicenna, aliisque Auctoribus legit de hac nostra per effervescentiam expectanda secretionem, non putabit requiri tantum apparatus ad utilia ab inutilibus separanda, sed sufficere in hunc finem alterationem, quæ fit in Ventriculo, cui si quid desit, obtineri id posse motu Intestinorum peristaltico, cujus ope propellatur pars fluidior in venas lacteas, remanentibus in cavitate intestinorum partibus crassioribus minusque utilibus & in alvinas fæces abeuntibus.

§. 100. Cui non negabo aliquid ad hanc rem conferre tum alimentorum fermentationem, tum dictum intestinorum motum peristalticum; non puto tamen aliquem Medicorum, nisi Antiquorum mancipium sit, ad omnia, quæ quotidie in brutorum sectionibus & praxi medicâ observantur, observari saltem possunt, attentum hanc à me positam causam rejecturum, imprimis si animo præsenti

exponderit in fluxu Coeliaco aliquando alimenta instar pultis viscida & ubique sibi similia & aliquando eadem cum albicante liquore mista excerni.

§. 101. Accidit autem illa diversitas à contingente aut non contingente per dictam effervescentiam utilium partium ab inutilibus secretionem, quam quis frustra soli expressioni adscribet.

§. 102. Non nego quidem solâ alimentorum fermentatione in ventriculo rite peractâ & imprimis ubi liquida simul fuerunt assumpta, aliquid fluidi posse sponte sua abire à cæteris alimentis magis pultaceis, illud autem parum est, si conferatur cum notabili copia chyli per lacteas venas colari soliti, aut etiam subinde in fluxu Coeliaco innatantis, adeo ut aquosior magis tunc sit illa pars sola compressione intestinorum sine effervescencia sponte prodians, altera vero longe albicantior aut ut sic loquar magis lactea.

§. 103. In spontanea quidem illa partium per fermentationem fieri solitâ secretionem, prodeunt imprimis cum aqueis spirituosæ, spiritibus animalibus reparandis necessariae; exemplum habemus in fermentatione plantarum, aliarumque rerum spiritu volatili abundantium, in qua partes spirituosæ ac maxime volatiles suis compedibus solutæ qua data porta ruunt: ab his subitanæ in hominibus debilitatis refocillationem quærendam & inveniendam plane sum persuasus.

§. 104. Quoniam vero ad vitam sustentandam non sufficiunt partes spirituosæ ac volatiles, quin insuper requirantur acidæ, oleosæ, salæ, imò terreæ, &c. idcirco novâ usurpatorum alteratione opus est, ut hæc copia decenti separentur ab inutilibus ac superfluis: quam alterationem vocamus effervescentiam, & hujus ope secretionem illam absolvi putamus cum Præside nostro clarissimo, ex cuius dictis ac dictatis non diffitemur nos pleraque hausisse, quæ hic proposuimus, una cum propriis observationibus ac ulterioribus cogitationibus.

§. 105. Mediante autem toties memoratâ effervescentiâ, non puto duntaxat alimentorum partes secerni à superfluis ac inutilibus, verum etiam ejusdem ope pituitam ex deglutita continuo saliva orram & naturaliter in Intestino præsertim tenui hærentem, aliqua sui parte dissolvi & cum meliore Bilis, Succique Pancreatici parte uniri & transferri per crustam Intestinorum rugosam & quodammodo spongiosam in lacteas venas, hinc ad cisternam, commune scilicet chyli atque lymphæ receptaculum, in lumborum regione sub diaphragmatis appendicibus situm, deferri; ac inde per chyliiferum aut rectius lymphaticum ductum thoracicum (quia semper lympham & per intervalla tantum chyli partem defert) ad venam subclaviam jugularemque sinistram ascendere, ut inde cum sanguine per venæ cavæ truncum superiorem descendat in dextram cordis auriculam, ipsumque dextrum ejusdem ventriculum.

§. 106. In dextra autem cordis auricula, ventriculoque confunditur sanguis uterque ascendens ac descendens prædicto humori ex Succo Pancreatico, Bile, Pituita & Lympha constanti, unde consistentia & grumofitas requisita comparatur Sanguini.

§. 107. Hoc dictum nostrum confirmat quodvis acidum pinguedinem omnem atque oleum coagulans.

§. 108. Quoniam vero se invicem temperandi vim obtinent prædicti humores, non est quod nimiam metuamus Sanguinis consistentiam, quamdiu saltem in statu laudabili atque naturali permanent.

§. 109. Dum autem tum alimentorum assumptorum, tum trium nominatorum humorum partes fluidiores ac corpori maxime utiles ad cor pergunt, reliquæ crassiores minusque utiles motu Intestinatorum peristaltico sensim propelluntur ad Intestina crassâ, ubi fœcum alvinarum nomine indigitantur.

§. 110. Succum Pancreaticum, utpote acido spiritu imprægnatum, à Deo opt. max. ordinatum quoque puto ad bilem fluidiorem quodammodo incrassandam, inspissandamque, & ad ejus acrimoniam quoque temperandam; quod patet in bile quæ à spiritibus quibuscvis acidis ipsi affusis, mox inde plus minus incrassatur, præcipitaturque pars ejus crassior ad fundum; ab iisdem spiritibus acidis præterea color bilis flavus in viridem mutatur, quod magis patet, si per noctem illa duo simul juncta in vitro servantur.

§. 111. Postquam primarios, hæcenus nobis notos, Succu Pancreatici usus retulimus, quis non videt quam multorum malorum causa esse possit idem male constitutus?

§. 112. Certe non pauci, quibus ignotus fuit Succus Pancreaticus, in Pancreate tamen multorum morborum gravissimorum causam quæriverunt, imo latitare putarunt, uti hoc clare patet ex verbis *Schenkij in Exercitat. Anat. 6. lib. 1. sect. 11. c. 21.* quæ sic se habent: *Innumerorum & admirabilium morborum sedes sunt* (agit autem illo capite de Pancreate & Mesenterio) *cui indagando non una sufficit hominis ætas. Ludibrium medicorum, quod exercitatissimos quoque in ruborem conjicit.*

§. 113. *Fernelius* quoque lib. 4. *Pathol. c. 7.* de Pancreatis & Mesenterii morbis agens affirmat & proficitur sese in his plerumque sedibus animadvertisse Cholera, Melancholia, Diarrhæa, Dysenteria, Cachexia, Atrophie, Languoris, lentarum errantiumque febrium, latentium denique morborum, causas, quarum depulsione deploratis salus redderetur.

§. 114. *Riolanus* ac *Plempius* cum aliis viris egregiis putant etiam in Pancreate febrium intermittentium, Melancholiæ hypochondriacæ & aliorum morborum chronicorum causam delitescere.

§. 115. Hoc autem negotium foelicius dubio procul tractassent hi, alique Viri excellentes, si penitus innotuisset ipsis Succus pancreaticus ejusdemque natura & generatio: tentabimus proinde eorum exemplo tam laudabili excitati aliquid in commune bonum proferre.

§. 116. Considerabimus autem ipsius vitia primaria, unde non paucae labefactantur, lædunturque functiones.

§. 117. Peccat igitur 1. Succus Pancreaticus, quando *parcius* deducitur in tenue Intestinum, quod fit vel quando parcius secernitur ac generatur in Pancreate, vel quando in uno pluribusve ipsius ductibus obstructio existit, ob quam ad tempus stagnat in ipsis Succus, donec denuo vel referatur obstructio, vel rumpatur Ductus.

§. 118. *Parcius* generatur, quando ipsius materia plus minus deficit in sanguine, convenientibus alimentis non restituta, vel quando eadem alio transfertur aut

effertur, vel quando arctius conjuncta est sanguini, nec ab illo sufficienter potest secerni.

§. 119. Obstruuntur unus vel plures Pancreatis Ductus à materia pituitosa & viscida una cum Succo Pancreatici materia in Pancreate secreta & in Ductus translata, ibique concrefcente ac hærente.

§. 120. Peccat pariter idem Succus Pancreaticus 2. quando *majori copia* profertur ad Intestinum, sive copiosior generetur, sive ad tempus in uno, pluribusve Ductibus lateralibus stagnatione detentus post solutam obstructionem eo tunc effundatur copiosius.

§. 121. *Copiosior* generatur tum ob usum liberaliorem alimentorum acidorum vel saltem acidis conditorum, vini v. g. acidiusculi, aceti, &c. tum ob vitium glandularum quaecumque, ob quod promovetur Succus hujus à sanguine secretio, tum aliquando forsan ob vasa ampliora in Pancreas tendentia & solito plus materiæ Succo suppeditantia.

§. 122. Peccat idem Succus Pancreaticus 3. quando *inequaliter* in tenue Intestinum excernitur, hoc est uno tempore abundantius, alio parcius: quod fit inprimis propter unius vel plurium Ductuum lateralium obstructionem, qua durante nihil ex illis effluit, & propterea in totum parcius tunc effunditur Succus; eadem obstructione quovis modo reserata, mox qui prius stagnabat, in medium Ductum & sic cum reliquo Succo in tenue Intestinum effunditur, unde contra copiosior tunc existit Succus Pancreatici excretio.

§. 123. Talem obstructionem in Pancreatis Ductibus lateralibus contingere posse non tantum suadet ratio, sed ipsa quoque experientia confirmat: Observavimus enim hyeme præterita in Nosocomio publico, jucundo æque ac utili spectaculo, talem obstructionem in Ductibus lateralibus Pancreatis contigisse, de quo in sequentibus, ubi de Febribus intermittentibus agemus, plura dicemus.

§. 124. Peccat idem Succus Pancreaticus 4. quando *naturali fluidior & liquidior* existit: quod fit ratione sanguinis talis, aut spirituum animalium copiosius ipsi admistorum.

§. 125. Peccat idem Succus 5. quando contra *viscidior* existit ob sanguinem similiter magis viscidum & multa pituita scatentem.

§. 126. Peccat idem Succus 6. quando *Sapor* ejus naturalis mutatur, unde nunc *minus acidus*, nunc *acidior*, nunc *salsus*, nunc *austerus*, nunc alius cujusvis saporis simplicis vel ex nominatis compositi existit.

§. 127. *Minus acidus* existit nominatus Succus vel ob spiritus animales copiosius ad Pancreas delatos, vel ob defectum acidi in sanguine; sive hoc fiat propter assumpta ablatum acidum reparare inepta, sive ob usum quodlibet acidum infringere, concentrare aut obtundere aptorum.

§. 128. *Aucta* Succus Pancreatici *aciditas* debetur plerumque humoribus acidis in corpore redundantibus; quandoque impedito spirituum animalium ad Pancreas affluxui; ut & ex parte saltem ipsius Succus in ductibus lateralibus stagnationi, idque forsan ob spirituum animalium exhaustionem.

§. 129. Re-

§. 129. Redundare solet in corpore humor acidus ut plurimum ex assumptis alimentis, condimentis, aut medicamentis acidis, ut & ob aërem frigidiorē ac Borealem, animi mœrorem non tamen nimium, &c.

§. 130. Spirituum animalium ad Pancreas motus impeditur, quando deficient, vel torpidiores existunt spiritus animales in toto corpore, item quando obstruuntur, dissecantur aut comprimuntur nervi.

§. 131. Salis marini vel fossilis salsedine falsus fit Succus Pancreaticus ob serum sanguinis similiter falsum, concurrente forsā simul glandularum vitio, ob quod partis salinæ lixivæ ab acidâ secretio absolvi nequit: constat enim sal nostrum vulgare duabus partibus, nempe sale lixivo & spiritu acido simul junctis.

§. 132. Succus Pancreatici *Austeritas* undenam deducenda sit hætenus satis assequi non possum. Quamvis enim Mercurius omnis saporis expers, si cum vitriolo vel sale vulgari sublimetur, fiat non tantum acris, sed simul extreme austerus, adeo ut ejus granum unum aquam multam eadem austeritate imbuiere possit, an ergo illa austeritas erit adscribenda mercurio? cur igitur addito recenti mercurio, iterataque aliquoties sublimatione prodit mercurius dulcis, hoc est, nec austerus, nec acris?

§. 133. Ab hoc Succo Pancreatico modis prædictis peccante plurima excitantur in homine damna, quæ paucis percurrēda & examinanda, quo postmodum ad eorum curationem transeamus.

§. 134. Succus ergo Pancreaticus *minori copia* ad intestina propulsus naturalem ac debitam chyli ab alvinis fœcibus secretionem non promovebit sufficienter, idque præcipue, si alimenta vel sicciora vel fermentationis difficilioris existant.

§. 135. Hinc sequetur necessario totius corporis diminuta nutritio, nec non tandem languor totius corporis, adeo ut tales non tam vivere, quam vitam miseram trahere videantur.

§. 136. Succus vero Pancreaticus *majori copia* secretus & ad intestina ductus, plus quam decebat secernet ab assumptis alimentis, adeo ut aliquando etiam una cum partibus utilibus inutiles & excrementitiæ ad massam sanguineam deferantur, aliquando vero tantum partes utiles sed majori quam decebat copia per easdem vias transibunt, unde si hic plethoram, ibi cacochymiam contingere dicamus, quis hoc evertet?

§. 137. *Inæqualis* Succus Pancreatici secretio & ad intestina propulsio varias mutationes in intestinis & alibi excitabit, & subinde quidem inopinato contingentes, quarum rationem vix commodam assignabit unquam, qui ad hæc non attenderit.

§. 138. Hinc deducendum existimamus ex improvise evenientia quandoque Animi deliquia, Suffocationes uterinas dictas, Febres erraticas, &c.

§. 139. *Fluidior* existens Succus Pancreaticus pituitam intestinale magis diluet & fortassis aliquando alvi fluxui ansam præbebit.

§. 140. *Viscidior* Succus Pancreaticus ad minimum frigus externum concrescens obstructionibus ut & febribus intermittētibz occasionem dabit, ut & alvo adstrictiori.

§. 141. Quoad qualitates sensibiles ac imprimis *Sapores*, producitur aliquando Succus Pancreaticus *minus acidus*, unde sanguis debitam consistentiam non habebit, atque talis homo minus poterit veneno pestilenti resistere, quam ille, in quo laudabilis vel etiam major sanguinis consistentia existit.

§. 142. Hinc ratio etiam patet, cur melancholici peste minus afficiantur, quam bilioso sanguine præditi.

§. 143. Cui libebit ad minutias attendere, licebit Succo Pancreatico, minus acido, ex accidenti non per se adscribere causam plurium affectuum, bili propterea minus temperatæ & acriori adscribi solitam; quales sunt Sitis aucta ob halitus magis falsos & biliosos sursum elevatos, Cruditas nidorosa ob bilem magis meracam usque ad ventriculum assurgentem atque ibi alimenta corrumpentem; Dolor urens, Diarrhoea, Colica passio, &c. quod per parenthesis quasi dictum esto,

§. 144. *Acidior* existens Succus Pancreaticus causa est cæteris paribus 1. frigoris omnis interni, in regione lumbari primo molesti ac postea per universum corpus dispersi, uti plerumque fieri observamus in principio paroxysmorum febrium intermittentium. 2. Omnium lancinationum, tam in hypochondriis & universo ventre quam in aliis quoque corporis partibus molestarum. 3. Torminum omnium in ventre imprimis sese manifestantium,

§. 145. Quin omnem Bilem atram & æruginosam ab eodem Succo Pancreatico deducimus, quia nonnunquam vel acidum spirat, vel pelvi æneæ infusâ ipsam corrodit, atque manifestam effervescentiam excitat, quam non nisi ab acido contingere posse ex dictis patet.

§. 146. Unde patet quoque lapsus eorum, qui omnem bilem atram vomitu alvive dejectione prodeuntem è folliculo fellis prodierunt affirmant.

§. 147. Hæc omnia non parum confirmantur sequenti experimento aliquando à me in cane factò, in cujus vivi sectione, aperto Intestino tenui reperi ex atro virescentem liquorem, cujus rationem ut assequer, bilem in vesicula examinavi, & ordinario, adeoque ex viridi flavescente colore præditam offencam in folliculo suo. Succum Pancreaticum autem falso-acidum reperi, ut & lymphidum; alimenta vero tunc in ventriculo tantum contenta adhuc satis cruda, & colorem ex albo cineritium habentia notavi: ut proinde de vera humoris ex atro virescentis origine fierem certior, bili ex vesicula suaeductæ spiritum vitrioli affudi & simul illa duo in solis æstu collocavi, unde similem colorem ex atro virescentem consecuta est: hinc conclusi humorem prædictum in tenui Intestino repertum ortum habuisse à bile eo effusâ, & à Succo Pancreatici tunc falso acidi occursum colorem ejus ita mutantem.

§. 148. Hanc mutationem bilis ut plurimum in tenui Intestino à Succo Pancreatico acidiori contingere plane sum persuasus, licet nihil obstat hanc mutationem in folliculo fellis à Succo Pancreatico vel Lympha acidiore, cum sanguine eo delato, contingere posse, quod aliquando in canibus observavi.

§. 149. Quemadmodum ex Succo Pancreatico vitioso functiones varias lædi ostendimus, ita ex eodem fonte deduci possunt varii affectus, inter quos merito primum

primum locum assignabimus Febribus intermittentibus omnibus, quippe quas Succo Pancreatico in ductibus lateralibus uno vel pluribus propter obstructionem stagnanti ac nunc serius, nunc citius per obstruentem pituitam, acrimoniâ sua auctâ viam sibi paranti, atque non tantum in tenui Intestino vitiosam tunc effervescentiam facienti, sed quaquaversum, ad Cor præsertim translato & Pulsus præter naturam frequentiorem producenti, accessum putamus adscribendos.

§. 190. Hæc opinio quia paucis hætenus innotuit operæ prætium forsan erit eam paucis explicare.

§. 151. Intermittentes igitur febres ratione paroxysmorum tempore diverso recurrentium distinguuntur in Quotidianas, quæ quotidie, Tertianas, quæ alternis diebus; Quartanas quæ quarto demum die, Quintanas, &c. quæ quinto, &c. die recurrunt.

§. 152. Observantur eadem aliquando simplices, aliquando duplices, aut triplices, quando duæ tresve ejusdem speciei febres ægrum infestant.

§. 153. Dantur & compositæ ex variis intermittentibus v.g. tertianis cum quartanis, &c. aut ex intermittentibus & continuis.

§. 154. Distinguuntur quoque ratione frigoris & caloris solum urgentis, in Algidas & Ardentes; quamvis plerumque soleat præcedere frigus & subsequi calor. Aliquando tamen solo frigore affici ægros testatur experientia; ideo Algidas non dubitamus proponere, quamvis nulla fieret ipsarum apud Veteres mentio.

§. 55. In quibusdam nullum frigus sentiri, & hætenus ob solum calorem continuo urgentem Ardentes vocari posse nemo forsan negabit, & quamvis negaret aliquis ardens contradicendi studio, non desinerent tamen subinde ab attentis Medicis observari.

§. 156. Algentes forsan omnes sunt quotidianæ & Ardentes tertianæ, quamvis nihil obstare videatur aliter sese rem habere posse.

§. 157. Distinguuntur, vel distinguui saltem possunt, ratione gravium Symptomatum cum paroxysmis singulis sese manifestantium Febres intermittentes in Syncopales, Hystericas sive suffocationem minantes, Colicas, Insanas & alias.

§. 158. Cum non perpetuo durent febres intermittentes, sed certis temporibus accedant, iterumque recedant, opus est ita cum Corde communicet ipsarum focus, ut ad tempus interrumpi queat illa communicatio, iterumque reintegrari.

§. 159. Consideratis attento animo tum symptomatibus omnibus febres intermittentes comitari solitis, tum partibus omnibus nostri corporis, tum varia earundum febrium curatione, nulla in toto corpore pars præter unum Pancreas poterit assignari, à qua febres intermittentes cum suis paroxysmis possint deduci.

§. 160. In febribus autem intermittentibus non impeditur in totum, sed tantum ex parte communicatio Pancreatis cum Corde, obstructis nempe uno vel pluribus ejus ductibus, & quidem à pituita quomodocumque in Ductus ejus

laterales delatâ, ibidemque à frigore imprimis externo coagulâtâ & ita adhærente, ut illos obstruat.

§. 161. Hoc contingere posse vidi præterita hieme in cane, cujus Succum Pancreaticum tentabam colligere, sed frigore externo ita incrassabatur, ut parum tantum consistentiæ crassioris efflueret, donec ante ignem inter duo pulvinaria positus incalesceret Canis, atque sic Succus Pancreaticus fluidior ac copiosior simul efflueret.

§. 162. Succus autem Pancreaticus dicto modo in uno pluribusve Ductibus lateralibus obstructis retentus & stagnans mora sua fit acrior, (avolantibus forsân spiritibus animalibus, ad Succu contemperationem accedentibus) & tandem pituitam obstruentem perforando viam sibi per illam parat in Ductum communem sive medium, donec effuso omni Succo prius retento sensim coalescat prædicta pituita, & obstructionem reparet, unde ad sequentem paroxysmum colligitur denuo Succus Pancreaticus, qui mora itidem acrior evadit.

§. 163. Acris autem Succus cum reliquo magis temperato in tenue Intestinum effusus cum affluente bile & pituita ibi reperta vitiosam excitat effervescentiam, & quidem Succu Pancreatici ratione talem, quæ ubivis sensum frigoris pariat.

§. 164. Nec tamen prius vocatur tunc febris, quam vel ipse Succus Pancreaticus in tenui Intestino vitiose effervescens, vel halitus saltem inde excitatus ad dextrum cordis ventriculum fuerit delatus, atque ipsum quocumque tandem modo ad frequentiores sui contractionem irritaverit.

§. 165. Existimo autem acrimonia sua acida illum id præstare, quamvis nihil obstat aliquid acrimoniæ salinæ à bile prodeuntis simul posse concurrere, quoniam quotidie observamus in omni effervescencia, ubi illa duo acria simul effervescunt, eadem testari suam acrimoniam & ex sese emittere halitus acres ipsis naribus admotis molestos.

§. 166. Sed quærat aliquis quænam est ratio paroxysmorum nunc quotidie, nunc tertio vel quarto quintove, &c. die recurrentium? cui omnia quæ hactenus in hoc negotio fuere à variis varie dicta, cum iis quæ hic à me dicuntur, conferenda commendans, diversitatem omnem partim à Pituitæ obstruentis, partim à Succu Pancreati stagnantis diversitate pendere arbitror.

§. 167. Prout autem plus vel minus Pituitæ in Ductu obstructo reperitur, estque ipsa magis vel minus viscida, ipseque Succus Pancreaticus universus existit magis vel minus acris, ita segnius vel citius perforatur ab ipso stagnatione acriore facta Pituita obstruens.

§. 168. Quamvis autem non semper 24. vel 48. vel 72. horis distant paroxysmorum se mutuo insequentium initia, sed aliquando 18. aliquando 24. aliquando 30. aliquando 36. & 40. & sic porro horis; solent tamen Medici secundum dies distinguere paroxysmos, adeo ut pro Quotidianis habeant, non tantum illas febres, quæ singulis 24. horis, sed illas quoque, quæ singulis 18. imo 30. horis recurrunt, atque illas quidem ante ponentes, has vero post ponentes nominant.

§. 169. Ita quarum paroxysmi singulis horis 48. redeunt, habentur quidem pro

pro Tertianis, ad easdem tamen referuntur tum quæ 36. vel 40. horis revertuntur, ante ponentes dictæ, tum quæ 50.55. vel 60. hora repetunt & post ponunt.

§. 170. Nec hanc sententiam evertunt symptomata & imprimis calor & frigus, tam diversimodè in febribus intermittentibus ægros molestantia, cum illa diversitas pendeat à cæterorum quoque humorum in corpore existentium constitutione diversâ. Longe tamen aliter se habebit paroxysmus tertianus v. g. incidens in corpus multa Bile eaque satis acri refertum, aliter in corpus pauca & blanda Bile donatum.

§. 171. Paroxysmi novi tam diu repetunt, quam diu in totum non est sublata è ductu obstructo pituita; sed in ipso remanens in unum iterum cogitur ad obstructionem redintegrandam; ubi autem vel sponte vel arte inde evacuatur omnis pituita, curatur quoque febris.

§. 172. Quoties autem unus Ductus lateralitantum est obstructus, toties una & simplex producitur Intermittens febris: quoties vero plures Ductus simul existunt obstructi, toties plures ac multiplices aut compositæ producuntur febres.

§. 173. Prout verò nunc ejusdem naturæ ac pertinaciæ ab æque viscida pituita occurrunt in variis ductibus obstructiones, nunc diversæ à pituita diverse viscida, ita nunc ejusdem speciei nascuntur Febres, Tertianæ puta vel Quartanæ, nunc diversæ, Tertianæ puta cum Quartanis, & sic porro junctæ.

§. 174. Idem accidet ratione diversitatis Ductuum secundum magnitudinem: quoties enim in ejusdem magnitudinis & amplitudinis ductibus oritur à simili pituita obstructio, toties æquali tempore acescet æqualiter Succus Pancreaticus & perforabit obstruentum pituitam ad paroxysmum novum producendum. Quoties vero diversæ magnitudinis ductus obstruentur ab æque viscidâ pituitâ, toties, quistagnat in ampliore Ductu Succus Pancreaticus, citius & amplius acescet, utpote copiosior existens, quam qui angustiore stagnat parcius; unde ex ampliore Ductu citius recurret & gravius affliget paroxysmus, quam ex angustiore.

§. 175. Talem in Pancreatis Ductibus obstructionem, ante paucos menses observavimus in foeminâ quadam febrem intermittentem passâ, in cujus dissectione per Syringam infudimus liquorem volatilem ac cæruleum in Ductum Pancreatis majorem, ex quo in plerosque Ductus laterales penetrabat, dum in perpaucis propter obstructionem sistebatur; undo dicto colore inficiebatur ipsa Pancreatis substantia in uno loco & non in alio,

§. 176. Primaria febrium intermittantium Symptomata dixi esse Frigus & Calorem, quorum hoc quidem Bili, illud vero Succo Pancreatico acidiori adscribimus. Hoc probant acida assumpta, quæ in sanis nonnunquam simile frigus excitant & in febricitantibus durante frigore usurpata frigus augere solent.

§. 177. Quamvis à Bile calorem dependere forsitan nemo sit facile negaturus, probatur tamen, quia assumptis amaris & aromaticis, Bilem acriorem reddentibus, calor augetur in corpore.

§. 178. Utrumque probatur præterea per curationem; postquam Frigus temperatur & tollitur per medicamenta Acidum infringentia, Calor vero per medicamenta Bilem temperantia, & præsertim Acida.

§. 179. Quæ de utriusque confluxu ad febres intermittentes producendas asseruimus, confirmantur quoque per locum, in quo inchoante paroxysmo febrili frigus, deinde calor etiam, ut & dolor atrocissimus plerumque percipitur, per regionem scil. Lumbarem, ubi sub mesenterio latet tenuis Intestini pars prima, in qua fit confluxus Succu Pancreatici cum Bile, & ex eo Effervescentia nonnunquam sensui satis molesta observatur ab ægris; unde halitus acidi non tantum sursum ad ventriculum elevati erumpunt per ructus acidos, sed deorsum quoque delati tormina pariunt, quin per lacteas venas ad cor penetrantes tum sanguinem magis incrassando minori pulsui ansam præbent, tum cor mordicando ad frequentiore pulsum edendum ipsum cogunt.

§. 130. Arthritidis causam ab eodem Succo Pancreatico acidiori pendere testantur symptomata simul concurrentia; solent enim dolores illi cum febrili paroxysmo & invadere & exacerbari: prout autem diversimode affectæ sunt bilis & pituita intestinalis, diversimode quoque sese manifestant tum articulorum dolores, tum cætera symptomata ipsos concomitantia: testatur idem urina, quam nuper cum aliquo hujus Civitatis Practico curiositatis gratia gustavi & in ea acrimoniam acidam, eamque notabilem percepi.

§. 101. Ab eodem Succo Pancreatico acidiore famem augeri pauci post hac dubitabant, qui halitus acidus ab ipso elevari & in Ventriculum usque assurgere observavit ex ructibus acidis simul erumpentibus, aut expiratione acida non nullos valde molestante, & quandoque ex humorum plus minus acidorum evomitione.

§. 182. Ab iisdem halitibus acidis per lacteas venas in Cor, hinc & Pulmones pertingentibus, ibidemque hærentibus non tantum Respiratio difficilis, sed sicca quoque Tussis excitari potest, ac sæpe solet: cujus rei confirmationem habuimus non semel in Nosocomio publico & alibi in dissectione cadaverum, reperiis adhuc Pulmonum vasis & parenchymate flatu distentis.

§. 183. Ab eodem Succo Pancreatico acidiore vel vomitione excreto, vel per halitus assurgente Aphthas produci nemo dubitabit, qui accurrate in hujus affectus generationem, & ipsum concomitantia symptomata attenderit; quemadmodum id imprimis apparet in nuper natis infantibus, non tantum acidum ex ore spirantibus, sed insuper tormina patientibus, lac concretum sursum ac deorsum excernentibus, alvi excrementa viridia & acidum odorem habentia dejicientibus, ac denique insultus epilepticos sustinentibus.

§. 134. Ab eodem Succo Pancreatico acidiore per lacteas venas in Sanguinem translato major huic consistentia accedit, unde minus rarefscens sanguis pulsum facit minorem: à quo vitio valde excedente Syncopen quandoque produci existimem. Quod confirmatur egregie exemplo, quod *Lazarus Riverius* refert in praxis suæ lib. VI II. fol. 258. de Syncope illa, quam *Petrus Salins*, ut ipse refert lib de affectibus particularibus cap 4. observavit in puellâ decimum quartum annum agente, quæ cum per diem capitis gravitatem, vertiginem, & anxietates passa esset, die sequenti subito extincta est; secto post mortem cadavere, in arteria magna & vena cava, totus sanguis concretus apparuit, ut, appre-

apprehenso illius altero principio, ita integer ex vena & arteria educeretur, ac gladius è vaginâ extrahi solet.

§. 185. De quo si quis dubitaverit, meo & aliorum exemplo liquorem multum acidem in viventis canis venam sensim infundat, & observabit non tantum sanguinem inde ita coagulari & concrefcere, ut postea sine ipsius effusione institui possit ulterior sectio, sed ubi ad dextrum cordis ventriculum notabili quantitate pertingit acidus ille liquor, mox extingui & subito interire canem.

§. 186. Ab eodem Succo Pancreatico acidiorè Stranguriam sæpius produci existimavi, postquam non semel cum aliis Studiosis gustavi in nosocomio ægrorum Stranguria laborantium urinas, ipsasque comperi valde acidas, quin ipsos assumptis medicamentis acidum temperantibus brevi restitutos & curatos vidi.

§. 187. Ab eodem Succo Pancreatico acidiorè alvum adstrictiorem produci existimo, præsertim ubi concurrat pituita intestinorum viscida unde excitantur à bile flatus viscida & acres, qui alvi excrementa potenter exsiccant.

§. 118. Ab eodem Succo Pancreatico variis modis vitiato, diversas Hypochondriacæ affectionis species produci ex conjunctis ipsis symptomatibus deduco; quæ ne in immensum excrescat Disputatio hæc cogor silentio cum multis aliis huc facientibus præterire,

§. 189. Unum tamen de ipso magis *Austero* libet addere, ortum ab ipso habere Strangulationis sensum ac metum, fœminis quidem quam maribus magis familiarem, atque ficti Uteri Ascensus nomine passim notum, cujus notabile in Viro Clarissimo exemplum libet propriis ejus verbis hûc afferre. *Factum mense anni præteriti 1663. Octobri, ut oblatum mihi ab Expertissimo D. Sylvio Succum Pancreaticum gustarerum, eumque perceperim primo, ut videbatur subsalsum, mutato tamen non nihil sapore visus deinde est esse cum levi austeritate subacidus; fœtor in ore productus tantus, ut qui mecum erant duo noti me de fœtore admonerent, similisque erat ille fœtor illi, qui ex aqua limosa & fœtida oritur; os & fauces non solum inde exsiccabantur, sed & constringebantur ita, ut suffocari viderer; quale quid simile patior in morbo mihi familiari: atque ea omnis non evanescebant subito, sed aliquamdiu permanebant & durabant, donec sensim & sponte desinerent.* Erat ille Succus ex cane à me præsentè Clarissimo meo Præfide educus.

§. 190. Ex hac & similibus observationibus aliis, non absurdum videtur dicere, viros aliquando Suffocatione laborare Hystericæ consimili, cum præsertim hujus causa proxima non accedat immediate ab Utero, sed à tenui intestino, in quo excitati ob vitiosam concurrentium humorum effervescentiam halitus & flatus austeri, quoties per œsophagum assurgunt, eundem ita angunt, ut in strangulationis periculo se versari putent ægri.

§. 191. Ab eodem Succo Pancreatico acidiorè pituitæ viscidæ conjuncto & una cum ipsa in flatus mutato pendent tormina ventris, quatenus non tantum distenduntur, sed simul perterebrantur quasi intestina in dolore colico atrocissimo.

§. 192. Ab eodem Succo Pancreatico acidiore Bili acriori conjuncto Dysenteriam produci censeo; quin ex iisdem Bilem atram generari puto.

§. 193. Ne autem in solo Succo Pancreatico acidiore & affectibus multiplicibus ab ipso excitatis diutius hæreamus, libet unum saltem affectum ab eodem magis falso deducere, Diarrhæam puta serosam, quatenus acrimoniâ suâ salinâ intestina ad sui contractionem continuo irritat: nec dubito, quin temporis tractu diligentibus eorum, quæ circa ægros contingunt, observationibus, hoc Succo Pancreatico penitius cognito, multi affectus fiant manifestiores.

§. 194. Coronidis loco pauca proferemus de modo & remediis varia Succu Pancreatici vitia evacuando & alterando curandi.

§. 125. Parcior ergo Succu Pancreatici secretio aut excretio ratione ipsius visciditatis contingens, curabitur assumptione medicamentorum visciditatem quamvis corrigentium, qualia acida volatilia, ut & salia tum fixa, tum volatilia: usurpanda vero acida quoties simul minus acidus creditur Succus toties nominatus; salia contra, quoties ipsius aciditas simul excedit.

§. 196. Ubi parcior est Succu Pancreatici excretio ratione obstructionis in uno pluribusve ductibus lateralibus existentis, conducent eadem mox memorata, quibus commode succedere possunt phlegmagoga; quorum beneficio pituitosi & serosi humores, non item biliosi expurgantur: quod nuper vidi in variis canibus, quibus tam hydragoga, quam phlegmagoga purgantia exhibueram, & quidem hac ratione: exhibito purgante cum jam alvum egregie deponerent, viventibus ipsis purgationis tempore subito abdomen cum intestinis aperio, quo facto observavi in illis canibus, quibus medicamentum cholagogum v. g. diagridii dragmam unam exhibueram, Bilem longe majori copia effluere è Ductu bilario: in alio vero cui hydragogum, rad. jalappæ dragmas duas exhibueram, animadverti Succum Pancreaticum majori copia effluere è Ductu Pancreatico, licet tunc Bilis quoque majori copia efflueret; & in alio, cui cholagogum porrexeram, Succus Pancreaticus majori copia emanavit; colligere tamen potui notabilem diversitatem; nempe à cholagogis Bilem, ab hydragogis Succum Pancreaticum copiosius expurgari. In hoc experimento faciendo alia adhuc notatu digna observavi; Primo nempe ipso purgationis tempore nihil per arterias mesaraicas in cavitatem intestinorum deponi, ut multi solis speculationibus contenti existimant; imo tantum abest, ut aliquid eo amandaretur, ut quod post expressionem adhuc liquidum in intestinis remansit, semper exsicceetur. Secundo in quibus, dum aperirem abdomen duabus vel tribus post assumptum purgans horis, venæ lacteæ non apparebant, in iis inquam nec Bilem nec Succum Pancreaticum majori copia deferri ad intestina. De quibus quia alia adhuc notatu digna restant dicenda, ea differemus, donec per plura experimenta certiores facti aliorum medicamentorum vires penitius cognoverimus.

§. 197. Copiosior Succu Pancreatici proventus, curabitur tum abstinendo ab usu potus multi & præsertim acidiusculi; tum usurpando medicamenta eundem è corpore per alvum, sudores ac urinas expellentia.

§. 198. Succus Pancreaticus fluidior curabitur usurpatione prudenti alimentorum

torum viscidorum, & medicamentorum incrassantium dictorum, pilularum puta de cynoglossa & similibus: quæ quoque salsedinem ipsius corrigent.

§. 199. Succus Pancreaticus acidior curabitur 1. spiritu volatili tam puro, quam aromatico ipsum temperante; 2. sale lixivo tam fixo, quam volatili, ut & oculis cancri, margaritis, coralliis, cretâ, chalybis limatura, & similibus ipsum concentrantibus. 3. emulsionibus oleosis, ut & oleis variis tam expressione, quam distillatione paratis ipsum obtundentibus. 4. aquâ & aqueis ipsum diluentibus ac enervantibus; nulla autem purgantia hic sunt adhibenda, priusquam (si fieri possit) temperatus sit Succus Pancreaticus, quoniam nulla hæctenus nota sunt, quæ humores acidos educunt, & per experientiam constat irritari, non quidem evacuari acida, nisi cum summis torminibus aliisque difficultatibus plurimis, à quibus aliquando ita afficiuntur ægri, ut non nisi summo labore noxam à purgantibus illatam emendare possint.

§. 200. Succus Pancreaticus austerus curabitur salibus volatilibus & imprimis ex sale ammoniaco post salis tartari & aquæ additionem distillato spiritu; quo referri quoque debet castoreum, ejusque tinctura, &c. quæ omnia hic memorare non videtur operæ pretium, postquam tempus est, ut huic Disputationi tandem imponatur finis.



EXPLICATIO TABULÆ IX.

Ex Exercitatione Anatomicâ de Succo Pancreatico REGNERI de GRAEF.

FIG. I.

Habet omnia Vitro parando necessaria.

- A. Vitrum phiala nominatum.
- B. Foramen exile in vitri ventris parte sup.
- C. Funiculus nodosus in Fig. II. notatus.
- D. Calamus anatum sylvestrium longus & tenuis.
- E. Charta quâ obvolvitur calamus.
- F. Calami pars amplior.
- H. Vitri orificium.
- I. Epistomium ligneum.
- K. Angustum calami orificium.
- L. Filum Epistomio annexum.

FIG. II.

Exhibet vitrum, ut decet ornatum cum omnibus requisitis in Fig. I. notatis.

FIG. III.

Denotat instrumentum, quo secundus ductus pancreatici exitus claudi queat, cujus partes sunt.

- AA. Tabula dua ex ebore confecta.

BBBB. Quatuor foramina in extremitatibus tabularum.

CC. Cylindri duo.

DD. Cochleæ dua circum cylindros volvenda.

FIG. IV.

Ostendit modum & locum, in quo instrumenta notata intestino affigi debent.

- A. Vitrum.
- B. Acus.
- M. Pylorus.
- N. Intestinum tenue.
- O. Pancreas.
- P. Prelum.

FIG. V.

Præbet Canem, cujus abdomen post applicationem instrumentorum confutum est.

AA. Vitra duo ad Succum Pancreaticum & Salivam circa Os colligendum.

N. Pars vesica, qua vitrum tegitur, ne sanguis per ejus foramen intrans Succum Pancreaticum inquinet.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4





Fig. 5



P A R S IX.

De Structurâ & Ufu Renum.

Ex Exercit. Anat. de Struct. & Ufu Renum Laurentii Bellini.

Falsum igitur est Renum substantiam fibrosam non esse, ut Vesalius asserit; insunt enim Renibus filamenta quædam fibris simillima (Fig. 1. *EE. & Fig. 10. AB*) non tamen musculosa, & carnosæ, quarum examen accuratius habebis inferius. Nec vasa Renum subingressa in unum corpus degenerant, quod arteriis duritie crassitieque respondeat; sunt namque tunicæ illius corporis à pelvis membranis mutuatae (Fig. 2. *CCC*), ut optime notavit Higmorus, & nos exponemus. Constat etiam ad sensum emulgentes ramos non interius multo in Renum corpore terminari; divisi enim in capillamenta ad extimam usque superficiem excurrunt (Fig. 11. *DD*.) Nec placet serosum sanguinem Renum vi, rectarumque fibrarum beneficio attrahi, cum ultrò sanguis à corde in arterias immissus celerrime irrumpat in Renes: quod etiam in cæteros attractionem defendentes dici potest.

Duplicem esse Renum substantiam, falsum omnino esse conspicitur, quarum externa fibrosa non sit, interna fibras habeat; est enim una Renis substantia, pelvi usque ad extimam superficiem continua, & undequaque fibrosa (Fig. 10. *AB*) Insuper Higmoro assentiri non possumus, cum vasa in interiori substantia terminari defendit, cum pateat sensibus, illa ad extremum usque Renis excurrere (Fig. 11. *D*.) Anastomoses, quas ille inter venas & arterias admittit, nunquam invenies.

Habent Renes (ut cuique notum est, præter Lymphæductus, quorum progressum, & ordinem accuratior manus ostendet aliquando, & de quibus hic agere non est opus,) arteriam & venam Emulgentem à truncis Aortæ, & Cavæ descendentibus, & ductus, seu canales proprios à quibus substantia Renum efformatur, quam fibrosam Renum carnem imposterum appellabo. Arteria, statim ac ad Renis portam devenit, dividitur in plures furculos, qui inter pelvis tunicas dispersi alios graciliores Ramulos (Fig. 1. *CC, & D*) producunt. Hi à pelvis tunicis erumpentes per fibrosam carnem feruntur, & circulariter illius partes amplectentes, rotundam figuram (Fig. 2. *CCC*) æmulantur. Ab interna, & concava horum circulorum parte prodeunt minores alii furculi (Fig. 1. & 2. *ooo*.) qui similem formam exprimentes fibrosæ carni arcuè connectuntur. Vena eodem modo divisa (Fig. 1. *BB. & NN*.) semper arteriæ adjacet, simulque à pelvi emergentes tunica quadam involvuntur (Fig. 2. *ccc*) ab ipsius membranæ mutuata, quæ in toto vasorum progressu venam, & arteriam in eadem vagina componit. Huc usque animadvertit etiam Higmorus, ut dictum est, eosque minores ramulos, à concava orbicularium parte erumpentes, apum loculamentis similes appellavit. Nos ulterius progredimur, & vasorum capilla-

menta

menta disquirimus: Ab externa igitur, & convexa horum circulorum parte tam arteriæ. quam venæ capillares (*Fig. 11. DDD*) producuntur, quæ ad extimam usque Renis superficiem excurrentes, undequaque fibrosæ carni miscentur. Hoc à nullis inventum esse iam patet, quin Vesalio, & Higmoro expressè negatur; inquit enim ille *Vasa non ad extimam usque superficiem ferri, sed interiorius multo in Renum corpore permanere*: Hic verò *interiorem substantiam à vasis non separari, transcendique* defendit. Has autem usque ad extremum productiones videre primò poteris, si diligenter & patienter fibrosam carnem amoveris, eo prorsus modo, quo parenchima jecoris, aliorumque viscerum cultro abraditur; tunc enim in brutis capillares ramuli evidentissimè conspiciuntur. Quòd si certissimum experimentum velis, imitte humorem aliquem coloratum, tam in venam, quam in arteriam emulgentem, videbis illicò non solum tumere Renem, quod ait aliquando Laurentius, sed per ipsius superficiem ingestum liquorem exsudare (*Fig. 6. CCC*), si nempe propriam tunicam separaveris. Quin etiam si Renem secueris, filamenta quædam directæ, eodem colore tincta, & fibrosæ carni intermixta ad superficiem usque pertingere videbis. Et si liberis oculis intueri non placeat, admotum perspicillum rem evidentissimè demonstrabit. Si verò illos vasorum alveolos inspicere desideres, poteris eodem modo fibrosam carnem abradere; tunc tamen res non adeò feliciter succedet; plerique enim illorum propter arctam cum substantia connexionem lacerantur, & divelluntur. Felicius multò hoc assequeris, si, secto à fima parte per longum Rene usque ad pelvis cavitatem, diligentioribus digitis pendentem fibrosam carnem (*Fig. 3. D.*) removeris; tunc enim tam vasorum majores circuli, quàm minores, seu alveoli (*Fig. 2. CCC, & OOO*) se se offerunt. Ut vero ad Renum substantiam, quam huc usque affusionem vocarunt, veniamus: hæc habe. Renes ex substantia dura, solida, carnosa, nullis fibris vel saltem paucis intexta, constare, communis est opinio. Restamen aliter se habet; nulla enim alia substantia Renum est, quam infinitorum sui generis vasorum aggregatum. Secto per quamvis partem Rene satis apertè conspiciuntur fibræ quædam, seu filamenta, à superficie externa ad cavum usque pelvis producta; quod ut clarius aspicias, aliquam ipsorum tenuem particulam digitis separare poteris (*Fig. 10. AB*) certoque certius apparebit, ab extima superficie usque ad pelvis cavitatem hæc fibras esse continuas. Hinc facillimè licet deducere, cur duplicis esse substantiæ Renes asseruerit Higmorus; cùm enim vasa circularia, & alveoli, ut dictum est, substantiæ Renum connectantur, si ipsius partem aliquam nimis copiosam, & crassam separare velis, statim ac ad illa vasa perveneris, ulteriùs progredi non potes: hinc sequitur fibrarum laceratio & disruptio, remanentibus fibris externis, si à pelvi separationem inchoaveris, internis verò si ab externa superficie. Hæ Renales fibræ, quæ versus externam Renis partem subrubro colore tingebantur, ubi pelvim subjere, albedinem induunt, & invicem contextæ, & implicitæ (*Fig. 3. D, & Fig. 4. CCC*) definunt in cavitate pelvis non in plures papillulas divisæ, sed in unum corpus abeuntes (*Fig. 3. D, & Fig. 4. CCC*) ne dum in ipsis brutis, verùm etiam in homine (*Fig. 8. BBB*), quod quidem ab omnibus usque adhuc prætermissum est;

admittunt enim tot distinctas papillulas pisi magnitudine, verrucæ instar acutas, quot sunt pelvis fistulæ. Hoc tamen diverso modo se habet; ablata enim pelvi tibi in conspectum veniet fibrosa Renis caro, non unum unitum corpus efformans, ut in aliis pluribus animalibus; neque in plures mamillulas distincta, ut plerique asserunt; sed inordinato, tortuoso, & implicito ductu, (*Fig. 8. BBB*) pelvim undequaque circundans. Et quia hujus corporis aliqua portio à pelvis fistullis aspicitur, hinc putarunt omnes cum Fallopio, Renem humanum pluribus hisce papillulis donari, per quas tantummodo serum transcolaretur in pelvim, cum tamen per universam mamillarem substantiam (*Fig. 8. BBB*) ab innumeris foraminulis (*ccc*) illud effundatur, ut ejusdem papillatis corporis expressione innotescit. Hæc verò filamenta Musculum non esse, nec quid illi simile, facile demonstratur, cum nullis tendinibus, ligamentisque insigniantur, nullis inhæreant ossibus, quod ad constitutionem musculi requirunt aliqui: Musculorum fibræ humiditate, elixationeque turgeant, & augeantur; fibræ autem Renum stringantur, & minuantur: illæ firmiter secundum longitudinem contextæ, & tractioni resistentes sint: istæ friabiles, & molles, & cum denique sensibus pateat, fibras hasce Musculos non esse, sed meatus, & canaliculos. Si igitur hæc filamenta ab altero illarum extremo, pelvim scilicet spectante, compresseris, inspexerisque, aquam uberrime profluentem (*Fig. 3. D, & 4. CCC*) intueberis. Hanc si lingua persentire non reformides, falsedinem quandam, & in paucis urinæ saporem invenies. Hoc idem experiri poteris, si Renis corpus per transversum secueris; tunc enim videre licebit à Renalibus ductibus, eo modo divisis, eundem succum prodire, ejusdem planè qualitatis, ejusdemquæ naturæ. Disces hoc multò facilius, si oculo perspicillum admoveris; tunc enim compressis tubulis prodiens urina, quasi ex tot siphunculis effusa (*Fig. 5. ccc*) apertissimè aspicitur. Ex quibus evidenter inferre possumus, substantiam Renum, quam usque dum parenchima nuncuparunt, nihil aliud esse, quam (licet reclamet Higmorus) canaliculorum, & capillarium meatuum, per quos urina in pelvim effluat, aggeriem; cum enim manifeste constet, fibras illas à cavitate pelvis usque ad extimam superficiem produci (*Fig. 10. AB*) atque eas perforatas esse ex effluente lotio evidenter deducamus. Quid nobis certius ipsis sensibus esse potest, quo tales fibrulas veras esse fistulas & canaliculos, serum in pelvim effundentes, dignoscamus? Et hinc clarissimè patet quam sit absolum, & à veritate remotum effatum illud, cui plerisque assentiuntur, Renes carnosos esse, similes cordis, vel epatis parenchymati, nullis fibris intextos, neque enim in iis carnem reperiatis, nullamque habent cum corde, vel epate convenientiam, fibrisque & canaliculis constantur. Et hæc, Erudite Lector, de Renibus habebam recensenda, ab aliorum scriptis, sed non à veritate discrepantia: quæ si nova sunt, absit quod ineruditi juvenis ingenio hoc inventum, ne per somnium quidem imaginantis, adscribas; solum hoc est fortunæ donum, cujus favore me primum hujus fabricæ repertorem esse latari possum.

Renum usus adeò verè ex ipsorum constitutione etiam externa deduci potest, ut nemo sit unus (demptis Erasistrato, & Asclepiade, ut dictum est) qui ipsos serum

serum à sanguine separare non asserat. Solùm, quomodo ista segregatio conficiatur, dissentiunt. Propria vi Renum illam fieri dicit Galenus : in foraminum angustiam, serique subtilitatem illam refundunt benedicti cribri repertores : facultate Renibus innata, propria ad justitiam temperie, formaque essentiali illam perfici adstruit Vesalius : Sanguinis retentioni, serique expulsionì illam tribuit Laurentius : à portione atræ bilis in Renalibus glandulis contentæ illam promoveri putat Veslingius, aliique alia arbitrantur. Quod si propriam de hoc sententiam exposcas, non is ego sum, qui in re tam ardua, & difficili quicquam in medium asferre possim ; neque enim tanti nostrum est ingeniolum, ut non evidenti, & tantum probabili opinione tot Anatomix patribus valeat adversari. Solum hic referre libet, quid superius laudatus Borellus ex hac inventa Renum constitutione ad serum separandum deducat. Certum, inquit, est, sanguinem è sinistro cordis ventriculo tanto cum impetu per universi corporis arterias effundi, ut usque ad minima, & tenuissima capillarium arteriolarum oscula perveniat. Per truncum ergo descendenti arteriæ fluens sanguis emulgentem (*Fig. 2. AA.*) irrumpit, ex qua Renes penetrans usque ad ipsorum superficiem per subtilissimas arteriolas (*Fig. 11. D*) progreditur. Hic verò cum illarum oscula pateant, nec mutua cum venis Anastomosi conjungantur (injecti enim per emulgentia vasa liquores à capillaribus osculis exsudare in superficie Renis videntur (*Fig. 6. ccc*) amota propria tunica,) sanguinem extra vasa effluere necessum est in spatium, (*Fig. 6. ccc*) quod licet sensu percipi non possit, reperiri tamen & ratio persuadet, & perspicillum manifestè confirmat. Desinunt ad idem spatium tam capillares venæ emulgentes (*Fig. 11. DD*) quam Renales ductus, (*Fig. 10. E.*) quos diximus : ambo enim hæc vasa ad extimam superficiem terminari, demonstratum est. Cum ergo sanguis extra arterias prodierit, duplicem vasorum ordinem offendit, Venalem scilicet unum, Renalem alterum. Serum itaque Renales ductus ingreditur à sanguine separatum, sanguisque venas subit à seroso humore sejunctus. Hæc verò secretio non per attractionem, non familiaritatem, non per sympathiam contingit, sed una, & sola vasorum configuratione hoc expetente perficitur. Quæ omnia adeò evidentè confirmari possunt, ut nullus deinde futurus sit dubitationi locus. Quod igitur serum, & sanguis sua sine ipsorum attractione vasa percurrant, quis inficiabitur? habemus enim experimenta, quibus id fieri posse demonstratur. Si namque, ut unum adducam, angustissima fistula vitrea, vel siphunculus aquæ erectus, vel inclinatus insistat, continuo ascendentem aquam licet ad attractionem confugere non possis, aspicies. Cum ergo ductus illi Renales (*Fig. 10. B*) & venulæ (*Fig. 11. D.*) siphunculis quibuscunque subtiliores hient ad spatium (*Fig. 6. ccc*), in quod sanguis ab arteriis evomitur, cur humores sine attractione sponte sua in canaliculos induci non licet. At, inquires, esto talis in vasa penetratio more siphunculorum sine attractione contingat, quomodo tamen sanguis in venas, serum in Renales ductus immittitur? Hoc verò facillimo, & brevi negotio absolvi potest, cum ex diversa meatuum configuratione isthæc introductio proveniat. Neque enim sufficit, ut Erasistratus assererat apud Galenum ad diversi humoris separationem, vasorum ora esse variæ ca-

pacitatis, ita ut sanguis v. gr. in Renibus ideo Renales ductus non subeat, sed venas, quia ipsius minimæ particulæ ab angustis eorum meatuum osculis excipi non possint; nam plurimis experimentis comprobari posset, poros angustissimos à Rebus subtilioribus non penetrari, licet ipsos crassiora pervadant: rursusque à poris satis patentibus, & laxis subtilia non admitti, quamvis minus tenuia introducantur. Sic quantæ sunt angustiae Auri porositates? adeo illæ sensum effugiunt, ut prorsus non reperiri aliqui contenderint; & tamen Mercurius poros illos penetrat, quos non aqua, non aer, nec ulla Hydrargiro subtiliora possunt pervadere. Rursus quantæ sunt amplitudinis pori vesicarum, & pellium? Ab his tamen exsudat aqua, licet exitum aëri tenuiori nunquam concedant. Unde patet ad sensum, majorem vel minorem osculorum angustiam nihil omnino ad hujus, illiusvè humoris penetrationem facere, nisi etiam partium, quæ introduci debent, figuræ accomodetur. Cùm ergò Renales ductus, & venæ ad spatiolum illud (*Fig. 6. C C C*) terminentur, ubi sanguis sero permixtus ab arteriis effluit, inveniatque serum siphunculos illos Renales sibi proportionatos; itemque sanguis venas sibi accommodatas obtineat, mirum non est, si uterque liquor in sua vasa deducitur, nulla attractione, vel familiaritate cogentibus. Quia tamen hæc in Renales, venalesque meatus introductio expressioni ipsius feri in pelvim, nec reductioni ipsius sanguinis in cavam sufficere poterat, (in Renum enim sectione constat, ex Renalibus ductibus nihil effluere, licet sero impleantur, nisi ipsos digitis constrinxeris), natura consultum est, ut quemadmodum in foeminarum papillis contingit, quæ licet lacte turgeant ad dolorem usque, non tamen illud effunditur, nisi constrictione, & compressione exprimatur; ita planè in Renibus licet ductus illi urina intumescerent, ipsa tamen sine expressione non efflueret. Hæc autem vis exprimens respirationis ope facillimè obtinetur; tumefactis enim pulmonibus, & thorace, à distento diaphragmate impellitur abdomen, ex cujus expressione à visceribus omnibus suppositos Renes comprimi necessum est, quorum compressione, & uberrimus sero fluxus in pelvim, liberque sanguini regressus in Cavam conceditur.

Hæc sunt, quæ breviter quidem, & obscurè, nec satis pro ipsius inventi merito ex multis aliis, quæ ex mente ejusdem doctissimi capitis recensenda essent, & quæ in ipsius de Motu Musculorum libro demonstrata leges, ipso annuente placuit aperire: quæ quàm aptè veritati consonent, & naturæ respondeant, disce ex jam dictis, dicendisque in eodem de motu musculorum libro longè meliùs ad-
disces.

Fig. 5




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 7




Fig. 3





Fig. 4



EXPLICATIO TABULÆ X. & XI.
Ex Exercitatione Anatomicâ de Structurâ & Ufu Renum,
LAURENTII BELLINI.

FIG. I.

- Ren Vervecinus à fima parte per longum sectus, & Pelvi denudatus, ut vasa videantur.*
A A. Arteria Emulgentis rami majores.
B B. Vena Emulgentis rami majores.
C C. Divisio Arteria in plures minores surculos.
D. Alia minores Arteria à dictis surculis procedentes.
E E. Extrema fibrosa carnis filamenta ad superficiem Renis desinentia.
NN. Vena Emulgentis ramuli.
O O. Vasa minora, quæ Apum loculamentis Hgmo-ro comparantur.

FIG. II.

- Ren Vervecinus à fima parte per longum sectus, à quo fibrosa caro ad Pelvim pendens separata est, ut rotunda vasorum divaricationes appareant.*
A A. Ren per longum sectus,
B B. Pelvis discissa.
C C. Vena, & Arteria Emulgentis ramuli tunica Pelvis involuti, & orbicularem figuram exprimentes.
O O. Vasorum minores circuli, seu alveoli, à majoribus procedentes.

FIG. III.

- Ren Vervecinus à fima parte per longum sectus, ut fibrosa carnis unio ad Pelvim appareat.*
A A. Ren per longum sectus.
B B. Pelvis divisa.
D. Fibrosa carnis, seu Renalium ductuum unio, & textura in Pelvi.

FIG. IV.

- Renalium ductuum extremitas, quæ papillare corpus ad Pelvim constituit.*
A. Papilla Renis vervecini separata.
B B. Pars inferior adhærens Alveolis.
C C. Papilla extremitas albicans, in qua omnes Renales ductus terminantur.

FIG. V.

- Ejusdem Papillaris corporis portio conspiciillo visa, & digitis expressa.*
A A. Papilla pars ut microscopio representatur.
C C C. Guttula serosa ab illa portione papilla albicantis erumpentes.

FIG. VI.

- Vervecini Renis superficies conspiciillo visa, postquam in emulgentes injectus est humor coloratus.*
A A. Renis superficies ut microscopio representatur.

B B. Spatiola inania.

C C C. Sinuli quidam vermiculares & tortuosi dicta spatiola circumambientes, & in quos humor infusus eructari cernitur.

FIG. VII.

- Renis humani ab Uretere ad Pelvim usque per longum secti aspectus.*
A A A. Ren dissectus, ut dictum est.
B. Ureteris dimidium ad dextram reflexum.
C. Alia ejus medietas ad sinistram inclinata.
D. Vena Emulgentis ramus.
E. Arteria Emulgentis ramus.
F. Alter vena Emulgentis ramus.
G. Pelvis aperta.
H H. Quædam papillaris corporis portiones à Pelvis tubulis conspicuæ.
I. Principium Ureteris.

FIG. VIII.

- Humani Renis medietas, Pelvi, vasisque plurimis liberata, ut unio & coitus tortuosus Renalium ductuum representetur.*
A A. Extrema filamenta ad extimam superficiem desinentia.
B B B. Renalium ductuum coitus, qui papillare corpus tortuosum efformat.
C C C. Guttula seri à papillari corpore digitis expresso effluentes.

FIG. IX.

- Ejusdem Papilla portio separata.*
A A. Fibrarum extremitates ad superficiem Renis protensa.
B B. Albicans ejusdem papilla pars, ex qua
C C C. Guttula seri eliciuntur.

FIG. X.

- Cervine Papilla portio à Rene separata.*
A. Cervine Papilla albicans pars, ex qua serum exprimitur.
B. Filamenta ejusdem à Pelvi ad usque Renis superficiem continua.

FIG. XI.

- Vasa Cervini Renis à gibba parte per longum secti à fibrosa carne liberata.*
A A. Pelvis.
B B. Ejusdem productiones, & processus, quibus emulgentia vasa vestiuntur.
C. Vasa Apum alveolos referentia.
DDD. Vasa capillaria ad extimam Renis superficiem excurrentia.

Fig. 10




Fig. 8



Fig. 9




Fig. 6





Fig. 11



P A R S X.

De Ductu novo Testium.

Ex Disq. Anatom. Hickmori lib. I. pag. 4. cap. I.

HÆc præter vasa, *inquit*, per membranas ipsamque testis substantiam disseminata, in medio ejusdem substantia Corpus quoddam teres, album ac densum vasi deferenti haud dissimile, nec minus, invenitur: nullâ aut obscurâ saltem cavitate donatum. Quod à testium fundo ad superiorem illius partem ascendens, in tunicæ albugineæ interiorem partem quam fortissimè implantatur, *ut ex Figura hic apposta videre est*. Neque tunicæ solummodo affixum, sed & illam ad b perforare, ac in Parastatarum caput se inferere videtur, cui quam pertinacissimè adhæret, nec nisi sectione separabile est. In inferiore ac mediâ parte non nisi vasorum interventu e e e f f membranæ alligatur. Per ductum hunc (ab Anatomicis nusquam adhuc designatum) semen à testibus elicium in parastatas educi merito statuimus, cum in omnium animalium testiculis, licet non ejusdem magnitudinis, reperiatur, nullaque alia, per quam ducatur, via assignetur, illi ergo hoc officium pertinere non dubitamus.

EXPLICATIO FIGURÆ II. & III.

TABULÆ VIII.

EX HIGHMORI loco dicto.

A. A.	Corpus Varicosum.	b. b. b.	Vasorum à plexu hoc in tunicâ divaricationes.
B. B.	Testes albuginea tunicâ plurimis vasis refertâ investiti.	c. c. c.	Vasorum Anastomoses.
D. D. D.	Parastata tortuosa pars descendens.	d. d. d.	Ubi capita vasorum se abscondunt.
C. C. C.	Parastata principium.	e. e. e.	Vasa à tunicâ medium testiculorum pendentia qua gemina sunt.
E. E.	Vas deferens, seu ejaculatorium rursus ascendens.	f. f. f.	Illorum unio ac reflexio versus tunicam.
F. F. F.	Interior glandulosa testium substantia ad medium usque divisa, ut ductus g. g. in medio cernatur.	g. g. g.	Ductus novus testiculî.
a. a. a.	Tortuosi vasorum gyri in plexu pampiniformi.	h.	Illius in tunicam implantatio, undè in parastatam ducitur.



Fig. II. et III.





Fig. I.




Fig. V.





Fig. IV.



P A R S X I.

De Structurâ & Ufu Pulmonum.

Epistola de Pulmonibus Marc. Malpighii Med. Prof. Bonon. ad Ioan. Alphons. Borellium, Pisis Mathes. Professor. Epistolis Thoma Bartholini addita.

E P I S T. I.

INter sectiones, quas in dies avidius prosequor, fors tulit, ut aliqua circa pulmones diligentius perscrutarer, quæ alias mihi visus eram veluti in umora deprehendisse; hæc qualiacunque sint tibi reor communicanda, poteris enim quopollens ingenio, & in anatomicis contemplatione, geometricum oculum, qui ictu solo veritatem, aut falsitatem è rebus colligit, observationibus istis adjicere. Tuum erit hæc inventa, vel ad usum meliorem dirigere vel nutantem adhuc meam mentem tuo asserere in verbo.

Pulmonum substantia vulgo censetur carnosâ, utpote quod sanguini suum debeat ortum, nec epati, nec lieni absimilis creditur, & ideo rubere pulmonem in fætu cum solo sanguine nutriatur, & consequenter ut carnosum viscus calida, & humida pollere temperie omnes fatentur. Diversam tamen substantiæ naturam accuratior sensus, & ratio videntur ostendere, diligenti enim indagine adveni totam pulmonum molem, quæ vasis excurrentibus appenditur, esse aggregatum quid ex levissimis, & tenuissimis membranis, quæ extensæ, & sinuatæ penè infinitas vesiculas orbiculares, & sinuosas efformant, veluti apum favis alveolos ab extensa cera in parietes conspiciamus; hæc talem habent situm, & connexionem, ut ex trachea in ipsas, mox ex una in alteram, patens sit aditus, & tandem desinant in continentem membranam; Hoc demonstrat sensus in pulmonibus mox ab animalibus erutis, in quibus aëre turgentibus perspicillis observantur in extrema superficie infinitæ pene vesiculæ aëre turgidæ, easdem etiam in eodem secto per medium pulmone, & aëre exinanito observare est, licet minores & minus conspicuas; clarius, & sælicius in pulmone inflato, & mox exsiccato deperiuntur, quia in extrema superficie protuberantes emergunt orbiculi, & in secta qualibet parte foveæ, & sinuosæ propagines levi extensa membrana efformatæ videntur; & ut dubiam mentem omnino in certam fidem asseras, erues è vivente adhuc animali pulmones, & immissa siphone aqua per arteriam pulmonarem, sanguinem totum foras protrudes & vasâ pulmonaria pertransiente aqua dilues, illico totam pulmonum substantiam ad quam pertingit aqua, & unde fere diaphanam efficies, hæc eadem si levi facta compressione, ut imbibita jam aqua extrudatur, mox aëre immisso per tracheam turgida ad umbram, vel solem exsiccetur, non tantum lumini objecta exterius diaphanos exponit orbiculos, sed & interius secta candidam vesicularum molem tutò oculis exhibet. Horum imaginem, tum in interna, tum externa pulmonum regione, prout potui aucta magnitudine, ut facilius me explicarem in postremis tabulis exaravi, ubi in secunda

cunda ex his, quæ summa cum diligentia colligere potui, membranæ istæ vesiculæ videntur efformari ex desinentia tracheæ, quæ extremitate, & lateribus in ampulosos sinus facessens, ab his in spatia, & vesiculas inæquales terminatur.

Sensuum imbecillitati opem ferre videtur ratio, cum aër, qui à trachea in pulmone ens irrumpit continuatum exigit tramitem ad facilem, & subitum ingressum, & egressum, unde fortasse tunica illa interna tracheæ in sinus, & vesiculas terminata consimilem inchoatæ vulgò spongiæ vesicularum molem efficit, quod mihi etiam indicare videntur in resiccato pulmone æqualis substantia, color, & splendor, qui reflectitur æque à scisso tracheæ extremo canali, & ab appensis orbiculis, & sinibus; immò interna tracheæ superficies levi oblinitur humiditate, quæ necessario propagari debet eadem servata proportione in oculos, ubi aër postremo recipitur, & excluditur, ne calore pertranseuntis sanguinis exsiccentur (tenuissimæ enim, & rarissimæ sunt membranæ) & ut possint in majorem molem dilatari, & statim etiam comprimi, quod in resiccatis membranis nequaquam accideret, ut constat in morbois constitutionibus.

Hic unum se se objicit indagandum, in frustulo enim extimo pulmonum luminis objecto mirabile quoddam rete videtur extensum, quo emergentes, & extuberantes dices singulas vesicas vinciri, colligari, quod idem etiam obscure tamen in secto interius pulmone observatur; an vero hoc rete sit vas, vel quid nerveum extensum ad vesiculas, an vero sint ipsi parietes membranosi vesicularum, terminantes ad extimam membranam investientem, dubium apud me est, quia tamen in internis vel evolantibus particulis in resiccatione, vel leviter cultro abrasis videntur quandoque remanere nerveæ quædam hujusce retis propagines, & in extimis splendor quidam, & substantiæ modus nervorum proprius observari videtur, idè non absolum credam nerveum esse ligamentum vesicularum parietibus unitum & immixtum, veluti semicirculos illos cartilagineos in aspera trachea propagatos videmus, & præcipuè cum probabile sit, ut superius posui, vesiculas illas esse propagines membranæ internæ tracheæ.

Pulmonariæ molis divisio communiter sumitur à figura, & situ; duas enim habet partes intercedente mediastino, quæ iterum in duos lobos, in hominibus præcipue non rarò subdividuntur, in brutis autem multiplicantur.

Mirabiliorem & altiore observavi divisionem, pulmonum enim moles lobulis pene infinitis propria membrana circumseptis, communibus vasis donatis, propaginibus asperæ arteriæ adnatis conflantur, attingi autem possunt lobuli, si seminflatus pulmo solis radiis, vel luminis objiciatur, interstitia enim quædam quasi diaphana emergent, quæ si lævi incisione prosequaris lobulos, utrinque asperæ arteriæ, & vasis adhærentes sejunctos reddes, & propria involutos membrana in spirato aëre per tracheam experieris: illa & diligenti sectione seungi potest, & luci opposita splendescit; clarius tamen hos tibi continget videre facta levi pulmonum elixatione, & elaborata interstitiorum sectione.

Lobulorum figuram delineatam videbis; horum insertionem, & variam situationem non in totum mihi licuit exprimere, quia varia est secundum diversam exigentiam, cum enim ad quamcunque partem trachea cum appensis vasis

ad modum arboris ramificetur, & hujusmodi ramificationes modo desinant in superficiem pulmonum extimam, quæ plana, & æqualis esse debet, modo in angulos eorumdem extremos, rursus cum debitè necti debeant contiguus, & circumpositis ramificationibus, ut servantur debitus situs, nexus, æqualis capacitas, & interstitium, idè vario modo situantur isti lobuli, ut quandoque basi uniantur trachæ, modo costa, modo cono, processuum horum in extimis similitudinem in cupressi nuce adumbratam videbis, præcipuos, & simpliciores, pro ut licuit in postremis subobscurè collegi tabulis.

Post lobulos occurrent observanda tacta superius interstitia, non undequaque nudæ vacuitates, & intercepta inania spatia, plures enim habent extensas membranas modo sibi parallelas, modo angulares, quæ non tantum ab extrema superficie lobulorum lateraliter positorum, verum, & ab interna lobulorum substantia propagantur, inter hæc membranas excurrunt plurima vasa minima à lobulis egressa, quæ in eisdem oppositos ingrediuntur, hisce membranis recipitur, & ejicitur aër, veluti in amplioribus sinibus, qui mutuam habent communionem ut aër ex uno in alium comprimi possit, ita ut interstitia sint eadem membranæ vesiculæ pulmonum, diaphanæ tamen, & tenuissimæ.

Interstitia talem habent propagationem, qualis relinquitur à situatis lobulis, quæ in grandioribus animalibus penè æquant latitudinem semidigiti per transversum, hæc non ad solam lobulorum distinctionem, & nexum fabrefacta à natura censeo, sed fortasse aëre intercepto coarctant undequaque investitos lobulos, & ita multiplicant impetum pressionis, consequenter juvant miscellam sanguinei corporis. Ulterius cum frequenter vesiculas, quæ à Græcis hydatides dicuntur, in istis interstitiis observaverim, item in animalibus senibus, & aliis quibusdam morbo extinctis, puncta quædam nigra, quæ veluti linea tenui protracta totam interstitiorum propaginem signant, probabile credam diverticula esse, & emunctoria minimorum lobulorum; eadem quoque denigratioprehenditur in glandulis lateribus asperæ arteriæ continuatis.

Per pulmonum substantiam triplex vasorum genus disseminari innotuit; varius tamen creditus est usus, cujus quidem varietatem, & longum, & absolum exarare in præsentem esset, ideo supposita sobole asperæ arteriæ, venæ & arteriæ pulmonariæ, quæ nexu quodam pari ramificatione totam excurrunt pulmonum substantiam, hoc solum tibi sum ratus communicare, quo modo liceat sinceram, & evidentem vasorum divisionem, usque ad minima assequi, quæ quidem licet alias levi parenchymatis abrasione subobscurè habeatur, mihi facile tamen, & summa cum oblectatione contigit eam colligere. In pulmone igitur canis minor, sed gracilis, & oblongus assumatur lobus, qui compressione facta aëre omnino exhaustus radiis solaribus expositus aperiet ductus asperæ arteriæ, item propagines arteriæ, utpote sanguine vacuas, quæ omnia cum adjunctis lobulis polypodii similitudinem dabunt, & quia crassus hic sensus est, levi cum impensa, & labore iterum licebit exquisitiorem habere delineationem; Hoc autem tibi accidet si inflaveris arteriam pulmonariam mediante evidenti trunco in principio ejusdem lobi, deinde nodo illigaveris, videbis enim exurgentem arteriam, veluti

anagly-

anaglypticè sculptam se se minimis, etiam prodeuntibus vasculis ramorum arboris ad instar, vel si lubeat formosiores habere delineationem, immisso mercurio argenteæ emergent ramificationes, usque ad minima.

An hæc vasa in finibus, vel alibi mutuam habeant anastomosim, ita ut sanguis à vena resorbeatur continuato tramite, an verò hient omnes in pulmonum substantiam, dubium, quod adhuc mentem meam torquet, pro quo enodando, in cassum licet, plura, & plura molitus sum aëre, & liquidis varie tinctis, sæpius enim immisam aquam nigram syphone per arteriam pulmonarem à pluribus erumpentem vidi partibus, nam facta levi compressione solet exsudare à membrana investiente, partim etiam coacervari in interstitiis, major verò copia cum commixto sanguine erumpit per venam pulmonarem, & quod mirabilius est per tracheam diluta, & minus colore tincta cum levi spuma, & ex quacumque pulmonum compressione per eandem foras exit; in eodem item resiccato pulmone parietes vesicularum, & finuum denigrati omnes videntur. Quid simile etiam immisso mercurio accidere videtur, nam repleta arteria pulmonaria mercurius excurrit ad extimas propaggines bifurcatas, quæ si leviter etiam eomprimantur foras è membrana investiente evomitur, quandoque facto aditu in interstitia ibi penè totus colligitur. In siccatis etiam pulmonibus, varie, & inordinate rubescences conspiciuntur vesiculæ, aliis albescentibus. Unde ex his omnibus sicuti naturalis via non habetur, quia immixtus humor plures, & plures sibi parat vias, quæ sanitatis statu insuetæ sunt, ita edocemur ex levi quocumque conatu, & humorum mutatione regias istas vias frangi, quare nil mirum si hydropes, sanguinis exuptiones, phthises, asthmata, & empiemata levibus etiam ex causis in pulmonibus contingant.

De pulmonum usu scio plura ab antiquis haberi, circa illa plurimum etiam ambigi, & præcipuè circa refrigerationem, quæ pro principali fine usurpatur, cum nitatur excedenti imaginato cordis calore, qui exquirat eventationem, quare hæc curiosum in alterius usus indagine fecerunt, & ex his, quæ subnectam probabiliter credam pulmones à natura fabrefactos esse ad *sanguinarie mollis miscellam*, pro sanguine autem non intelligo aggregatum ex quatuor vulgatis humoribus, utraque bile, sanguine & pituita, sed totam illam corporaturam, quæ per venas, & arterias continuo fluit, quæ licet pene infinitis constet particulis, omnes tamen sub duplici parte comprehendi posse videntur, ad rudem nostrum sensum quoddammodo similari, subalba scilicet, quæ vulgo dicitur ferum, & subrubra.

Et primo non est, quod tibi persuadeam longa verborum serie in natura dari corpora quæ à proprio exortu non sint sortita fluxibilitatem, sed partes etiam minimas ad facilem nexum, & unionem ita paratas habeant, ut nisi summâ cum vi disungi possint, & aliquando disuncta mutuam moliantur unionem, hæc iterum corpora facillime etiam negotio mixtione alterius interpositi corporis fluida fieri, hoc primo videmus in metallis, & aliis igne fuis, deinde partibus tartareis, quæ fusæ, & cum aqua commixtæ sunt fluxiles & inconspicuæ, unitæ autem constituunt lapidis soliditatem, rursus aquis regiis, acidis, & similibus inter-

interpositis, & discontinuantibus fluxibilia reddimus solidiora metalla, quin immò, quod mirabilius est, ex sola partium discontinuitate in siccissimis contingit fluxus, ut in plumbo, & stanno adusto mox à figulo mola contrito, ea enim est nostri sensus crassities, ut facile credat minima arenularum grana instar aquæ, & ipsa fluere.

Nec dubium est in sanguinis massa partes esse, quæ ad facilem unionem sint proclives, & ad tantam deveniant soliditatem, ut lapidem duritie quandoque æmulentur; Hujus inditum sit sanguinis pars rubra, quæ à sero sejuncta ita resiccatur, ut præ se ferat lapidis speciem, licet in frustula determinatæ tamen figuræ sit friabilis, portio item serosæ substantiæ, levi calore ad ignem concretæ, quæ vehementiori nexu procedente tempore ossæ fit, & diaphana; hæ igitur particulæ debite ad invicem commixtæ fluidum quoddam in totum efficiunt, fit enim primo fluxile serum tum ex mixtura aqueæ substantiæ, cujus existentiam ostendit sensibilis evaporatio è sartagine erumpens, dum serum concrescit, & clarius humor quidam odore, & sapore urinam representans à sanguinis sero medio alembico sejunctus, qui solet æqualem penè servare mensuram cum concreto sero, tum ex bile, & salibus diversis, quæ copiose à sero aqueo extrahuntur, fusa enim, & cum sero debite mixta majorem partium solutionem, & fluxibilitatem efficiunt; Ex serosa, seu hac alba parte contingit fluxibilitas alterius, scil. rubræ, hoc expresse videmus à contrario in extracto sanguine ex secta vena, sejuncta enim minima rubra jam commixta fortasse ad motum excitata ex calidis particulis foras erumpentibus sibi similibus uniuntur, & serosa substantia undequaque expressa in circuitu separatur, hoc idem accidens in viventibus observatur, ubi scirrosi tumores coacervantur, & nigri muci; quorum originem vulgus videtur recognoscere à melancholia, vel atra bile; firmatur hoc totum ex vulgari experimento, mulieres enim, ne sanguis exiens à vivente adhuc animali in suas concrescendo dividatur partes, solent digitis, vel baculo conterere, & exagitare; ut scilicet perpetuetur fortis illa miscella albi, & rubri.

Ut igitur hæc miscella optime succedat, & minimum albi intercitat, & tangat minimum rubri, & stabili facta mixtione sanguinis massa instauretur, natura pulmones fabrefecit. His lucem ferunt, quæ ex anatomicis circumferuntur, nam constat in pulmones derivari media arteria pulmonari sanguinem minus dilutum sero è toto ambitu redeuntem, item mediis vasis thoracis chilosam materiam, & *Bartolini* lympham, quæ eadem est cum sanguinis albo, quæ omnia cum in dextro cordis ventriculo nequeant, nisi rudem subire miscellam, ulterius in appensos pulmones propagantur.

Pulmonum structura talis est, ut exacte miscere possit; perreptant enim per pulmonum molem ad minima usque vasorum rami, adeò ut inclusæ substantiæ, dum hinc inde propagantur in divisionibus fractæ, & veluti ab allisu divaricationum vasculorum mixtæ, simul melius in unam confluant naturam, subigente quodammodo illas substantias aëre in vesiculis incuneato, quædam undique vasa stipantes, dum modo vacuantur, modo implentur totam materiam continuata per suas vices pressione penitus miscere possunt. Simile quid in dies vide-

mus,

mus, dum farina in massam compingitur, ut enim eam exactè misceamus crebra tundimus manu.

Hanc veritatem è piscium pulmonibus, qui in branchias efformantur petimus; in his branchiæ componuntur plurimis radios semicirculis, sibi invicem incumbentibus; vasa pulmonaria suis minimis propaginibus, usque ad radiorum apices excurrunt, qui ita sunt dispositi, ut aquam majoris corporaturæ, quam sit aër, undequaque recipiant, hæc enim vi pressa ab osseo operculo radios ita coarctat, ut in propagatis vasis, & humoribus miscella, & motus sufficienter habeantur. Quin immò, & quia mucus continuò inde facillimè abraditur, non incongruum est censere, quod ea, quæ in aliis per renes, & transpiratum exirent, hac compressione excludantur. In ovis item incubatis argumentum habemus; ex extrema nempe umbilici ramificatione in albumen, & vitellum, quæ ita in minima multiplicatur, ut efformatum rete delineet, hac namque infinitus ramis in humores, seu colliquamentum terminante miscetur minimum delati sanguinis cum succo mox adducendo. Ex his, & consimilibus, ut alias tibi per litteras exposui, cum necessariam in animalibus sanguineis pulmonum opem conspicerem, & his otiantibus in fætu quandam molem in mulieribus uterinam placenta dictam, in quam ultimò terminantur umbilicalia vasa viderem, non incongruè fortasse credidi, hanc esse pulmonum vicariam, per hanc enim consimili ramificatione excurrunt propagata vasa, & à matre exsudans humor albus advenienti copioso sanguini per umbilicales arterias, ita exactè miscetur, ut jam factus sanguis ad cor iterum revehatur, & inde in universum corporis habitum.

Ad minimorum unionem non tantum sequitur stabilis miscella, & fluxibilitas in sanguine, & eodem tempore ex deducta materia intercedente fermentatione sanguineæ massæ instauratio contingit, calor emergit, & major, & major inducitur particularum libertas; horum inditium sit colliquatio, & turgentia cum in albumine, tum in vitello in ovis incubatis ex miscella immixti sanguinis per vasa umbilicalia, in quorum meandris novus progignitur sanguis ope appulsi, & fermentantis sanguinis, nondum adhuc vigente epate, quam eandem motionem in nobis ipsis experimur, dum brevi à cibo turgentiam in pulmonibus ex affluente alimento perferimus, subsequenter calore, pulsu aucto, & crebra respiratione, & præcipuè in me ipso ex oleribus, & leguminibus talem perfero tensionem, ex qua per vicem insinuante se quodam acri, & turgente humore mihi ipsi, & adstantibus prænuntio palpitationis ictum mox in corde futurum, quo mox sequuto vagus ille morsus tollitur. Manifestius se se exerit hæc fermentatio in hæcticis, ubi plus justo acrior est sanguis, ut non tantum partes, in quas influit per arterias delatus solvat, & fundat, verum & ulterius procedente fermento, talem inferat in partibus sanguis libertatem, & motum, ut posthabita unione, & nutritione foras evolent innumeræ particulæ per cutim insensibiliter, per renes, nares, alvum, sensibili, & copiosa evacuatione; quin immò, & pulmones ipsi, in quibus totum hoc agitur negotium, ferè primi sunt, qui hujus sævitiam perferunt, quare nil mirum si solis impensè incrassantibus, & motum cohibentibus, ut lacte, pituita, cochleis, balneis, oleis, & similibus pro reprimenda

menda hujus fermenti activitate fit incedendum; in his igitur à cibi novo adveniente chilo in pulmones talis increfcit calor, ut fenfibiliter tunc febricitent, & attenuato fanguine magis fe fe infinuante genæ præcipuè rubeant, & tandem, quod in confimilibus etiam accidit, pulmonum compages, & meatus vel erodantur, vel plus jufto aperiantur hiantes in peftoris capacitatem, vel in afperas arterias, & ita modo fanguis, modo fola pars alba levi concreta calore per fputum erumpat, modo in thorace recolligatur. Tanta eft demum hujus fermentationis neceffitas, & præftantia, ut in fæminis quibusdam, quibus aliqua ex caufa non debite excitatur, alba, & ferofa fanguinis pars non fine pulmonum affectione, adeo excrefcit, pereunte penè rubra, quod, & infpectione fanguinis è fecta vena, quilibet experiri poteft, & colore, torpore, corporis cachexia etiam confirmare, quin immò ftato tempore ex naturæ instituto in fanis fæminis, ita turget, ut vias fibi aperiendo fingulo menfe menftruas celebret purgationes. Ex his omnibus non eft difficile caloris actualis originem agnofcere, cum aliunde fciamus particulas calidas folutas, & ad motum excitationem actualem in nobis inducere caloris fenfum, quod benè præftatur à fermento.

His ufibus poffem alium æque neceffarium addere, pulmones f. fabrefactos effe à natura veluti fanguineum penu, ut continuo per vices fuppeditent fanguinem cordi, qui ab eo in univerfum perpetuo circuitu impulfus, & vitam & motum omnibus impertiatur, quoniam tamen ab aliis tactum eft, ideò tranfeuntèr folum fubnectam, quod in animalibus adhuc viventibus fecto thorace, fi jam collapsi pulmones iterum immiffa fiftula aëre inflentur, reftituitur motus cordi, jam penè extinctus, irrumpente fanguine in finiftrum ventriculum ex facta aëris compreffione. Praxis etiam hoc idem comprobât, obftructis namque pulmonum vafis, vel auriculis, pulfus inæqualitas primò emergit, & tandem mors; & tanta dignitate pollent ad vitam in animantibus pulmones, ut perpetuò hoc verum fit, morbos ut plurimum, vel ab ipsis pulmonibus, vel tandem in ipfos definere.

Hæc licuit ex obfervationibus factis ad ufum anatomicum comparaffè. Ifta quo ad aliqua certius determinaffem, nifi labor hic in minimis, & penè vifum effugientibus effet. Solita tua humanitate me profequere, & neftoreos ducas annos.

E P I S T. II.

EA eft inveniendis in rebus phyficis obfcuritas, ac difficultas, ut aliquid penitus determinare integrum non omnino fenfibus noftris effe videatur, & licet improbo pervicaces in labore, fuis in fætibus, veluti in exararo per myfteria volumine, naturam parentem contemplemus, obfcura magis in effoffis animantium vifceribus recludere tentemus, noftris demum conatibus non nifi per immenfa obfervationum tædia veritatem conftare colligimus, dum modo infectorum, modo perfectorum animantium fectione veluti per gradus lucem mutuumur, folet .n. quibusdam, licet vilioribus, magnis, & omnibus numeris abfo-

absolutis natura præludere, & in imperfectis rudimenta perfectorum animantium ponere, ut propius tamen, Vir præclarissime, rem tangam, duo erant, quæ in mea de Pulmonum observationibus Epistola, ut dubia, indaganda exactiori studio reliqui, Primum erat, quodnam sit rete illud descriptum, quo singulæ vesicæ, & sinus quodammodo vinciuntur in pulmonibus, alterum erat, an pulmonum vasa mutua anastomosi jungantur, an verò hient in communem pulmonum substantiam, & sinus; Problemata, quæ soluta, majoribus sibi viam agent, & ob oculos naturæ operationes clarius sunt positura, pro quibus enodandis ferè totum ranarum genus perdidit, quod non contigit in effera illa Homeri batrachomyomachia. In ranarum .n. anatome, quam favente Excellentissimo D. Carolo Fracastato Collega meo institueram, ut certior fierem circa membraneam pulmonum substantiam, talia mihi videre contigit, ut non immerito illud Homeri usurpare possim ad rem præsentem melius;

Magnum certum opus oculis video.

Nam in hac propter structuræ simplicitatem, vasorumque & ferè totius diaphaneitatem, quæ oculos in penitiora admittit evidentius res ita demonstrantur, ut cæteris obscurioribus lucem sint tandem allaturæ.

In rana igitur, scisso per longum abdomine, erumpunt pulmones utrimque cordi adhærentes, qui non ut in cæteris animantibus illico flaccescunt, sed tensi ad animalis libitum perdurant, hi nil aliud sunt, quam membranea quædam vesica, quæ primò intuitu minimis conspergi videtur maculis ex ordine dispositis instar corii piscis squatinæ, vulgo dicti *Sagrino*, figura, & extimis protuberantiis æmulatur conum pineum; colligatur autem interius. & exterius textura quædam vasorum diversimodè propagatorum, quæ ex pulsu, contrario motu, & insertionem venæ, & arteriæ pulmonares sunt, in ejus concava, & interiori parte tota ferè faciescit in inane spatium aëri recipiendo dicatum, non undequaque tamen levis est, sed intercipitur occurrentibus alveolis, qui ex elatis in pusillam altitudinem membranosis parietibus conflantur, non sunt verò omnes ejusdem figuræ, sed dum parietes in longum, & latum ducuntur, & nectuntur, ferè in exagonos sinus efformantur; ad angulos sinuum, dum flexa aliquantisper extenditur membrana, infundibulum veluti constituitur, & ita minorum ranarum pulmones effinguntur: in grandioribus autem in majorem altitudinem elewantur parietes, & à medio contentæ areæ tres ut plurimum sensim augescendo excurrunt, sibi que occurrunt parietes in minoribus ranis ferè inobservabiles, hi cum sibi invicem, & majoribus nectuntur in tres alios sinus, ut plurimum sinum majorem partiuntur. Sinuum area, seu fundus vasa superius tacta admittit, & quo ad arteriam ipsa aliquando non conspicuo desinit in medium furculo, sed ulterius suo majori ductu exporrigitur, & aliquando manifestè unum vel alterum ramum depromit, vena autem parietum interna fastigia alabatur, hisque immiscetur, & demissis inferius ramis per parietem tandem excurrit in aream.

His visis meram structuram, & compagem attinentibus mirabiliora, microscopica deteget observatio, nam pulsante adhuc corde sanguinis contrarius motus,

tus, licet difficulter, in vasis observatur, ita ut evidenter detegatur sanguinis circulatio, quæ scilicet etiam in mesenterio, cæterisque venis majoribus abdomine contentisprehenditur. Sanguis itaque hoc impetu per arterias in quascunque cellulas uno, vel altero ramo conspicuo pertranseunte, seu ibi desinente per modum effluvii in minima depluit, & ita multipliciter divisus rubrum colorem exuit, & sinuose circumductus, undique spargitur, donec ad parietes, angulos, & venarum ramos resorbentes appellat.

Non ulterius vis oculi in vivente animante aperto potuit extendi, hinc credideram sanguineum corpus in spatium inane erumpere, hiant vase, & parietum structura recolligi, huic ansam præbebant tortuosus, & in diversa diffusus sanguinis motus, & ejus ad determinatam partem unio: fidem tamen meam dubiam fecit exsiccatus ranae pulmo, qui forte in minimis (ut postea deprehensum) vasculis; sanguineam rubedinem servaverat, ibi n. perfectiori vitro oculis non amplius puncta efformantia corium, quod dicitur *Sagrino*, sed vascula annulatim immixta occurrebant; & tanta est horum vasculorum divaricatio, dum hinc inde à vena, & arteria prodeunt, ut non amplius vasis ordo fervetur, sed rete conflatum ex duorum vasorum productionibus appareat, hoc rete non solum totam aream occupat, verum ad parietes extenditur, & excurrenti vasi adnascitur, pro ut copiosius licet difficiliter potui in testudinis oblongo pulmone pariter membraneo, & diaphano observasse, hinc patuit ad sensum sanguinem per tortuosa vasa divisum excurrere, nec in spatia effundi, sed per tubulos semper agi, & multiplici flexu vasorum disjici. Nec novus est naturæ mos extrema vasorum ora invicem jungere, cum in intestinis, aliisque partibus idem ipsa fervet, quinimo quod mirabilius videbitur, venarum fines superiores cum inferioribus spectabili invicem necit anastomosi, ut optime observavit Doctissimus Fallopius.

Ut autem proposita facilius obtinere possis, & visu assequi, sectæ ranae emergentem, turgidumque pulmonem, dum copioso undique aluitur sanguine, filo qua jungitur cordi neces, etenim hic exsiccatus servabit vasa sanguine turgentia, quæ tunc optimè videbis si contra horizontalem solem exposita pulicari unius lentis perscruteris microscopio, vel aliam instituere poteris in his videndis methodum, supra laminam crystallinam pulmonem pones subtus lucernæ lumine per tubum illustratam, huic microscopium duarum lentium admovebis, & ita annulatim propagata vasa tibi aperientur, eadem dispositione instrumentorum, & luminis motum sanguinis per tacta vasa observabis, & ipse ex te alia comminisci poteris per diversos lucis gradus, qui calami subterfugiunt descriptionem, circa verò motum sanguinis tua dignum speculatione unum se promit, ligatis n. auricula, & corde, & ita sublatis motu, & impulsu, qui posset à corde in appensa derivari, adhuc sanguis per venas movetur ad cor, ut vasa suo conatu, & affluente copia distendat, & hoc per plures perseverat horas, in fine tamen, si præcipue solaribus exponatur radiis, non eodem continuato agitur motu, sed veluti per vires impulsus, fluctuans eadem simul progreditur, regrediturque via, quod & accidit avulsis corde & auriculâ.

Ex his igitur ad prima problemata resolvenda ex analogia, simplicitateque qua utitur natura in suis operibus, colligi potest rete illud, quod alias nerveum creditur, vesicis, & sinibus immixtum, vas esse deferens sanguineum corpus, seu idem efferens, & quamvis in perfectorum animantium pulmonibus in medio annulorum retis, aliquando vas definere videatur, probabile tamen est, pro ut fit in cellulis ranarum, & testudinum, illud vas minima ulterius propagata vasa ad modum retis habere, quæ propter exiguitatem suam exquisitum etiam sensum effugiant.

Ex his etiam summa cum probabilitate illud solvi potest de mutua vasorum unione, & anastomosi, etenim si semel intra vasa natura sanguinem voluit, & vasorum fines in rete confundit, probabile est etiam in aliis anastomosi jungeretur, hoc evidenter depræhenditur in ranarum vesica ab urina turgente, in qua citatus sanguinis motus per diaphana vasa mutua invicem anastomosi juncta observatur, quin & vasa ista illum sortita sunt nexum, & progressum, quem in foliis omnium ferè arborum illarum venæ, sive fibræ perpetuo designant.

In quem verò finem hæc omnia fiant, ultra ea, quæ superiori epistola tetigi de pulmonaris miscella, tu ipse visus eâ apprimè deprehendisse, nec celeberrimo tuo hoc invento mens est fraudanda, quod humanitate tua ad me exaratis litteris commisisti, quibus subtiliter philosophabaris mira in vegetabilibus portenta naturæ observando, dum miramur poma ex trunco non suo pendere, plantarumque adulteria jucunda mixtura legitimis nothos superinduxisse partus: videmus enim unam eandem arborem in ramis suis diversos induisse mores, dum hic grata aciditate gustum penduli prolestant fructus, illic nectarea dulcedine omne desiderium implent, & ipse fidem veritati astruis, dum Romæ miratus es è massilici mali trunco vitem, & jesimum prodiisse; hæc ingenia, qui vitidaria excoluit levi indito furculo grandioribus ramis fecit, & ad diversarum rerum foeturam non reluctantes arbores erudivit, nam in hanc rem appositè cecinit Virg. in Geor,

— *aliena ex arbore germen*

Includum, ideoque docent inolescere libro.

Miri hujus effectus tua philosophandi methodo secretum aperis, existimare enim debemus eatenus massilici mali acidum succum in meri naturam dulcescere, quatenus particulæ illius succi, licet sæliciter excurrant per exiles meatus proprii trunci, non eodem tamen modo possunt continuatos vitis tubulos subire, hinc suo percitæ motu, & subsequenti impulsu extra suum ordinem divulsæ, & fractæ, necesse est ut ad superinductam meatus figuram se componant, & novam induant naturam, qua & jesimum producit. Similem operationis modum in pulmonibus natura perficit, redit enim ab ambitu corporis viduatus alibilibus particulis turbatus sanguis, cui novus è vena subclavia humor additur ulteriori naturæ actione perficiendus. Hic igitur, ut in particularum carnis, ossis, nervi, &c. naturam disponatur, & præparetur, dum subit pulmonarium vasculorum miriades, veluti in diversa minima stamina dicitur, & ita sanguineis particulis conciliatur nova figura, situs, & motus, quibus carnes, ossa & spi-

ritus possint efformati; cumulatur tui dicti fides à consimili seminalium vasorum structura, ac si animantis nutritio quædam esset ejusdem regeneratio.

Hæc paucula in epistolam cœgi, ut inventa jam de pulmonibus auferem; si punctum tuli hoc totum mearum observationum additamentum ranæ debui. Istis rebus tua auctoritate, & invento pretium concilias, & dignitatem. Interim lætè philosophare, pergasque me omninò fælicem reddere has minimas cogitationes meas tuorum scriptorum de animalium motu, particula adaugendo.

Declarat hanc materiam fufius Barthol. in Diatribe de Pulmonum substantiâ & Motu addita Epistolis Bartholinians.

EXPLICATIO TABULÆ XII.

Ex Epistolis de Structurâ & Usu Pulmonum, MARCELLI MALPIGHII.

FIG. I.

Frustulum extimum Pulmonis exsiccati continens delineatum rete.

FIG. II.

Interna vesicula, & sinus adumbrati cum appensa particula, interstitiū in parte superiori; cæterum exortus, & integra propagatio icone oculis subjici non potuit.

FIG. III.

Lobulorum varia adaptatio supra tracheam, & pulmonaria vasa, qui etiam à naturali situ distracti exhibentur ad faciliorem intelligentiam.

FIG. IV.

Exhibens ranarum Pulmones cum appensa trachea.

A. Larynx, qua Semicartilaginea est.

B. Rimula, qua exactissimè clauditur, & aperitur ad animalis libitum, & clausa aëre turgentibus servat Pulmones.

C. Cordis situs.

D. Pars exterior Pulmonis.

E. Cellularum propagatum rete.

F. Arteria Pulmonaria propagatio.

G. Pars concava Pulmonis per medium scissi.

H. Vena Pulmonaria parietum apices excurrentis propagatio.

FIG. V.

Continens cellulam simplicissimam absque intermediis parietibus aucta in magnitudine.





A. Cellula area interior.

B. Parietes divulsi, & inclinati.

C. Arteria Pulmonaria truncus cum appensis Ramis, quasi reticulato opere desinentibus.

D. Vena Pulmonaria truncus parietum fastigia perretrans suis decurrentibus ramis.

E. Vas in fundo & angulis parietum commune lateralibus, & continuatis retis ramificationibus.



P A R S XII.

De Columnis Cordis.

Ex Disquis. Anatom. Hiphmori, pag. 141.

Paulo cordis sinus penitiùs introspiciamus, qui *κρητήρ* seu specus cordis dicti, gemini sunt; quorum dexter tenuior & capacior: lævus fibrosus magis & crassior: in quo sanguis ultimam suam acquirit concoctionem, & per fibras illas robustiores, in singulas Microcosmi regiones propellitur.

Utriusque superficies aspera est, & veluti serosa aliquantulum. Quæ quidem inæqualitas nihil aliud est quam textura varia partium fibrosarum; quæ se ad modum musculorum habent: & non tantum figuram aliquo modo fatentur, sed & officium mutuatur, sine quibus cor se validiuscule constringere nequit. In sinistro ventriculo plures quam in dextro inveniuntur. Tab. XIV, F.F.F. M. M. M. Quia in illo majori ad expellendum sanguinem violentia opus est, ut ad distantes corporis particulas propellatur, quam in dextro: In illo etiam sanguis tenuiorem consistentiam acquisivit; & quo tenuiora sunt corpora, eò magis vim expellentis effugiunt. In dextro verò ventriculo asperitas illa minor est, nec tantus musculosarum partium invenitur numerus, quia in illo sanguis crassior est & minori educitur violentia; præterea vis facultatis expultricis citius terminatur, quæ ab hoc solummodo ad pulmones extenditur; ab illo verò ad remotissimos angulos derivatur; sinus dexter sanguinem duntaxat ad partem privatam, sinister ad singulas partes impellit. Deinde ex pulmonum dilatatione sanguis è ventriculo dextro expromitur, ut à cochleis aqua, ob vacui fugam; adeò ut non tam nervosa facultate expultrice in illo opus sit, & ex consequenti, minori indiget musculorum numero. Atque hoc ipsum natura manifestè demonstravit. In avibus enim quarum pectus angustius occupat spatium, & brevior est à dextro ventriculo ad pulmones transitus, sinus iste glaber & prorsus æqualis invenitur. Siquidem in torosis & agrestibus corporibus, ac masculinis plures, in tenellis corporibus & fœmineis pauciores conspiciuntur asperitates.

In sinibus hisce utrisque, præter musculosas illas texturas, Papillæ quædem carneæ, quasi musculi teretes adsunt, Tab. XIII. III. & XIV. G, G. M. M. M. quæ ad mucronem affixæ, sursum spectantes fibras quasdam filares, tenues annexas habent; quibus inferiores valvularum tricuspidum particulae firmantur. Tab. XIII. R. R. R. & Tab. XIV. N. N. N. Carunculas illa nominamus Papillares, qui papillis assimilantur, quarum sæpè quinque vel sex in dextro sinu, in sinistro verò binæ majores crassiores ac solidiores inveniuntur.

Carunculæ hæc vix officium aliquod inter Anatomicos obtinuerunt, & qui in penitioribus absconduntur thalamis, penè negliguntur. Illarum verò usum situs ac connexio cum cæteris partibus aptè demonstrare videtur. Mucroni enim cordis affixæ, tenuioribus fibris valvas tricuspidales sibi affixas habent, ita ut, cum cordis mucro ad basim contrahatur (ut in Systole ejus videre licet) fibræ illæ

illæ carunculis annexæ laxentur, flaccidè pendeant, & valvulæ super venarum orificia, in ventriculos spectantia, decidant, eaque penitus occludant. In cordis verò diastole, cùm in longum se extendat, & à basi discedat mucro, & cum illo papillæ; fibræ illis annexæ tenduntur, & valvulæ versùs basim retrahuntur, quibus detractis orificia rursus patent, ut sanguis intromittatur. Atque hunc usum esse harum particularum opinamur; probabiliorem nobis proponant, & beabunt.

P A R S XIII.

De Ductu Salivali Inferiori.

Ex Adenographiâ Warthoni. pag. 116.

M*Axillares* glandulæ vel in *externas*, vel *internas* dividuntur. *Externæ* exiguæ admodum sunt & minoris momenti, *sitæ* sunt exterius in mediâ ferè longitudine maxillæ inferioris, ubi exterior ramus arteriæ carotidis, venaque jugularis externa & ramus conspicuus nervi tertii paris in musculos faciei adscendunt.

Credibile est & admodum verisimile, eas dicti nervi superfluitates aliquas excipere, & in venam proximam transmittere, qui plurimarum glandularum mos est.

Forſitan majore concitato fluxu per nervos ad faciem, quàm qui per habitum partis percolari, perque lymphæductus ad glandulam hanc remitti poſſit; facies plane ſubtumida & inflata apparet; nempe œdematoſo tumore inflari, quemadmodum frequenter cernimus in odontalgia declinatione.

Glandulæ *maxillares internæ* immediatè intra maxillam inferiorem *sitæ ſunt*; Earum pars poſterior, ubi parotidi & glandulis jugularibus appropinquat, multo craſſior & rotundior eſt, ut & rubicendior; antè progreſſa, paulatim attenuatur; mediâ autem viâ videtur primo aſpectu ab anteriore parte quaſi diſcontinuari & recedere, reiſpâ tamen exiguo ramento continuatur; dein verò non-nihil iterum craſſeſcit & cunei inſtar inter maxillam & linguæ musculos ad mentum uſque omnino protenditur.

Habet arterias, venas, & nervos, item *vas quoddam* diverſi generis ſibi proprium: arterias à carotidibus; venas à jugularibus; nervos inſignes à tertio præſertim, quarto & ſeptimo paribus, anatoſes inter ſe evidentes habentibus. *Vas* huic parti proprium Anatomicis hæcenus incognitum fuit. Verùm haud difficulter in conſpectum proſeras, ſi præmonitus advertas illud, ortum ducere è craſſiore & poſteriore hujus glandulæ parte, rectâque tendere mentum verſus. Antequam verò ad anteriorem ejuſdem partem pervenit, ramulos ſubinde novos ab eadem excipit; adeoque protenditur ad medium menti ſpaciū, ubi immediatè intra gingivas in papillam quandam utrinque terminatur, qua ſe facilè exponeret, nihil verò ab ore reſſuum admittat.

Pinguedine & musculis quibusdam hæ glandulæ magna ex parte teguntur, adeò ut primo aspectu minores multò appareant quàm reipsa sunt, quemadmodum amotis illis musculis videre est.

Substantia earum simillima est thymo vitulino, vel hominis pancreati; videtur, nimirum, quasi ex frustulis plurimis aptè inter se commissis, & membranarum ac vasorum ope junctis, coagmentari, sapore quoque & colore thymum vituli & hominis pancreata æmulatur, & apud nos in porcis & vitulis sapidiore est, cupidèque expetitur.

Quo certius hujus glandulæ genium & usum deprehenderem ipsemet, præfente Collega nostro celeberrimo *D. Glissono*, aperui caput bovis, in quo sperabamus, ob animalis magnitudinem, omnia ut ampliora, ita conspicua magis futura esse; summa autem diligentia quærebamus vas excretorium huic parti proprium, idque demum invenimus.

Vas hoc radices suas capillares in omnes hujus glandulæ partes æqualiter spargit; & in aliquibus geminum ramum, in aliis plures ramulos emittit. Cum geminum, è glandulæ capite alter alter è cauda prodit. Anterior ramus mox ab egressu extrorsum fertur versus glandulam quandam *minorem*, sitam inter intimam maxillæ partem, & hanc glandulam majorem; estque diversi generis, cineritii coloris, substantiæ compactioris, minusque granulata, & figuræ ovalis, quæ interno latere impressura levi & rotunda excavatur, è qua prodit vas peculiare, quod recta fertur, & in glandulam hanc maxillarem distribuitur circa locum dictum. Posterior ramus, spacio trium vel quatuor digitorum è glandula egreditur, priusquam cum anteriore caudice jungitur. Simulac verò è glandulæ substantia prodiit, fertur sub musculo maxillari tereti biventri, vel digastrico, qui eidem ramo quasi *trochlea* vicem præstat. Exinde reflectitur ferè ad glandulæ medium, ubi cum anteriore ramo descripto & pluribus ramulis eidem quasi fociis, unitur, & inde *canalis communis* ex horum concursu aliquantò auctior redditur. Hinc canalis dictus rectà anteriùs tendit, & à linguæ lateribus, nimirum in inferiore ejus parte, cute, pinguedine glandulosa tectus, ductu *tredecim* pollices longo provehitur, & inter gingivas in maxillæ extremitate, inter ipsam & papillas quasdam compressas & rigidas ei pertinaciter adhærentes in os aperitur, eidemque quoties usus postulat humorem salivalem impertit. In equo, circa mediam linguæ longitudinem utrinque aliæ glandulæ conspicuæ in ductum salivalem sese exonerantes occurrunt. de quibus forsàn uberius dicetur posthac, cum earum varietates in cæteris animalibus examinatæ fuerint.

Notatu dignum est, hanc glandulam, prout variatur in junioribus & senioribus animalibus, diversam servare sibimet ipsi proportionem: diversam inquam, & quodammodo contrariam illi, quam thymus in iisdem animalium ætatibus obtinet. Nam quò juniùs est animal, eò minor hæc glandula, major thymus: & contra, quò ætate grandius, nisi in extrema senectute, eò major hæc glandula & minor thymus. Maxillaris foetus vaccini 3 ij. pendebat, thymus ejusdem 3 14. Maxillaris vituli bimestris 3 j. thymus ejusdem 3 1 x. Maxillaris bovis 3 ix s. thymus ejusdem 3 iiij. Maxillaris foetus ovini 3 j. thymus ejusdem 3 j. s. Maxillaris

laris agni semestris 3 ij. thymus ejusdem 3 j. β. maxillaris ovis 3 v. thymus ejusdem fere 3 vj. ponderabat.

Ufus harum glandularum scriptores hætenus latuit, ut & ipsæ glandulæ. Utunque certum videtur, esse partes excretorias, munereque publico fungi. Etenim ubicunque vas excretorium peculiare reperitur, non putandum est, frustra; conditum fuisse sed speciali cuidam excretioni destinari. Cumque excretio quælibet determinati excrementi, humorum residuorum depurationi inserviat, quod in emolumentum totius cedit: sequitur hoc ipsum esse officii publici.

Restat autem adhuc inquiramus, quem peculiarem humorem hæc glandula secernat & excernat, unde eundem excipiat, & quis sit ejusdem post excretionem usus.

Certissimum est, humorem hunc *salivam* esse; at per salivam non intelligo crassum illum viscidumque humorem, qui è tonsillis screatu aut tussi (sputum dicimus) exprimitur: sed illum tenuem & aquosum, quem Græci *σίαλον* & *σίελον* vocant; de quo sic Gorræus, *σίαλον* saliva videtur esse similis, medio-criter fluida & aquosa, est enim ei naturalis aquæ qualitas, quæ *ἁπλοῦς* est. Hujusmodi verò humorem ex hac glandula per suum vas in os exspui oculari experientia testari possumus. Enimvero in partis hujus canali, tam in homine quam in bove, humorem salivalem manifestè deprehendimus, neque quicquam præterea inerat. Quare cum vas hoc adhuc nomine careat, licebit appellare Canalem sive Ductum Salivalem; siquidem tenuem illum humorem, quem propriè *salivam* dicimus, quique ad masticationem necessarius est, sub anteriore interioreque linguæ parte in os effundit.

Proximo loco inquirendum est, è quibusnam partibus & per quas vias hic humor in glandulas salivales derivetur. Credibile est, è nervoso genere profundi. siquidem corpora tum humidiora, tum sicciora (modò hypochondriaca) salivam copiosius exspuunt: illa, quod eorum nervi quoque superflua humiditate madescant; hæc, per consensum nauseantis ventriculi. Etenim nervus sexti paris, cujus magna pars in ventriculum disseminatur, origine haud longè distat à nervis ad has glandulas delatis: unde nervi maxillares faciliè per consensum cum inordinato motu ejusdem sexti paris, excitantur ad consimilem motum moliendum; & copiosas humiditates in maxillares glandulas exprimunt. Idem quoque consensus ex eo promovetur, quod interior ventriculi tunica continuetur illi, quæ faucium & palati cavitatem occupat: hinc irritato guttore irritatur quoque ventriculus; & vice versa irritato ventriculo, fibræ tunicæ oris una vellicantur; ut cernere est in vomiturientibus quibus copiosa saliva ex ore profluit. Etenim membrana illa inter linguam & maxillam glandulæ maxillari accumbit, adeoque mota, ex solo suo contactu excretionem ejusdem promovet. Cujus rei testimonium ulterius exhibent masticatoria omnia medicamenta, item acria quævis & pungentia in ore retenta; salivam quippe copiose prolucunt.

Porro in magnis salivationibus quales Mercurii opera cientur, nervi multum exsiccantur & à superflua humiditate liberantur. Quod vix contingeret, si nervi ad ptialissimum nihil planè conferrent. Præterea haud facile dictum est, in quem

aliū ufum tanta nervorum copia in has glandulas deferatur. Certe motui nihil plane conducunt, nec multum fenfui, quoniam ab objectis fenfibilibus longe abfunt. Quare aliquid vel apportant vel auferunt. Afferre autem, non auferre aliquid, ex eo conftat quod hæ glandulæ fint excretoriæ. Denique, major eft quantitas materiæ falivalis per has glandulas excretæ, quam facile credas ab exiguīs illis arteriis & venas quæ ad has partes diftribuantur, adferri poffe. Non negamus tamen, quin forte arteriæ quoque aliquid ad hanc humoris illius accumulationem conferant.

Tertio loco, refat refpiciendum quia fic ufus falivæ in os excretæ occafionem huius difquifitionis miniftrat, quod faliva excrementum quoddam videatur, & in os partem nobilem per quam alimenta omnia ingeramus, præter rationem excernetur, nifi infignis aliquis hic foret ejuſdem ufus. Dicimus igitur falivam non eſſe excrementum omnino inutile, nec indignam eſſe, quæ in os ipſum deponatur. Etenim primo quaſi lymphæ peculiaris ad maſticationem ſolidiorum & præſertim aridorum ciborum idonea expetitur. Abſque eo enim, animalia quæ fœno, avenâ, aliifve ficcis alimentis veſcuntur, vix commodè ea maſticare poſſent aut deglutire. Secundò, requiritur idem humor ad guſtum, quod è ficcis, tinctura ſapida ſine aliqua humiditatis perfuſione vix educi queat. Tertio, idem conducit ad coctionem ventriculi promovendam, quippe fermenti cujuſdam vicem in ventriculo ſubit. Ultimo, ſitim alias perpetuo moleſturam exſtinguit, linguæ motum lubricat, ardorem oris, ſqualoremque ſua humiditate temperat.

Egregiè etiam de hæc Materiâ, Salivâ nempe ejuſque Materiâ, nec non viis, per quas materia ea adferatur Glandulis Salivalibus hinc ex iſdem excernatur, in Obſervationibus Anatomicis de Glandulis oris, &c. paginâ maximè 28. & ſeq. agit Doctiſſimus Nicolaus Steno, quæ videri poſſunt.



Fig. II




Fig. IV




Fig. I.





Fig. III.



EXPLICATIO FIGURARUM TABULÆ XIII.

FIG. I.

Ex Highmor. pag. 141. Tab. XIII.

Dextri cordis Ventriculi interiora, una cum pulmonibus, vasisque.

- A. Aspera arteria pars pulmonibus affixa.
 B. Truncus vena cava descendens à jugularibus & axillaribus.
 C. Arteria magna.
 D. Truncus ejus ascendens.
 E. E. Truncus descendens.
 F. Arteria pulmonaria, seu vena arteriosa dicta.
 G. G. Interna dextri Ventriculi cordis superficies fibrosa.
 H. Cordis apex.
 I. I. I. Papilla quadam musculoſa, quibus fibrae
 K. K. K. Annectuntur.
 L. Orificium vena cava descendens.
 M. Orificium ejus ascendens.
 N. Auricula dextra.
 O. Orificium arteria pulmonaria.
 t t t. Valvula ejus semilunares.
 f. Unio arteria hujus cum arteria magna.
 P. P. Interna superficies partis exterioris Ventriculi dextri eversa, ut interna ejus facies melius perspicitur.
 Q. Interna auricula dextrae superficies.
 R. R. R. Fibrae valvulas tricuspidales papillis musculosis annectentes.
 S. Oesophagi pars in proprio situ.
 T. Vena cava ascendens.
 V V V V. Lobi pulmonum flacciscentes.

FIG. II.

Ex Highmor. pag. 141. Tabula XIV.

In hac figura sinistri cordis Ventriculi interiora depinguntur, una cum pulmonum lobis flaccidis, vasisque hisce famulantibus in propriis locis.

- A. Arteria aspera.
 B. Arteria magna truncus ascendens.
 C. Arteria pulmonaria, seu vena arterialis à dextro cordis Ventriculo in pulmonis lobos transiens.

- D. Vena pulmonaria, seu arteria venosa à pulmonibus in sinistrum cordis sinum inhians.
 E. E. E. Crassities carnis Ventriculum hunc concludentis.
 F. F. E. Interna hujus Ventriculi superficies aspera.
 G. G. Caruncula papillares.
 H. H. Valvula tricuspidales.
 I. Larynx.
 K. Interna sinistra auriculae superficies aspera.
 L. Locum ubi aorta sub Valvula
 H. Se exierit, denotat.
 M. M. Asperitates & caruncula minores in Ventriculo sinistro.
 N. N. N. Fibrae Valvulas carunculis adnectentes.
 O. Auricula sinistra.
 P. P. Arteria truncus descendens.
 Q. Q. Nervi recurrentes.
 R. R. R. R. Pulmonum Lobi expansi.
 S. Divisio aorta in subclavios.
 T. T. Carotides.
 V. Vena cava descendens.

FIG. III. & IV.

Ex Warthoni Adenographia.

Glandula maxillaris exhibetur cum Ductu Salivali Inferiori.

- A. Posterior pars ejusdem.
 a. a. a. Radices posteriores Ductus salivaris.
 B. Anterior pars glandulae.
 b. b. Radices anteriores Ductus ejusdem.
 C. Truncus posterior ductus ejusdem tendinem musculi biventris conscendens.
 D. Reditus ejus & unio cum ductu anteriore.
 E. Truncus communis Ductus salivaris.
 F. G. Musculus Biventer.
 H. Processus trunci dicti versus dentes anteriores maxilla inferioris.
 I. Aperio ductus salivaris sub apice lingua prope dentes incisores maxilla dicta.
 K. Glandula rotunda maxillari assidens.
 L. Series asperitatum sub lingua latere.
 M. Lingua extra sedem propulsa, ut vasis exitus cernatur.
 N. Tonsilla.
 O. Auriculae foramen.

P A R S XIV.

De Ductu Salivali superiori.

QUæ de Ductu Salivali inferiori protulit Warthonus, suo etiam modo obtinent in eo qui paucos ante annos ad Maxillam superiorem à me inventus fuit, à glandulâ maxillari posteriori, (parotis conglomerata D. Stenoni vocatur) parotidi veræ (conglobata eidem parotis dicitur) vicinâ, variis radicibus initium fumens, hinc simplex ferè, quandoque divisus, sub cute ad buccas properans ad dentium molarium anteriorum regionem, ubi manifesto foramine, papillari quadam prominentia in animalibus maximè munito, in oris cavitatem hiat. Prout in vitulino capite exhibeantur figura addita proponit.

P A R S XV.

De Glandulis, Ductibusque variis aliis, Os spectantibus,
Salivæ vel muco dicatis.

Ex Observationibus Anatomicis Nicolai Stenonis.

I. BUCCARUM.

INter glandulas quæ pluribus excretoriis vasis donatæ sunt, primo loco veniunt, quæ in buccis reperiuntur, ut inter cæteras tum glandulæ, tum vasorum magnitudine maximè conspicuæ. Hæ autem totam buccarum regionem occupantes exteriorem oris cavitatem undique ambiunt, & sursum deorsumque ad gingivas pertingentes, musculos inter & tunicam oris feruntur. Inferiore sui parte crassiores sunt, hinc tenuiores redditæ venis, arteriisque & nervis tum in hanc, tum in anteriora transmissis liberam per exteriorem superficiem viam concedunt. Poterat vasorum mox describendorum ratione dividi in partem inferiorem, quæ crassitie & soliditate reliquis prior, mediam, quæ tenuissima, & superiorem, quæ medio modo se habet. colore cum parotide in bubulo conveniebat.

Præter dicta vasa peculiare in illis ductus 21. Maii observavi, cum crassiorem ejus partem transversam paulò obliquius diffecarem. Hanc enim conglomeratam videns etiam, conglomeratarum exemplo, sui generis vase donatam putabam, quod non fefellit. Vix enim divisa erat, cum per resectum eodem ictu vasculum immissus stylus in cavitatem oris liberè penetraret, hinc totum buccarum corpus ab inferiori maxilla prope gingivas resecando, & extendendo aliquantulum membranam, video plures in eadem recta linea exiguos hiatus, per quos immissus stylus in ipsam glandulam facili negotiò viam invenit. Oriuntur autem ductus, proceduntque non unò modò. Intra crassiorem, quæ inferior est, glandulæ partem quidam ex plusculis radicibus in singulares truncos concurrentibus

tibus orti, cum in via sunt capaciores, ubi ad membranam interiorem ascenderint, ferè ad gingivarum inferiorum altitudinem foraminibus illam pertundunt quadruplò, quam ipse ductus est, angustioribus, in eadem linea secundum totam maxillæ inferioris longitudinem dispositis: infra quæ ad aliquod intervallum exiguæ semiglobosæ protuberantiæ apparent, nullæ acutæ: quæ aliàs ad digiti supra prædicta foramina altitudinem copiosæ conspiciuntur. in media quoque parte excretoria vasa copiosa adsunt, sed admodum brevia, vixque, nisi per expressum humorem, conspicienda, dum quæ à superiore descendunt, paulo sint manifestiora.

In homine buccarum glandulas salivæ dicatas superiori anno observavit Clarissim. Sylvius, licet vasa nondum essent detecta. Cum enim haberet ægram buccarum ulceribus laborantem, & interdum limpidam inde aquam salivæ æmulam manare videret, data in Nosocomio occasione buccas examinando glandulosam illarum carnem nobis demonstravit. Sed &, quæ apud Aquapendentem leguntur de humore aqueo per relictum à curato buccarum vulnere foramen quotidie stillante idem arguere videntur.

Hæc in Observ. Anat. de Glandulis oris, &c. habet, quibus adde quæ de iisdem, Glandulisque unde proveniunt in Observ. Specimine de Musculis & Glandulis, proponit.

Buccarum inquit Vascula numero parvitatem compensantia; quorum glandulæ ut in homine egregiè labiorum stipantes ambitum totidem uvas referunt, vasorum ad illas nervorumque distributione figuræ gratiam augente; sic in brutis totum buccarum replent planum. In hisce, brutis scilicet, quædam in unum congestæ corpus, & inferiori maxillæ secundum longitudinem incumbentes, mediæ magnitudinis vasa emittunt, quorum ostia in eadem rectâ sita, vix nisi expressio humore se produnt, etiamsi semel detecta setarum non usque adeo subtilium sint capacia; ea illis in locis superficiei est æqualitas & planities: in ovibus tamen quibusdam fuscus interdum ostia prodit color: aliæ magis à se mutuo dispersæ partim buccarum tunicæ accumbunt planæ, partim in asperas, & acuminatas illam elevant papillas.

II. SUBLINGUALES.

Sublinguales quod attinet utrinque ad linguæ latera sitæ, ejusdem generis cum proximè præcedentibus sunt, nisi quod vasa excretoria obtinuerint, non quidem breviora, sed angustiora. Oriuntur intra ipsam exilibus rivulis, & hinc sibi invicem parallela, à lingua versus gingivas recedunt, ubi ad digiti ferè à dentibus distantiam vix conspicuis, nisi premantur, ostiis per tunicam hiant. Nullæ ostiis, nisi ad aliquod intervallum, protuberantiæ adsunt, sed, ut in buccæ vasis dictum, ubicunque vascula prædicta tunicam penetrant, ibi æqualis est, & plana. An in papillis etiam sinuli adsint, non licuit observare. compressi aliquot, sed nihil expressi; hinc resectas examinando, vidi glandulosam frustula esse, quæ reliquas supereminentia tunicam ibi loci in acumen elevant.

In avium quarundam linguis rara horum occurrit elegantia, ubi in ipsis linguæ late-

lateribus propè basin secundum eandem rectam disposita decem duodecimvè ostia, si comprimatur lingua, serosi humoris totidem protrudunt gemmas. In cygno eadem stylum admittebant facilè, & pro linguæ magnitudine satis profundè, quemadmodum & in anate: fuere forte etiam in illis prædictis plura vasa, sed horum pulcherrimo aspectu abreptus ad alia non attendi. In Gallo Africano vidi non modò hanc ostiorum rectam seriem, sed etiam totam tunicam, tum basin linguæ inter & ostium laryngis, tum in ipsis linguæ lateribus, tum sub linguam & glandularum abscondere corpora, & vasorum ostium pertusam: reliquorum animalium linguæ accumbunt tantum laxè & glandulæ, & vasa, ne quidem in boum genere setam facile recipientia, licet vasorum parallelo à glandulis ad ostia ductu incedentium elegantiam contenti exornet splendor, & ipsa expressus liquor detegat ostia.

III. PALATINI.

AD Palatum quæ sunt Glandulæ, eas Palatinas appellare visum mihi, cum vera tota palati caro ut in brutis, sic & in homine nil nisi conglomerata glandula sit tonsillis continuata; unde innumeri exiles ductus prodeunt, qui ipsam membranam perforantes, quasi cribrum indè formant. Notavi illos primum 27. Maii, cùm bubulum caput jam totum ferè dissecuisssem, tunc enim, cùm tonsillas excinderem, vicina premendo tenacem indè humorem excerni videbam. Hinc totum, quod cælum oris constituit, exsectum, digitisque compressum innumeras glutinosi humoris guttulas per tenella foramina erumpentes exhibuit. Qui à pituita palati, quam tertiam sputi speciem Clar. Warthonus *Adenogr. cap. 22.* constituit, planè diversus est; quod ex ipsius explicatione manifestum: dum è naribus supra palatum illam exsugi statuatur, & cerebri pituitam appellet: quod huic minime competit.

Quæ palati superioris tota tunica innumeris pertusa foraminibus à glandularum glomeraminibus orta recipit vasa: quæ quo retrorsum magis perrexeris, eò magis conspicua. Si avium rostra distraxeris, & ibi liquoris in palato superiori notabis fontes. Omne enim illud, quod albam tunicam rostro proximam excipit, rimamque cingit undique carneo colore conspicuum, si presseris, glandularum ostia prodet: præ cæteris notanda in ipso hujus substantiæ anteriori extremo duo puncta, per quæ magna humoris albicantis exprimitur copia, quæque vel in Gallina domestica stylum admittunt non tantum in superficie.

IV. EPIGLOTTIDIS CARTILAGINIS.

Epiglottidis cartilagine permeantes canaliculi; qui à carunculis epiglottidi incumbentibus orti, per cartilagine transmissum humorem averfa ejus parte, quæ laryngi imminet, evacuant.

EXPLICATIO FIGURARUM

TABULÆ XIV.

Ex Observat. Anatom. Nicol. Stenonis.

FIG. I.

- a. Parotis conglomerata.
- b. Parotis conglobata.
- c. Lymphaticum ex conglobata deorsum tendens.
- d. Radices ductus salivaris exterioris.
- e. Truncus ductus salivaris.
- f. Vena jugularis rami exteriores.
- g. Nervi qui ut intra glandulam & caput, sic & extra illum locum ut, in h. sibi innectuntur.
- i. Nervi funiculi ductum salivarem comitantes.

FIG. II.

- a. Ostia vasorum à glandula buccarum inferiori prodeuntium, quorum nonnullis seta immissa est.
- b. Apertio ductus salivaris exterioris in papillarum summâ & postremâ occurrens. Reliqua

puncta innuunt cetera foramina, per quæ compressione viscidus humor exit.

FIG. III.

- a. Glandula sublingualis.
- b. Vasa ejus.
- c. Vasorum excretoriorum oscula.
- d. Sinus ad latus lingua observatus.

FIG. IV.

- a. Foramina palati per quæ lentus humor exprimitur.
- b. Tonsillæ.

FIG. V.

Vasculum unum ex illis quæ è glandula buccarum inferiore parte prodeunt.

NOTA.

Quæ D. Stenoni Parotis dicitur Conglomerata (ut suprà indicatum) mihi Glandula vocatur Maxillaris, quæ parotis Conglobata, mihi est Parotis vera, ut fufius habetur in Tractatu à Cl. D. Nicolao ab Hoboken, Professore Steinfurtenfi, edito, cui Titulus Novus Ductus Salivatis Blasianus.

Fig. 1




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 5



Ex libro III. de Catharris Schneideri.

Membranæ pituitariæ oris.

Quam facilè narium & aurium vasa sanguinem reddere queant, aut eum sensim rorare, ad rem hanc pertinet scire. Hoc ipsum certe est pars propositi. Minimè igitur hic in devium exiisse possumus videri. Primum sciri volo, sanguinem cursim profluere, adaperto vasorum nasi osculo. Eruditi vocant *ἀναστροφήν*. Dein eadem vasa sanguinem sensim & in modum sudoris emittunt. Si vino fervet corpus & vehementius excercetur, manè illud mucigenus excreatur, adducto spiritu. Ac quoniam est nasi interioris membranæ duplicitas interveniente ossè, cui nomen est *Vomer*, sæpè evenit, ut ex alterâ nare mucus, ex altera cruor protrahatur, utque, si hic ad os, tracto spiritu, revocetur, is muco confusus efferatur. Tandem eadem membrana syncero muco naturaliter manat. Sed hic paucus est. Sæpè is vitio valetudinis propensius coit, & pendet rotunditate guttæ, quam mox alia consequitur, ut talis humor tandem stillet. Quid verò muneris *ventriculi Cerebri priores*, *Infundibulum* & *Glandula Pituitaria* habeant alio loco hic æstimabitur. Sæpè quidem phlegma aliunde trahitur. Nam cibalis fistula ex stomacho pertingit in os. Per illum verò cunctum corpus exinaniri potest. Est quidem talis humor sæpè lentus & huic muco sat assimilis. *Lucret. lib. 6.*

*Cetera jam quàm multa licet reperire! Quid ergo?
Nec tibi tam longis opus est ambagibus unquam:
Nec me tam multam hinc operam consumere par est:
Sed breviter paucis restat comprehendere multa.*

Hæc membrana, quâ meatus spirandi circumsecus convescit, multum noctu & interdum sudat. Nec ex conjecturis in hoc opus Naturæ ducimur. Illud ipsum tuis oculis subjicitur, tuisque manibus tangitur. Si namque eam contrectas, ea tuos digitos confestim madefacit. Si illum lentorem, qui filatim trahitur, detergis, mox alius & priori similis elabatur, se in oculos tuos ingerens, ita tamen, ut exitus tam manifestè non appareat. Proinde eam membranam contra priores affirmavimus, illo sudoris genere jugiter manare. Quemadmodum ille fluvius, qui *Africam* ab *Æthiopiâ* discescit, cognominatur *Astapus*, quod illarum gentium linguâ significat aquam è tenebris profluentem, & alius quoque *Astusapes*, quod latentis significationem adjicit, sic & hic latex venit ex abdito. Ac veluti solum inter *Tigrim* & *Euphratem* propter venas aquarum prodente *Q. Curtio* semper refudat, ita hoc involucri obtinet vicem terræ, vasa sanguinis ab *Aortâ* & *Cavâ Venâ* ad illud pertingentia, sunt *vena subterranea*, Massâ Sanguinea est *Oceanus* seu *Amnis*. Sæpè terra, inquit *Seneca Nat. Quæst.* si facilis est, in tabem ipsa resolvitur, & humescit. Idem evenit sub terrâ, quod in nubibus, ut spissetur, graviorque, quàm ut manere in terrâ possit, gignat humorem. Sæpè colligitur roris modo tenuis & dispersus liquor, qui ex multis in unum locis confluit.

Sudorem

Sudorem aquæ legēs vocant, quia guttæ quædam vel pressurâ loci eliduntur vel æstu evocantur. *Si hæc quoque membrana* manu premitur, plus illius liquoris de eâ emergit.

Nec contrâ pugnant, in promptu cognita quæ sunt,

Sed magis ipsa manu ducunt & credere cogunt.

Si ille succus quoque detergendo molliter cogitur, ad mucî spontè exeuntis similitudinem magis magisque effingitur, quippe qui illâ ratione pinguior fit, lentiorque, ac absoluteiore rotunditate cernitur.

Hoc integumentum quàm optimè potes oculis, manibusque contrectare, si invertas caput, maxillam inferiorem amovendo, & mox perfringasque avellas quartum *os maxilla superioris*. Quo factò, nares incidas utrinque ac diducas. Extrema hæc membrana est fungosa, sublivida, ac extrâ intusque venosa, ut facîle credas, esse hîc officinam cujusdam humoris digerendi. Quà *os Vomer* cognominatum ad gulam & Laryngem spectat, illa tunica nonnihil defluit. Quam hîc signant *num. I. & II.* Cæterùm cuncta hæc membrana ab *Infundibulo* & à *glandulâ*, quam falsò vocas *pituitariam*, haud propè abest. Quocircà illum mucum tam frequentem Cerebro emergere atque priorum ad hanc tunicam usque pergere, compertâ nunc hujus loci conditione, & puerilium & senilium deliramentorum erit. Ac viâ à foraminibus ossis in *Cribri* speciem similis ad hunc animæ canalem non patent, ut humor desuper deciduus, hanc tunicam ex æquo rigare possit. Quare illa veterum scita, nunc peritis rei anatomicae, cùm vana tùm delira videntur.

Cùm inanitas illa sit divisa intercedente osse, quod *vomer* dicitur, pituita vergit vel in nares vel in fauces. Ac illa quoque modò huc, modò illuc spiritu impelli potest. Tenuior non ægrè decedit, hujus verò spissioris guttæ parvis orbibus globatæ se figunt, ut sæpè vomitus illo nisu, quem excreationem vocas, concitetur. Perliquidus humor plerunque & copiosior est & acrior; nonnunquam tamen utraque parte moderatior. Utque talis sine fraude & offensione tunicarum derivatur, ita idem cursus spontè substituisse consuevit. Acriorem verò sequitur inflammatio, hanc ulcus, ut suprà comprehensum est.

Hæc denique membrana materiæ *Coryzæ* sufficere posse videtur. Ea namque est sat ampla & lata, cùm illud spiritûs iter sit oblongum, spatiosumque, ac quoque geminum. Hoc si pituita desuper præcludit, spiratio est impedita, sonantior, ac vocalis spiritus etiam efficitur vitiosus. Sæpius quoque, *Coryzâ* superveniente, hæc tunica quâdam inflammatione inter initia afficitur, hinc illæ narium æstuantium verminationes, hinc illæ prurigines, hinc istæ emunctiones, quæ non sunt sine sensu doloris, sine cruore, sine sternutatione. Nam Vapor, quo turget sanguis huc affluens, prætentat hanc viam & aperit oscula vasorum. Quo fit, ut tunicâ narium tam molliter vellicatâ frequens sæpè sternutamentum provocetur. Ac ille dolor non circa regionem *processuum Mammillarum*, sed in interioribus naribus ac in ipso animæ canali esse consuevit. Hujus membranæ vasa quoque sunt turgidula, de quibus quasi jam exiit sanguis; tam crassus est, tam pendulus. Unde mucus occultè eliquatur, coit interdum & cadit. Dissectis

gravedinosorum hominum capitibus, illa vasa erant distentiora, & confusa gelato illo sanguine magis exuberante, in quo candens pituita latebat, ut ea oculis signari posset. Cerebri *ventriculi, pelvis, glandula, & processus usamillaris* erant sine spurcitie. Massa Sanguinea est fons pituitæ, unde sæpè tanta vis ejus defluit, quanta Cerebro contineri aut in illud sine pernitie immitti non potest. Hic locus est ejus conceptaculum & primus rivulus. Restant enim plures scaturigines. Hunc fontem propere confectatus, omnibus demonstro. Hoc, hoc, inquam, loco, minimè in Cerebro tanta portio pituitæ à sanguine secernitur. *Hoc nostrum dogma, hæc sententia est. Quanta itaque voce possum, testificor, proclamo, denuntio.*

Eò igitur nunc imus, quò acies mentis & oculorum trahit, quò ipsius mucii vestigia ducunt. Quidni ergò, quem usum *glandula* detraximus, eum *huic membrana* ex parte attribuerim? Quidni eandem nunc appellaverim *Pituitariam*? Ex fine unaquæque res sibi doctore *Aristotele* nomen asserat. Cumque membrum ceu *Nilus* teste *Eusebio* pro diversitate regionum diversa capiat nomina, hanc tunicam prædicabo *Pituitariam Anteriorem*. Ad hæc cognomina lubens descendo demonstrandæ rei causa, & pervulgatè loqui malui. Res est nova, nomen autem vetus & calcatum usurpetur. Quodque tam scitum tamque aptum per se haud est, est tamen receptum, usitatum, & jam dudum quasi civitate donatum.

Hoc loco alius *rivulus pituitæ* juxtà fluit, quæ priori non adeò dissimilis, excreando expuitur. Ejus portio cibo immiscetur ac deglutitur. Naturalis est modica, si præternaturaliter fertur, morbus est; ut novissimè ostendemus. Illa membrana, quæ *additamentum ossis Occipitis* in ultimo palato involvit, illa, inquam, pituitam condit, continet & emittit. Ante omnia monstrabo illius Ossis regionem & membranam: Numeri III. & IV. & V. & VI. ob oculos ponunt illam cavitatem, quam biforem facit os *Vomer* dictum. Hæc aër commeat reciproca vicissitudine. Suprà dixi, *Os quartum maxillæ superioris* esse sublatum, ut membrana os *Vomer* dictum vestiens, in conspectum veniret. Inspicias hîc velim apud *Spigelium* figuram secundam Cranii in Tab. V.L. II. Ubi is geminâ *Lit: G.* eadem foramina in narium amplitudinem dehiscencia, *Litera I. septi narium* seu *Vomeris* inferiorem partem, & *Lit: X.* additamentum *Ossis Occipitii* designat. Illa portio ossis occipitii in figurâ apud *Spigelium* est nuda: nam ab hoc autore *Sceletus* describitur. Ego autem hîc demonstro additamentum *ossis Occipitii*, quod adhuc membranâ suâ integitur. Hanc membranam *Num: VII. & VIII. & IX. & X.* noto.

Huic membranæ hæc sedes est: Oritur illa ab extremo illo aëris meatu, quem *Os Vomer* dictum dividit, aut, ut dilucidius dicam, ubi in inverso capite, cui maxilla inferior demta est, processus *pterygoides* utrinque ac in medio os *Vomer* dictum desinunt, ibi incipit hæc membrana & propè usque ad foramen magnum *Ossis Occipitis* fertur. Ea itaque, ut modò jeci, *additamentum ossis Occipitis* operit. Si homo, quanto maximo nisu potest, ad fornicem oris subrigit linguam, & ejus apice pertractat palatum, ea ad hanc usque membranam minimè porrigi potest, quippe quæ sublimiore loco posita est. Sume in manus caput modò obtruncatum, ac inverte, & ablata inferiore maxillâ, hanc membranam considera. Ac
inver-

invertas caput ita, ut facies superiora intueatur, utque os Occipitis respiciat ad pectus tuum. Tùm hæc membrana facilè notabitur. Quod enim spatii inter *Os vomer dictum* & magnum foramen *Offis Occipitis* extat, illâ involvitur membrana, de quâ nos primi loquimur. Primum articulum pollicis *inter os Vomer dictum* & inter magnum *Offis Occipitis* foramen potes conjicere. Hac ratione circumscribitur membrana, quæ quoque illum digiti articulum longa est & lata. Quare superiores *numeri VII. VIII. IX. & X.* etiam hanc sedem assignarunt. Verùm illius membranæ descensio ad gulam hæc icunculâ repræsentari non potuit.

Facilè se dat in conspectum: Colore enim est exalbida, vicinæ membranæ sunt sanguinæ, hoc est, subfuscæ. Præterea est plenior, & quasi præpinguis. Hæc semper uda est & muco quodam glutinoso sudat. Si illa in inverso capite acu compungitur, & illud mox in mensâ asservatur, ut eam attingant dentes; pituita per illa foramina se penetrat, exit, hæret pendula, tandem interposito tempore exstillat & in mensam delabitur. Minister ejus quam plurimum hac ratione elicit: hic manè & à meridie eam aciculis ex intervallo leviter fauciari & tandem caput inclinari jubebat, ut humor intus collectus, denuò defluere posset. In hac membranâ tam multa vasa discurrentia non notantur, in viciniâ autem sunt venosæ raritates. Quare nunc cuius exploratum erit, vasa sanguinis hîc definentia, illius mucî materiam subministrare, quæ tandem hæc membranâ concipitur, digeritur, ac in modum sudoris subindè emittitur. Confinia certè harum partium in hunc usum formata sunt.

Hæc membrana non valdè abdita est; sed latet in aperto; & ita latuit usque ad hunc diem. Tempus est, ei nomen indere. Eam vocamus *pituitariam posteriorem*, glandulæ quidem, quæ in ossè Cuneiformi latitat, tale est vocabulum, quod recentiores duce *Galeno* putârint, illâc decurrere pituitam. Verùm cum illa glandula tali officio non fungatur, sed hæc potiùs membrana, hoc certe illa cognomentum merebitur.

Non omittendum est, cum de *humana pituita* egestionē hîc disserimus, hanc membranam nec *reliquo animalium generi* esse negatam: Cujus monstratus perquam facilis est. Administer Anatomix riçtu *vituli* distento, linguam amolitur, inferiorem maxillam penitus auferendo. Si quis igitur, ita patentibus faucibus, priorem partem palati intuetur, quædam ejus asperitas, & ea gradatim discreta, se ingerit in oculos. In ulteriore autem palato occurrit illa ipsa membrana, cui idem ex sede, ex formâ, & denique ex munere nomen esse poterit. Hæc ab animæ canali est candore carnosio, circâ mollior pinguiorque & magis suffarcinata, circumsecus verò per pluribus sanguinis vasculis suffusa & in illo ambitu sublivida & gracilior, cætera albidior, pleniorque. Hæc nunquam reglutinoso humore non uncta, si spongiâ admotâ ficcatur, simili humore confestim & spontè exuberat. Isq; cæcâ semper & occultâ provenit origine in modum sudoris. *Lucret.*

Ne quâ fortè tamen captes diffidere dictis,

Hæc membrana sex *Lit: y* notatur. In hæc mediâ si digitus figitur pressius, illius mucî guttulæ per secretum pervadunt, jam oculis orientes. Sunt per parvulæ, candidulæ in perlarum speciem, & circumstant in orbem. Hæc *corona* aspectu tam

tam manifesta, plus hîc ministrat lucis, quàm *Ariadnaa*, per quam ex perlis & gemmis factam *Theseus* existimatur de tenebris Labyrinthi ad lucem venisse. *Hâc membranâ* hic occultus latex continetur, ut etiam clementiori vi eliciatur. Sique illæ guttulæ ex illis locis in unum confluunt spontè aut coguntur, syncerus mucus illâ conglobatione fingitur, qui etiam tactu prætenuia fila mittit. Incisa simile quid pingui ostendit, unde etiam ejusmodi mucus filatim distrahitur.

Fauces animalium maximè ruminantium sunt indigæ humoris, quo pabula in ore extenuantur, extenuata globantur, globata devorantur. Aput *Senecam* etiam *Possidonius* sat intelligit, humidum oris maximè requiri, *Receptas*, inquit, in os fruges, concurrens inter se duritia dentium frangit, & quicquid excidit, adeosdem dentes lingua refertur. Tunc verò saliva miscetur, ut facilius per fauces lubricas transeat. Verùm Naturæ maximè & hujus utilitatis provida, portionem illius humoris circumciscâ & hinc supernè etiam in summa faucium inferri voluit.

Nec hîc requiritur *anterior pituitaria membrana*: Nam illa os *Vomer* dictum, convestiens, etiam confudascit, & lentescente illo humore stillat, ut is interdum ore naribusque boum propendeat. Hæc tandem, quæ ejus continuitas est usque ad gulam, in arctum coit, simpliciter cancellata, ejus incisuris crebrioribus in rectam longitudinem jacentibus nec aliis transversis intercurrentibus. Hæc inibi hunc laticem largiùs fundit, nam ea si explicatur, ille mucus hîc insidet. Hanc membranam *L. Z.* demonstrat.

Et aves animalium siccissimæ minimè deficiuntur eo palati humore; cujus fons quoque hîc est geminus. *Alter* in palati tunicâ latenter emicat, *alter* animæ in canali, qui etiam est divisus, interjectâ ossæ laminâ, quæ ad similitudinem ossis *vomer* dicti efficta est. Hujus cooperimentum est valdè quàm roscidum. Utrunque *tubulata vesica* adjacent, quarum membrana admodum tenuis & ob vaforum multitudinem rubicundior, etiam ferè simili muco succida reperitur. Nam exilia illa sanguinis conceptacula sunt subter illam pelliculam mirificè fusa, per quam ille humor indefinenter, sensim & occultate prorumpit. Hic paulatim conducitur in rostri superioris foramen, cui in ore contra situm est foramen *Laryngis*. Ille mucus diducto rostro avis grandioris, ut *anseris*, est visu facilis, & è vestigio se vel cæcis notum facit. Multus namque dependet à summo usque ad imum oris. Hoc nunquam invenietur secus. Cuius palam est.

Ante oculos rem res ipsa finire videtur.

Præstò fuit semper administer dissectionis. Hic, inspectantibus nonnullis studiosis rei Medicæ, vim illius mucii omni ex parte considerandam præbuit, quæ, cum tanta esset, ipsis vitio hîc constituisse videbatur. Quamobrem ille in unius è grege arrepti *anseris* fauces, ita hiantes ore, oculos inferri jubebat; quæ limi copia ibi æquè notabilis erat. Mox capite abscisso, superioris rostri foramen illius operâ liquidò pervidebatur; Ante quod quæ scrobs acta in profundum extat, est quasi confluentiæ locus, nusquam alibi conspectiore multitudine illius mucii. Hoc patulo in præceps meatu ille devolvitur, propendet jam & imminet adversus *Laryngis* foramini. Interdum quoque cavum oris opplet. Hujus decum-

cumbentis muci indicium faciunt *Lit. N. & S.* Major ejus copia est portione capit-
tis. Irridendus nunc aut miserandus es, qui reris, eum esse Cerebri purgamentum
& de eo stillare. Quos *nervos* meâ opinione geminum Cerebri tegumentum de
se procreat, illi eam pituitam ex se non fundent. Nec ea à *glandula pituitaria* huc
iter suum potest intendere. Nam si colligitur, quicquid hic est muci, & lance
pensatur, plus ponderis habet, quam cuncta illa *glandula pituitaria*. Si acus seu
clavulus per Cerebrum & per hanc *glandulam pituitariam* adigitur, haud venit in
hunc locum, quo confluit mucus. Hic quoque si abstergitur, mox alius per oc-
cultum rorem se iterum tunicâ palati ita exerit, ut sub oculos acriter intuentis
veniat. Tam non inobservabilis est exitus, *Quin nihil unquam invenies hoc
certo certius.*

Nec locus ingenio est, oculi te judice vincunt.

Ac si minister guttulas muci (loquor hic de altero fonte) pressura elidet, illa etiam
quaquaversum apparent. Nunquam ad illam dubitationem adduceri, an ille hu-
mor desuper cadat, & se in hanc tunicam diffundat. Illa rorifera membrana & hæc
glandula nec propinquitate, nec natura, nec ulla alia ratione sunt sociatæ. Hæc tu-
nica est lata, prædensata & imbricatæ asperitatis, ac intus pinguior. Quid? Ea levi-
ter insecta, eundem humorem ostendit. Hoc nunquam secus reperitur, cum nihil
hic inexpertum affirmetur. Ipse sectioni interfui sæpius. Quare possum in his ob-
stringere fidem & testificari. Quid proderit plures testes citare? Ac si, ut cum *Plan-
to* loquar, testicularis. Testes eam in rem præsto tibi erunt omnes, qui rem aggre-
diuntur. Hi fidem dabunt sponte & veritati reddent testimonium.

Ac ne, quod hic quæri possit, reliqui quicquam sit; in superiore scrobiculo &
in hac membrana muci quod est, aliquam certè ad rem usui erit. Arida frumen-
ta, hoc succo se admiscente, facilius transeunt. Quare si ille in nimia aviditate
conficitur aves ingesta majore nisu & rigidiore cervice deglutiunt. Hæc, quando
à fabricâ corporis humani digredior, expono, quam brevissime possum.

Tandem ille minister aliquantò audacior factus, aliquid simile hujus sudatricis
tunicæ quoque in *piscium* extremo palato, illi circumstanti in orbem multitudini
juvenum demonstrare aggrediebatur. Primum hic foramina sensus *Odoratus* in
capitibus *piscium*, *Cyprini* & *Lupi*, sub aspectu omnium omni ex parte subjecit,
quæ *Aristotelem* haud quaquam fefellerunt. Nam ejus interpretes, aut si vis, comes,
C. Plinius, non alii *animalium*, inquit, *nares eminent. Avibus, serpentibus, piscibus fora-
mina tantum ad Olfactus sine naribus.* Hæc utrinque sunt gemina, interveniente exi-
gua membrana, quæ foramen per vices obtendere potest & aperire. Forsitan eâ
re *Aristoteles* tractus tam multa de operculo narium scripta reliquit. Hæc fora-
mina *N: 9999* indicata, ferunt in illam cavernulam, quæ *N: 10, 10, 10, 10*, hic
significatur. Nervos Minister credebat à primori parte Cerebri ad eam cavitatem
pertingere. At hoc non sine cunctatione in medium proferri patiebar. Nam alios
nervos ad hoc loci infernè perquam occulto itinere tendere, admodum adoles-
cens quondam, discisso piscis *Trutta* capite, ostenderam. Nunc ad has sectiones
non descendo. Earum autem studio ducitur ille Chirurgus, cujus opera soleo uti.

Illà *piscium* & *avium* foramina, quæ ad sensum *Odoratus* dantur, paulum

oppidò inter se differunt. Nam illa hic definunt rotundà quadam cavitate conclusa, hæc verò ultrà excurrentia, pergunt tendere ad pulmones. Quapropter aves vitio aëris è medio volato, quo spiritus in illud viscus adigitur vehementius, præfocari queunt. *Spiritus letales*, inquit Plinius, *sunt alibi aut scrobibus emissi aut ipso loci situ mortiferi, alibi volucris tantum, ut Soracte vicino urbi tractu*. Iterum aliò: *Locus Aornas & pestifera avibus exhalatio*. Atq; suprà l. 2. ejusmodi experimentis agebatur.

Dein minister, ore illius *piscis* patefacto, illam summi palati membranam dabat in conspectum: est plenior, in vulgus quoque sat nota, cum gràti sit saporis. Hæc sub N: 2 2 2 2 2 2 & 6 6 6 6 6 hic magis innotescit. Pressu Chirurgus aliquantulum lenti succi elidebat, hunc priori esse similem, idemque utilitatis habere opinans. At ego iterum aliquantò cunctantius assentiebar, cum cunctum *piscis* corpus roscido humore sit oblitum.

Hæc membrana non tam ampla est, quàm *membrana pituitaria anterior*. Nam ille commeatus aëris est bipartitus & admodum laxus. Unde quidam in eum tam altè infigere clavum poterat, ut hominem esse arbitarer neminem, qui hoc viderit, quin crederet, eum in vitalia Cerebri adactum fuisse. Hujus quoque primoris membranæ sudorem statim notabis, si in nares indis digitum, qui citò quasi conspuitur. Chirurgus, sanguine ex dextrà nare cujusdam juvenis exiliente, in eam conjecerat linum Xylinum. Hoc jam exemptum supernè, concreto cruore, erat aridum, infernè à latere utroque erat plenum muci, qui obstructà illà viâ, ex Cerebro procedere non potuit. Atque Narium interiorum membranam ita mucò sudare, etiam aliis experimentis chirurgus doceret, nisi illa aliquid obscœni habere viderentur.

Hæc Palati membrana est aliquantò interior, non excurrit, & est minùs lata, sublimiorem locum fortita: ex eo & ex pituitæ decursu ipsi nomen erit. Itaque hæ membranæ erunt cognomines, at hæc, quâ de loquor, *posterior pituitaria membrana*, ut principiò dixi, appellatur. Ab hac labens pituita, ægrè ad nares revocatur, sed excreando projicitur. Plurimum ejus deglutitur, & sæpè nolentibus nobis & invitis.

EXPLICATIO FIGURARUM TABULÆ XV.

Ex Lib. III. de Catharris Schneideri pag. 503. & 513.

FIG. I.

I. & II. Est membrana qua os Vomer dictum investit, vocatur Membrana pituitaria anterior, fit sub osse palati in inverso capite, utrinque valde fungosa.

III. IV. V. & VI. Monstrat meatum aëris biforem, quo aurâ naribus tracta tendit ad pulmones & de iis per eundem meatum efflatur.

VII. VIII. IX. & X. Designat Membranam qua aditamentum ossis occipitis investit & tegit, hæc continet Mucum & emittit. Quamobrem vocanda venit Membrana pituitaria posterior.

Abc.d. Designat magnum foramen occipitis, quo spinalis medulla descendit.

FIG. II.

xx. Vituli palatum cujus asperitas gradatim discreta cernitur.

yyyyyy. Membrana palati plenior & pinguior, reddis hac pressurâ mucum, qui sparsim prodit per tenuissimos rores & guttulas qua ad formam margaritarum albicant.

zzzzzz. Membrana à tunica ossis Vomer dicti tracta secatur in multiplicam longitudinem. Vocatur simpliciter cancellata, quod transversî cancelli desint. Est plena muci. Ea jam arcuata prope abest à gula.

aaa. Lamina ossis vomer dicti prout sua membrana involuitur.

ssss. Lingua.

Fig. 1





Fig. 2



EXPLICATIO FIGURARUM

TABULÆ XVI.

Ex eodem Schneidero, pag. 515. & 516.

FIG. I.

Cerebrum Anseris detectum.

- F. Collum Anseris nudatum.
 G.G.G.G. Cerebrum suis membranis opertum.
 H. H. Oculi.
 I. Lamina ossea inter nervos, ad tabulatas narium vesicas tendentes interjecta.
 K. K. Nervi duo de durâ matre utrinque tracti, in tunicam superioris tubulata vesica narium interiorum inseruntur.
 L. L. Vesica tubulata superior.
 M. M. Foramina narium in rostro superiore extantia, quibus anima meat, remeatque.

FIG. II.

Rictus Oris Anserini.

- N. Mucus, qui diducto rostro conspicitur, ac extergi potest, portione Cerebri & totius corporis multus hic invenitur.

FIG. III.

Maxima rostri anserini distensio, qua intima faucium cognoscuntur.

- O. O. Rostrum Anseris superius & inversum.
 P. P. Meatus anima.
 Q. Lamina ossis: Hac illud iter anima ad pulmones vadentis, & hinc redeuntis, dispartit. Illa lamina rosida membrana involvitur.
 R. R. R. R. Membrana Pituitaria: Hac est subaspera & leviter denticulata. Si illa stylo ferro premitur, ejus per poros guttula emergunt, qua instar perlarum minimarum candent, qua si in unum coguntur, mucis formam induunt.
 S. Mucus supernè illabens ubertim confluit.
 T. Foramen laryngis, quo aer ex foraminibus rostri, & ex meatu illo anima inte-

riore ad pulmones per Laryngem ducitur.

U. U. Rostrum inferius.

FIG. IV.

In hac Caput piscis Carpionis representatur.

1. 1. 1. Os Carpionis infernè scissum.
 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Membrana palati crassa & densa.
 3. 3. 3. 3. Lapis spina.
 4. 4. 4. 4. Bronchia.
 5. 5. Pinna.

FIG. V.

In hac Caput piscis infernè sectum exhibetur.

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Membrana palati in gulam desinens, est etiam simpliciter cancellata.
 5. 5. Pinna.

FIG. VI.

Caput Carpionis supernè incisum.

7. 7. 7. 7. Scissura & hiatus, ut Cerebrum inspicere possit.
 8. 8. Oculi.
 9. 9. 9. 9. Foramen Narium geminum, intercurrente membrana, qua utrinque foramen operire & aperire potest.
 10. 10. 10. 10. Cavitas membranacea, & nigris lineis spectatior, in quam illud foramen narium definit.
 11. 11. Nervi ad illam membranam tendentes.

FIG. VII.

Cerebrum piscis lupi detectum.

12. 12. 12. 12. Cerebrum piscis lupi.
 13. 13. 13. 13. Vasa ad oculos & ad membranaceam cavitatem narium excurrentia.
 14. 14. Oculi.

Fig. 4




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 5




Fig. 3



Fig. 6





Fig. 7



P A R S X V I.

De Ductibus novis Oculorum & Narium.

Ex Observ. Anat. & Observationum Specimine Nicolai Stenonis.

I. OCULARES.

Glandula internam palpebrarum superficiem humectantes binæ sunt, *Lacrymalis* altera, altera *Clariff. Whartono Innominata* dicta, ex conglomeratarum genere utraque. Videtur quippe conglomeratarum hoc esse munus, ut peculiarem per lymphatica excretoria excernendum humorem præparent: quod ante tantum in pancreate, & maxillarium inferiore observatum, in pluribus aliis manifestum: ut præter illa, quæ de Stomaticis dicta, etiam aliæ carnes ex glomis glandulosis compositæ, demonstrant: quales & sub narium tunica tum internam, tum posteriorem, & sub tunica faucium, & in epiglottidis superiori parte, observantur, unde per ipsam cartilagineam ad internam partem meatus reperiuntur conspici, in quibus lymphaticorum præsentiam facillimè licet demonstrare. De glandulosa carne, quæ in meatu aurium externo, cartilagineam inter & cutem, se offert, res non ita manifesta, cum ceruminum color aliam videatur originem agnoscere. Sed non mirum flavum illis è glandulis succum excerni, cum etiam ex oris glandulis similis exprimatur; quod in bubulo capite, ut & ovillo, mihi perspectum. Quid quod & aquosas excretiones sine ulla auditus læsione per aurem factas, (quarum *Platerus* meminit, qui tom. 3. l. 2. c. 7. refert cuidam puellæ ad mensuras aliquot diu per vices citra ullam aliam læsionem inde profluxisse) ex illis vitiatis originem ducere opinarer, cum alias per tympanum auditu manente integro vix potuisset penetrare. Vel dicendum forte, obstructo, qui ad nares pergit ab auribus, canali, illac excernendum humorem, hac tandem viam invenisse. Ut ut autem sit, prædictus glomeratarum usus experientiam indies magis magisque sentit faventem, quod & sequentia confirmant.

Glandularum oculi altera, quam *Innominatam* vocant, in superiori exterioris anguli regione sita, magna & fere rotunda eo in loco conspicitur; unde ad inferiorem orbitæ partem inflexa in angustam veluti laciniam sensim attenuatur. Pars ejus anterior per loborum, in quos eleganter divisa est, intervalla prodeuntibus ex ipsa glandula, quæ humorem ibi secretum excernunt, vasis liberum exitum concedit; quæ inde internam intra palpebrarum tunicam introrsum pergentia eandem foraminibus ad brevem à ciliis distantiam pertundunt. In conspectum facillè protrahuntur prædictorum fluminum ostia, modo inversam in exteriori angulo palpebram tantillum extenderis; mox enim ad medii pollicis ab exteriori limbo recessum, in ipso angulo tria, infra quatuor, supra sex interdatum & septem patebunt: per quæ immissa sine sectione seta facillè in ipsam usque glandulam transitum offendit. Hæc superior mihi annus vasa detexit, cum

11. Novembr. eruti ex orbita ovilli oculi palpebram exterioribus tunicis nudatam

tam candelæ lumini exponerem, an pellucida esset exploraturus: mox enim splendentes lymphâ rivuli suô se indicio prodiderunt.

Vasa palpebrarum, seu lacrymalia, quæ numero plura fontium habitâ ratione ad duo reducuntur genera; quorum alia exteriora externo oculi angulo accum-bentia, glandulæ eundem angulum occupanti debentur multis dictæ innomina-tæ; interiora alia, quam communiter lacrymalem appellant glandulam pro fonte agnoscunt: quibus, quâ niçtent, data membrana, per eandem inceden-tium vasculorum interius hiantia continent ostia etiam in avibus stylum non ex-cludentia.

Altera *lacrymalis* dicta, oblonga, in vitulo, & in cantho interiore seu majore recondita, præter vasa sanguinea & nervos, quæ illi cum reliquis glandulis omni-bus communia, etiam cartilagine prædita est peculiari, & duobus præterea lym-pham evehentibus vasis donata. *Cartilago* duabus constat partibus, altera *tenuiore*, quæ cuilibet vituli oculum inspicienti se offert, lata, semirotonda, & ad mem-branæ naturam accedens, imo in membranam degenerans, cui limbus prætexi-tur crassior, & quâ oculum tangit, planus, aversâ autem parte crenis paulò ob-tusioribus asper: alterâ *crassiore*, quæ verè cartilaginea est, & alba, qua medio limbo continuatur, arctior, hinc in majorem amplitudinem sensim expansâ ipsam glandulam inter & oculum fertur, ubi iterum angustior reddita circa me-dium glandulæ definit. *Excretoria vasa* bina sunt, quæ intra glandulam orta, & ad cartilaginis latera assurgentia, ubi hæc superiora versus arctatur, cartilaginem inter & oculum se aperiunt, ostiis, non papillâ quâdam, sed solò hiatu dignoscen-dis; qua ratione se mihi primò obtûlere, cum 19. Junii hujus anni in oculo eruendo occuparer.

Puncta lacrymalia, ut in ove, vitulo, cane observavi, licet in utrovis oculo ad majorem angulum bina appareant, ubi tamen ad foramen lacrymale ossi in-sculptum continuaveris, in unum truncum concurrere videbis; qui, ubi cana-lem osseum superavit, ad interius reliqui ossis latus anteriora versus productus, non procul ab extremo narium definit, foramine uno quidem, sed admodum manifestò.

Non exigua hic in diversis animalibus differentia. In homine ipsis ciliorum apicibus inculpta foramina breves demittunt canaliculos, nec demonstratu faci-les, nisi cautè diffractis narium ossibus tunicæ relinquantur integræ, mox enim ubi ossa penetraverint (quousque tenui separantur membrana,) in sinum am-pliati narium continuantur tunicæ. In ove, lepore, vitulo, cuniculo non in ipsis ciliis, sed interiùs paulò eadem reperiuntur ostia, quæ profundius in avibus quæ-renda, ubi quam in ullo alio genere longè majora, receptum majorem stylum per palati rimam emittunt; brevis hic admodum, quæ foramina distinguit, membrana.

Licet autem prædicta vasa non nisi in brutis viderim, quin tamen etiam homi-ni sint concessa, nullus dubito. Cum enim & glandulæ illi adsint similes, simili in loco sitæ, cum humor, qui sub palpebris reperitur, non sit diversus, oportet etiam ejusdem generis vasa ibi admittantur. Sic & puncta lacrymalia in homine,
non

non minus, quam in brutis conspicua fatis arguunt, continuationem eorundem etiam in homine inveniendam.

Ex hisce glandulis, earumque vasis, qui palpebras inter oculique globum observantur, humor procedens, per lacrymalia puncta in nares defluit: qui modo parcius accedens à paucis observatur, modo impetuosius profluens lacrymarum nomine venit: de cujus origine quam varia à diversis fuerint tradita nemini ignotum; ut vel hoc argumentum ex illis unum esse possit non postremum, quæ quam parum ingenii, etiam subtilissimi, vis valeat, nisi sufficientia habuerit experimenta, demonstrant. Quid enim non à variis hac in parte excogitatum; fuere, qui lacrymarum materiam à parcius allabente humore distinguentes diversam utrique originem assignarunt: sic è venis oculorum hunc exsudare, illas à cerebro provenire *Platerus* statuit. Nec, qui è cerebro lacrymas derivant, inter se conveniunt: alii solo cerebro contenti de viis dissentiunt, dum hi anteriores Choanæ canales, illi nervos, isti venas, &, nescio quas non alias vias excogitarunt: quidam verò, præter cerebrum, alias in auxilium vocarunt partes; sic ea partim à cerebro per secundum ossis cuneiformis foramen, partim à vertice capitis & lateribus ad punctorum lacrymalium ductum confluere *Veslingius* putat. Qui cerebro excluso alia putarunt afferenda, nec hi inter se consentiunt, quidam enim ab oculorum nutrimento, alii à crystallini humoris, vitreique excrementis deducunt, *Clariss. Schneiderus* proximè ex arteriis; Ingeniosissimus *Cartesius* ex vaporibus, qui ex oculis, quam ulla alia parte, ob nervorum optico- rum magnitudinem, & multitudinem parvarum arteriarum, copiosiores egrediuntur.

Sed licet ex illis variæ opiniones fatis ingeniosæ magna probabilitate niti videantur, experientia tamen longe alias vias demonstrat ordinario naturæ modo magis convenientes. Ut enim, quæ omnibus partibus communia, universalibus organis peraguntur, sic, quæ singulis debentur peculiariora, peculiaribus locis præparantur, & per vasa peculiariora excernuntur. Existimo itaque manifestum fatis esse, illum saltem humorem, qui motui palpebrarum inservit, ex arterioso sanguine in glandulis secretum, per descripta modo vasa adferri. Quem usum etiam alii illis attribuerunt, quibus tamen vasa nondum fuere cognita. *Clariss. enim Wharton. Adenogr. c. 26. ait: non negandum easdem humiditates aliquas quantum non eâ copiâ, quâ lacryma stillant, suppeditare*, licet idem brevi ante dixerit: *Verum quo modo glandule illæ humiditates has exspuant, vel per quæ vasa easdem excipiant, nemo adhuc demonstravit.*

An autem & lacrymæ inde deducendæ dubium videtur, cum magni viri glandulas illas muneri huic non fatis idoneas judicarint; Non enim crediderunt posse ex tam parvis glandulis tantam lacrymarum copiam prodire, & sequeretur, etiam brutis attribuendas lacrymas, quod multis absurdum videtur.

Sed, quod primum spectat, si guttarum magnitudo cum tempore, quo colliguntur; conferatur, nulla hic videbitur difficulas. Nec enim tempus adeo breve, quin per plura vasa tantum humoris affluere possit, quantum ad guttam constituendam requiritur. Nec, qui ex oculis emanat, humor, totus in glandulis

antea

antea fuit coavervatus: sufficit ex eo, qui singulis pulsibus appellit, arterioso sanguine celeriore in glandulis fieri secretionem, de qua mox pluribus. Quod vero bruta attinet, cum & illis hæc glandulæ, & hæc adsint vasa, poterit & illis (quod sæpius observatur) copiosior ex angulis oculorum emanans humor lacrymarum speciem præbere, qui non minus lacrymarum nomen meretur, quam qui ex oculis hominum, sine ullo animi motu, ob solam materiæ copiam, aut irritationem, organive vitium, promanat.

Existimo itaque lacrymas nihil esse, nisi humorem, qui oculo irrigando destinatus, majori copia affluentem, ideoque, cum vasa in glandulis oculorum observata manifestas & propinquas ostendant vias, ex oculis aliis, aut remotis non deducendæ. Non negaverim, ut ex oculis humor ductum peculiarem in nares stillat, licet ipsæ suis glandulosis carnibus non destituantur; sic quoque ex cerebro fortasse humorem subfalsum per singularia vasa in oculos derivari posse: sed quia suspiciones pro veris venditare meum non est, in medio hæc relinquens quæ manifesta sunt proponam: cum ex iis omnia, quæ circa lacrymas observantur, phænomena commodè possint explicari.

II. N A S A L E S.

NAres succingens tunica cum non modo in demortuis, tum hominibus, tum brutis humida reperitur, sed & in vivis perpetuo quodam madore percipitur irrigata, nec tamen perpetuus è naribus aquosi humoris profluat rivus, necesse est, vias dari tum in nares humorem illum deponentes, tum eo in loco depositum alia inde via abducentes. In hanc me non de naribus modo, sed & pericardio, aliisque partibus, opinionem jam tum pertraxerat oculorum, & oris fabrica: sed cum argumenta Anatomica, præter Analogiam, etiam *αὐτοψία* requirant, suspicionibus tantum annumerandum duxi, eò quod utrumque hujus propositionis membrum suos videbatur expectare adversarios. Prioris enim vias in dubium vocarent, qui ad odores benè percipiendos ficcas, non unctas, requirunt nares, & magni *Hippocratis* verba vel dubitantibus opponunt, quæ libr. de carn. leguntur: *καὶ ὅταν μὲν ξηροὶ τῇ κατὰ τὸ μύλον, ὁ σμικρὸς τῶν ξηρότερων αὐτὸς (ὁ ἐγκέφαλος) αὐτῷ ἀκράβειρος ἐσται.* & mox: *ὁ κατὰ δὲ ὑπερθεωρεῖται αἱ ρῖνες, ἃ δύνανται σφραγισθῆναι.* Quod si itaque odoratus organi ficitatem requireret; nulla hic admittenda vasa, cum non modo nulli essent usui, sed ipsum impedirent sensum. Posteriores vero ab imminente faucibus hiatu diversos non faciliè admitterent, qui narium humorem, si quis esset, aut à prætervecto aere exsiccare posse contendunt, aut per patentes vias in fauces rejici: atque ita, licet illis humiditas canum, quorum odora via nulli non cantata, nares, & ipsam humoris necessitatem ad halitusosorum corporum faciliorem in poros ad nervorum extrema transitum objicere potuissim, licet his tum illum & in homine, & in brutis, narium situm, qui non patitur humorem in fauces relabi, tum illam humoris naturam opponerem, ut non possit ab aere solo intra pectus pulso, vel ab eodem una cum calidis fuliginibus è pulmonibus rejecto, in tenues auras dissipari, id quod ipse *Vulcanus*, si ad partes vocetur, de

monstrat: dubius nihilominus hærebam, usque dum præter *aquæ ductum* jam ante cognitum, & præter glandulosas carnes *tunica Schneideri* *pituitarie* appellatæ, etiam *punctorum lacrymalium in nares usque continuationem*, aliumque *naribus peculiarem ductum*, omnia *nares humectantia vasa*, & simul *angustum quasi fretum*, per quod contentus in naribus humor in palatum transmittatur, observarem: tum enim patebat, nisi Hippocratis verba de immoderato humore essent intelligenda, ipsi experientiæ bellum esse indicendum.

De primo nares irrigante canali, s. *aquæ ductu*, humorem, quo aurium cavernæ maduerunt, eo deferente, cum à variis Celeberrimis Viris sit descriptus, nihil hoc loco addam, sed reliquis annumerasse contentus ad sequentes pergam.

Secundum, per quem ab oculis in nares derivatur humor, quod attinet, cum in antecedentibus pag. 91. fuerit descriptus, nec ille diu nos morabitur. Clariss. *Veslingius* existimat desinere illum intra palpebrarum tunicas, cui suum etiam calculum *Celeb. Schneiderus* addit, qui de catarrhis lib. 3. c. 9. p. 348. ait: *Ante hunc Autorem (sc. Vesling.) hæc & huiusmodi alia pervidimus, ac multis locis docuimus hæc foramina non ulterius ferri. Nam palpebra ex duabus constat membranis, inter has usque ad orbitæ finem excurret hoc foraminis genus, & inibi desinit. Sed in nares usque pertingere, non in brutis modò, sed & in homine una cum Clariss. D. van Horne, jam secundo observavi. Mirum sanè exercitatissimum Virum Fabricium ab Aquapendente, qui nervosum in ipso ossis lacrymalis meatu observavit ductum, eundem punctis lacrymalibus continuum non perspexisse. Sic enim de ocul: part. 1. c. 13. refert: Propter quam causam natura sapientissima duplicem viam ad lacrymas expurgandas paravit. Una est per oculorum utrosque angulos, alia per nares. Etenim in utroque extremitate tarforum superna scilicet & inferna, bina in utroque angulo foraminula apparent, tam exigua atque angusta, ut vix in viventium corporibus aspectabilia sint: in cadaveribus autem omnino sensum effugiant, per quæ lacrymæ, cum effunduntur, exeunt, potissimum autem per internum angulum, quo ut decliviore utitur natura ad lacrymarum effluxum. Alia autem atque adhuc patentior via nares sunt, in quarum summitate ad internum angulum foramina in osse insculpuntur tam magna, ut quivis ea admiretur: quæ si attente intuearis, insignes quidem canales tibi videbuntur eo loci ad hunc usum excavati, ut lacrymæ per nares expurgentur, quin etiam ductum quendam nervosum ab oculis in ejusmodi foramina ingredi videbis, quasi accommodatum canalem ad lacrymas in nares derivandas. Mirum, inquam, Virum Celeberrimum, una cum aliis ejusdem sententiæ patronis, ea dividere, quæ natura voluit esse conjuncta.*

Tertio loco, quæ in ipsa narium tunica oriuntur, vasa examinanda, quæ duum generum sunt: breviora alia & vix nisi per expressum humorem, cujus guttæ sensim prodeuntes vasorum ostia produnt, conspicua; alia longiora, quæ veri canalis nomen merentur.

Breviora vascula illum effundunt humorem, quem in membrana pituitaria anteriore observavit *Schneiderus*, cui Celeberrimo Viro ad stipulari nequeo, dum membranæ munus illud totum adscribit, nulla glandularum facta mentione: cum tamen sub ipsa membrana vasorum, quæ copiosa ibi reperiuntur, extremis affusæ sint glandosæ portiones, in parte narium anteriore minores, quo vero posteriora

steriora versus magis recesseris, majores, unde exigua quædam excretoria oriunda secretum ex arterioso sanguine humorem emittunt.

Longiora vero in homine quidem nondum vidi, in ovibus tamen canibusque non raro. Sunt autem bina, in utraque narium cavitate unum, ubi & originem agnoscit & finem. In illis enim, quæ sub narium tunica in ovibus dispersæ latent, glandulis radices plurimæ supra molarium regionem observantur, eleganti ordine dispositæ, è quibus unum in truncum coeuntibus ductus exsurgit, qui, ubi sub nervoso canali dorsum versus ascenderit, in anteriora inde reflexus dorsum inter & continuum punctis lacrymalibus vasculum progreditur, donec circa extrema fere narium, quo loco supra reliquam planitiem cartilago exsurgit, in sinum intra cartilaginofam alarum protuberantiam conspicuum se exonerat. Non difficulter in adspectum producit, sive ostia quæras, sive fontes: hos enim cum ipso progressu ut oculis subjicias, effringenda tibi narium ossa, integra manente, qua succinguntur, tunica, & simul suo se splendore per tunicæ exteriora decurrens lymphaticum prodet, quod si fursum continuaveris, elegantem ramulorum sobolem radicum munere fungentum deprehendes. Sin ostium desideras, primo circa globum nasi refecanda est alarum alterutra, hinc supra cartilaginofam excrescentiam (in cujus inferiori loco ostium, per quod oculi se exonerant, hiat) eadem ala dividenda, illico enim quendam quasi fulcum videbis brevem illum, sed immisum stylum in ipsum usque vasculum deducentem. Sæpius in ovibus totam extra ductum procurrentem fossam nigredo, qua ut hæc sic & omnia lymphaticorum excretoriorum tum in buccis, tum sub lingua, ostia in iisdem non raro tincta observantur, vel obiter inspicientibus velut intento digito demonstrat. In canibus ostium ejus non in ipso cartilaginis dorso, sed inferiori loco se exonerat, nec ipse canalis eandem à narium culmine in progressu suo distantiam servat.

Visis, quibus nares irriguntur, vasis, inspiciendæ sunt viæ, quibus idem ubi munere suo functus est humor, alio ablegentur. Sunt autem ex illo genere, quæ hic examinari merentur, binæ, in utraque parte una. Nec enim hiantia nasi ostia, quæ reciproco aëris motui patent, huc referenda, cum foras spectantia huic muneri destinata non esse integer vitæ status, quo nunquam quicquam hac excernitur, demonstret: quæ vero introrsum vergentia faucibus imminet, præterquam quod magnitudo & usus omnibus nota reddiderit, ut adeoque supervacuum sit ea hic describere, etiam ipse situs huic muneri non sufficientes manifestè convincat. A naribus itaque in palatum qui patet, transitus brevis admodum est, nec canalis sed foraminis nomine dignandus. Locum si quæris, in extremo naso offendes, ubi supra tertii maxillæ ossis supercilium exsurgens cartilago allabentem humorem, ne extrorsum profluat, remoratur. Hoc intra repagulum in homine ad vomeris latera proximè invenies foramen rotundum, quod licet superiori ambitu satis sit amplum, mox tamen arctatur adeo, ut ne setæ quidem in palatum transitum concedit. Quod si palati coelum inspexeris in homine quidem, ut & in canibus, ad anteriorum dentium radicem tuberculum exsurgere videbis, ad cujus latera, modo tantillum presseris tunicam, gutta utrinque

una profiliens oris cum naribus commercium manifestabit. In bubulo autem ut & ovillo, quibus in superiori oris parte primores denegati, eundem meatum cordis figura quærentibus indicabit, latera enim cordis illius immisso stylo in nares viam aperient. Observandum autem in duobus hisce subjectis situ variare illam cordis figuram & mucronem ejus in ovibus fauces respicere, cum in bobus eò basis dirigatur. Sed nec in diversis craniis eadem est meatus hujus conformatio; in homine enim, quæ ab intermedio vomere in narium cavo divisa conspiciuntur foramina & parva, si maxillam invertas infra dentes in unum confluisse deprehendes. In brutis autem manent divisa, nec rotunda sunt, sed in oblongas rimas extensa.

Ex illis, quæ tum hic, tum superius dicta, manifestè patet, quam studiosè id egerit ingeniosissimus animalium Conditor, ne quæ fordes regiam sedem, caput puta, inquinarent. Humectandi erant cum aurium cavitate oculi, irrigandæ nares, os, faucesque unctuosò humore oblinendæ: nihilominus nec oculi, nec nares, nec fauces, si naturæ convenienter vixeris, quicquam excernent. Quid enim lacrymæ, nisi moti animi signa? quid mucus narium, quid oris sputum, nisi vitæ à sanitatis legibus deficientis symbola; *αγγέλιον τῆς σιτῆς τῆς πύξης*. Ubi munus suum implevit ille humor, ex auribus per aquæductum, ex oculis per collicias in nares derivatur, unde partim per ingentes hiatus in fauces, partim per angustum fretum in oris cavitatem dimittitur; & hinc per œsophagum in ventriculum descendens & in vasa sanguinea per chyli lymphæque ductus viam affectans, peculiarem suò modò circuitum absolvit.

E naribus in palatum anteriori loco dentes intra, quibus dentes sunt, proximè descendens meatus; quem fretum si dicere placuerit, non erit è longinquo petitum simile: In brutis hic quàm homine ut amplior ita & manifestior. In diversis varius apparet, quod vituli, ovis, canis, cuniculi diducta inter se conferentibus ora, dignoscere integrum. Ejusdem in avibus vice fungitur posterius palatum dividens rima.

EXPLICATIO FIGURARUM TABULÆ XVII.

Ex Observat. Anatom. Nicol. Stenonis.

FIG. I.

Exhibens oculum vituli sinistram.

- A. Glandula oculi superior aliàs innominata dicta.
 B. Angulus oculi major.
 C. Angulus oculi minor.
 d.d.d. Lobi in quos anterior glandula limbus divisus, per quorum interstitia lymphatica e.e.e. exeunt.

FIG. II.

- A. Interior palpebra superficies.
 b.b.b. Glandula innominata, qua una cum vasculis

c.c.c. per tenuem palpebra tunicam transperet.

d.d.d. Oscula vasorum lacrymalium.

FIG. III.

- A. Glandula lacrymalis in interiori angulo sita.
 B. Cartilago ex ipsa glandula prodians.
 b.b.b. Limbus cartilaginofusus.
 c.c. Membrana.
 d.d. Ostia duo, ad utrumvis cartilaginis latius unum.

FIG. IV.

- a.a. Punctorum lacrymalium ad extremas nares continuatio.
 b. b. Vas excretorium naribus proprium.

PARS

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



P A R S XVII.

De Ossibus Wormianis.

Ex Anatom. Barthol. pag. 483.

PRæter ossa triquetra, alia in futura Lambdoidea invenit *Cl. Wormius*, utramque cranii Tabulam perforantia, à paucissimis hætenus animadversa. Tria ut plurimum in dextro, totidem in sinistro ductu, magnitudine, & situ discrepantia, quæ etiam in infantibus accuratè discernuntur. Infimum ad processum mamillarem conspicitur, medium paulo superius, vix dimidii digiti intervallo, tertium aliquanto longius à secundo distat. Figura sunt varia, triquetra, oblonga, ovalia, interdum instar exostoseon in viventibus eminuissè notavi, ut tactu perceperim. In sinistro ductu majora omnia apparent; Maximum tamen ungem pollicis non excedit. In concavâ cranii parte distincta magis quam in convexa apparent, quare omnia observantur clarius ablata calvaria.

Notandum tamen in diversis craniis tam numero quam magnitudine & figura situque variare hæc ossa Wormiana, ut modo quatuor sint, modo duo, atque in dextra linea tantum, aliquando in ipsa junctura sagittalis cum Lambdoideâ, aliquando etiam in squammosis temporalibus. Usus credo. 1. Ut ampliori circa ea tractu futuræ ad excrementorum exitum ampliuntur. 2. Ut cranium plurius officulorum contextu in contusionibus magis sit tutum.

P A R S XVIII.

De Maxillæ superioris cavitate.

Ex Disquis. Anatom. Highmori, pag. 227.

CAvernula in maxillâ superiore magna est, quæ quia observationis rarioris, ejus historiam ex *Highmoro* hic lubenter inferemus. Antrum hoc utrinque unum, sub oculi sede inferiore ubi os ad oculi tutelam quodammodo protuberat, ad latera inferiora nasi situm est. Insigniter cavum, sphaericum, aliquantulum vero oblongum, & ita amplum ut articulus pollicis majoris pedis ultimus in illo delitescat. Osse attenuato seu squammâ ossæ obtegitur: Os enim quod illud includit, & quod à dentium alveolis extremis distinguit, crassitie chartam emporeticam non multum excedit. *d. d. d.* In basi hujus protuberantes quædam eminentiæ cernuntur. *a. a. a. a.* Quibus dentium apices tenuiores includuntur. *b. b. b.* Dentium alveoli margini hujus ossis inferiori insculpuntur, quibus dentes insiguntur. *c. c. c.* Antrum hoc frequentius vacuum, aliquando muco repletum reperitur, in quod humores à capite per meatum quandam à cavitate illa in osse frontis, & ab osse Ethmoide destillare poterunt. *d. D. C.*

Atque

Atque hic silentio præterire non possumus, quod generosæ cuidam fœminæ sub nostra cura laboranti accidit. Cum subferina eaque continua falsi humoris destillatione, per multos retro annos laborasset, omnesque pene dentes corrofos ac cariosos evulserat, nec tamen à dolore liberata, tandem dente canino sinistri lateris effossio simul squammosa illa distinctio inter cavitatem hanc & dentis fo-veam eripitur, adeo ut humorum, per alveolum dicti dentis, ab antro illo perennis succederet destillatio? Qua multum perterrita, stylo argenteo in alveolum immisso originem fontis hujus exploratura, usque ad oculum, per tunicas penè duas sursum adegit; magis adhuc metuens, pennam minorem plumis decerptis totam penè ad longitudinem palmæ unius immisit. Jam maximè consternata, ad Cerebrum usque decurrere existimans, me inter alios consuluit; ubi autem singulas examinavimus circumstantias, pennæ reduplicaciones, illamque per cavitatem hanc circumgyrare invenimus. Atque sic ubi in figura convenienti cavitatem hanc designavimus, illam usu ac necessitate hujus satis instructam, perrenisque illius fontis patientissimam habuimus, à timore & Medicina simul desistit. Antrum hoc levitatis ossium causa, quæ hic oculorum situs gratia crassa debueret, factum esse arbitramur.

P A R S X I X.

De Cavernâ Offis frontis.

Ex Disq. Anatom. Highmori lib. 3. part. I. cap. 4.

IN Offe frontis Cavernulam observandam inter utramque laminam, ad nasi radicem sitam, interdum unam, Tab. XVI. fig. 3. C. & Tab. XV. fig. 1. n. n. maxima autem ex parte geminam non præteriemus. In puellis aut quibus frons depressa, vel frontis os cum futura est divisum, illam non inveniri asserit Bartholinus: Nos vero ad eundem modum & situm in dissectione Cranii semper non invenimus; Nunc enim unam amplam ad latus alterutrum inclinantem, cum multum minore in alio latere; Tab. XVI. fig. 4. c. c. In fronte futura sagittali divisa binas, utrinque unam æqualis magnitudinis, Tab. XV. fig. 2. b. b. à quibus utrinque ad narium cavitatem foramina expanduntur, sæpissimè reperimus. In aliis vero, quibus scilicet frons multum depressa fuerat, ut in fœminâ quam nuperrimè dissecuimus, nulla vestigia invenire licet.

Cavernula hæc, simplex sit angemina, meatus binos obtinuit, quorum uno à cerebro per offis cribriformis foramen in illam ducitur pituita, Tab. XVI. fig. 3. c. atque hinc per alterum. e. ad nares descendit.

De Usu harum cavitatum maximè dubitatur: suas quisque habet conjecturas. Alii (ut *Placentinus*,) mucosum humorem, qui in nares destillat, continere, alii illas voci inservire, ut magis sit canora, quia in illis qui malè loquuntur non inveniuntur: alii, ut in illis elaboretur aër ad generationem spirituum animalium, contendunt. *Spigelius* ad odores hauriendos facere existimat; cum ibi aër odore præ-

prægnans excipitur, paulumque conservetur nè nares tam subito præterlabatur, unde odor per integrum diem in narium summitate perferitur. Alii illas humorem, quo oculi humectantur & lubricantur continere putarunt. Nos verò illas à Natura primario institutas arbitramur, ut protuberantiam illam & eminentiam superciliorum extendant, quæ aliter adeo feliciter fieri vix poterit. Si enim ex osse solido extuberet frons & supercilium, onus nimis grave ac naturæ molestum effingeretur. Hisce verò cavernulis processus seu prominentia superciliorum, ad faciei gratiam & oculorum propugnaculum, tenditur, neque gravitas offensiva inde conciliatur. Atque hanc in omnibus processibus & prominentiis, (ad quodcunque officium designatis,) methodum observavit Natura, ut nulli parti inutile pondus designaret, quo officium damno inevitabili compensetur. Sic os maxillæ superioris magnum est, maximeque protuberat, cavum tamen est, adeò ut Natura non solum robur, sed & utile quandoque ac conveniens excogitare videatur.

Hanc nostram de cavitatum harum usu sententiam abundè illustravit illud Bartholini, asserentis cavernulas hæc in frontibus depressis non inveniri; scilicet ubi nulla est superciliorum prominentia; atque talem faciei formationem in ancillâ à nobis dissectâ anno 1640. fuisse, in quâ nullum invenimus cavernulæ hujus vestigium. Hoc itaque officium esse à Natura primario excogitatum existimamus; alios verò usus secundarios habere negare nolumus.

P A R S XX.

De Cerebro, ejusque partibus.

Ex Disq. Anatom. Hiclmori, lib. 3. part. 1. cap. 6.

Veterum omnes Anatomici dissectionem à summis sunt aggressi, partes in vertice primò speculantes, ut ex *Vesalio* divino illo Anatomicæ restauratore patet. Obscurè verò hoc modo nervorum principia, quæque in basi cerebri veniuntur, deteguntur. Ingenuè itaque *Varolius* Anatomicus oculatissimus à Basi cerebri dissectionis initium tulit, atque sic nervos omnes ad originem illorum primarium insequitur, ut fusiùs in libro ejus Anatomico admodum docto videatis. Atque hunc Neoterici plurimi sequentes opera sua similibus adornarunt observationibus. Sed quia & hæc dissectionis administratio est aliquantulum perplexa, alteram à nobis sæpe usitatam proponere liceat, quâ partes nonnullæ clariùs multò dilucidari oculisque proponi, (ut ex sequenti schemate ac partium descriptione patet) poterunt; Ubi exempto cranio secundum methodum antiquam coronæ in modum, partem cerebri dextram scilicet usque ad ventriculos & fornicem dissecando, sinistram integram oculis exhibuimus.

Ubi primò post Membranas, Falcem, cerebrique corticem observationi opponitur *Corpus callosum*, quod ex substantiâ duriore ac compactiore quàm reliquum cerebrum consistit, callicque naturam quodammodo refert. Ventriculis infra-

infratum illos quasi constringit, ne humores in illis contenti diffuant, & in laxam cerebri substantiam imbiberentur. Ventriculos circumdat Tab. XV. fig. 1. B. B. & sustentat, plurimis arteriis & venis donatur, unde in dissectione guttulas sanguinis copiose illachrymavit.

Hoc diviso & cerebri dextra parte ad ventriculi superioris usque basim exempta, *Ventriculus Dexter* seu superiorum primus Tab. XV. E. E. (sinister in latere integro est absconditus) sub aspectum cadit: Estque amplus, anfractuosus, à parte postica cerebri ad anteriora excurrans: In parte anteriore & posteriore insigni amplitudine dilatatur & obtusa rotunditate circulat; in medio autem stringitur & angustatur. Versus superiora à sinistro, (qui ad eundem modum conformatur) septo quodam dirimitur. Tab. XV. fig. 1. D. D. Quod quia substantiam habet tenuem, laxam, & transparentem, ideo *Septum Lucidum* dicitur. Ad inferiora verò, juxta basin, declivitate quadam ambo ad se contententes, sub Fornice, Tab. XV. fig. 1. F. F. m. m. in cavitate una in medio posita, coeunt utrique, & Dexter & Sinister: Quam cavitatem *Ventriculum tertium* nominarunt; quæ fovea quædam in medio cerebri est, ex utrisque superioribus ventriculis descendentem materiam recipiens. Tab. XV. fig. 2. H. O. Y. L. Super mediam foveæ hujus partem, inter hanc & ventriculos superiores substantia quædam crassa, alba, & corpori calloso non absimilis, in modum arcus sita, illos determinat, separat; nisi ubi ad latera utrinque laxa & libera, solum in partes subiectas ventriculorum superiorum incumbens, non unita, delabentes humores admittit ventriculus inferior seu tertius. Substantia hæc à Græcis *κρηδεῖον* dicitur, *Fornix*, à forma scilicet, quia testudinis instar tertio ventriculo superstratur. Tab. XV. fig. 1. F. F. m. m. sub corpore calloso latens, illi per substantiam, quam *Septum lucidum* D. D. nominarunt, connectitur. Qua posteriorum ventriculorum sedem respicit, unde emanat, latus est Fornix hic & amplus, at mox in anteriora progressus; paulatim angustatus, in tenuem apicem definit Tab. XII. fig. 2. P. P. Superna sede se quodammodo attollit. Fig. 1. F. F. Inferna cavus sinuatur & fornicis in modum arcuatur, quo supetstructam cerebri molem feliciter sustentet.

Verumenimverò non ad sustentationem esse conflatum, vel substantia ejus mollis & laxa, cuilibet compressioni cedens, suadere poterit. Ideò verò cavum sphæræque portionem quodammodo æmulantem Naturam fabricasse arbitramur, ut cavitas ejus amplior ac capacior reddatur. Officium itaque Fornicis est præter ventriculorum separationem, ut excrementa in cavitatem illam inferiorem delabentia, foramen parvum per quod in Infundibulum excernuntur, affatim & præcipitanter defluentia non obstruant.

In ventriculis hisce dextro & sinistro, plexus quidam, qui à Græcis *χοροειδὴς πλέγμα*, plexus Choroeides dicuntur, à similitudine cum Chorio Membranâ foetum involvente, ex infinitis arteriarum & venarum furculis invicem complicatis conflantur. Tab. XV. fig. 1. K. Arteriæ f. à carotidis ramo majori proveniunt, Tab. XVIII. α. β. γ. quæ sanguinem huc ad cerebri nutritionem adducunt; Ubi ob infinitos hosce Meandros & complicationes retardatur

tur sanguis in motu ejus circulari; donec cerebrum alimentum sibi idoneum, particulæque pro spirituum generatione copiosas per vasa pene infinita, Tab. XV. fig. 1. k. k. k. Tab. XVIII. v. v. v. à plexu hoc exeuntia, ac per substantiam cerebri disseminata. Partes verò sanguineæ à nutritione repudiatæ per venas. Tab. XV. fig. 10. h. h. h. quibus arteriæ per Anastomoses i. i. i. ubi vis conjunguntur ad sinum quartum per vas venale (g.) in quod reliquæ minores & penè capillares venæ in plexu dispersæ exonerantur, desertur.

Indè sequitur cavitas illa quam tertium Ventriculum nominarunt, quem si rectè intuearis, superiorum potius concursum, quam peculiarem & distinctum ventriculum dixeris: Ubi enim dicti ventriculi sub Fornice in unum coeunt, in basi cerebri vallem oblongam acutum angulum ad inferiora efformantem, ut cavitas indè constituatur, exprimunt. Tab. XV. fig. 2. H. O. Y. Meatus duos obtinet, alium in mediâ ipsius sede recta deorsum ad infundibulum ducentem. Tab. XV. fig. 2. L. per quem cerebri excrementa ad glandulam pituitalem, atque inde in palatum ac os deferuntur; Alterum, qui posterior est, non autem ut prior rotundus, quia ex fissura duorum corporum à cerebri basi ad spinalem medullam tendentium conficitur; Atque hic in ventriculum quartum quo spiritus animales (inquit *Banhinus*) transire possint, permeat. Fig. 2. Y.

Ad foraminis hujus exitum, Glandula, figuræ oblongioris, nucleo pini similis, adponitur. Fig. 2. h. *κωνοειδής* Glandula Pinealis nominatur, duobus illis corporibus à cerebro prodeuntibus, quæ ab Anatomicis Testes vocantur, innitens. Substantia ejus duriuscula membranâ tenui oblecta est, vasi illi venoso in Sinum quartum tendenti, fig. 1. g. & 2. Y. in quod omnia plexum Choroeidum vasa suum sanguinem effundunt, supponitur; Eundemque habere usum, quem & reliquæ glandulæ venis appositæ, ut earum scilicet divisiones firmit, testatur *Banhinus*. Verumenimvero meatum hunc ad venæ egressum fieri faciliè concedimus; Glandula autem ideo ductui huic conceditur, ut foramen per quod vena exiverit obtureretur; ne excrementa cerebri in prædictis ventriculis collecta, per foramen, seu ductum hunc in cavitatem illam, quam abusivè quartum ventriculum nominarunt, effluant, ac spinalis medullæ originem comprimant, ac partibus inferioribus spirituum denegetur influxus.

Indè oculis Spinalis Medullæ principium objicitur. Quod (abscissâ cerebri parte dextrâ usque ad membranas ad F. in fig. 2. Tab. XV.) ex quatuor quasi radicibus rotundis exoriri videtur; Quorum duo à cerebro majores & anteriores, C. C. posteriores verò duo à cerebelli parte inferiore enascuntur D. D. qui anterioribus versus posteriora reflexis, occurrentes, conjunguntur, unumque constituunt corpus, medullam dictum Spinalem; Ex quâ ut uno, sic vero principio omnes educuntur nervi.

Trunci hi tam à cerebro quam cerebello à divisis cerebri cerebellique lateribus, à dextro scilicet & sinistro ortum petunt, ut una parte affecta, altera inviolata suum præstaret officium.

Ex quatuor harum radicum conventu processus quidam seu extuberatio occurrit; qui per transversum in anteriora & inferiora fertur, sicque spinalem medul-

medullam, ut musculorum gulam constringentium primum par, Oesophagi principium ambit. A Varolio Pons Cerebri dicitur Tab. XV. fig. 2. E. à quo penè omnes enascuntur nervi in cerebro intra Cranion educti.

Principia horum corporum, ob formam, quam adepta sunt, sphaericam, & effigiem quandam duarum Natium commissurarum fig. 1. D. D. ac Testium C. C. referun, γλεττα & δίδυμα, parvas Nares ac Testes vocarunt Anatomici: In quorum usu & descriptione multum fudarunt. *Banhus* illa esse cerebri sustentacula, ejus molem columnarum instar sustinere contendit; ne ventriculus tertius, s. meatus ex tertio quartum accedens comprimatur, sicq; spiritus animalis transitus prohibeatur. At verò tale officium præstare omnimodo sunt inepta; substantiam enim mollem, & ejusdem naturæ cum ipso cerebro, nequaquam ad firmitudinem aptam, habent; nec alio usui inservire, aut à natura fuisse instituta arbitramur, quam ut spinali medullæ ob utroque cerebri latere spiritus animales transmittant.

Ex contiguo corporum horum rotundorum versus spinam progressu, cavitas illa quam quartum ventriculum appellarunt, efficitur. Tab. XV. fig. 2. G. Quæ vero nihil aliud est quam intervallum, quod ex concursu quatuor horum corporum rotundorum, ob figuræ necessitatem sequitur & formatur.

Atque hoc modo ventriculorum cerebri officium ad excrementa ejus recipienda nobis depingitur. Cerebrum enim cum sit membrum humidissimum, molle, laxum, & frigidum respective; altissimaque parte locatum, cranio duro ac denso contextum, velut operculo quodam ebullienti vasi superpositum; unde tectum domus calidæ à *Galeno* 9. de Usu partium part. 2. appellatur; necesse est ut multa illic accumulentur excrementa; dum continuo ex inferioribus partibus cucurbitulæ ritu attrahat, exhauriatque vapores: tum etiam quia excrementa plurima illud ipsum ob frigiditatem congreget. Multa itaque excrementorum indiget evacuatione, insignesque exitus & receptacula capacia habere debuit. Ne itaque hisce obrueretur excrementis & vaporibus, provida natura & Suturas in Cranio, quibus fuliginum partes tenuiores expirare possint; & ventriculos hosce fabricavit: quibus crassiores & expiratione ineptas, præcipue quæ in medulla cerebri generantur, recipiantur, ac per infundibulum ad palatum transmitti possint. Quæ vero in Cortice Cerebri & Membranis contegentibus colliguntur excrementa, per os cribrosum atque inde per nares evacuantur. Officium autem hoc Ventriculorum ex Varolii, aliorumque Anatomicorum observationibus confirmatur: Qui humore lento & pituitoso sæpissime illos repletos invenerunt. Præterea ductus ille ad infundibulum & glandulam pituitalem à tertio ventriculo excrementorum separationi potius inservire docet, neque sanè ullum cum nervis, partibus corporis communicatis, commercium habere videmus; Quod per quartum ventriculum assignarunt structura ejus abundè evincit. Quid obstat enim quin (cum in spatium illud inane à ventriculo tertio emittantur spiritus) per membranas corporumque Tab. XV. fig. 2. C. C. D. D. fissuras evolarent? Ut fusius postea illustrabitur. Galenus vero 8. de usu partium cap. 10. anteriorum ventriculorum officium voluit facere expirationem & inspirationem illam, quæ prodit ex cerebro: hanc alibi toti cerebro ob fabricationem spirituum animalium

malium ascribit. De quarto vero ventriculo illum ait spiritus in superioribus elaboratos recipere, & ad cerebellum deducere. Sed quicumque hujus ventriculi structuram examinavit, faciliè concedet posse & *Galenum* errare.

His indagatis, remota cerebri parte dextra usque ad tertii ventriculi divisionem, occurrunt Infundibulum, Glandula pituitalis, & Rete mirabile. Infundibulum est cavitas orbicularis ex tenui membrana, ubi cerebri basin succingit, facta. Ad foramen anterius quod ex ventriculo tertio ducit situm & connexum est; ubi amplum habet principium; sensim vero, ad modum infundibuli, quo utimur ad transfundenda liquida in vasa strictioris orificii, donec in glandulam pituitalem definit angustatur. Tab. XV. fig. 2. L. I. Hujus usus est ut excrementa crassiora quæ à cerebro separantur, ad Glandulam pituitalem ablegentur.

In fine hujus infundibuli angustiore sita est Glandula pituitalis, quæ orificium ejus exactè claudit, quæque eadem tenui membrana obvelatur. Tab. XV. fig. 2. K. Substantia ejus durior est & compactior quam aliarum glandularum. Sita est in sinu ossis Cuneiformis quadrato, qui in Sellæ medio exsculptus est Tab. XVI. fig. 3. G. A quo quatuor alii sinus excurrunt; partim versus anteriora, ad secundum ejusdem ossis foramen in oculi sedis radice positum. Tab. XV. fig. 2. Z. Ideoque cum caput humoribus pituitosis & aquosis repleatur, oculi etiam humoribus distenduntur & intumescunt. Partim versus posteriora ad palatum ducentes Tab. XVI. fig. 3. H. In tali autem ossis Sella absconditur, ut cerebri superstrata moles humores attractos non continuo exprimat, sed in illa retineantur, donec nimia ejus copia gravata & distenta, sensim exstillare sinat.

Circa Glandulam elateribus dictorum sinuum in ossè Sphenoeide plexus quidam consistit infinitis arteriarum furculis ex ramo majori carotidis ortis & venarum, instar retis complicatis, exstructus. Rete mirabile seu *διπλοειδὲς πλέγμα* plexus retiformis dicitur; ab artificiosa partis figura nomen accipit. Hujus officium ad spirituum animalium præparationem fuisse asserunt Anatomici. Verum ad moram & retardationem sanguinis fieri potius dicendum est. Ut scilicet partes vicinæ, quæ ad vasa majora recipienda prorsus sunt ineptæ, succo appropriato & cognato irrigentur. Sanguis enim dum plexus hosce & Mæandros percurrit, non tam præcipiti cursu rapitur, ut in aliis partibus; sed diutius ibi retentus, partes adjacentes fatis habent otii, ut ab illo alimentum eliciant cognatum & appropriatum. In cæteris etiam partibus nullas pene particulas per vasa majora, ubi sanguinis præceps fertur, nutriri videmus: sed ex illis alia ducuntur capillaria pene infinita; per quæ sanguis lente serpens & protrusus, particulæ corporis fatis foeliciter cognatas sibi attrahunt atomos. Ideo vero circa Glandulam hanc repositum fuisse dicamus; ut serosa sanguinis pars, dum in plexu hoc moram faciat, à Glandula eliciatur. Atque hoc modo, sanguinem ad generationem spirituum animalium præparari in rete hoc pronuntiemus.

EXPLICATIO FIGURARUM

TABULÆ XVIII.

FIG. I.

Ex Bartholin. Anatom. Reform. pag. 483.

Ossa Wormiana exhibet.

- A. Portio Sutura sagittalis.
- B. Sutura Lambdoidea.
- C. Sectio serra facta.
- D. Primum Os Wormianum sinistri ductus.
- E. Secundum.
- F. Tertium.
- G. Primum dextri ductus.
- H. Secundum.
- I. Tertium.
- K. Magnum cranii foramen.
- L. L. Processus mammillares.

FIG. II. & III.

Ex Highmor. pag. 227. Tab. XVI.

Hic nati Spongiosa Ossa, Cavitas in osse frontis, & Ductus ab illis ad maxillæ antrum exhibentur.

- A. A. Cranium dissectum cum medullari interstitio.
- B. B. Interior cranii pars.
- C. Cavitas ossis frontis.
- D. Cavitas inferior à priore ad navium cavitatem ducens, à qua etiam ductus alter ad maxilla antrum fertur.
- E. Navium cavitas.
- F. Antrum maxilla.
- G. Glandula pituitalis in sella.
- H. Ductus è sella ad palatum.
- I. Os maxilla supra palatum dissectum.
- K. Palatum cum dentibus maxilla infixis.
- L. L. Vestigia venarum in cranio insculpta.
- a. Crista Galli.
- b. Os cribrosum.
- c. Meatus à cerebro ad cavitatem illam in osse frontis ducens.
- d. Ductus à cavitate inferiore frontis ad antrum maxilla.
- e. Ubi superior cavitas se in inferiorem exonerat.

- Fig. 3. M. Antrum maxilla.
- N. Os maxilla dissectum.

- a. a. a. a. Protuberantes dentium clavacula in locellis suis adhuc abscondita.
- b. b. b. Dentium radices in alveolis adhuc latentes.
- c. Dentium alveolus vacuus.

FIG. IV.

Ex Highmor. pag. 211. quæ ipsi Tab. XV.

Cerebri lateralem dissectionem indicat.

- A. A. A. Cranium, ut in communi dissectione apparet, cum corpore medulloso inter binas ejus lamellas.
- B. B. Corpus callosum, ut in laterali capitis dissectione, cum vasorum sinibus punctis quibusdam expressis, cernitur.
- C. C. C. Falx in proprio suo situ, cum cerebri parte sinistra inviolata.
- D. D. Septum lucidum in proprio loco ventriculorum dextrum à sinistro determinans.
- E. E. Fundus ventriculi dextri, ut abscissa dextra cerebri parte, usque ad primam & majoris meningum reduplicationis terminus apparet.
- F. F. Fornix in situ proprio super ventriculorum tertium superjacens, illumque à superioribus distinguens.
- G. G. Latus cerebri sinistrum cranio denudatum, & dura matre adhuc obvolutum.
- H. H. Cerebrum seu medulla cerebri, ut in dissectione cum terminis vasorum abscissis cernatur.
- I. I. I. Cortex cerebri ut gyris variis se in medullam insinuet.
- K. Plexus chorooides in proprio loco, ut in fundo ventriculi superioris ad osia (ut sic dicam) ventriculi tertii jaceat.
- L. L. Ventriculus tertius sub Fornice descendens vix conspicuus.
- M. M. N. Facies & nasus. M. Occiput. N.
- O. O. P. P. Ventriculi dextri latera. O. Sinus tertius in proprio situ. P. P.
- a. a. a. Vasa à meninge ad sinum tertium ducentia in dextro latere abscissa.
- b. b. b. Ubi ventriculus dexter superior versus tertium paululum inclinatur.
- c. c. c. Sinus inferior & minor Falcis.

Q 9 3 d. d. d. d. Vasa

- d. d. d. d. *Vasa sinistri lateris sinum tertium petentia.*
 e. e. *Crista galli cui annectitur Falx.*
 f. *Arteria sanguinem Plexui Choroeidi adducens Tab. XVIII. fig. 1. literis A. A. signata.*
 g. *Vena sanguinem à Plexu reducens, ad sinum quartum emandans Tab. XVIII. fig. 1. literis X. X. 1. notata.*
 h. h. h. *Vena sanguinem à substantiâ cerebri recipientes, & in plexum choroeidem exonerantes.*
 i. i. i. *Anastomoses harum venarum cum arteriis k k. quibus sanguis à plexu cerebro communicatus, in venas ut reducat emandatur.*
 k. k. k. *Arteria ab arteriis plexui oblatis, cerebro concessa.*
 m. m. *Crassities Fornicis.*
 n. n. *Cavernula in osse frontis.*
 o. o. o. *Vasa in Falce disseminata, se in sinum inferiorem exonerantia.*

FIG. V.

Ex Highm. p. 211. quæ ipsi Tabulæ xv. fig. 11.

In hac figurâ Spinalis medullæ ortum, ac Nervorum principium delineavimus.

- A. A. *Cranion.*
 B. B. *Cerebri pars sinistra usque ad basin Ventriculi tertii abscissa.*
 C. C. *Duo corpora rotunda à cerebro enata, quæ ab Anatomicis Testes nominantur, Spinali Medulla principium præbentia; quæ invicem tangentia ad anteriora capitis paulo reflectuntur, & duobus aliis à cerebello egressis unita, ventriculū illum cerebri quartum, tantis elogiis ab Anatomicis celebratum, conspiciunt.*
 D. D. *Corpora illa à cerebello prodeuntia Nates dicta cum superioribus unita.*
 E. *Spinalis Medulla adhuc intra Cranion contenta, ex quatuor hisce corporibus conflata.*
 F. *Pars Cerebri in dextro latere abscissa, usque ad Meninges, ut processus ejus C. & nervorum derivatio clarius cernatur.*
 G. *Cavitas qua Ventriculus quartus nominatur.*
 H. *Infima Ventriculi tertii sedes dextra, cui in sinistro latere respondet O. defalcata ut glandula pituitalis & infundibulum melius videantur, pars hujus anterior usque ad infundibulum auferetur, litera N. signata.*

- I. *Infundibulum in proprio situ.*
 K. *Glandula pituitalis Infundibulo annexa & in Sella propria in osse Sphenoidæ sita.*
 L. *Foramen anterius Ventriculi tertii ad Infundibulum ducens.*
 M. *Sella ossis Sphenoides.*
 N. *Pars cerebri abscissa.*
 O. *Sinistra Ventriculi tertii pars versus Infundibulum declinans.*
 P. P. *Fornix extra situm positus ut tertius Ventriculus clarius eluceat.*
 Q. Q. *Sinistra Cerebelli pars integra in suo loco.*
 R. *Dextra ejus pars abscissa.*
 S. *Os petrosum dextri lateris.*
 T. *Foramen primum ossis occipitis, per quod descendit Spina Medullaris.*
 V. *Crista Galli.*
 W. *Protuberantia ossis frontis superiorem orbitalem oculi sedem in dextro latere constituens.*
 X. *Os Cribriforme cum nervo Olfactorio. C.*
 Y. *Foramen posterius tertii Ventriculi.*
 Z. *Ductus prior à sella ad foramen secundum ossis Cuneiformis tendens. Et Ductus posterior à sella ad palatum ducens.*
 a. *Foramen quintum ossis Cuneiformis per quod arteria Carotidis ramus major in caput ascendit.*
 b. b. *Cavernula bina in osse frontis.*
 c. *Nervus olfactorius.*
 d. d. *Secundum & tertium ossis occipitis Foramen, per quod Vena Jugularis interna ramus major, & Arteria Carotidis minor cerebrum intrant, & Sextum nervorum par egreditur.*
 e. *Foramen septimum ossis Cuneiformis, Vena Jugularis interna ramo minori viam præbens, cujus vestigia in Cranio impressa semper conspiciuntur.*
 f. *Foramen Primum ejusdem ossis nervorum Opticorum egressui dicatum.*
 g. i. *Secundum & Tertium par nervorum per secundum foramen ejusdem ossis exeunt.*
 h. *Glandula Pinealis.*
 k. *Secundum Foramen ossis temporum per quod vena jugularis externa ramus transit.*
 4. *Quartum Par Nervorum.*
 5. *Quintum Par Nervorum per os Petrosum egressum.*
 6. *Sextum Nervorum Par per tertium occipitis foramen elabitur.*
 7. *Septimum Nervorum Par per quartum ejusdem ossis foramen descendens.*
 l. *Ramus minor Quinti partis nervorum ad musculos oris & temporum transmittitur.*
 m. *Surculi tertii & quarti paris nervorum.*

Fig. I.




Fig. V.




Fig. III.



Fig. IV.




Fig. II.



P A R S XXI.

De Cerebro, ejusque partibus.

Ex Anatome Cerebri Thomæ Willis.

Nova omnia sunt, eaque curiosissima, que Tractatu singulari, cui Titulus est Cerebri Anatome, nuper exhibuit Nobilissimus Thomas Willis, Anglus, dignissima que huic appendici inserantur, ast cum omnium manibus teratur hic libellus, & prolixiori stylo omnia tractentur, ne nimium excurrat hæc tractatio, ea hoc loco & tempore omittemus, que partium Cerebri usum spectant, ad Auctorem ipsum eâ in materia lectorem ablegant, contenti iis solis que earum descriptiones ac anatomen proponunt.

EX CAPITULO I.

UT Cerebri ita proprie dicti Anatome rite celebretur, haud vulgari sectionis modo procedendum esse existimo: Verum ubi *totius ἐγκεφάλου* calvaria exempti compages coram oculis sistitur, imprimis posterior Cerebri limbus, ubi Cerebello ac medullæ oblongatæ connectitur, membranis undique discissis aut avulsis, à cohæfione cum partibus subjectis (quantum fieri potest) liberetur; tunc facile constabit, quod Cerebri substantia corporibus istis haudquaquam unitur, verum per se, nisi quod membranarum nexu superficie tenus conjungitur, ab iis omnino libera ac independens fuerit: quinetiam hæc Cerebri puppis à vicinis partibus eo ritu divisa, si antè reclinetur, medullæ oblongatæ Crura, prorsus nuda, ac à Cerebro & cerebello (nisi in quibus locis hæc illi appenduntur) omnino distincta apparebunt. Porro, cum Cerebri limbus à cohæfione sua solutus elevatur, tres ventriculi, ita vulgo dicti, in *unum inane spatium* (seu vacuitatem meram è *complicatione Cerebri* resultantem) evadent. Insuper observare erit, quomodo *Cerebrum antè tantum medulle oblongatæ uniatur*; utque *binis in locis crurum* ejus velut *apicibus* affigatur; quod *fornix* ita dictus, velut *subtensa*, sive *ligamentum* fuerit, quæ antè, ubi Cerebrum appenditur, exorta, ad posteriorem ejus limbum producitur, cui duobus veluti brachiis expansis unitur, adeoque totam Cerebri compagem, ne in planum evolvatur, usque in figura sphaerica continet, eamque medullæ oblongatæ cruribus firmiter colligat. *Cerebri humani* à partium aliarum nexu divisi, ac fursum elevati, quo sc. *vacuitas* à plicatura ejus resultans, & pro ventriculis habita, item quo *fornix*, & *crura medulle oblongatæ* nuda & distincta conspiciantur, Figura in Tabula quarta representatur.

Et vero hæc Cerebri *positio* sive *aspectus*, nempe cum posterior ejus limbus, à medullæ oblongatæ cohæfione per membranas facta liberatus & elevatus, antrorsum inclinatur, totam ejus compagem, quicquid nimirum *extra* aut *intus*, sive in *fronte* aut *recessu* habet, item quæ sit illius ad alias partes *habitudo* & *respectus*, plane detegit, & ipsis oculis usurpanda exponit. Horum præcipua breviter, ac eodem ordine quo inspectioni occurrunt, subjiciam.

Cerebri

Cerebri figura, præsertim in *homine*, ad globosam five sphaericam nonnihil accedit: superficies exterior, gyris & anfractibus, qui intestinorum convolutio-nibus similes sunt, unde quaque insignitur: singuli Anfractus, imo totus ejus am-bitus, duplicem substantiam continet, sc. *corticalem*, quæ cineritii coloris & extima est, atque *medullarem*, quæ, isti substrata, subalbida apparet. Cerebrum hujusmodi Anfractibus, quasi *liris* & *sulcis* exaratum, in medio diffinditur, ac veluti in *duo Hemisphæria* dirimitur; Ultræque tamen medietates conveniunt, & quasi fundantur in substantia similari albißima, quæ totam Cerebri molem interius obducit, ac quasi concamerat. Hæc durior quam alia quævis Cerebri portio existit; cumque omnino medullaris fuerit, omnes omnium Anfractuum medullas in se recipit, iisque baseos communis loco est. In utroque Cerebri Hemisphærio, circa partes anteriores, hoc *corpus callosum*, five substantia medullaris, supra quam in alio quovis loco longe crassior & spissior evadit; atque ibidem medullæ oblongatæ apicibus utrobique affigitur: ab istis Apicibus, tanquam ortu suo, medullaris hæc substantia Cerebrum obducens, & concamerans versus posteriora expanditur, ac sensim in crassitie minuitur: demum hujus expansi limbus exterior arctius contrahitur, ac inferius medullæ oblongatæ caudici (uti modo innuitur) membranarum & vasorum nexu conjungitur. Porro firmioris connexionis gratia, ab anteriore callosi partes juxta ipsius apices, processus medullaris exoritur, qui Cerebri fissuram subtendens, ad limbum ejus pertingit; cui velut brachiis utrinque reflexis unitur: quæ quidem brachia medullæ oblongatæ caudicem amplectuntur, adeoque istum Cerebri limbum ei firmius annectunt.

Iste medullaris processus, vulgo *Fornix* dictus, sub exortu suo *duas* habet *radices albas* & *medullares*, utrasque pariter prodeuntes è corpore calloso, quæ juxta apices, ubi cerebrum appenditur, coeuntes, in ipsum *fornicem* velut processum latum transeunt, qui Cerebri cameram tanquam trabes subtendit. Sub duplici hac fornicis radice transversim sternitur, ejusdem magnitudinis, truncus medullaris, per quem, pontis instar, transitus & communicatio quædam existit inter duos processus lentiformes, corporaque striata in iisdem radiantia. Porro è media hujus *fornicis* superficie *septum tenue & pellucidum* erigitur, quod toto fere ductu corporis callosi lacunari affigitur. Atque hac ratione, dum *fornix trilaterus* cameram ex Cerebri complicatione ortam subtendit, cavitatem ejus aparentem in *tres veluti partitiones* distinguit, adeoque efficit ut in ipso tres ventriculi repræsententur.

Interiores Cerebri recessus adhuc clarius patebunt, si limbus ejus à medullæ oblongatæ cohæsiōne, quantum fieri potest, ex omni parte separatus & elevatus, ad latera ejusdem medullæ, quibus juxta corpora striata unitur, paulo ulterius per substantiam suam secetur, simulque fornix juxta radices discissus una cum Cerebro reflectatur; tunc enim *Cerebri compages* penitus *elevari*, antrorsum reflecti, ac in planum explicari poterit, ita ut corporis callosi in aream latam expansi interior superficies tota conspici & tractari possit. Ubi, præter medullarem & nitidissimam illius substantiam, observare est *plures lineas albas parallelas*,

quæ cerebri dissepimentum rectis angulis serant; quasi essent *tractus* quidam, sive *vestigia*, in quibus spiritus animales ab uno Cerebri hemisphætio in alterum migrant, resiliuntque.

Ad hunc modum in plerisque quadrupedibus perfectis *Cerebri compages*, veluti *sphæra in planum projecta, evolvi*, ejusque interior superficies in latum explicari solet. Hujusmodi item dissectionis methodus in *Cerebro humano* locum habet, ubi prorsus eadem phænomena observationi Anatomicæ occurrunt. Præcipua discriminis ratio est, quod in *Homine* Cerebri moles, siquidem præmagna, item longe crassior & pluribus anfractibus prædita fuerit; ideo non ita facile uti in *Vitulo* aut *Ove* penitus inverti, ac in latam aream reduci queat: Eousque tamen juxta limbum elevari & expandi potest, ut interiores quivis recessus in conspectum veniant. Cerebri *humani reclinati* Imaginem Figura tertia & quarta exhibent: Cerebri autem *Ovini* penitus explicati ac veluti in planum projecti aspectus in Tabula septima ostenditur.

In *quadrupedibus minoribus, uti, Mure, Lepore, Cuniculo*, & quibusdam aliis, Cerebri superficies omnino plana & æquabilis, anfractibus caret; tamen à limbi complicatione & fornix subensione, cavitas, ventriculos repræsentans, resultat.

Postquam omnia quæ ad Cerebrum spectant, ordine quo dictum est, perstravimus, utrumque ejus Hemisphærium corpore calloso intus obductum, qua appensum est, à medullæ oblongatæ apicibus dividatur & amoveatur; quod quidem exacte fiat, secando prope latera *prominentiarum lentiformium*, quæ in vulgari Capitis dissectione intra ventriculos anteriores reperiuntur: sunt enim istæ *prominentiæ crurum medullæ oblongatæ* summitates sive *apices*, quibus corpus callosum immediate affigitur. Quando Cerebrum eo ritu discinditur, prominentiæ, quæ medullæ oblongatæ crurum apices sunt, nudæ relinquuntur, ista per longum in medio secantur (nimirum in parte medullari ubi corpori calloso conjungebantur) atque interior earum substantia per totum *striata* apparebit; sc. *stria medullares* prorsum & retrorsum ascendere & descendere videntur; ne quis dubitet, quin istæ *stria* velut *ductus* sive *canales* facti à natura fuerint, pro *spirituum* è corpore calloso in medullam oblongatam, & è contra, ita redituque. Medullæ oblongatæ crurum à Cerebro divisorum, cum apicibus suis, qui nempe sunt corpora striata, Figura in Tabula octava exprimitur.

Post hæc corpora striata medullæ oblongatæ crura aliquanto spatio divisa pergunt, dein unita in eundem caudicem, è binis veluti caulibus conflatum, coeunt. Medullæ autem oblongatæ caudex in toto ejus tractu, sc. ante, & post crurum ejus coalitionem, plures habet *processus, appendices, prominentias*, & *vasorum insertiones*, quarum aliquæ ex uno latere, & aliæ ex altero emergunt, ipsumque variis productionibus & protuberantiis inæqualem reddunt; de quibus in sequenti.

CAPUT II.

*Medulla oblongata, & cetera posteriores τὸ Ἑγκεφάλῳ partes recensentur;
earumque dissectio traditur.*

Postquam igitur utrasque meninges, & vasorum in iisdem ramificationes, nec non Cerebri, ita proprie dicti, fabricam, descripsimus; tum exteriorem ejus limbum circa medulla oblongata crura in plicas collectum, & utrumque ipsius meditullium corporibus striatis appensum ostendimus; jam reliquas τὸ Ἑγκεφάλῳ partes ordine prosequamur.

Corpora striata, seu medullæ oblongatæ apices, sunt due prominentie lentiformes, quæ intra priores Cerebri ventriculos, vulgo dictos, conspiciuntur; harum capita, quæ ampliora & magis obtusa sunt, ad se mutuo inclinantur, & fere contigua sunt: ex hujus inclinationis angulo fornix gemina radice oritur, quibus subjicitur, & striata hæc corpora simul connectere videtur transversarius quidam processus medullaris, prout videre est in Tabula septima, G. G. at eorundem corporum extremitates, acutiores factæ, extrorsum reflectuntur, & trianguli acuti bina quasi latera efficiunt; quorum superficiei anteriori corporis callosi meditullia longo tractu cohærent; ubi, si hæc corpora per medium & in longum secentur, striæ medullares (prout supra dictum erat) illico apparebunt. Horum figura & situs, item striæ medullares, in Tabula octava apte repræsentantur.

Ubi corpora striata desinunt, proximam medullæ oblongatæ partem occupant nervorum Opticorum Thalami appellati; nempe hic loci crura ejus in protuberantias inæquales assurgunt, è quorum jugis nervi optici oriuntur, & illinc antrorsum ambitu quodam deflexi, circa basin ejusdem medullæ coeunt, ac uniri videntur; mox iterum sejuncti, & versus oculi orbitam pergentes, calvaria egrediuntur. Medulla oblongatæ crura hic loci in homine ut plurimum sunt prorsus distincta, & ab invicem dehiscencia, aperturam declivem, quæ ad infundibulum transitus est, relinquunt; verum in quadrupedibus plerisque, ejusdem caudicis medullaris crura illic tantum inferius sunt distincta & rimam pro infundibulo incisam habent: ast illorum juga in quibus nervi optici origines latent, aliquatenus conjunguntur, & per uncia semissis spacium coalescunt: quare in brutis foramen unum ante hunc coalitum, & aliud pone eundem consistit, quæ ambo versus infundibulum ducunt. Hujus discriminis ratio est, quod in homine, si quidem ipsius Cerebri compages perampla, ejusque meditullia ab invicem remota existunt; crura ejus, quo melius iisdem medullæ oblongatæ apices adaptentur, sejungi & à mutuo contactu in majorem aperturam deflecti oportuit. Hinc observare est, quod in homine Crura medullæ oblongatæ, à Cerebri appensione, majori inclinationis angulo, ac ambitu quodam deflexa prodeunt; verum in brutis eadem fere parallela jacent. Quo ritu hæc partes in Cerebro humano conformantur, Figura tertia item & quarta exhibet; quo ritu in quadrupedibus habent, in figura septima ostenditur.

Ab iisdem Crurum medullarium jugis, unde Nervi optici origines desumunt,

processus quidam medullares exorti, & utrinque supra foraminis secundi marginem delati, juxta radicem *glandule pinealis* una coeunt. *Hi processus* (uti videtur) sunt partes istæ, quas insignissimus *Cartesius* supposuit esse *nervos ad glandulam pinealem* pertinentes: quin potius suspicor has tantum productiones esse, quibuscum nervi optici, etiam juxta origines suas, communicant. Harum figura in *Tabula septima* satis apte describitur.

Post *Thalamos nervorum opticorum*, adhuc aliæ protuberantiæ insignes, vulgo *Nates & Testes* dictæ, superiori *caudicis medullaris* parti accrescunt, & superficiem ejus, circiter uncia spatium, obtegunt; cui tamen cum in medio non sint contiguæ, iis toto ipsarum tractu cavitas quædam subjicitur. *Hæ protuberantiæ* sunt minores in *homine*, item in *canē & fele*; denique, si recte observavimus, in cæteris animalibus, quæ recens edita, ad victum quærendum impotentia & minime instructa sunt. In *vitulo, ove, porco*, & similibus, longe majores apparent; in *piscibus & volucris* omnino defunt.

Numero sunt quatuor; scil. utrique medullæ oblongatæ lateri *binæ* adnascuntur: *priores, Nates* dictæ, sunt majores, & principales videntur; quibus *aliæ* posteriores, *Testes* dictæ, illarum velut *epiphyfes* appenduntur. Quoad *Figuram, orbiculares* sunt, & vulgo habentur pro *Cerebri & Cerebelli*, juxta confitorium, binis utrinque cruribus, quæ scil. incurvata & versus se invicem reflexa, una coalescere, adeoque medullam oblongatam constituere dicuntur. Verum hæc opinio, uti postea fufius ostendetur, dissectione ad nostram methodum instituta, plane concidit: Nam liquido constabit, *Cerebrum* longe ante hæc corpora medullæ oblongatæ affigi; neque inter hæc & istud commercia quævis, nisi valde remota, intercedere.

At vero si partium harum situs, earumque ad corpora vicina respectus & habitudines probe adnotentur, plane liquebit, ipsas velut regionem quandam peculiarem constituere, à *Cerebro & Cerebello*, etiam ab ipsa *medulla oblongata*, prorsus distinctam. Earum situs ab anterioribus satis remotus est, satisque à medullari caudice, per cavitatem seu ventriculū subiectum, seponuntur: quinimo *via propria*, sive processus *unus* è medulla oblongata in has prominentias ducere, atque *alius* ab iisdem *abducere*, & illinc in *Cerebellum* deferri videtur. Hinc suspicari licet quod prominentiæ istæ (præsertim *Natifformes*, quæ principales sunt) *diverticula* quædam fuerint, in quæ spiritus animales à *medulla oblongata* in *Cerebellum*, & vice versa, ab *hoc* in *illam* derivandi, secedant, ibidemque propter usum quosdam animales (de quibus postea dicemus) commorentur. Quoad *viam*, qua ex medulla oblongata in has prominentias ducitur, manifestum est, quod infra nervorum opticorum origines, utrinque processus medullaris, cum villis sibi propriis, descendit, qui in prominentias prædictas terminatur. Dein si ex his *exitum* quæras, æque clarum est, è prominentiis posterioribus, qui testes dicuntur, utrinque *processum medullarem* oblique ascendere, qui in *Cerebellum* delatus, per totam ejus compagem divaricatur. Quod vero prominentiæ *Natifformes* sint principales, & *Testes* illarum *epiphyes*, sive processuum medullarium, qui exinde in *Cerebellum* feruntur, capita, quibus isti

isti diverticulis primariis adjunguntur; manifesto apparet in *Ove*, *Vitulo*, *Equo*, & quibusdam aliis, ubi cum *Nates* sint magnitudinis insignis, iis *Testes* perexiguæ molis adnascuntur; atque his plane intermediis, *processus medullares* prominentiarum priorum appendices existunt. Prominentiæ prædictæ, una ac *processus medullares*, qui versus ipsas ducunt, abducuntque, apte repræsentantur in *Tabula quarta*, adhuc clarius in *Tabula octava*, t. t. P. P.

Porro quoniam spiritus animales, in utroque promptuario & appendice refides, priusquam Cerebello inferuntur, invicem confundi & commisceri debent, idcirco *pares* utriusque lateris *prominentiæ*, velut alis ad invicem exporrectis, mutuo coalescunt; quatenus vero coalitus istos à medulla oblongata distingui oportuit, ideo cavitas intercedit, quæ à quibusdam *ventriculus quartus*, ab aliis *transitus ad illum*, habetur. Hæ *prominentiæ* in *Homine*, *Cane*, & *Fele*, & quibusdam aliis animalibus, (uti supra innuitur) perexiguæ sunt, & fere æquales; item, uti reliqua portio medullæ oblongatæ, albidæ coloris apparent. In *Vitulo*, *Ove*, *Equo*, & plerisque aliis quadrupedibus, protuberantiæ priores, vulgo *Nates* dictæ, insigniter magnæ sunt, item exterius carnei coloris esse apparent, quia tenui meninge, quæ plures venas & arterias in se continet, investiuntur; quæ si separetur, interior illarum partium substantia sublutei coloris existit, qualis præterea non est in tota medulla oblongata. Attamen plane constat, quod sicuti in brutis, ita in homine *prominentiæ posteriores priorum epiphyses* sunt, quodque ab his *epiphysibus processus medullares* in *Cerebellum* oblique *ascendunt*; juxta quos alii *processus* istos interfecantes, *recta à Cerebello descendunt*, qui Caudici medullari haud inferi videntur, ast eum circumambientes, *protuberantiam annularem* constituunt. Hæc annularis protuberantia major est in *Homine* quam in alio quovis animali. Porro observare est, quod ubicunque *prominentia superior Natiformis* amplior existit, hæc *inferior annularis perexigua* est; & è contra. Porro, isti *processus medullares*, versus *Cerebellum* ascendentes, per *processum* alterum *medullarem transversum*, inter se mutuo communicant; & è processu hoc transverso duo exiles nervuli oriuntur, *quartum Par* eorum quos supra recensuimus, quique à nobis *pathetici* appellantur. Singula horum figuris idoneis delineata *Tabula septima* satis clare exhibet.

Non procul à prominentiis prædictis, nempe inter has & rimam quæ *Anus* vocatur, *Glandula pinealis* collocatur. Hæc in convalli posita est, quæ protuberantias *Natiformes*, atque illas quæ nervorum opticorum *Thalami* sunt, interjacet, ubi loci glandula ista, modo per plures fibras exiles, ac interdum per duas radices medullares insignes, parti subjunctæ affigitur; atque insuper membrana, quæ piæ matris portio est, velut in capsula includitur; cumque hæc membrana pluribus arteriis & venis refertur, etiam vasa quædam exilia hanc glandulam subeunt.

Subter prominentias modo descriptas (prout supra innuimus) *cavitas angusta* seu *ventriculus* longo ductu protenditur, qui licet usus quosdam egregios obtineat, tamen ipse secundario & velut casu tantum existere videtur; in quantum scil. utriusque prominentiæ *processus* inter se *conjugi*, & à substrato medullari

Caudice *distingui* oportuit. In ventriculum hunc duo patent foramina, quorum *unum* in principio, & *aliud* in fine ejus consistit; perque medium ejus ductum *apertura declivis* versus infundibulum tendit; ita ut humor serosus alterutrum foramen subiens, protinus ad infundibulum dilabatur. Porro, in eandem infundibuli aperturam *transitus alius*, nempe per foramen primum, quod prope fornicis radices constitutum est, patescit; ita ut ab omni *ἐγκεφάλῳ* plaga, serositates in cloacam istam ferantur: nempe per foramen primum è *Cerebri plicatura*, seu ventriculis anterioribus; per *secundum foramen*, humores qui circa *prominentias orbiculares* aggregantur, decidunt; atque per *tertium foramen*, qui juxta *Cerebelli confinia* deponuntur, exitum inveniunt. Singula hæc foramina, cum distinctis ad infundibulum viis, in *Tabula septima* plane adumbrantur. H. M. T.

Supra glandulam pinealem, velut supra fibulam, *plexus choroeides* suspendi videtur: iste autem *plexus* ad hunc modum constituitur: ex utroque medullæ oblongatæ latere, qua Cerebri limbus ei connectitur, *duæ arteriæ* è posterioribus carotidum ramis, ubi vertebralibus uniuntur, oriundæ, recta ascendunt; quæ statim divisæ, velut plures rivuli juxta confiti, versus glandulam pinealem evehuntur, ibidemque mutuo occurſu terminari videntur; atque illic loci, è sinu quarto super glandulam pinealem dimissò, *sirculi venosi* utrinque prodeunt, qui, pariter in filamenta divisi, *arteriis capillaribus* obviam fiunt, inque illas pluribus in locis *inofculantur*, & varie *complicantur*; adeoque hæc vasa, inter se plurimum irretita, & glandulis interſerta, plexus admirandos constituunt: cujusmodi vasorum plexus, duabus veluti alis expansis, utrinque super crura medullæ oblongatæ, usque ad corpora striata protenduntur; attamen iis fere tantum superficietenus incumbunt, neque ullis vasorum insertionibus, aut medullæ oblongatæ, aut corpori calloſo, firmitus affiguntur; adeo ut sanguis in hæc loca, nullo affluxu ejus in partes subiectas factò, solummodo adduci abdu-cique videatur; propter quos usus infra dicetur. *Plexus choroeides cum glandula pineali*, in *Tabula septima* delineantur, G, F. E.

Atque hætenus de phænomenis supra medullam oblongatam, inter corpora striata & Cerebellum repertis, quæ quidem, tum in homine tum in quadrupedibus, nisi quod in magnitudine solum differant, fere simili modo constanter habent. Intra hoc spatium, in basi ejusdem medullæ, plura notatu digna occurrunt: nam præter vasorum quæ supra recensuimus abscissorum fines, *infundibuli situs & structura* considerationem merentur: Nam pone utriusque nervi optici coalitionem, inter crura medullæ oblongatæ ibi dehiscencia, receptaculum velut tubulatum, membrana tenui, à pia matre orta, extus obductum, atque intus medullari substantia munitum, dimittitur: hujus orificium superius inter crura medullæ oblongatæ constitutum est, eorumque aperturam declivem excipit; exinde tubus brevis dimissus *glandule pituitariæ* inferitur. Vidimus hunc tubum, in Cerebro equino, penna anserina majorem, item pellucidum & aqua limpida repletum; ut minime dubitandum fuerit, quin serosi humores hac via, de Cerebro in *glandulam pituitariam* dilabantur: quo tamen humores isti illinc

ablegantur, postea inquiretur; quippe, quod vulgo creditur, in palatum minime feruntur.

Juxta inferiorem infundibuli oram, in *homine* *duæ glandulæ* candicantes subsistunt, licet in *brutis* tantum *unica*, quæ tamen major est, reperitur. Quis proprius sit partis illius usus, posthac dicetur: interim siue gemina, siue unica tantum amplior fuerit, videtur quasi *aggeris* loco esse, & tenuem infundibuli membranam, ne disrumpatur, aut loco suo extrudatur, suffulcire: ex altero latere nervorum opti-
corum coalitus ejusmodi suffulcimenti vicem præstat.

Quod præterea in hoc spatio continetur, fere tantum sunt ipsius *medulla oblongata crura*, quæ à Thalamis nervorum opti-
corum, versus occipitium ductu recto procedunt; cumque infra infundibulum ambo coalescunt, postea toto illorum tractu, linea per medium ducta, distinguuntur. *Hæc crura homini* longe ampliora sunt quam *brutis* animalibus: nimirum in isto, pluribus velut chordis medullaribus una conjunctis constare videntur; quasi in communi hoc spirituum animalium ductu, & *via regia*, totidem essent *distinctæ orbitæ*, quas spiritus, juxta varios *sensus & motus localis* impulsus, respective subeunt. Porro, hoc spatium medullæ oblongatæ ideo brevius & curtius in homine apparet, quia multum ejus à *protuberantia annulari*, quæ à Cerebello dimittitur, & præmagna existit, occultatur. Hujus Caudicis medullaris latera, pia mater undequaque obducens, confertissimis vasorum plexibus investit; quibus nempe calor & succus nervosus, spiritibus longe iter instituentibus, velut continuum vectigal, advehuntur. Hæc de *priori medulla oblongatæ sectione*, siue portione ejus anteriori: jam proxime inspectionis ordo nos ducit ad *posticam* ejus *regionem*, cui nempe *Cerebellum* adnascitur; & *processus* ab hoc dimissi aut Caudicem ejus *circumdant*, aut eidem *inseruntur*; item è qua *ceteri nervi*, intra Cranium producti, origines desumunt; super his deinceps ordine dicemus.

C A P U T III.

Cerebelli & processuum ejus, nec non posticæ medullæ oblongatæ regionis, descriptio.

INfra prominentias orbiculares *Cerebellum* inspiciendum succedit. Hujus *Figura*, instar Cerebri, nonnihil *globosa*, etiam *gyris & anfractibus* quibusdam insignita, inæqualis apparet; quorum anfractuum & liras & sulcos pia mater ob-
tendit, eorum summitates colligat, & hiatus profundos obducit, iisque omnibus vasorum plexus exporrigit, eosque altius inserit. Attamen *Cerebellum gyris & convolutionibus* suis, haud uti *Cerebrum* incerto modo variegatur; verum *plicæ* ejus serie quadam ordinata disponuntur; namque exterior illius compages, *lamellis*, siue *circellis* invicem contiguis & complicatis, nec non situ parallelo per totum ambitum circumeuntibus, constare videtur.

Utraque *Cerebelli* regio, nimirum *anterior & postica*, in *processum vermiformem* terminatur: juxta hos terminos, velut in *gemino polo*, *circelli* isti sunt *brevissimi*; exinde versus summitatem, velut *Aequatorem*, ascendendo, isti, velut *paralleli*
in

in *sphæra*, sensim ampliuntur. Hi *Circelli* extus *corticales* & intus *medullares* existunt, atque omnes omnium *medulla* in bina ampla *meditullia* transeunt; quæ quidem in *Cerebello* eadem esse videntur ac *corpus callosum* in *Cerebro*.

Cerebellum in quibusdam animalibus *unica* compage constat, ejusque omnes *circelli*, eodem situ parallelo confiti, eandem inter se proportionem servant; in aliis vero, *Cerebello* velut *sphæra primaria* & circulis majoribus præditæ, corpora quædam alia, quasi *tubera* seu *epistheria* *circellis* minoribus insignita, adnascuntur: hæc ipsi *Cerebello* eccentrica, sæpe plicas sive lamellas, serie diversa ab eo ordinatas, habent.

Cerebellum autem (seu ipsi accreverint tubercula prædicta, seu defuerint) ipsum, in quibusvis fere animalibus, ejusdem figuræ & proportionis, nec non ex ejusmodi lamellis conflatum, reperitur. Quæ *Cerebrum* diversimode ab homine configuratum habent, uti *volucres* & *pisces*, item inter quadrupedes *cuniculi* & *mures*, quorum *Cerebragyrus* seu convolutionibus carent, his *Cerebelli* species eadem, similis plicarum dispositio, & partium cæterarum composituræ existunt. Hujusmodi *discriminis* in *Cerebro*, & *conformitatis* in *Cerebello*, ratio inferius reddetur, cum de usu partium disseremus.

Prout *Cerebrum* intra cavitatem suam *plexum choroeiden*, ex arteriis & venis varie complicatis, & glandulis densissime interfertis conflatum habet; ita & *Cerebellum* similes vasorum plexus, eosque glandulis plurimis, & majoribus quam sunt in plexu choroeideo, insignes, obtinet. Hi *plexus* & *glandularum acervus*, separata pia matre, quæ posteriorem *Cerebelli* partem investit, facile in conspectum venient; nam illic loci, utrinque juxta processum vermiformem, duobus velut ramis, hi sursum repunt; *arteriam* utrobique ab arteria vertebrali, *medullæ oblongatæ* basi substrata, atque *ductus venosos* ab utroque *sinu laterali* emissos accipiunt. In hujusce *plexus* & *glandularum* ejus usum, posthac inquiremus.

Interim ut *Cerebelli situm* & *appensionem* describamus; idem *medulla oblongatæ* insistens, lateribus ejus per *duos pedunculos* affigi videtur; inter quos ex utroque latere confitos atque *Cerebellum supra*, & *medullæ oblongatæ caudicem infra*, collocatum, (quoniam hæc omnia ab invicem distincta esse debent) *cavitas* intercedit, quæ *ventriculus quartus* vulgo appellatur.

In utroque *pedunculo* *Cerebrum* sustentante, *tres* distincti *processus medullares* reperiuntur. Horum *primus* à protuberantiis orbicularibus emissus, oblique ascendit; *secundus* recta à *Cerebello* descendens, & per priorem decussatim transiens, *medullam oblongatam* circumdat; *tertius* processus è postica *Cerebelli* regione descendens, *medullæ oblongatæ* inferitur, ejusque *Truncum*, velut *chorda adscititia* exauget. Singuli hi processus in *Tabula septima*, Q. P. R. apte repræsentantur.

Quod vero spectat ad *Protuberantiam annularem* qua *Truncus medullaris*, tum in homine, tum in quadrupedibus quibusvis, cingitur, ista ad hunc modum efformatur. *Secundus* sive *medius Cerebelli processus*, recta ad *medullam oblongatam* descendens, quamprimum hujus latera attingit, non statim iisdem implantari videtur, verum in molem ampliorem succrescens, diversis, nempe circularibus

fibris,

fibris, ejusdem medullæ superficiem ambit: Cumque adeò in utroque latere, istiusmodi ambo Cerebelli processus, à summitate Caudicis medullaris versus basin ejus delati, mutuo occurrunt, *circularem istam protuberantiam efficiunt.* Hujus compages longe amplior est in homine quam in alio quovis animali; in *le-pore, cuniculo, mure*, & similibus perexigua est; in *volucris* aut omnino deest, aut præ tenuitate ejus vix oculis conspicuus est. Circa hujus molem hæc constans observatio est; *Quibus prominentiæ orbiculares ante Cerebellum sunt minima, hæc annularis protuberantia maxima existit;* & è contra quibus *prominentia ista majores, aut maximæ existunt, hic annulus perexiguus est;* porro in quibus *protuberantia natiformes omnino desunt* uti in *volucris*, etiam hæc annularis desiderari videtur.

In plerisque brutis animalibus, non item in homine, juxta hanc *protuberantiam majorem paulo inferius, alia minor, pariter circularis, ac medullæ oblongatæ superficiem circumambiens, consistit;* cujus radix est *linea alba* & medullaris, sub Cerebello, supra fundum quarti ventriculi protensa. E lateribus hujus *minoris protuberantiæ, nervi auditorii* exoriuntur: in homine, nervi auditorii è margine extrema protuberantiæ majoris oriri visi, pariter pro radice sua *lineam albam medullarem* ventriculo quarro obductam habent.

Ut hæc *linea* & *tres distincti processus medullares*, qui utrumque Cerebelli pedunculum constituunt, conspectui planius exhibeantur, item quo intima Cerebelli compages perlustrari queat, totum ejus globum, per utrumque palum, sc. per processus vermiformes in medio secare oportet; tunc plane constabit quod in *utroque hemisphærio meditullium amplum consistit*, in quo rami medullares, velut arboris cujusdam quaquaversus expansi, corticalem Cerebelli substantiam ubi-vis diffusam oblinunt; quodque *utrique meditullio, distincti processus* qui utrumque Cerebelli Caudicem seu pedunculum efficiunt, inseruntur. Singula horum in *Tabula septima* apte repræsentantur.

Hæc de Cerebello, & qua ratione medullæ oblongatæ appenditur. Porro super his observare est, quod circa imam medullæ oblongatæ basin, ex annullo majore *duæ velut chordæ medullares* prodeunt, quæ à reliquo medullari Trunco distinctæ, versus medullam spinalem recta pergunt, ac in processu suo sensim angustiores factæ *pyramidum* instar, post uncia circiter spacium in cuspides acutas desinunt. Harum extremitates, è regione qua origines vagi nervorum Paris habentur, consistunt, & in medulla oblongata intumescuntiam quandam faciunt. Hinc verisimile est, quod hæ chordæ spirituum animalium ductus, sive canales fuerint, in quibus isti ab annulo majore, seu, quod idem est, à Cerebello, in Par vagum, aliorumque nervorum origines juxta consitas, perducuntur; in quem finem inferius dicetur. Hæc *corpora pyramidalia*, quamdiu eadem pia mater investit, & vasorum plexibus obducit, non ita manifesta apparent; verum membrana isthac avulsa, adeo conspicua sunt, præsertim in *homine & cane*, ut velut *nervi majores* videantur. In quibus animalibus protuberantia annularis paulo major est, processus ab eadem ad rectos angulos producti, ampliores conspectioresque existunt; & è contra in *volucris* plane desunt.

Circa hanc posticam τῆ ἐγκεφάλου regionem, haud multa præterea, exceptis vasorum productionibus, notatu digna occurrunt. Sunt autem vasa quæ præcipue ad has partes spectant, *posteriora sex nervorum Paria*, intra cranium oriunda, & *arterie vertebrales*. Priorum origines aliquatenus supra descripsimus; quæ ad pleniores eorum Theorias spectant, proprio loco tractanda reservamus. Quoad *arterias vertebrales*, istæ circa extremum medullæ oblongatæ, jam in spinalem cessuræ, finem, ad latera ejus pertingunt. De his sub finem operis plenius.

Hæc sunt *Phænomena*, quæ tota Cerebri, ejusque appendicis compages, quoad fabricam, partesque & processus omnes, qui tum intus, tum extra reperiuntur, inspectioni Anatomicæ exhibere solet. De singulorum actionibus & usu disquirere, ut opus arduum & plenum alea, ita res est tanta cum utilitate & voluptate conjuncta, ut ausim mihi aliisque operæ etiam maximæ pretium polliceri. Prius tamen quam hæc aggredior, nonnulla in quibusdam Cranii ossibus recondita, uti imprimis sunt *glandula pituitaria*, *rete mirabile*, & quædam alia, explicanda restant; item Cerebri in volucris & piscibus, saltem brevis hypotyposis præmitti debet.

CAPUT IV.

Calvarie sepositæ partes, & contenta quædam explicantur.

NON est nostri instituti, sed neque opus erit, singulorum Cranii ossium figuras & situs delineare, aut varia illorum *foramina* (quæ vasorum truncos, veluti machinæ horologicæ pensilia, transmittunt) describere. Hæc omnia vulgo satis innotescunt; ut hujusmodi *Osteologiam* instituere, esset jam satis superque actum agere. Porro item quo ritu *nervi* intra Cranium oriundi, cum ramificationibus suis, ossium claustra & cavernas subeunt, inferius speciatim tradetur. Quare in præsentiarum hoc nobis solum negotii incumbit, ut quædam circa *vasa sanguifera*, *Os cuneiforme pertranscurrentia*, præcipue observatu digna, nec ab aliis satis animadversa, annotemus.

Inter varios usus & officiorum munera, quæ *Os cuneiforme* Cerebro ac appendici ejus præstat, haud minimæ notæ aut momenti est, quod *arterias carotidas*, non sine apparatu quodam mechanico, transmittat; quodque in media, qua illis transeundum est, via, *glandulam pituitariam*, ac interdum *rete mirabile*, contineat. Horum singula considerationem merentur; eo magis, quoniam in diversis animalibus sese diversimode habent, & de illorum fabrica atque usu inter Medicos valde controvertitur. Imprimis autem de *Glandula pituitaria* dicemus; quoniam hæc pars superius collocata, inspectioni Anatomicæ ante alias obversatur.

Glandula pituitaria intra sellam propriam, in medio ossis cuneiformis excavatam, reconditur, in arca modo strictius, modo laxius inclusa: Nam in *cane, fele*, & quibusdam aliis animalibus, infundibulo cohærens, cum eo amoto una dividitur; & tunc moles ejus glandulis duabus, inter se distinctis, & facile ab invicem separabilibus, constat. Verum in *vitulo, ove, porco*, & multis aliis, ex omni parte,

parte, nisi qua infundibulum admittit, dura meninge investitur, ejusque obductione, intra ossis cavitatem arcte concluditur. Insuper in his, compages ejus unica & individua videtur, licet revera, è substantia, quæ duplicis generis est, conflatur.

Hæc *Glandula* in cunctis animalibus perfectis reperitur; ea namque *homo*, *quadrupedes* omnes, imo *volucres* & *pisces* instruuntur: unde ipsam necessarios quosdam usus in Cerebro habere concludimus. Attamen quoad *quantitatem* ejus, in diversis animalibus, ad Capitis aut corporis cui inest magnitudinem, varia est proportio; quippe in *agno* major est quam in *homine* aut *cane*; item moles ejus in *equo* minor est quam in *bove*. Verum hujusce discriminis ratio in eo potissimum consistere videtur, quod *glandula pituitaria* in aliquibus, solummodo superimpositam *Cerebri* molem, atque in aliis, & *Cerebrum*, & *arterias carotidas*, juxta illam ascendentes, respiciat; adeoque prout simul utrique horum, aut tantum alteri respectum debet, ejus moles aut major, aut minor existit. Enimvero in quibusdam animalibus, *arteriæ Carotides* intra cranium delatæ, statim in *plexus retiformes* divaricantur, & à plexibus istis, plures utrobique vasorum propagines hanc glandulam subeunt, ejusque substantiam intertexunt. Porro quoniam iste vasorum plexus, *Rete mirabile* dictus, in aliquibus valde amplus, & in aliis perexiguus reperitur; idcirco hæc *Glandula*, siquidem ab his pauciores ramos, & ab istis longe plures, atque in aliis quibusdam animalibus, ab arteriis vix ulla propagines admittit, diversæ huic vasorum distributioni, molis suæ variata proportionem respondet. Quippe observare est, quibusdam animalibus, uti imprimis *Homini* & *Equo*, *Rete mirabile* omnino deesse; cumque in talibus, utraque arteria longa ambage intra hujusce ossis recessus circumducitur; à trunco ejus in *homine* modo furculus unus, aut alter, modo nullus, in glandulam pituitariam infertur; etiam in *Equo* pauciores ramuli eam subeunt; ideoque moles ejus in his diminutior evadit.

Verum in aliis plerisque animalibus (præsertim quibus *rete mirabile* adest) multa vasa sanguifera hanc *Glandulam* subire, præter *autopsiæ*, etiam hoc experimento probari potest: Si enim liquor atratus carotidi per syringam injiciatur, *Glandulæ* pars exterior & vasis sanguineis intertexta, colore nigro plurimum inficietur. Quapropter hanc *Glandulam humores* in se recipere, nempe in omni animalium genere ab *infundibulo*, & in nonnullis à *carotidum ramis* influentes, extra dubium haberi debet. Quo tamen isti humores denuo ablegentur, non ita plane constat; ipsos enim per ossis subjecti foramina in palatum desidere omnino falsum esse, cum Doctissimo *Schneidero* asserimus. Interea tamen, foramina isthæc, haud tantum propter levitatem ossi conciliandam fabrefacta esse censemus; quippe in iis animalibus quæ majorem habent *glandulam pituitariam*, plura etiam & majora ei subsunt foramina; porro intra foramina ista, vasa sive canales contineri sæpius deprehendi: cumque in *vitulo*, intra ossis ejusdem majus foramen atramentum injicerem, liquor atratus illico *venas minores* ossi subjectas, ac denuo *venam jugularem* subibat. Atque ex hoc potissimum experimento, de *Glandulæ* hujus officio & munere conjecturam facimus;

de quo posthac explicatius dicemus, cum in hujus ac infundibuli usum inquiramus.

Juxta utrumque *glandula pituitariae* latus, si *dura meninx* aperiatur, *Arteria Carotis*, ad unciae circiter longitudinem, super os cuneiforme exporrecta jacet: cum enim hæc *arteria*, infra *sellam Turcicam*, modo propius, modo posterius, intra cranium emergit; eadem mox à primo ascensu intorta, sub dura matre incedit, donec ad anteriorem ejusdem *sellæ* oram pervenitur; ubi denuo intorta, ac cum ambitu quodam sursum emissâ, duram meningem perforat, & recta versus Cerebrum evehitur. Adeo hoc vas *duplici suo ascensu & curvatura*, (nempe supra *cranii basin*, & dein supra *duram meningem*, una cum situ subter eandem, in longum porrecto) literam ~ inversam in plerisque refert. Verum in *homine* (uti posthac fusius ostendetur) *situs* ejus, ob *longiorem vasis protractum & magis sinuosam curvaturam*, eadem Litera ad hunc modum duplicata ~~ repræsentatur.

Arteria Carotis in cunctis animalibus oblique intra cranium ascendit; verum quoad situm, sive protensionem ejus, juxta glandulam pituitariam, non eodem modo se habet in omnibus: nam in *Homine* canalem osseum, propter ipsam, peculiariter exsculptum, trunco singulari pertransiens, utrobique per longum exporrecta jacet; atque ex hoc trunco, interdum furculos quosdam ad glandulam pituitariam, licet haud semper, emittit. Item in *Equo*, truncus ejus singularis est; verum ubi primum intra cranium emergit, per *ramum transversum* ab uno latere in alterum emissum, *utraq; Carotides*, priusquam duram matrem perforant, inter se *communicant*, cumque in cæteris plerisque animalibus arteria, utut prius ramificata, tamen singularis & truncus unicus facta, Cerebrum conscendit; in *Equo* utraque *Carotis* bipartita, duos ramos, è dura matre in duobus distinctis emergentes, sursum emittit.

In *Cane*, *Vulpe*, *Ove*, *Vitulo*, *Cervo*, & plerisque aliis quadrupedibus, *utraq; Carotis*, dum intra cranium sub dura matre reconditur, in *propagines exiles* divisa, cumque aliis vasis, sc. tum *venis*, tum *fibris nervosis* complicata, *Plures retiformes* constituit, qui plexus utrinque ad latera *sellæ Turcicæ* protensi, cavitationem inibi existentem implent; dein post multiplices vasorum omnium devaricationes, propagines quædam arteriosæ, ab aliis extricatae, ac denuo unitæ, in eundem truncum coalescunt, qui duram matrem perforans, recta Cerebrum conscendit.

Prædictus plexus, *Rete mirabile* (idque jure merito, quia nihil in tota corporis animalis fabrica magis admiratione dignum occurrit) vulgo appellatur; in quo præter *ramusculos arteriosos*, qui ab utraque *Carotide* ascendente procedunt, *furculi venosi*, pauciores licet, à ramis jugularibus internis descendentibus occurrunt; atque utriusque generis vasa, in propagines exiles divisa, instar fasciæ è filo holoserico intortæ, varie complicantur: quæ tamen vasorum complicationes, *fibris nervosis*, à majore quinti nervorum Paris trunco suppeditatis, sustinentur. Prædicti vasorum plexus, sive *Rete mirabile*, in quibusdam animalibus longe majus est, ac multo plures vasorum divaricationes continet, quam illud ipsum

ipsum in aliis; nam in *vitulo, ove, capra*, & cæteris quæ herbaceis vescuntur, ejus compages amplior est, quam in *cane, fele*, aliisque brutis carnivoris, & calidioribus. Porro observare est, ubi *Rete mirabile* majus existit, unius lateris plexus, in plexus oppositi lateris inosculari, ac ab utrisque longe plures vasorum furculos glandulam pituitariam subire; ita quidem ut si infra cranium arteriæ trunco atramentum injicias, utriusque lateris vasa, sive plexus eadem tinctura inficiuntur, & liquor atratus ex arteriæ oppositæ trunco abscisso effluet.

Profecto hujusmodi experimentum sæpius repetitum vidimus. *Arteriæ Carotides* in utroque cervicis latere denudentur, adeo ut eorum tubuli sesquiunciam circiter longi, una conspectui exhibeantur; dein unius lateris trunco, liquor tinctus, & embolo majore contentus, sursum injiciatur: post unam aut alteram injectionem, videbis tincturam à latere altero, per arteriæ oppositæ truncum descendere: imo si eadem copiosius versus caput injiciatur, illinc per arteriam lateris oppositi redux, infra præcordia, usque ad imam corporis regionem pervadet; cum interea parum aut nihil ejusdem tincturæ, per venas jugulares externas & majores referatur: dein capite aperto, arteriæ omnes ante capitis ingressum, & venæ iisdem succenturiatæ, liquoris injecti colore imbuuntur. Porro in vasis quæ *Rete mirabile* constituunt, & quæ Cerebri basin obducunt, ejusdem tincturæ vestigia quædam apparebunt. Veruntamen quod liquor iste ubertim adeo per *oppositam arteriam*, ac minime per *venam jugularem*, aut sociam aut oppositam descenderat, ratio est, quoniam venas istas subire nequit, nisi prius totius Cerebri regione trajecta, *sinus* intraverat; at vero liquor affatim injectus, minutula vasa Cerebrum obducentia tam cito trajicere non potuit: quare potius quam à violento ejusdem liquoris impulsu vis Cerebro inferatur, iste ab injectione redundans, ac alias Cerebro diluvium minaturus, recessus viam inveniet, etiam per *arterias oppositas*, eum nempe in finem, & priusquam ingrediuntur Cerebrum, & postquam ingressæ sunt, inter se communicantes. Atque hic nunquam satis admirari possumus adeo providam, & nulla mechanica arte æquandam, *sanguinis intra Cerebri confinia dispensationem*. Quandoquidem enim arteriæ carotides inter se variis in locis communicant, ac mutuo inosculantur; *duplex* inde commodum, effectu licet contrario, resultat: quippe hac una eademque ratione cavetur, tum, ne Cerebrum debita sanguinis irrigatione defraudetur; tum etiam, ne tumentis alvei impetuoso nimis affluxu obruatur. Quoad primum, ne accidat, una forte Carotidum obstructa, altera utriusque penum suppeditat; deinde ne cruor, nimis pleno torrente irruens, Cerebri alveos & canales inundaret, opposito quasi emissario fluvius castigatur, & per eandem fluxus sui vias, *retro properare* jubetur, *versisque recurrere lymphis*.

Istiusmodi apparatu, *arteriæ* Cerebrum consensuræ instruantur: Quinimo & *ductus venosi* sanguini illinc reducendo destinati, mirabili quoque artificio disponi videntur. Cum enim *sinus anteriores* sarcinam suam in *duas laterales*, qui posteriores sunt, transferant, ipsique in *venas jugulares* desinant; observare est, quod isti posteriores sinus, sulcos sive cavitates, quibus infideant, occipiti insculptos habent: cumque per foramen proprium uterque sinus, in venam jugula-

rem cessurus, Cranio elabatur; juxta foramen illud, in exteriori calvariæ parte *specus amplius*, rotundus, ejusdem utrinque sinus extremitate, in majorem capacitatem ampliata obductus, excavatur; eo quidem fine ut sanguis, ne, dum pleno torrente extra caput proripitur, rapido nimis & vorticoso influxu in venas irruat, adeoque ipsi cordi impetum faciat, illic diverticulum satis amplum habeat, in quo æstuans, donec suo decursui spatium laxius & patentius conceditur, sine molestia commoretur. Certe opportuna hac Sanguinis in Cerebro, & extra ipsum *αλεδοχη*, ejusque in diversis animalibus, pro cujusque necessitate, accommodata reciprocationis via, nihil artificiosius, quodque magis summi Conditoris providentiam arguit, excogitari potest. Denique in *Zootomia*, alia id genus miracula occurrunt, quibus digitum numinis & divinum opificem spirantibus, Atheismo, utut pervicaci, potentissimus Elenchus opponatur.

CAPUT V.

Volucrum & Piscium Cerebra describuntur.

QUæ hæcenus de Cerebri ejusque appendicis descriptione protulimus, observationibus ex dissectione capitum *Hominis & Quadrupedum* factis, potissimum debemus. Mox tandem procedere oportet, ad commentarios super observationibus istis subnectendos; nimirum ut ex partium Cerebri ita descriptarum fabrica rite pensitata, earum *munera & usus* eruere, adeoque functionis animalis œconomiam designare satagamus: At vero quoniam *Anatomia comparata*, Physiologiam de usu partium pleniorē & magis exactam suppeditat; ideo, priusquam hoc pensum aggredior, in Capita quorundam aliorum animalium, nempe *volucrum & piscium*, inquirere, operæ pretium videtur.

Supra innuimus, Cerebra hominum & quadrupedum in plerisque similia existere; tum etiam Capitibus volucrum & piscium contenta, ab utrisque prioribus longe diversa, tamen inter se, quoad præcipuas *εγκεφαλικας* partes, symbola reperiri. Utræque animalium species, à mundo condito, coætaneæ & velut gemellæ, in nihilo magis quam in Cerebri fabrica affinitatem suam testantur. In homine & quadrupedibus rem ita habere, in superioribus plane constitit: Jam videamus si quæ notatu digna *volucrum & piscium* Anatomia exhibeat.

Ut à *Volucris* ordiamur; cranii tegmine sublato, dura meninx molem intus contentam arte complectitur: in medio illius, ubi Cerebrum in duo hemisphæria dividitur, *sinus* in *longum* protensus habetur, qui tamen nulla falce interstitia dimissa, Cerebro minus profunde inseritur: dein ubi hæc membrana Cerebrum & Cerebellum interstinguit, *duo sinus laterales* efformantur: Insuper volucris *sinus quartus* adest, verum qui aliquanto posterius, quam in homine aut quadrupedibus, situm habet; nam paulo infra glandulam pinealem, duræ meningis processus cavus & teres super medullæ oblongatæ crura dimittitur; ubi statim dividitur in duos ramos, quorum utrinque unum sursum emittit, in cavitatem, inter membranam striatam & Cerebri hemisphærium, in posteriore Cerebri parte confitam.

Supe-

Superiore hac membrana, sive *dura meninge* circumquaque discissa & seposita, *Pia mater* valde tenuis apparet, quæ non, uti in homine, aliisque perfectis animalibus, tam crebris vasorum plexibus insignitur; verum hæc meninx subtilissima fibrarum textura constans, Cerebri intus contenti superficiem, planam & æquabilem, gyrisque & anfractibus prorsus destitutam, solummodo investit undique ac intime succingit.

Cerebri fabrica in volucribus aliter habet ac in homine aut quadrupedibus: nam præterquam quod in ambitu ejus anfractus & inæqualitates omnino desunt; etiam interius, *corpus callosum*, & *fornix*, etiam *corpora striata*, qualia supra descripsimus, prorsus desiderantur: atque insuper ipsa Cerebri compages alio modo configuratur. Quo hæc melius perspiciantur, Cerebri *anseris*, aut *galli Indici* dissectionem instituas; atque membranis discissis, Cerebri fissuras, & medietatem ejus unam ab altera leviter comprimendo, diducas, & separare pergas, donec ventum erit ad ipsum fundum, in quo duo corpora medullosa existunt; quæ nervorum instar, transversim protensa, hemisphæria invicem connectunt. Utrumque interstitii latus membrana subalbida investit, quæ quidem striis velut radiis, à toto ambitu versus angulum inferiorem productis, insignitur; striæque istæ circa corporum medullarium insertiones concentrantur. Dein, si membrana hæc secetur, in utroque Cerebri hemisphærio, cavitas subjecta apparebit; quæ totum ab interstitii latere spatium, ac insuper posticam Cerebri regionem, magna ex parte subducit, eaque membrana striata concameratur. Utraque cavitas circa fundum, in ductum intermedium & communem, qui ad insundibulum patescit, aperitur; & ex utroque ductus istius latera medullæ oblongatæ crura exporriguntur, quibus utrinque Cerebri hemisphærium per duo medullaria corpora appenditur; nimirum è Cerebri mole, ventriculo substrata medullium unum, & è membrana striata ventriculorum obtegente, medullium alterum prodit. E binis hisce, in utroque latere positis, Corpora medullaria, nervorum instar, transversim protensa, duo Cerebri hemisphæria invicem conjungunt. Insuper bina hæc utrinque coalescentia, utrumque Cerebri hemisphærium medullæ oblongatæ cruribus affigunt.

Adeo Cerebri figura in volucribus, si hominum & quadrupedum perfectiorum Cerebro comparaveris, veluti *inversa* esse videtur. Nam sicuti in his, pars *corticalis* exterior est, eique *medullaris* substernitur; ita in volucribus inferior Cerebri compages, quæ mole crassa & spissiori constat, *corticis* loco est: membrana autem extima & superior, ventriculorum concamerans, supra quamvis aliam partem *medullaris* apparet. Porro *ventriculi* in hominis & quadrupedum Cerebris, *infra* & prope fundum, in volucribus *superius* & juxta oram anteriorem collocantur. Hujus discriminis ratio esse videtur, quod in Cerebro perfectiore, quale homini & quadrupedibus contingit, spiritus animales tum ortum suum tum exercitium habent; sc. in parte ejus *corticali* procreantur, atque in *medullari*, quæ satis ampla huic substernitur, pro facultatum actibus, iidem circulantur, varieque expanduntur. At vero in volucrium Cerebro, spatium quidem satis amplum subest pro spirituum *generatione*, sed pro *circulatione* eorum ibidem locus vix ullus conce-

conceditur. Nempe avium cerebra, muneribus phantasiæ aut memoriæ non multum occupari videntur: Quinimo putandum est, spiritus in Cerebro genitos, in medulla oblongata, pro tuenda functione animali, potissimum exerceri; namque illic, uti mox ostendemus, substantia medullaris, quæ corporis callosi loco est, consistit, & instar corporum striatorum in *aliis*, in *his* sunt membranæ striatæ, per quas sc. spiritus in Cerebro procreati, sine quavis ibidem diatæxi, protinus in medullam oblongatam feruntur. Cæterum quia spiritus in Cerebro geniti excrementa serosa deponere debent, ideo à complicatura membranæ striatæ, super Cerebri puppim, ipsiusque medullæ oblongatæ crura, ventriculi ad hanc rem satis idonei resultant. Attamen volucrum Cerebris, quia fornix omnino deest, *bini* tantum *ventriculi* anteriores adsunt, intra quos plexus choroeides expanditur, cujus portio venosa à sinu quarto, uti modo dictum erat, paulo inferius oritur; arteriæ autem ex utroque latere medullæ oblongatæ ascendentes accedunt.

Nec magis in ipso volucrum Cerebro, quam in medulla oblongata, heterogeneitas, sive conformatio ab eadem in hominibus & quadrupedibus longe dispar apparet: nam in prima illius sectione, unde nervi optici oriuntur, *duæ insignes protuberantie* lateri utrique accrescunt: Hæ multo majoris sunt proportionis quam in perfectioribus prominentiæ orbiculares; adeo ut *Cerebrum alterum & succenturiatum* videantur: utraque albidi coloris & pure medullaris, interius excavata est; ita ut hujusce generis animalibus bini ventriculi in Cerebro, totidemque in medulla oblongata, reperiantur: Cumque in his, sicuti in cæteris quibuscunque animalibus, etiam cavitas Cerebello subjiciatur, ventriculi in toto *εγκεφάλῳ* evistentes *numero* pariter ac *figura & positione differant*.

In medio Caudicis medullaris, ubi sc. istæ prominentiæ lateribus ejus adnascuntur, Rima ad infundibulum ducens inciditur, in istam autem utriusque ventriculi apertura dehiscit, ut minime dubium fuerit, quin serositates ibidem congestæ ista via amandentur. Porro verisimile est, has prominentias excavatas, & medullares, in volucris corporis callosi vicem supplere, in quibus nempe spiritus animales, propter facultarum suarum exercitia, circulentur: Quippe in Cerebro spatium angustum est, ut spiritus intra illius confinia produci, ac una circulari nequeant. Porro cum in volucris spirituum animalium usus ad facultatis sensitivæ ac locomotivæ actus, plus quam ad phantasiam aut memoriam requiratur; certe præcipuus locus ubi & convenient & exerceantur, in medulla oblongata potius quam in Cerebro collocari debuit.

Arteriæ carotides quæ ad avium majorum Cerebra sanguinem adducunt, tam exiles sunt, ut ad easdem in homine & quadrupedibus harum nulla sit proportio. Trunci ipsarum intra calvariam delati, sine quavis divaricatione in plexus retiformes, eodem quo in aliis animalibus ritu, juxta glandulam pituitariam ascendunt, & recta Cerebrum petunt, vasorumque exiles quasdam propaggines, tum ad anteriorem ejus ambitum, tum per interiores recessus distribuunt. Enimvero perexigua sanguinis portione, respectu aliorum animantium, avium Cerebra irrigantur; quia nempe ad spirituum animalium refectionem, ubi

ubi phantasia aut imaginatio minus exercetur, haud multum sanguinis requiritur.

Volucres (secus ac nonnulli asserunt) & *Processus mamillares*, & *Os cribrosum* habent; nam anteriores Cerebri productiones, summe extenuatæ & dura meningē involutæ, fere ad mediam rostri partem protensæ, ossi triangulari (cui sinus duplex, tenui septo interstinctus, adest) inferuntur. Isti autem processus intra prædicti ossis sinus delati, desinunt in vesicas aqua limpida plenas, quæ plane referunt processus mamillares in vitulo aqua limpida tumidos. Porro cum è quinto nervorum Pari ramus insignis in utroque latere, oculi orbitam pertransiens, naris cavernam ingreditur, è trunco ejus furculus emissus, ipsi naris orificio impenditur; interim ambo majores trunci, ossi cribroso circumdato, mutuo conveniunt, & mox ab invicem abscedentes, & ad rostri finem perducti, in palatum distribuuntur. Ad hunc modum *volucres*, pariter ac *homo* & *quadrupedes*, peculiari *olfactus organo*, gemino sc. *processu mamillari*, instruuntur; ac insuper intra nares, è quinto Pari nervos ascititios habent; quorum actione, & ramorum in alias partes communicatione, etiam in ipsis stricta adeo inter olfactum & gustum affinitas contrahitur. Cætera nervorum Paria fere ad eundem modum habent, ac in homine & quadrupedibus. Pariter item observamus, quantum ad Cerebellum, & reliquam medullæ oblongatæ portionem, inter aves & alia quæ supra consideravimus animalia, haud magnum discrimen intercedere; nisi quod prominentiæ orbiculares ante Cerebellum, aliæque annulares sub ipso, in illis occurrentes, utræque in volucris desiderantur; nempe hæc posteriores non videntur omnino requiri; priorum autem vires à prominentiis medullaribus excavatis, quales volucris subesse ostendimus, facile supplentur.

Atque hæc præcipue notatu digna in *avium* Cerebris reperiuntur. Inter hos & *Pisces*, quoad plurimas τῶ ἐγκεφάλου partes similitudinem quandam intercedere supra innuimus: Quare ex re fore videtur, ut hic, coronidis loco, de *piscium* Cerebro nonnulla proferamus. Primo observamus, quod cum piscium *Capita*, respectu totius corporis, sint *majora* quam cujusquam alterius animalis, *Cerebrum* tamen præ cæteris *minimum* in se continent: Nam duæ moleculæ, antèrius positæ, totum Cerebri ita proprie dicti locum sustinent; ex his duo nervi olfactorii insignes procedunt, qui longo & recto itinere ad foramina ex utroque oris latere excavata, quæque instar narium sunt, feruntur: atque hoc piscibus singulare est. Porro de nervis Opticis advertimus, quod isti, uti in cæteris animalibus, ad se mutuo inclinati, haud tamen uniuntur, nisi forsan superficie tentus; verum intercussantur, nervusque è dextro medullæ oblongatæ latere oriundus, in sinistrum oculum deferitur, & è contra: ita quidem ut radii visorii non tantum in oculo, verum intra ipsa nervorum corpora, refractionem subeant. Medulla oblongata in piscibus simili omnino ritu, ac in avibus, *duas insignes protuberantias* intus excavatas habet; & revera quoad motus locales, spiritus in utrisque simili modo exerceri videntur; nam uti *pisces natant in æquore*, ita *avium volatus* videtur quoddam *natationis genus esse in aere*. Porro in his observare est glandulam Pituitariam, Infundibulum, & Arterias carotidas, uti

in cæteris animalibus ; item pleraque nervorum Paria easdem origines & distributiones habent ; excepto tamen quod nervi auditorii hic desiderantur ; licet *Casserius Placentinus* hoc munus nervis olfactoriis attribuat. Cerebelli figura eadem est quæ in perfectioribus animalibus. Porro quod de nervorum Pari vago in homine & quadrupedibus advertimus ; nempe quod pluribus ejus fibris una oriundis , ad eas nervi truncus à spinali medulla accedit , omnino pariter habet in Piscibus. Verum singula ulterius describere non opus est : nam cætera , cum ea quæ Ipsi tantum & Avibus propria sunt , tum etiam quæ cum volucrum & perfectiorum quoque animalium genere communiora obtinent , partim ex peculiari cum Avibus similitudine , partim ex universali omnium analogia , facile innotescunt.

EXPLICATIO FIGURÆ TABULÆ XIX.

Ex Anatome Cerebri TH. WILLIS.


Quæ ipsi est in ordine Septima.

Proposita Figuris variis declarare studuit Nobil. Willis. Ex omnibus tamen unicam tantum hûc transferemus , tum quod ea primaria videatur , ad dictorum declarationem ferè unicè sufficiens , tum etiam , ne si plures adponerem , junioribus ansam præberem utilissimum hoc maximoque labore compositum opus negligendi.

Exhibet Cerebrum Ovinum reclinatum , & in cohæsionem locis juxta corpora striata aliquatenus discissum , ut interior ejus compages evolvi , ac in planum explicari queat.

- A. A. Substantia Cerebri abscissa , qua in naturali situ complicata , cohærebat cum reliqua illius substantia a. a. super corpora striata relicta.
- B. Fornicis truncus abscissus , qui in situ naturali cohærebat cum ejusdem Fornicis basi E.
- C. C. Fornicis brachia , qua Caudicem medullarem è regione gland. pinealis amplexabantur.
- D. D. Corporis callosi margo , qui caudicem medullarem prope Cerebellum amplexabatur.
- E. Fornicis Basis.
- F. F. Fornicis dua radices rectæ , inter corpora striata jacentes.
- G. G. Processus medullaris transversus , duo corpora striata invicem connectens.
- H. Rima juxta Fornicis radices , ad infundibulum ducens.
- I. I. Corpora striata , quorum superficies arteria ac vena exiles obducunt.
- K. K. Corporis callosi superficies interior , striis medullaribus transversis , sive ab uno Cerebri hemisphærio in alterum protensus , insignita.

- L. L. Thalami nervorum opticorum.
- M. Foramen anterius in ventriculum protuberantis orbicularibus subjectum ducens , quod etiam ad Infundibulum per aperturam declivem tendit.
- N. Glandula Pinealis , qua separatis & amotis Pia matre ac plexu Choroeide , conspectior apparet.
- O. O. Protuberantia Natiformes , qua hic longe majores sunt quam in Homine aut Cane.
- P. P. Protuberantia minores , Testes dictæ , quæ priorum sunt epiphyse.
- Q. Q. Processus medullares , è Testibus in Cerebelli meditullia protensi.
- R. Processuum istorum commissura.
- S. S. Nervus oculorum pathetici , è processuum istorum commissura oriundi.
- T. Foramen posterius , in ventriculum , protuberantis orbicularibus subjectum , atque in ipsam infundibuli aperturam ducens.
- V. Scrobs in medullari Caudice , qua Cerebello oblecta , quantum ventriculum efficit.
- W. Cerebelli substantia medullaris ramificationes , quæ instar arboris apparent.
- X. Medulla oblongata , in spinalem cessura , extremitas.



P A R S XXII.

De Nervis & Spinali Medullâ hujusque Vasis & Sinubus.

Ex Nervorum descriptione & Usu ejusdem Thoma Willis.

Eodem modo hîc procedemus cum Nervis, ac in jam prægressis cum Cerebro ipso, solam nempe eorum anatomen ex Authore dicto adducendo, de Usu quæ proponit hîc omittendo, digna quo ex ipso Authoris scripto hauriantur.

EX CAPITE XXI.

Quatuor priora Nervorum Paria, intra Cranium oriunda, describuntur.

Nervorum divisio, five distinctio, propter varios eorum respectus, multiplex adhiberi solet: nempe quod sint *molles*, aut *duri*; in origine *singulares*, aut *numerosi*; quod *sensui* tantum, aut *motui*, vel simul *utrique facultati* inserviant. Cæterum vulgo distinguuntur, quod nervi alii intra Cranium oriundi, è *Medulla oblongata* procedunt; aliiquæ è vertebrarum internodiis exeuntes, à *medulla spinali* derivantur. His insuper quandam aliam discriminis rationem nobis subjungere visum erat; nempe quod Nervi quidam, tanquam *Cerebri clientelæ* & *servitia*, *actus* solummodo *spontaneos* exequuntur; alii autem, administri & *satellites Cerebelli*, circa *functionis* fere tantum *involuntaria* exercitia versentur. Non opus erit juxta singulas hæc differentias, diversimodas Nervorum essentias aut constitutiones assignare: quin potius ut *particularis* eorum *census*, five *lustratio* instituat, naturæ ordinem sequuti, singulos eâ serie qua in corpore animali disponuntur, speciatim explicabimus.

Inter Nervos è cranio oriundos, *Olfactorii*, seu qui vulgo *processus mamillares* dicuntur, agmen ducunt; utpote qui ante cæteros omnes originem suam habent, & ultra ipsum Cerebrum antrorsum exporriguntur. Hi Nervi è cruribus *Medullæ oblongatæ* inter corpora striata & thalamos Nervorum opticorum proficiscuntur; & cavitate manifesta præditi, utrinque pone eadem corpora striata in priorem Cerebri ventriculum dehiscunt: adeo ut humiditas intra Cerebri plicaturam scatens, per hos Nervorum Canales in processum mamillares feratur; utrum ulterius pergat, mox inquiretur: quippe his Nervis latis & amplis prope corpora striata exortis, atque illinc sub Cerebri basi antè protensis, sensim moles sua augetur, donec in processum rotundos mamillis similes, quibus uterque ossis cribrosi sinus oblinitur, evadunt. Intra hujus ossis lacunæ *Nervi* isti adhucque *molles* & *teneri*, tunicas è dura matre sortiuntur; quibus cum in plures *fibras* & *filamenta* divisi, & foramina ossis cribriformis pertranseuntes, cranio egrediuntur: unde in tubulatas narium cavernas delati, & quaquaversus distributi, membranæ labyrinthos istos oblinenti inferuntur.

Secunda Conjugatio Nervorum sunt Optici, seu visorii: de quibus, quo ritu pone corpora

corpora è secunda crurum medullarium sectione (quam *Galenus Nervi optici Thalamum* appellavit) oriuntur, & exinde cum ambitu quodam descendentes uniuntur, iterumque se juncti ac in oculorum orbitas delati, fibris diffusis tunicam scleroticam constituunt, superius in *Cerebri anatomia* ostendimus.

Tertia Nervorum Conjugatio sunt *Oculorum motorii*, qui in basi Caudicis medullaris pone infundibulum exoriuntur; unde antèrius juxta *Par visorium* pergentes, cumque aliis nervis oculo destinatis calvaria egressi, versùs oculi globum deferuntur; ubi statim in plures ramos divisi, musculis ipsum moventibus prospiciunt; verum in diversis animalibus cum vario discrimine. Quippe in bove, oculum ampliorem sortito, nervus oculi motorius ramum cuilibet è lex musculis communibus impertit; atque præterea è nervis quarti, quinti, & sexti Paris, rami quidam nonnullis eorundem musculorum distribuuntur.

Attamen de his *Nervis tertii Paris*, qui propriè *oculorum motorii* dicuntur, observamus, quod in homine, cane, & quibusdam aliis animalibus, paulo secus habent quam prout in bove reperiuntur: nam uterque nervus in istis simulacum reliquis extra cranium defertur, in 4 ramos dividitur, quorum tres exinde in totidem distinctos musculos rectos, scil. *artollemem, adducentem & deprimentem*, feruntur; ramus ejus alter singulari trunco longius pergit, & in medium musculi oculum ad angulum internum deorsum versùs oblique circumducentis implantatur.

Quarta Nervorum Conjugatio (quam ordinis & successionis jure quartam appellamus, licet à *Fallopio* octava & ultima habeatur) diversam ab omnibus aliis originem sortitur. Quum enim plerique alii à *Medulla oblongata basi* aut *lateribus* prodeant, hic in *summitate ejus*, pone protuberantias orbiculares *nates & testes* dictas, radicem suam habet: unde antèrius juxta latera medullæ oblongatæ deflexus, statim sub dura matre reconditur; sub qua aliquandiu incedens, & per idem cum reliquis oculo destinatis foramen cranium pertransiens, singulari trunco, nec cum aliis Nervis uspiam communicante, totus in musculum trochlearem dictum impenditur. In superioribus hos nervos *oculorum patheticos* appellavimus.

EX CAPITE XXII.

Nervorum Paria, quintum, sextum, ac septimum explicantur.

Hoc *Par* (quod ab antiquis *tertium*, à nobis *quintum*, idque ordinis seu positionis jure, habetur) infra priores nervos, è lateribus protuberantiæ seu processus annularis à Cerebello dimissi, trunco amplo & lato procedit: fibris hoc quidem plurimis, quarum aliæ sunt molles, aliæ duriores, simul colligatis constat; adeo ut magnus ipsius Caudex, prope originem, nihil aliud sit quam *plurium nervorum fasciculus*, quorum scil. aliqui his partibus, alii autem aliis impenduntur; ac in quibusdam *motus*, in reliquis *sensus* munia exequentur.

Interim ut *Nervi hujus brevem hypotyposin* tradamus; truncus ejus è lateribus annuli majoris prodians, interdum juxta ipsam originem, sæpius tamen dura

membrana prius perforata, in *duos ramos* insignes dividitur. Horum *primus* deorsum recta tendens per proprium foramen calvaria egressus, in descensu versus mandibulam inferiorem (cujus partibus præcipue destinatur) in plures ramos dividitur; quibus musculo temporali, item faciei & buccarum musculis prospicitur. Porro ab eo furculi & propagines in labia, gingivas, dentium radices, fauces, tonsillas, & extremum palatum, imo & in linguam distribuuntur.

Alter superior, idemque *major Paris quinti ramus*, sub dura matre, juxta sellæ Turcicæ latus, aliquanto spatio recta incedit atque è regione Glandulæ pituitariæ Carotidis trunco, aut Reti mirabili (siquidem hoc adest) propagines quasdam elargitur; dein Nervo sexti Paris inosculatur, & exinde furculum, modo unum, modo duos, remittit; qui cum furculo altero, à Nervo sexti Paris reflexo, uniti, Nervi intercostalis radicem, sive Caudicem, primum constituunt. De hoc *Nervo intercostali*, qui Nervorum quinti & sexti Paris ramificatione inferiore constat, posthæc speciatim dicetur,

Statim à furculis pro Nervi intercostalis radice reflexis, magnus, iste *Paris quinti Nervus* in *duos ramos* insignes dividitur. Horum *minor & superior*, versus oculi globum tendens, ac iterum bifidus, duos ramos à se dimittit; quorum alter ad latus ossis internam oculi orbitam sive angulum continentis vergens in duos furculos dirimitur. Horum alter, perforato osse, juxta processus mamillares in nares deferitur: Alter autem hujus divisionis ramus in musculum quo bruta nictitant impenditur.

Ramus secundus quinti Paris Ophthalmicus in quatuor vel quinque furculos dividitur, qui omnes supra musculos oculi pergentes, perque glandulas ejus aliquatenus trajecti, ferè toti in palpebras absumentur, nisi quod in transitu duas exiles propagines dimittunt, quæ tunicam scleroticam paulo infra tendines musculorum subeunt, ac ad uveam pertingunt; quin & propagines exiles ad glandulas oculi in itinere mittunt. Porro observare est, quod è ramo quinti Paris ophthalmico furculus quidam, juxta musculorum capita, superius reflectitur; qui ubi per proprium foramen, os oculi orbitam continens trajecerit, recta in narium cavernas deferitur.

Secundus, sive *major ramus secunda divisionis Nervi quinti Paris*, juxta oculi orbitam delatus, iterum in binos ramos dividitur. Horum inferior deorsum reflexus, seque in plures furculos diffindens, palato & supernæ faucium regioni impenditur: ramus alter & superior hujusce secundæ divisionis, ultra oculi orbitam protensus, foramen proprium in osse maxillæ superioris excavatum cum vena & arteria simul pertransit; quæ vasa hic nervus, furculis plurimis emissis, scandit, & varie circumligat; dein ex osse emergens, musculis genarum, labiorum, nasi, & dentium superiorum radicibus ramulos impertit.

Sequitur *Nervus Conjugationis sextæ*, qui ex imâ protuberantiæ annularis basi oriundus, & sub dura matre statim demersus, per idem foramen cum nervis tertii & quarti Paris calvaria egreditur, ac singulari trunco in oculi orbitam deferitur; ita tamen ut juxta latus sellæ Turcicæ ramo secundo, sive majori quinti Paris, inosculatur; unde ramulum modo unum, modo geminum reflectit; qui cum

cum ramis Paris quinti recurrentibus uniti, *intercostalis Nervi* principium constituunt: Deinde Nervus iste antrorsum tendens, prope oculi orbitam in duos ramos dividitur; quorum *alter* in musculus oculi abducentem, in exteriore ejus angulo situm inferitur; atque *alter* in varias fibras diremptus, musculo septimo, brutis proprio impenditur, adeo ut hic etiam Nervus oculi motibus, fere tantum patheticis, aut ab instinctu naturali excitatis, inservire videatur.

Septima Nervorum Conjugatio, ab Antiquis pro quinta habita, circa auditus sensum occupatur. *Hujus Paris bini processus mollis unus, alter autem durior*, vulgo accensentur; qui revera duo distincti nervi esse videntur utpote qui origines, licet propinquas, aliquatenus tamen distinctas habent, ad organa diversa feruntur; interim utrisque in communi quodam usus sive actionis respectu convenientibus: quippe dum *unus nervus auditus actum perficit*, *alter requisita quadam quo actus iste melius perficiatur suppeditat*. Quapropter contra vulgarem hujus Paris descriptionem, qua pro unico sumitur, non multum litigamus. *Hujus Paris processus. sive Nervus proprie auditorius qui ramus mollis appellatur*, è latere inferiore protuberantiæ annularis homine, éque medio annuli minoris in quadrupedibus exoriri videtur. In quibusdam dissectionibus plane deprehendi, quod *mollior hic nervus* originem inferius habens, paulo ascendere videretur priusquam è Caudice medullari prodierit, atque *alter durior nervus* superius (nempe ex linea albida medullari quarti ventriculi fundum obducente,) exoriri visus, paulo descenderet, & prope alterius occursum emergeret. Nervus iste mollior in meatum ossis petrosi deferitur, ubi in specum, qui sono excipiendi destinatus, circa cochleam & tympanum consistit, ingressus, in membranam tenuissimam, qua illud antrum obducitur, sese explicat.

Alter hujus Paris *Nervus*, sive *processus*, qui *durior* existens *motui* potius quam *sensui* conducit, os petrosum per foramen sibi proprium pertransiens, juxta meatum auditorium emergit, ubi mox in truncum suum furculum è *Pari vago* illuc elatum asciscit, deinde statim ab isto coalitu in *binos ramos* dividitur: horum *prior* deorsum tendens, musculis linguæ & ossis hyoideos impenditur; *alter* meatum auditorium circumiens, & superius deflexus, in *tres furculos* dividitur; quorum *primus* divisionis prioris nervo correspondens, labiorum, oris, & faciei, nariumque musculis quosdam furculos elargitur, adeoque vocis edendæ organa quædam exteriora, sicut iste prior interiora quædam organa, actuat: *secundus* hujus divisionis furculus in musculos palpebrarum & frontis; ac *tertius* in ipsius auris musculos propagines distribuit. Quo melius prædictorum Nervorum descriptiones intelligantur, visum est hic *Paris Quinti & Sexti Ramificationes in Figura sequenti* repræsentari. *Par Septimum in Figura IX.* satis apte delineatur.

EXPLICATIO FIGURARUM TABULÆ XX.

EX CL. WILLIS de Nervis.

FIG. I.

Nervorum Paris Quinti & Sexti Ramificationes exhibet.

- A. Paris Sexti Nervus, (quem ideo prius, quoniam in Schemate extimus est, referimus) è cuius trunco duo surculi, a. a. in binos oculi musculos feruntur.
- a. Surculus à Nervo Sexti Paris pro radice Nervi intercostalis reflexus.
- B. Paris Quinti truncus, statim in duos ramos majores divisus,
- bb. Duo surculi ab hoc ramo pro Nervi intercostalis radice reflexi,
- C. Divisio Caudicis superioris in quatuor minores ramos, quorum superior c. ophthalmicus, oculi orbitam ingressus, quatuor surculos emittit.
- c. Primus juxta oculi orbitam delatus, in naves reflectitur.
- d. Secundus exteriorem oculi orbitam prateriens, in musculos frontis effertur.
- cc. Tertius & quartus, in palpebras & glandulas oculi interiores distribuuntur.
- D. Ramus secundus secunda divisionis, etiam ophthalmicus, qui oculi orbitam ingressus, & versus oculi angulum exteriorem delatus, in palpebras ac glandulas exteriores distribuitur.
- E. Ramus tertius secunda divisionis, sive maxillaris, qui oculi orbitam pratergressus, foramen in osse maxilla proprium ingreditur, in quò transitu surculum e. per aliud foramen emittit in musculum masseterem, dein è foramine emergens effert
- f. Surculum in musculos naris.
- g. g. Multas propagines deorsum mittit in labium superius.
- F. Ramus inferior, sive quartus, secunda divisionis, qui recta versus oris lacunam descendens, in duos ramos dividitur, quorum
- h. Primus in gingivas distribuitur.
- i. Secundus in Palatum cum multis propaginibus disseminatur.
- G. Ramus secundus prima divisionis Paris quinti, qui recta deorsum versus maxillam inferiorem tendens, in itinere plures surculos dimittit.
- k. Propago ejus in glandulas parotidas.
- l. Surculus ad masticatorium internum.
- m. Surculus, qui inferioris maxilla processum circumdans ad masticatorii externi partem exteriorem deferretur.
- n. Surculus alter in prioris oppositum tendens, qui eodem processu circumdato, in ejusdem masticatorii partem internam distribuitur.

- H. Ejusdem rami majoris Truncus ulterius pro-
vectus, in multos surculos dirimitur, quorum
- o. In radicem lingua tendit.
- pp. In totius lingua compagem cum multis propaginibus deferretur.
- q. In partes sublinguales.
- r. Os maxilla pertransiens, in plures propagines dirimitur, quæ partim in labrum inferius, sss & partim in mentum discescuntur, ttt.

FIG. II.

Exhibit Nervos omnes, qui scilicet à nervi tertii, quarti, quinti, & sexti Paris profecti, oculi musculis aliisque partibus impenduntur.

- A. Nervus tertii Paris ad tres rectos musculos & obliquum externum.
- B. Nervus quarti Paris, sive patheticus, totus in musculum trochlearem.
- C. Nervus sexti Paris in musculum abducentem, & septimum bruiis proprium.
- D. Nervus quinti Paris, cujus ramus ophthalmicus E. in duos ramos dividitur.
- F. Ramus superior statim in plures surculos diremptus recta tendit versus angulum interiorem, ubi glandula & palpebris impenditur.
- G. Ramus ophthalmicus inferior, qui in surculos diremptus, pari modo glandula & palpebris in externo oculi angulo sitis prospicit.
- a. Nervus quarti Paris ad musculum trochlearem.
- b. Ramus Nervi tertii Paris ad musculum attollentem.
- c. Ramus ejusdem Paris ad musculum adducentem.
- d. Ramus ejusdem nervi ad musculum deprimentem.
- f. Ramus ejusdem ad musculum obliquum externum.
- g. Nervi minores è plexu tertii Paris per tunnicam scleroticam in uveam tendentes.
- e. Nervus sexti Paris in muscul. abducentem.
- *** Fibra seu rami minores à quinto & sexto Pari in musculum septimum, brutis proprium.
- h. Nervus à ramo ophthalmico superiore in naves abscedens.
- i. Nervus ab eodem ramo in supercilia & frontem.
- H. Quinti Paris truncus abscissus, qui ad maxillam inferiorem tendit.
- I. Ejusdem ramus abscissus, qui ad palatum fertur.
- K. Ejus ramus maxillaris superior.

Fig. 1





Fig. 2



CAPUT XIII.

Octavi Nervorum Paris Descriptio.

Octava Nervorum Paris Conjugatio, ab Antiquis pro sexta habita, *Par vagum* appellatur, eo scil. quod Nervus ejus, non uno contentus membro, aut corporis regione, partes diversas ac longe distitas respicere, atque ramificationes suas non modo in vicinia circa Caput & cervicem, sed per totam medii ac imi ventris cavitatem, ac ad pleraque in utrisque viscera, exporrigere putatur. Revera hic Nervus provinciam satis amplam habet; attamen non adeo diffusam uti vulgo creditur: nam plures alii nervi, quoniam huic se adjungentes inosculati sunt, ejus pars esse perhibentur, licet ipsi distinctas origines, & rursus à *Paris octavi* nervo abscedentes, divaricationes peculiare & ab eo diversas obtineant. Quare ut unicuique suum tribuamus, hunc *Paris vagi nervum* à carceribus ad metam profecuti, proprios extensionis ejus tractus & vestigia indagabimus; & insuper aliorum cum ipso confederationes & coincidentias ostendemus.

Itaque *Octava Nervorum Conjugatio* infra Nervos auditorios, è lateribus medullæ oblongatæ, radice ejus fibris numerosis constante, exoritur: in homine duodecim ad minus, quarum aliæ majores, aliæ minores sunt, satis conspicuæ habentur; quibus *fibra insignis*, seu potius *Nervus* cæteris longe major, à *spinali medulla* accedit, iisque adjunctus, eademque tunica à dura matre ascita involutus, una Cranio egreditur, ac si omnes in eundem truncum coalescerent: Iste autem *Nervus accessorius*, quin & aliæ plures *fibræ* sub involucri illo usque distinctæ manent, & postea abscedentes separatim in provincias peculiare feruntur.

Quippe *Nervus iste spinalis*, Cranio perforato, conjugationem suam deferens, in *musculos cervicis & scapulæ* deferitur; porro, *fibra insignis* è *Paris vagi* origine, mox in *Conjugationis septime processum* duriorē effertur; duæque aliæ *fibræ*, statim relicto *cæterarum consortio*, in *musculos gula & cervicis* tendunt: reliquæ autem *fibræ* simul colligatæ, usque sociæ pergunt, & vice aliorum comitum, à quibus deferebantur, satellitium illico novum & quasi succedaneum asciscunt; nimirum *ipsius Nervus intercostalis* modo *truncus integer*, prout in plerisque quadrupedibus habet; modo *ramus* tantum, prout in homine & aliis quibusdam animalibus observare est, accedit.

Hic loci ubi *Nervi intercostalis* seu *truncus*, sive *ramus*, *Paris vagi caudici* inosculatur, *plexus insignis* constituitur, scil. *Nervi truncus*, ibidem major factus, in tumorem quendam, corpori calloso, seu ganglio similem, attolli atque excrescere videtur: hic, cum oblongus sit, à *Fallopio Corpus olivare* dicitur; cuiusmodi modo unicum, modo bina, idem Author huic *Nervo* adesse pronunciat; cum revera in *Paris vagi trunco* unum, alterum autem in vicino *intercostali*, constanter reperiatur.

Circa hujusmodi *plexus* in genere advertimus, ipsos in *Nervis*, quasi *nodos* in *canna* aut arboris caudice, constitutos esse, quoties scil. *ramus* è *trunco* prodit,
aut

aut aliunde illapsus, in eundem recipitur; cumque eodem sæpe loco furculi quidam abscedunt, alique adveniunt, plexus ibi major evadit; & adhuc, quo plurimum furculorum ac propaginum alicubi in Nervo aditus exitusque simul conveniunt, eo magis plexus magnitudo & moles augetur: si quando autem ramus à Nervo quopiam sine plexu constituto procedere videatur, revera sub eadem tunica solum inclusus, non tam ramus quam socius habendus est, utpote qui longo prius ductu, singularis ipse Nervus & satis distinctus simul pergebat, neque ante discessum suum omnino inosculabatur. Ejusmodi vero *plexum usum* videtur esse idem qui est nodorum in caudice arboris, seu qualis *diverticuli* est juxta compita siti; nempe ut cum spiritus animales una cum succo nervoso itinera diversa instituant, nè mutuo occurrentes confunderentur, alii ab aliis secedere, & donec ordines suos & justam diataxin recuperent, paululum divertere possint.

In dissectione Nervorum qui præcordiis & visceribus distribuuntur, *duo plexus Gangliiformes*, nempe prædictus in *Paris vagi trunco*, atque alter vicinus in *Nervo intercostali* succrescens, sunt velut *bini lapides terminales*, quibus primo perquisitis, exinde cætera pensæ Anatomici fila ultra citraque facile pertractantur. Verum ut *hi plexus* investigantur, *arteria carotidis* truncus utrinque inter cervicis musculos detegatur; dein tractum ejus sequendo, prædicta corpora olivaria circa mandibulæ inferioris insertionem in conspectum venient; è quibus utriusque Nervi tum *origines superiores* tum *ramificationem inferiores* designari poterint. Verum quoniam hic circiter loci Nervi aliter in *homine* ac in *brutis* configurari inipiunt; quo discriminis ratio innotescat, libet utriusque *ideologiam* distincte & theorisum prosequi; atque imprimis *Paris vagi hypotyposin*, ejusque cum *intercostali* aliorumque Nervis *confederationes*, quemadmodum in *homine* reperiuntur, trademus.

Itaque *plexus gangliiformes*, super *Paris vagi* trunco constitutus, Nervum unum aliunde immissum recipit, aliumque à se foras emittit. Hinc à *Nervo intercostali* furculus infertur, secus ac in quadrupedibus plerisque, ubi Nervi intercostalis integer truncus Pari vago accedit, ac uniri videtur. A *plexu* autem prædicto *ramus insignis* emissus versus *laryngem* defertur, qui cum in *tres* furculos dividitur, *primus* illorum in sphincterem gulæ protenditur; *secundus* sub cartilagine scutiformi demersus, ad laryngis musculos superiores, atque ad musculum quo laryngis rima occluditur, propagines distribuit; atque *tertius* etiam cartilaginem scutiformem subiens, Nervi recurrentis apici occurrit, eidemque unitur. Talis *Nervi hujus* cum *recurrente inosculatio* in homine & quibusvis perfectis animalibus constanter reperitur.

Infra prædictum *Paris vagi plexum*, caudex ejus, juxta latus arteriæ carotidis ascendens, recta deorsum pergit, atque in itinere propagines quasdam exiles eidem impertit, quæ modo vasis truncum circumligant, modo tunicis ejus inferuntur. In *ima cervice* hic *Paris vagi* truncus è plexu vicino Nervi intercostalis ramum admittit, atque in sinistro latere ibidem circiter loci, ramum alium à se in Nervum recurrentem dimittit; qui ramus transversus in sinistro tantum latere protensus in homine ac brutis omnibus reperitur: exinde vero *Paris vagi truncus* absque ulla insigni ramificatione descendit, usque dum è regione primæ

aut secundæ costæ pervenitur; ubi *plexu* altero constituto, *furculi* plures ac *fibræ* numerosæ versus *Cor* & *appendicem* ejus dimittuntur. Attamen hæc *nervorum cardiacorum* *divaricatio* non eodem profus modo in utroque latere habet.

Nam in *sinistro*, *furculus* unus aut alter insignis emissus, una cum aliis *furculis* è Nervo intercostalioriundis, plexui cardiaco inferuntur; *fibræ* autem multæ ibidem prodeuntes, vasis cordis appensis, auriculis ejus & *pericardio* distribuuntur. In *dextro latere* *furculus* insignis in plexum cardiacum majorem, alter in minorem, atque *duo* alii *furculi* cum nervo, è plexu medio trunci intercostalis versus plexum cardiacum eunte, se associant, ac uniuntur: Insuper *fibræ* numerosæ in *vasa Cordis* & *pericardium* pariter descendunt. Prætera item, *Nervus recurrens* in hoc latere superius oriundus, circa arteriam axillarem reflectitur, cum in *sinistro latere* idem multo inferius hoc plexu à trunco Paris vagi abscedens, *arteria truncum* *descendentem* circumligat, & exinde sursum retrovertitur.

Nervus recurrens etiam si videtur ramus à Paris vagi trunco emissus, revera distinctus & *singularis Nervus* usque ab origine Paris vagi accessit; tamen melioris conductus gratia, sub eadem tunica cum reliquo Paris vagi trunco continetur. In utroque latere, circa reflexionis nodos, *furculos* & *fibras* dimittit, qui in *Cor*dis *vasa* distribuuntur. *Nervus reflexus* in ascensu suo ramum à plexu medio intercostali, aliumque è Paris vago, in sinistro latere accipit; uterque autem *recurrens* asperæ arteriæ propagines plures distribuit; dein extremitas ejus cum *furculo*, qui è plexu Paris vagi ganglioformi dimittitur, occurrens, unitur.

Paulo infra *sinistri recurrentis* à Paris vagi trunco abscessum *ramus alter insignis* utrinque dimittitur, qui versus *Cor* delatus in postica regione basin ejus obducens, utrinque occurrit, ac in toto processu *furculos* per totam *Cordis* superficiem dispergit. Prout *furculi* ab his ramis in *posticam cordis regionem*, ita à *plexibus cardiacis* rami & propagines multæ procedunt, qui in *partem ejus anticam* divaricantur.

Sunt autem *duo plexus* è quibus *Nervi* in *Cor* distribuuntur, *Superior* & *major inter Aortam* & *arteriam pneumonicam* consistit. *Nervi* hunc constituentes sunt ramus unus aut alter insignis, utrinque è *Paris vagi trunco*; at præcipui & plures *nervi*, ex utroque *Nervo intercostali*, sc. è medio ejus plexu, huc descendunt. E *plexu* hoc, *duo* aut *tres* insignes *Nervi*, subtus *Aortam* lati, in *Cordis* *latus sinistrum* feruntur. Cæterum ab hoc *plexu* *furculus* emissus, *arteriam pneumonicam*, facta velut ansula, circumdat; atque hujus ansulæ partem exteriorem, ramus è *dextro Paris vagi trunco* descendens, ac alter è *Nervo* qui in *posticam cordis regionem* destinatur elatus, conveniunt, & *plexum minorem* efficiunt; è quo *Nervi* in *dextrum* in *dextrum Cordis* *anterioris* *latus* mittuntur.

Notandum fit, quod in *brutis animalibus*, à *Paris vagi trunco* longe plures & majores *Nervi* in *Cor* & *appendicem* ejus feruntur, quam in *homine*; in quo sc. præcipui *Nervi* cardiaci à Paris intercostali procedunt, prout inferius ostendetur; quare in *brutis* ideo *Par vagum* *Cordi* *majora subsidia* præbet, quia *Nervus intercostalis* eidem vix ulla contribuit. Porro per totum *Paris vagi tractum*, unde *Nervi* cardiaci procedunt, plures exiles propagines utrinque emissæ *œsophago* & *glandulis* extra *pericardium* sitis inferuntur.

E regione Cordis, *Paris vagi truncus* plures furculos insignes utrinque emittit, qui in *pulmones* delati, una cum vasis sanguiferis per totas illorum compages distribuuntur, ac in transitu *bronchiorum ductus*, tum *arterias* quoque & *venas* & *modos* assequuntur, & propaginibus quaquaversus emissis, hæc vasa superascendunt & circumligant; dein ejusdem *Paris vagi truncus*, juxta tracheæ latera utrinque descendens, multas propagines etiam in *œsophagi tunicas* distribuit.

Infra *ramos pneumonicos*, uterque truncus *Paris vagi*, juxta *œsophagi* latera deorsum pergens, in *duos ramos*, scil. *exteriolem* & *interiolem*, dividitur. *Rami utrique interni* statim ad se mutuo inclinati, rursus in eundem Nervum coalescunt, qui recta versus *œsophagum* dimissus, juxta *exteriolem* orificii ejus partem incedens, *ventriculi fundum* circumdat. Pariter *duo rami externi* ad se mutuo inclinati, in eundem Nervum coalescunt, qui ad ventriculum dimissus, juxta *internam* orificii ejus partem delatus, illinc reflectitur, ac *partem ejus supernam* perreptat. Ab utrisque ramis, juxta oppositas orificii superioris partes delatis, plures furculi producuntur, qui mutuo inosculati, *plexum nervæum*, reticuli instar, constituunt. *Ramus stomachicus inferior* juxta sinistram partem fundi ventriculi plures fibras & propagines dimittit, qui aliis à *plexu mesenterico* & *lienari* emissis uniuntur. Porro, in dextra parte ejusdem fundi ventriculi, propagines ab utroque ramo *stomachico* emissæ, furculis aliis à *plexu hepatico* sursum emissis uniuntur; atque circiter hunc locum, octavi nervorum *Paris* uterque truncus terminari videtur, quippe ultimum quod illius percipere licet, sunt propagines quædam à ramis *stomachicis* dimissæ, quæ ramulis & fibris à *plexibus mesentericis* sursum emissis inosculantur.

CAPUT XXV.

Nervi Intercoastalis Descriptio.

POST explicationem *Nervi* ad *præcordia* & *ventriculum* protensi, partium interinarum serie ducimur ad describendum Nervum huic affinem, quique ad finitimam provinciam, nempe ad *viscera omnia imi ventris* infra ventriculum contenta, ramificationes suas exporrigit. Hic *Intercoastalis* vulgo appellatur, eo quod juxta costarum radices incedens, in singulis earum interstitiis à medulla spinali ramum accipit. Origo ejus nondum satis detecta fuit; nam à plerisque Anatomicis pro ramo *Paris vagi* perperam sumitur: cum revera licet *Par vagum* & *Intercoastale* per furculos invicem emissos inter se communicant; tamen quoad utriusque principia, truncos & divaricationes plane distinguuntur. Quod si hæc posterior Conjugatio, peculiaris *Nervi* titulo ei denegato, prosapiam alienam confiteri debeat, certe *Pari vago* nihil debet, sed *Nervis Parium quinti & sexti* originem suam acceptam refert; nam bini aut tres furculi, à nervis istis versus oculos & faciem euntibus reflexi, in eundem caudicem, qui *Nervi intercoastalis* truncus est, evadunt, prout supra innuitur.

Nervus intercoastalis eo ritu constitutus, & cranio per foramen proprium egressus,

fus, mox *plexum ganglioformem*, prope alium similem *Paris vagi plexum*, continet; in quem duo nervosi processus à Pari intra cranium ultimo, seu primo vertebrali, feruntur. Ab isto *plexu* furculus unus in *sphincterem gula*, atque alter insignis in *plexum ganglioformem Paris vagi* demittitur. Deinde hic Nervus juxta vertebrae descendens, in media cervice *plexum alium* longe majorem habet, in quem Nervus amplius à vicino Pari vertebrali inferitur; ab eodem vero plures Nervi qui *præcordia* respiciunt quaquaversus distribuuntur: Nam duo vel tres Surculi in diaphragmatis Nervum, furculus unus in Nervum recurrentem, mittuntur; præterea fibræ & propagines numerosæ & versus Tracheam feruntur, quæ ipsius & oesophagi tunicis atque vasis sanguiferis inferuntur; porro ramus in Paris vagi truncum, & bini notabiles Nervi in *plexum Cardiacum* descendunt: dein paulo inferius Nervus alter solitarius, è trunco intercostali procedens, etiam *plexui Cardiacum* inferitur: Qui rami insignes à *Nervo intercostali* utrinque dimissi, quatenus cum aliis ab utroque *Paris vagi* trunco derivatis una coeunt, ipsum *plexum cardiacum* efficiunt; Attamen hi *rami cardiaci* à *Nervo intercostali*, sicuti & *plexus cervicalis*, à quo procedunt, homini peculiare sunt, atque in brutis animalibus omnino desiderantur.

Truncus intercostalis à *plexu Cervicali* versus claviculam descendit, ubi pectoris cavitatem ingressurus, in arteriam axillarem veluti ad rectos angulos incidit, eamque stringit; unde in Thoracem juxta primæ & secundæ Costæ radices demergitur; atque illic tres vel quatuor ramos à Nervis vertebralibus proxime superioribus accipiens, *Plexum alium insignem* (qui vulgo *intercostalis* appellatur) constituit. Supremus Nervorum vertebralium huic *plexui* accedens in itinere arteriam vertebralem stringit, ac fere circumligat. In brutis per hunc Nervum, qui arteriam vertebralem stringit, *plexus intercostalis cum radice Nervi diaphragmatis* communicat, & non alio modo nisi per fibras minores ab infima parte hujus *plexus* in Nervos emissas. Porro in brutis ramus insignis ab hoc *plexu* in truncum *Paris vagi* effertur. Verum in homine truncus intercostalis Thoracis cavitatem, sine ulla communicatione cum aliis partibus habita, pertransit; nisi quod hinc, in toto descensu, juxta costarum radices incedens, in singulis earum interstitiis, & deinceps usque ad os sacrum, à vertebrarum internodiis *ramum vertebrarum* admittit.

Par intercostale, ubi Thoracis cavitate emensa è regione fundi ventriculi pervenerit, utrinque *ramum insignem* dimittit, qui versus *mesenterium* tendens, præcipuos illius *plexus* constituit. Sunt autem *Plexus mesenterici* numero septem; videlicet quinque magni superiores, & duo minores inferiores siti: è quibus omnibus propagines & fibræ numerosæ in partes quas respiciunt, inque *plexus* vicinos, invicem mittuntur. Nervi mesenterici qui in hos *plexus* feruntur, ipsique *plexus*, ac demum fibræ & propagines, quæ tanquam lucis radii ab iis quaquaversus emanant, juxta modum sequentem, tum in homine tum in brutis perfectioribus disponuntur.

Itaque in sinistro latere ramus mesentericus, à *Nervo intercostali* abscedens, & deorsum vergens, in duos surculos insignes dirimitur: horum major superius versus stomachum reclinatus, mox in *plexum*, velut rivulus angustus in stagnum amplum, se diffundit. E *plexu* hoc fibræ & propagines numerosæ per quatuor vel ut

manipulos egrediuntur. Primus horum, qui & maximus fibrarum ejus fasciculus est, in *ventriculum* elatus, partim fundo ejus impenditur, partimque hæ fibræ aliis à ramo stomachico dimissis occurrunt ac inosculantur. *Alter* fibrarum nervearum manipulus ab hoc plexu ad *Lienem* progreditur; ubi Nervi vasa sanguifera comitati, eaque varie circumligantes, in penitiorem lienis compagem discescuntur; è quibus tamen versus lienem euntibus furculi quidam *vasa brevissima* assecuti in *Stomachum* feruntur. *Tertia* fibrarum nervearum cohors inter *hunc plexum* & *hepaticum*, in latere dextro, è regione positum, interjecta est. *Quarta* denique fibrarum Conjugatio *hunc*, & *plexum* mesenterii *maximum* ei subditum, connectit.

Inferior rami mesenterici, qui è sinistro latere est, *furculus*, in plexum succrescit, ad quem ramus proximus vertebralis, Nervo intercostali destinatus, perducitur: Ab hoc *plexu* præcipuus *fibrarum nervearum fasciculus* in *renem* sinistram deferitur, fibræque ante renis ingressum vasa emulgentia stringunt, & varie circumligant: porro inter hunc plexum & mesenterii maximum, plures fibræ protenduntur; hinc etiam multæ propagines in capsulam atrabiliariam distribuuntur.

In dextro latere, ramus mesentericus à trunco intercostali dimissus, & pariter bifidus, in *furculo* ejus *superiore plexum hepaticum* continet; è quo maximus fibrarum nervearum fasciculus versus *hepar* effertur; cujus numerosæ propagines, vasa sanguifera comitatæ, arteriæ hepaticæ truncum valde stipant, & veluti facto reticulo investiant: Quæ fibræ & propagines superius elatæ, in *hepar*, in *cistina felleam*, *ductum cholidochum*, *pylorum*, & *pancreas* disseminantur. Porro, multæ quæ hujus Conjugationis sunt *fibræ*, propaginibus & fibris ab utroque Nervo stomachico dimissis, occurrunt, iisdemque inosculantur. *Aliis* fibrarum nervearum *manipulus* inter hunc *plexum* & *lienarem* oppositum, alterque inter *hunc* & *maximum mesenterii plexum* protenditur; quinimo inter *hunc* & *Renalem* ejusdem lateris subiectum, per *furculum* amplum dimissum, communicatio quædam habetur.

Surculus inferior rami mesenterici dextri pariter ac in latere opposito habet, prope capsulam atrabiliariam *plexum* satis notabilem continet; cui statim Nervus intercostalis ramum suum vertebralem inferius acceptum impertit. Ab hoc plexu præcipuus fibrarum Nervearum fasciculus, *Reni* destinatus, vasa sanguifera, pari modo ac in latere opposito est, amplectitur; item multæ fibræ & propagines ab hoc *plexu* ad *vicinos*, scil. *hepaticum* & mesenterii maximum, protenduntur; quinimo ab eodem fibræ quædam in *capsulam atrabiliariam* disperguntur.

Ad hunc modum *uterque ramus mesentericus*, à Pari intercostali profectus, & statim bifidus, *binos* in *utroque latere plexus* immediate constituit. In medio horum, *plexus omnium maximus*, velut *Sol* inter *ceteros planetas*, consistit; è quo *furculi* & fibræ numerosæ in omnes mesenterii partes disperguntur; quæ quidem in toto processu vasa sanguifera assequuntæ, eadem varie supercandunt & circumligant. Porro, inter hunc plexum & singulos quatuor prædictos, peculiaris fibrarum fasciculus producitur. Insuper in sexu foemineo hinc propagines quædam in uteri glandulas, Testes vulgo dictas, feruntur. Attamen à ramis mesen-

mesentericis, qui priores plexus constituunt, nulli insignes rami, sed tantum minores furculi, in hunc plexum mittuntur. Quinimo *præcipuus Nervus* qui huic inferitur, & spirituum copiis in ipsum convehendis primarius & via lata esse videtur, à *plexu* quodam *exiguo*, longe inferius juxta intestinum rectum nato, effertur; qui *plexu* una cum altero vicino suo, quos *mesenterii plexus minores* appellamus, mox describetur; interim, ut ad eos ordine perveniamus, *Nervi intercostalis* ductum sequemur.

Infra ramos mesentericos, à quibus prædicti *plexus superiores* constituuntur, *intercostali truncus* inter lumborum musculos descendit, atque *ramum* quemlibet *vertebralem* in descensu admissum partibus quibusdam internis impendit.

Ramus enim *vertebralis*, *trunco intercostali* juxta renes utrinque adductus, in *testes femineos*, dein aliquot sequentes in *ureteres* feruntur. E regione vigesimæ septimæ vertebræ, ramus unus *vertebralis*, & bini alii ab *intercostali truncus* profecti, versus rectum intestinum tendunt, ibidemque ternis paribus ad altero latere emissis occurrunt; qui omnes simul uniti, *plexum* qui *abdominis infimus* est, constituunt. A *plexu* hoc Nervus insignis, sursum elatus, in maximam mesenterii plexum effertur, qui in itinere furculum unum, & deinde alterum, à Nervo *intercostali* utrinque dimissum accipit; idemque prope metam suam propagines quasdam in *glandulas uterinas* distribuit.

Cæterum à *plexu prædicto infimo* Nervus versus superiora circiter uncia spatium incidens, *plexum alium minorem* in vicinia constituit; è quo Nervus unus *sursum*, & alter ex opposito recta *deorsum* tendit. Prior horum in plexum mesenterii maximum deferitur, atque in toto transitu intestinum rectum & coli partem subten dit, iisque multas exiles propagines inserit. Alter autem ab hoc *plexu* Nervus, versus anum sub intestini recti parte inferiore descendens, ei crebras item propagines impertit; adeo ut *hic plexus* omnium qui intra abdomen sunt *minimus*, tantum istius Nervi gratia, qui scil. intestino recto colique parti substratus, plexui mesenterii maximo inferitur, constitutus esse videtur.

A *plexu vicino infimo*, cui *hic minimus* originem debet, duo Nervi prodeuntes, atque in pelvim dimissi, *binos ibi plexus*, scil. in alterutro latere unum, efficiunt, in quos nervi ab ossæ sacro asciti & prioribus inosculati coeunt; è quibus vero nervi in partes adjacentes distributi; singulis excretionibus, sc. *urina*, *stercoris*, & *seminis* illic loci factis, prospiciunt: nam *duo nervi intestini recti* extremitatem subeunt, totidemque in *uterum*, aut *prostatas*; unus autem, isque *insignis*, in *vesicam* deferitur.

Ut vero ad *Par intercostale* redeamus, postquam uterque ejus truncus tres ramos, è quibus inferiores prædicti abdominis plexus mediate aut immediate constant, emiserat, recta versus os sacrum descendit, atque in itinere propaginem adhuc unam aut alteram in *ureteres* dimittit: quamprimum autem ad principium ossis sacri pervenitur, ambo Nervi ad se mutuo inclinati, intra ejusdem ossis curvaturam demerguntur, ibidemque juxta declivitatem ejus, & deinde in suo descensu, super ipsum, duobus aut tribus processibus simul connecti videntur; atque ita demum *uterque nervus* in *fibras minutas* desinit, quæ in *sphincterem ani* distri-

distribuantur: quandoque tamen prope unum processum transversum uterque Nervus in *plexum rotundum* coeunt, è quo singulari plexu similes fibræ minutæ producuntur. Porro istis fibris ab *intercostali Pari* ano insertis multæ aliæ à *Nervo primo vertebrali* occurrunt, ac mutuo inosculantur.

CAPUT XXVIII.

De Nervo spinali ad Par vagum accessorio; item de Nervo Diaphragmatis.

Postquam Nervos *Paris vagi & Intercostalis*, qui ad præcordia & viscera omnia mediæ ac imi ventris, nec non ad quasdam alias partes functionis involuntariæ executrices protenduntur, explicavimus: Proxime his succedunt Nervi quidam alii, cum prædictis in origine, aut in ejusdem muneris exercitio, communicantes, sc. *Nervus spinalis, & Nervus Diaphragmatis*; de quibus ordine dicemus.

Supra ostendimus, quod *Paris vagi Nervus* in ipsa origine fibris numerosis constat: quibus alter insignis Nervus è longinquo oriundus accedit, cumque ipsis inosculatus, simul cranio egreditur. Circa Nervum hunc, quoniam ortus & distributio ejus valde anomalos habentes, nondum ab aliis Anatomicis notantur, operæ pretium videtur, paulo diligentius inquirere. Itaque si *Nervi hujus principium indagare velimus*, illud in latere *spinalis medulla* cum acuta cuspide incipiens, juxta sextam aut septimam cervicis vertebra, deprehendetur, Fig. 12. c. c. In ascensu vero mole auctus, Caudici medullari nusquam inseritur, sed in toto tractu lateri ejus utrinque accumbit, cui fibris quibusdam admissis superficiem tenus annectitur. Iste ad hunc modum è cervice assurgens, ac intra cranium delatus, *Paris vagi* fibris adjungitur, quibus in unum truncum coalescere visis inosculatur, ac eodem foramine cranio egreditur; quo perforato, Nervus spinalis, denuo statim *Paris vagi* trunco abscedens, extrorsum reflectitur, Fig. 9. ♀. ♂. Advena seu peregrinus hic Nervus, sodali suo post breve commercium relicto, super musculos Cervicis defertur, quibus propagines quasdam impertit, cumque *Paris decimi furculi* quodam inosculatur; exinde vero, ulterius provectus, longo ductu solitarius incedit; donec ad musculum scapularem pervenerit, cui fere totus impenditur. Fig. 9. ♀. Hic Nervus non tantum in *Homine & quadrupedibus*, ast etiam in *volucris & piscibus* constanter reperitur; in illisque vice brachiorum, alis & pinnis movendis destinari videtur.

Circa *Diaphragmatis Nervum* multa non minus observatu digna occurrunt. Quoad originem observare est, quod è *Nervis brachialibus* cum gemina aut tripla radice oriatur; nempe duo vel tres furculi, è prædictis *Nervis* profecti, in eundem truncum, qui *Diaphragmatis Nervus* est, coalescunt. In homine furculus ejus primus, qui & maximus, è *Nervo secundo vertebrali* producitur; cumque ab eodem Nervorum vertebralium manipulo hic loci prodeunte *primus brachialis* exoritur, in principio ejus prædictus furculus radicatur: quare cum in *Brutis* *primus Nervus brachialis* è quarto aut quinto vertebrali exoritur, etiam *Diaphragmatis Nervus* originem suam longe inferius incipit: bini alii furculi ex ipsis Caudicibus Nervorum brachialium,

chialium, qui proxime succedunt, oriuntur, Fig. 9. γ. φ. Truncus autem qui ex furculis istis conflatur, per Cervicis ductum & Thoracis cavitatem, sine ulla ramificatione usq; ad Diaphragma singularis pergit, Fig. 9. ζ. ubi in tres aut quatuor furculos denuo expansus, in utroq; latere, carnosæ sive musculosæ ejus parti inseritur.

CAPUT XXIX.

De ratione discriminis quod Nervos Paris vagi ac intercostalis in homine ac in brutis animalibus intercedit; item de reliquis Nervorum paribus tum intra Cranium, tum è medulla spinali oriundis: etiam nonnihil, de vasis sanguiferis quæ ad spinalem medullam pertinent.

HActenus Nervos omnes ad præcordia & viscera, nec non ad plerasque alias partes, quæ functionis involuntariæ organa sunt, protensos, juxta ritum quo isti in *homine* conformantur, descripsimus; eorumque munera ac usus, ac in omnibus phænomenon^{um} maxime notabilium rationes, subdidimus. Priusquam ad reliquas Nervorum conjugationes procedimus, ostendere oportet, sub quo discrimine Nervi prædicti in *brutis animalibus* reperiuntur, & in quem finem talis cuiusque illorum discrepantia instituitur.

Supra innuebatur Paris vagi truncum, in *quadrupedibus*, vasa nervea plura quam in *homine* ad Cor & appendicem ejus mittere: Cujus ratio satis obvia est; quia scil. Nervi cardiaci in brutis fere tantum ab hoc Pari, & vix omnino ab intercostali procedunt; quare cum isti solum unius originationis sunt, ideo plures requiruntur, qui tamen omnes multo pauciores sunt quam iidem in homine, à gemina stirpe, scil. ambobus Nervis, profecti: in quantum bestię prudentia carent, & variis diversisque passionibus non multum obnoxie sunt, ideo non opus erat, ut spiritus ab *ἐγκεφάλῳ* in præcordia derivandi, duplici commeatu, scil. uno pro functionis vitalis exercitio, & altero pro affectuum impressionibus recipiendis, potirentur; quin sufficiat eos omnes, in quacunque ipsorum munera destinatos, eodem usque tramite deferri.

In plerisque Brutis, *Nervus intercostalis* à Plexu ejus ganglioformi, fere sine ulla ramificatione, usque ad Plexum ejus thoracicum, solitarius perstat: in quo tamen transitu non eodem ritu in omnibus habet: nam in quibusdam *singularis*, & seorsum à Paris vagi trunco deferitur, nec in toto itinere, nisi superius per furculum à Plexu ganglioformi dimissum, cum eo communicat: in plurimis vero Nervus intercostalis mox à plexu ejus ganglioformi in vicinum Paris vagi plexum transit, Fig. 10. C. ubi cum utriusque Nervi coalescere videntur, illuc ambo sub eadem communi capsula involuti, quasi unicus essent, simul feruntur, donec è regione primæ costæ pervenitur, ibidemque plexu constituto, Nervus intercostalis Pari vago abscedens, in plexum Thoracicum deferitur; simulque Nervus alter inter hunc & istum plexum protenditur: qui Nervi cum unus sub, & alter supra Arteriam subclaviam deferitur, facta velut ansula, truncum ejus constringunt, Fig. 10. g.

Etiam si Nervus intercostalis, à jugulo ad summitatem Thoracis, cum Paris vagi

vagi trunco sub eadem vagina defertur; haud tamen eidem unitur, sed utrique in toto hoc tractu usque distincti manent, & membrana dissecta, facile ab invicem secedunt, nisi quod fibrillis quibusdam ab invicem emissis quibusdam locis connectuntur: quatenus autem hoc ritu Nervus intercostalis Paris vagi trunco adjunctus, sub tegmine ejus incedit, solum *tutela & melioris conductus* gratia ita constitui videtur: quare in quibusdam, forsan ubi truncus intercostalis major est, aut transitus ejus stadium brevius, quasi tali prædio non opus esset, ipse solitarius descendit. Vidimus hunc Nervum in uno latere Paris vagi præsidio obtectum fuisse, altero solitarium processisse.

Sive Nervus intercostalis ab inferiori Paris vagi plexu abscedit, sive non, utcumque inter hunc & plexum Thoracicum in plerisque brutis, forsan omnibus, ramus protenditur qui in transitu Arteriam vertebralem circumligat, quo certe inter *præcordia & exteriora respirationis organa sympraxis* sustinetur: quinimo ab hoc inferiori Paris vagi plexu quandoque furculum & fibras ad rami brachialis principium, in quo Diaphragmatis nervus radicitur, deferri observavimus; quandoque etiam, licet rarius, à plexu thoracico propagines quasdam versus Cor & appendicem ejus emissas vidimus. In Cercopitheco, supra hunc Plexum thoracicum, furculos quosdam & propagines à Nervo intercostali versus præcordia attentos, prius innumimus.

Circa hos Nervos infra præcordia, in ventriculum & viscera inferiora ubivis distributos, nullum fere discrimen, quo in homine ac brutis differunt, advertere licet. *Diaphragmatis Nervus* in quadrupedibus inferius consistit: cujus ratio est, quia *Nervi brachiales*, è quibus iste procedere debet, inferius oriuntur; quoniam scilicet. *Brutis longiora colla*, utpote *jugo destinata*, tribuuntur. His ita de Nervorum in utraque specie differentia præmissis, quod superest, *reliqua eorum Paria* explicanda transeamus.

Itaque ex illis intra Cranium oriundis, *Par Nonum* fibris etiam multis in origine constat (prout supra ostendimus) quibus una colligatis truncus existens, versus linguam defertur, per cujus integram compagem, nempe à basi usque ad apicem, trajectus, in toto tractu propagines exiles in utrumque latus dispescit. Fig. 9. ☉. adeo ut nihil magis obvium sit, quam quod hic Nervus *linguæ motus* pro *Sonorum articulatione* requisitos perficiat, prout Nervi à Pari quinto in hoc membrum lati *Saporibus dignoscendis* inserviunt; pro utriusque facultatis, sc. tum motivæ, tum sensitivæ, exercitio, linguæ textura insigniter fibrata, duplicis organi virtutem præstat; itaque à binis nervis, præter spirituum supplementa, tum motus instinctus, tum sensibiles impressiones deferuntur.

Quo prædictus *Paris noni* Nervus linguæ motus facilius exequatur, ante linguæ ingressum furculum unum deorsum mittit, qui furculo è Pari decimo in musculum Sternothytoeidum destinato occurrenti unitur; atque alter conjugationis nonæ ramulus in musculos ossis hyoideos distribuitur, Fig. 9. ☉. ☉. Revera, hi furculi tanquam funiculi dimissi, musculis qui ad linguæ *basin* affiguntur movendis conducunt, qui equidem musculi, tanquam *vectes linguæ suppositi*, ejus motum faciunt.

Nervus decimi Paris, licet intra Cranium cum multis etiam fibris exoriri videatur, tamen illinc in spinæ claustra ossæ dimissus, non nisi intra primam ac secundam vertebra emergens, extra defertur. Statim ab egressu duos Nervos in plexum Nervi intercostalis emittit; in quem finem supra ostenditur: præcipuus vero truncus ejus deorsum latus, & furculum à Pari nono productum suscipiens, musculo sternothyroideo impenditur: porro hic Nervus ramos exterius reflectit, qui in musculos cervicis versus occiput protensos distribuuntur; adeo hoc Par, quasi tantum è vertebralium Nervorum censu esset, *ramos quosdam Nervo intercostali impertit*, cæterique omnes furculi & propaggines ejus *musculorum cervicis motibus peragendis inserviunt*, Fig. 9. H.*. □. Δ.

Hæc de Nervis intra Cranium oriundis, qui (prout ostensum erat) à Cerebri aut Cerebelli partibus existentes, ad functionis spontanæ aut involuntariæ munera destinantur, atque potissimum in *sensuum organa*, aut *facultatum vitalis & naturalis viscera* distribuuntur. Restant plures aliæ Nervorum conjugationes quarum radices sive origines in *medulla spinali* (quæ quidem oblongatæ tantum exterior productio est) consistunt. Hi Nervi spinales, præterquam quod Pari intercostali ramos quosdam elargiuntur, fere in totum musculofo generi impenduntur eorumque munus est, *spirituum copias & motuum obeundorum instinctus extra deferre*, atque *sensibilium impressiones intus convehere*. In quantum medulla spinalis à Cerebro derivari videtur, sitque tanquam via lata & regia ab eodem producta, absque compitis ullis aut tractibus à Cerebello huic insertis, ideo spiritus animales intra Nervos ejus scatentes functionis spontanæ actus fere tantum exeuntur.

Unaquæque Nervorum spinalium paria describere, & singulorum divagationes recensere, eorumque usus & actiones explicare, esset opus immensi laboris ac tædii: cumque hæc *negotia* sine exacta musculorum notitia satis intelligi aut addisci nequit; ab institutione ejus particulari merito hic supersedendum erit: sufficiat vero circa hos Nervos, eorumque principium medullare, in genere tantum, quæ imprimis notabilia & præcipue notatu digna occurrunt, advertere.

Quoad Nervos igitur è spinali medulla productos, observare est, quod in utroque ejus latere, prope limbum anteriorem quatuor vel quinque fibræ in margine superiori, totidemque in inferiori, oriuntur: utrique manipuli piam matrem, sive infimam medullæ spinalis tunicam, & dein membranam proximam sive duram meningem, quæ omnium velut capsula communis est, cum fibris distinctis pertranseunt; postea tamen utriusque marginis fibræ membranam tertiam (tres enim medullam spinalem investiant) pertransientes, una coeunt, & tunica ipsæ sive secunda membrana ascita investiti, in unum quasi truncum evadunt; qui truncus vertebrarum internodio exiens, iterum in plures Nervos ad varias partes destinatos dirimitur. Ad hunc modum in toto medullæ spinalis tractu singuli Nervi vertebrales natalitia sua habent; istis vero in loci ubi Nervi brachiales & crurales egrediuntur, tum medullæ spinalis crassities & latitudo augentur, tum fibrarum manipuli ampliores existunt. Hæc omnia in Fig. 12. satis apte præsentantur.

Nervi brachiales non modo proximis vertebralibus longe majores sunt, ut velut chordæ nerveæ amplæ ac late appareant; verum ut melius pro validis brachiorum, aut crurum anteriorum motibus una conspirent & connituntur, observare est, quod plures eorum per *processus nerveos transversos* invicem connectuntur. Hi processus in quadrupedibus (quorum crura anteriora in nixus difficiliiores & indefatigabiles destinantur) concinno modo intorcessatim producuntur, uti cernitur *Fig. 10. l. l.* Harum usus videtur, non modo in pluribus simul nervis actionis consensum, verum & mutuum robur sustinere; nempe ut spirituum manipuli alii alios exsuscitent, & pro virtute locomotiva fortiter exercenda se invicem suffulciant, ac mutuo sibimet succenturientur. Non absimili ritu circa *Nervos crurales* res habet, ubi chordæ nerveæ insigniter amplæ, è vertebrarum juncturis productæ, dum versus femur descendunt, in toto tractu, quæ superiores sunt processus nerveos usque ab inferioribus emissos suscipiunt. *Figur. 11. p. p. p.*

Adhuc amplius circa *medullam spinalem* advertere liceat, quod sicut *Nervos* ordinata serie & diatxi velut militari manipulatim ac quasi per turmas emittit; ita *Vasa ejus sanguifera* non minus insigni artificio disponuntur: nam quæ in superficie spinalis medullæ quæque juxta ambitum ejus *Arterie & venæ* aliique *sanguiductus* feruntur, rariora quædam & summe notatu digna continent.

Primo observare est, quod *vasa sanguifera* totam *medullam spinalem* pariter ac *oblongata* compagem densa propaginum serie investiunt; quod cuiquam inquirenti manifestius fiet, si prius arteriis vertebralibus atramentum injiciatur; nam à tali injectione aliquoties iterata, facile patebit vasorum plexus veluti retiformes superiorem medullæ tractum obducere. Quo tamen ritu hæc vasa utrinque ab arteriæ vertebralis trunco procedunt, ac qui insuper *sanguiductus venosi* totæ medullæ spinali, ac *arteriosi* ejus portioni inferiori destinantur, non ita plane constat; quia sc. vertebrarum claustra ossea non sine difficili negotio, præsertim in adultis animalibus, perumpuntur; eoque opere ut plurimum vasorum ortus & ramificationes deleri solent: verum ut recondita hæc accuratius rimemur, varias *embryonum* dissectiones instituimus, nempe in quibus vertebrae adhuc molliores quoquomodo diffecare, iisque medullam integram eximere, atque ossium recessus quosvis penitus introspicere licebat; porro vasis omnibus, quo illorum tractus & divaricationes melius perciperentur, liquores vario modo tinctos injecimus. Atque huic indagini successus optatus aderat: nam cito cum plurima admiratione deteximus, quod ejusmodi vasa, sc. *Arteriæ, Sinus & Venæ*, quæ ἐν τῇ σπονδυλικῇ respiciunt, cum apparatu non minus insigni disposita, etiam ad *medullam spinalem* pertinent.

Cum olim *Capita* seorsim à *spina* diffecaremus, *arterias vertebrales* tantum ad ἐν τῇ σπονδυλικῇ spectare, juxta vulgi sententiam, opinabamur: Cumque in abscisso medullæ oblongatæ Caudice tres rami arteriosi (prout in *prima & secunda Tabula pag. 26. & 27.* superius describuuntur) apparerent, idcirco in utriusque Figuræ explicatione, *arteriam vertebralem cum triplici ramo in occiput efferrî* pronuntiavimus. Verum enimvero *Arteria vertebralis*, superiori *spinæ* parti, sanguinis æque

magna tributa ac ipsi *ἐνκεφάλῳ* pendit; atque *medius isteramus arteriosus*, qui in Figura prima litera T. in secunda vero S. insignitur, minime in caput ascendit, verum ab isto arteriarum vertebraliū concursu versus spinam descendit, ac à communi sanguinis per plures arterias confluxu ibidem factō, laticem pro medullæ spinalis summitate irriganda deorsum convehit. Quare hic loci non modo istum errorem nostrum corrigere, at vasorum omnium quæ spinæ destinantur, quæ sc. plurima stupenda continent, exactam descriptionem tradere, oportuno videtur. Cum itaque hæc vasa triplicis sunt generis, sc. *Arteria*, *Sinus*, & *Vena*, singula eorum particulatim exponemus; ac imprimis de *Arteriis* dicemus.

Arteriæ, quæ sanguinem versus spinam conducunt, alio modo *supra Cor*, alioque *infra ipsum* disponuntur. Quoad *prims*, cum *Aortæ* truncus ibi statim in plures ramos fissus, regione spinæ adscendit, ideo è ramis ejus axillaribus *Arteria vertebralis* utrinque producit, quæ recta in occiput ascendens, furculum in cuiusque vertebræ commissuram emittit. *Infra Cor* vero, in quantum Aorta in toto descensu suo spinæ incumbit, è basi ejus juxta singula internodia, duæ arteriæ in spinam suscipiuntur; adeo ut si Aortæ truncus per longum dissectus aperiatur, foraminum duplicium series per totum ejus tractum concinno modo, velut in *capite muræna*, dispositæ apparebunt.

Rami arteriosi, qui tum supra, tum infra Cor versus spinam feruntur, statim bifidi furculum unum musculis vicinis impertiunt, atque alterum juncturis vertebrarum inferunt; qui intra specum osseum delatus, statim in tres ramulos finditur, quorum *bini Caudici medullari*, atque *alter membrana* specum osseum antè succingenti impenditur. Tab. 13. Fig. III. a. b. c. d. e.

Quoad propagines Caudici medullari destinatas, illæ mox duplici via tendentes, hæc utrique fibrarum nervearum manipulo obviam factæ, versus earum origines ascendunt; adeoque arteriola una *posteriorem* medullæ superficiem affecuta, vasa capillaria in ipsam distribuit: altera autem propago arteriosa, quæ major & præcipua est, quamprimum *medulla anterioris* marginem attingit, exinde obliquo transitu in mediam ejus fissuram defertur, ubi pari alterius lateris propagini occurrens eidem unitur, ac ab isto coalitionis nodo Caudex arteriosus, quasi ductus communis, ab utraque propagine vertebrali conflatus, in ea fissura, per unius vertebræ spatium descendit, ac in brevi isto transitu arteriolas tum in utrumque latus dispensat, tum inter medullæ latera eas piæ matri innixas altius inserit: cumque adeo in toto medullæ tractu, præcipuus cuiusque arteriæ caudex in fissura media defertur, primo aspectu videtur, quasi idem truncus arteriosus totam medullæ compagem à Capite ad caudam subduceret: Tabul. 13. Fig. 1. Porro veluti à singularum utriusque lateris propaginum concursu, *Arterias spinæ* supra medullæ fissuram descendit; ita ubi Arteriarum vertebraliū trunci coeunt (quod interdum in *occipite* supra *medullam oblongatam*, & non raro in *cervice* supra *spinalem* fieri contingit) Ramus arteriosus, cæteris aliquanto major, deorsum protenditur. Hunc olim (uti modo innuimus) pro tertio arteriæ vertebralis ramo ascendente perperam cepimus. Cæterum aliquoties adverti, quod in brutis, ubi Arteriæ vertebrales cum angulo acuto supra Caudicem medullarem

dullarem coiverint, isti mox ab invicem discedentes ad utrumque medullæ marginem recta protenduntur, unde statim reflexi iterum in mutuos occursum feruntur, adeo ut inter binas ipsorum coalitiones *figura Rhomboides* describeretur, uti est Tab. 13. Fig. 1. C. Cujus ratio proculdubio hæc est; nempe ut sanguinis versus *ἐν κέφαλον* euntis, flumine ejus parumper diviso, rapidior decursus inhibeat.

Tertius Arteriæ cujusque vertebralis furculus in specus ossæi cavitatem anteriorem delatus, ac statim bifidus, in dextram lævamque tendit, ac utrinque furculo proximo ejusdem lateris, & per processum transversum, istis alterius lateris eodem modo unitis, inosculatur; adeoque omnes hujus census arteriæ in toto spinæ tractu velut *catena annuli* se mutuo excipiunt, & sub eodem ductu flexuoso continuantur. Si Arteriæ vertebralis trunco ac plerisque Aortæ foraminibus atramentum injicitur, omnes hæ arteriæ eodem tinctæ, cum jucundo spectaculo, velut *instita reticularis* apparebunt, prout cernitur in Tab. 13. Fig. III.

Hujusce *plexus arteriosi* summitas in cranium delata, duas propaggines recta emissas *reti mirabili* inserit, & binas alias utrinque lateraliter exeuntes *dura meningi* impertit; ejusdem extremitas inferior, usque ad *os Sacrum* protensa, in vasa minuta, quæ ossium membranæ inserviunt, desinit.

Si inquiratur, ob quem finem hæ arteriæ ita crebra inosculacione concatenatæ intra spinam disponuntur: propter *tres usus* hoc ita institui videtur. Sc. *primo*, hæc vasa (sicuti & Sinuum ductus) repetitis ambagibus eo ritu divaricantur, ut à sanguine ita in crebros quasi vortices contorto, *calor constans*, tanquam à *Balneo marie*, circa medullæ spinalis ambitum suppeditetur; quale quidem muneris genus *plexus Choroeides* intra Cerebri plicaturam præstat. *Secundo*, hac ratione providetur, ne sanguis in medullam spinalem destinatus, illuc ubertim nimis influat, aut à debito influxu deficiat; nam sanguis Caudicem medullarem uberius influxurus, è ramulis *c. d.* in hæc emissaria *e. f.* divertat, atque in defectu ejus, penus subsidiarius è plexu medio per canalem *e.* in vasa *c. d.* evocatus, in eundem Caudicem medullarem derivetur. *Tertius* hujusce *plexus arteriosi* usus videtur esse ut à ductibus ejus sanguis in membranas distribuatur, qui sc. ubique ab istis per vasa capillaria effertur; cujus item reliquiæ per canaliculos à *sinubus* emissos reforbentur. Porro ab hoc condo, si necessitas urget, penus quidam in Cerebri exigentias accieatur; quare hinc vasa minuta in rete mirabile desinunt.

Hæc de *Arteriis* circa spinam distributis. Vasa secundi generis sunt *Sinus*, qui propter medullæ spinalis, non minus quam ipsius *ἐν κέφαλον* usus, *arterias & venas intercedunt*, atque hic implicatione magis concinna ordinantur. Ratio autem cur Sinus ad nobiliores has partes, atque præterea vix ad ullas in toto corpore requiruntur, hæc est; nempe ut circa corpora isthæc sanguinis extravasatio, aut stagnatio quævis omnimodo inhibeat: attamen *vene* interdum non satis deplentur, ut sanguinem ab *Arteriis* depositum illico excipiant, adeoque eluvionem ejus quamvis prohibeant; quapropter *sinus*, velut excipuli magis idonei, ei muneri destinantur, utpote quorum receptacula ampliora sunt, ac cito inaniantur; proindeque sanguinem ab utraque substantia medullari, ne sc. ipsam in *capite* aut *spina* inundet, commodius derivent.

Quoad *Sinus vertebralis* Figuram, ductus ejus *plexui arterioso* conformes huic in toto spinæ tractu subjiciuntur: pari enim modo in *utroque sinu*, qui intra specus ossis cavitatem ab occipite in os sacrum protenditur, *vas unum excipiens*, per cuius statim bifidos canales sanguis ab utraque medullæ superficie in finem reducit; atque aliud *deferens* habetur, cuius ductu idem in venas exportatur. Porro in plerisque animalibus (licet non omnibus) Sinus utriusque lateris super vertebrarum internodia per processus transversos connecti videntur, adeoque inter se communicant: *uterque Sinus* in summitate sua in *sinus Capitis laterales* continuatur; porro ab eo tum in *venam jugularem* tum in *vertebralem* ductus utrinque patescit, Tab. 13. Fig. IV.

Quis sinus prædicti usus in genere sit modo innuitur; nempe ut sanguis ab arteriis in spinali medulla depositus, illinc à vestigio exantletur, ac intra sinuum cavitates ampliores retineatur, donec in venas depletiores factas transferi poterit: at vero, quæ circa istorum canaliculos deprehenditur, *diversimodæ implicationis crebraque inosculatio* ratio esse videtur, ut sanguis, si forte intra sinus partem aliquam uberius aggestus, ibidem stagnare, aut in medullam regurgitare aptus fuerit, per ista crebra emissaria huc illuc in medium, aut in latus oppositum prolixiatur: pari modo de sinibus circa spinam habet, ac cum rusticus in agro suo cerebras poccas transversim factas ad derivandam uliginem quamvis effodit.

Restat alius sinuum vertebraliū usus, cuius supra mentionem fecimus, nempe ut sanguis juxta corpus medullare, per horum (uti & plexus arteriosi) mæandros varie intortos traductus, *calorem* pro spirituum animalium celeri traiectione requisitum velut à *Balneo mariæ* suggerat. Quo flexuosi sinuum tractus & complicationes melius conspiciantur, tinctura quædam venis vertebraliibus injiciantur, atque statim ea sinuum ductus pervadens, ipsosque insigniens, *scale longioris*, cum *multis appendiculis*, apparentiam exhibebit.

Quinimo demum, per istas *sinuum appendiculas* ad *tertium vasorum spinalium genus* manuducitur, quæ nempe sunt *Venæ* in quas sinus omnes sarcinam suam immediate convehunt, quo nimirum ipsi continuo inaniti sanguinem usque recentem excipere possint: Quare per singulas vertebrarum commissuras *ramus venosus* in *sinum* protenditur, qui exemplo sanguinem in eo depositum, ac versus Cor reducendum, auferat. *Venæ* huic muneri designatæ, ad arteriarum exemplar, alio modo *supra Cor*, alioque *infra ipsum* disponuntur. Quoad prius, ramus à venæ trunco infra subclavium profectus arteriam vertebralem comitatur, & per processuum foramina ascendens, inter singulas vertebrae ramulum *Sinui* inferit, Tab. 13. Fig. II. h. h. h. Dein vero hujus venæ summitas, versus occiput delata, in sinus truncum continuatur, perque ductum alium in venam jugularem dehiscit: insuper vero, tanquam hæ communicationes pro sanguine elutriando adhuc minus sufficiant, etiam *inter utrasque venas rami transversim* protenduntur, Tab. 13. Fig. II. i. i. i. Adeo multiplicia prostant diverticula, quibus satis superque providetur ne sanguis propter quamvis occasionem versus Caudicem medullarem regurgitet. Infra Cor, quia venæ Cavæ truncus non uti Aorta immediate spinæ incumbere, easdemque propagines inferre potest, ideo venam

fine

sine pari dimittit, cujus trunco rami bijugi emissi, ac statim bifidi, & *musculis* utriusque lateris & *ipsi spinæ* prospiciunt: Infra renes, cum venæ Cavæ prope spinam deferri spatium conceditur, vena Azygos desinit, atque à majoris venæ, pariter ac ab arteriæ trunco *vasa lumbaria* immediate procedunt.

Hæc de *vasis sanguiferis* ad *spinam* & *superiorem ἐντεφάλην partem* spectantibus nuper observata, & hic *appendicis loco* inserta, referri debent ad aliam hujus farinæ doctrinam superius in capite octavo traditam. Interim ad instituti nostri, *Συγλογίας* sc. quod residuum est ut redeamus, non multa præterea circa Nervos observatu digna occurrunt: Enimvero isti, quoad majores & præcipuas ramificationes, quo ritu eos descripsimus, tum in *homine* tum in *brutis animalibus*, fere constanter habent. Interdum accidit, licet hoc etiam rarius, circa minimarum propaginem & fibrarum divaricationes varietatem quandam evenire: attamen quoad stamina primaria, eorumque protractus, cujusque nervorum paris configuratio in omnibus usque eadem, aut similis existit. Modo restat, ut nervorum Theoriæ hæctenus orationis stylo exaratæ, adeoque intellectui tantum objectæ, demum sensus (quem illi magis respiciunt) prospectui ac arbitrio fistantur. Quapropter Nervorum *Paris vagi* ac *intercostalis*, nec non aliorum qui præcipuæ sunt notæ, ipsiusque *medullæ spinalis declineationes ichnographicas*, palam exhibendas curavimus: Horum Icones ab exemplari mortuo licet desumptæ, tamen post plures dissectiones, & à collatione crebra quoad singulas cujusque partes instituta, quasi ad vivum describuntur; quarum lineamenta, cum notis caracteristicis, ut melius & distincte magis percipiantur, cujusque figuræ protractum ampliorem, ac eorundem in corpore animato nervorum schematismo fere parem, procudi fecimus: porro, quoniam utriusque simul lateris & cavitatis interjectæ contenta in proprio situ describi non possunt, ideo hic supponitur spinam cum medulla oblongata, sive totum Caudicem medullarem in medio dissectum evolvi, ejusque latus utrumque cum Nervorum partibus in toto tractu oriundis ad exteriora projici.

EXPLICATIO FIGURÆ, TABULÆ XXI.

EX CL. WILLIS de Nervis.

Exhibet Nervorum Paris quinti & sexti origines, ab iisque Nervi intercostalis radices profectas; porro ejusdem Nervi & Paris vagi, atque nervi è spina ad Par vagum accessorii origines, & ramificationes usque ad ventriculi regionem productus: Insuper hic Nervorum Paris septimi, noni, decimi, atque Nervi diaphragmatis principia & distributiones repræsentantur; atque in toto tractu è regione Nervorum præcordiis & visceribus insertorum, origines Nervorum Vertebraliū, eorumque cum prioribus communicationes describuntur. Totum hoc Tabula sequens exhibet, prout in Homine diversum ab aliis animalibus reperitur.

- A. Nervus quinti Paris, cum duobus ejus ramis
 A. A. quorum superior recta antrosum tendens, in musculos oculi & faciei, in nasum, palatum, & totius oris partem superiorem propagines distribuit; insuper binos surculos reflectit a. a. qui Nervi intercostalis dua radices sunt: alter quinti Paris ramus inferior, deorsum vergens, in maxillam inferiorem ejusque partes omnes dispergitur.
- a. a. Dua propagines à superiore quinti Paris ramo dimisse, quæ cum surculo altero b. à Nervo sexti Paris reflexo cœuentes, Nervi intercostalis truncum D. constituunt.
- B. Nervus sexti Paris recta antrosum in oculi musculos tendens, è cuius trunco surculus b. qui tertia Nervi intercostalis radix est, reflectitur.
- b. Tertia Nervi intercostalis radix.
- Ci Nervi Auditorii, sive Paris septimi, origo, cum duplici ejus processu, sc. molli & duro.
- c. Ramus ejus mollior, qui totus in partem auris internam distribuitur, scil. in musculum mallei elevatorum, & cochleam.
- c. Ramus ejus durior, qui integer extra cranium emergens, & propagini s. octavi Paris inosculatus, cum ea Nervum singularem constituit, qui statim dividitur in plures surculos: horum
 1. in musculos linguæ & ossis hyoides assumitur.
 2. rursus in plures propagines, quorum superior
 3. in musculos faciei & oris.
 4. in musculos palpebrarum & frontis.
 5. in musculos auris.
- D. Nervi intercostalis truncus, è tribus prædictis radicibus constans, in plexum gangli-
- formem transiturus; qui plexus Nervi intercostalis, extra Cranium producti, supremus nodus esse videtur.
- E. Nervi Paris vagi, sive octavi, origo, multis fibris constans, quibus Nervus Q. è spina oriundus accedit, cumque iisdem inosculatus una cranium pertransit, quo trajecto, demum abscedit, & communicatione cum vicinis quibusdam nervis habita, in musculos scapula ac dorsi impenditur.
- c. Surculus octavi Paris, ramo auditorio occurrens.
- f. f. f. Aliæ propagines Paris vagi in musculos cervicis.
- G. Ejusdem Paris ramus principalis, in plexum ganglioformem proprium demersus.
- H. Plexus ganglioformis superior Paris vagi, qui surculum k. è plexu altero Nervi intercostalis vicino admittit.
- h. Ramus è plexu prædicto Paris vagi in musculos laryngis, cujus surculus insignis Cartilaginem scutiformem subiens, Nervo recurrenti occurrit, eidemque unitur.
- i. Surculus è plexu cervicali Nervi intercostalis in truncum Paris vagi immisus.
- K. Plexus inferior Paris vagi, è quo plures nervi ad Cor & appendicem ejus procedunt.
- l. Surculus insignis ad plexum Cardiacum demissus.
- m. Fibra nervosa in pericardium & vasa cordi appensa distributa.
- n. Nervus recurrens sinister, qui, Aorta trunco descendente circumligato, sursum versus cartilaginem scutiformem reflexus, in ascensu multas propagines * * * *. aspera arteria impertit, ac demum surculo h. è plexu ganglioformi demisso occurrit. Hi-

recurs.

- recurrens à reflexionis nodo propagines quasdam versus Cor dimittit.
- L. Nervus recurrens in latere dextro, qui multo superius reflexus Arteriam axillarem circumligat.
- o. Ramus insignis è trunco Paris vagi in latere sinistro versus Cor dimissus, cujus statim bifidi surculus unus vena pneumonica truncum circumligat; alter posticam Cordis regionem attingens, in plures propagines qua superficiem ejus obducunt, disperseitur: huic pari ramus cardiacus ab alterius lateris trunco emissus occurrit.
- p. Rami prædicti surculus, venam pneumonicam circumambiens.
- q. Ejusdem ramus alter, multas propagines Cordi impertiens; qua propagines superficiem ejus posteriorem obducunt.
- r.r.r. Propagines exiles è trunco Paris vagi emisse, qua longo tractu œsophago inferuntur, extra proprium situm reflexa.
- S.S.S. Surculi plures resecti, quorum ramificationes in pulmonum substantiam distributa, vasa sanguifera varie stringunt & circumligant.
- T.T.T. Truncus Paris vagi dividitur in duos ramos, sc. exteriorem & interiorem, quorum utrique versus pares ramos alterius lateris inclinati, iidem uniuntur, & post mutuam communicationem duos ramos stomachicos, sc. superiorem & inferiorem, constituunt.
- v.v. Rami interni, qui uniti in X rami stomachici inferioris principium constituunt.
- w.w. Rami externi, qui in figura huic adjicienda uniti, ramum stomachicum superiorem efficiunt.
- X. Ramorum internorum coalitio.
- F. Origo Nervi Paris noni cum multis fibris, è quibus unitis Truncus constans versus linguam deferitur; in progressu tamen duos surculos dimittit.
- o.o. Surculus primus deorsum tendens, & ramo Paris decimi unitus, musculo sternothyroideo impenditur.
- o.o. Surculus secundus in musculos ossis hyoidis.
- o. Hujus Nervi truncus in lingua corpus transiens,
- G. Plexus Ganglioformis Nervi intercostalis superior, qui hujus Nervi Cranio egressi supremus nodus est.
- a. Surculus è Plexu hoc in plexum vicinum Paris vagi emissus.
- b.b. Duo processus nervosi, per quos hic Plexus cum Nervo Paris decimi communicat.
- γ. Surculus in Sphincterem gula dimissus.
- F. Plexus medius, sive Cervicalis, qui homini proprius, juxta mediam cervicem, in trunco Nervi intercostalis consistit.
- d. Ramus insignis è secundo pari vertebrali in hunc plexum, quo hic cum Nervo diaphragmatis, in prima radice sua communicat.
- e.e. Duo rami ab eodem Plexu in truncum Nervi diaphragmatis.
- ζ.ζ. Plures fibrae nervosae è Plexu cervicali in Nervum recurrentem, ac in vasa sanguifera; item in Trachea ac œsophagi tunicas disseminantur.
- θ. Surculus ab eodem in Truncum Paris vagi.
- χ. Surculus alter insignis in Nervum recurrentem.
- κ.κ. Duo rami insignes versus Cor dimissi, quos ramus alter λ. paulo inferius oriundus, assequitur; hi deorsum lati inter Aortam & arteriam pneumonicam, paribus ramis alterius lateris occurrentes, Plexum cardiacum Δ constituunt, è quo Nervi præcipui qui Cordi impenduntur procedunt.
- λ. Ramus paulo inferius à Trunco intercostali profectus, qui cum prioribus Plexui cardiaci destinatur.
- Δ . Plexus iste prædictus cardiacus.
- μ. Ansula ab eodem profecta, qua Arteriam pneumonicam circumligat.
- ν. Ansula inferior venam pneumonicam stringens.
- Ξ. Nervus intercostalis in cavitatem Thoracis demersus, ubi arteriam axillarem stringit.
- ξ.ξ.ξ.ξ. Quatuor Nervi vertebrales in Plexum thoracicum dimissi, quorum superior Arteriam vertebralem stringit.
- o.o.o. Tres rami insignes à Cardiaci plexu dimissi, qui anteriorem Cordis regionem obducunt, sicut Nervi p.q. è trunco Paris vagi profecti, ramificationes parti ejus postica impertiunt.
- ω. Arteria vertebralis à Nervo vertebrali circumligata.
- ς.ς.ς. Propagines nervosae anteriorem Cordis regionem obducunt.
- τ.τ.τ. Propagines, & fibrae nervosae in posticam ejus partem distributa.
- ο. Plexus inferior, proprie Intercostalis, sive Thoracicus dictus, cui præter Nervum intercostalem quatuor vertebrales inferuntur. horum supremus in descensu arteriam vertebralem circumligat.
- L. Nervus intercostalis per thoracis cavitatem juxta costarum radices descendens, ubi in toto progressu à singulis vertebrarum internodiis ramum admittit,
- H. Nervus, multis fibris in origine constans,

inter primam & secundam cerebriam emergit, ubi statim duo processus nervosus ē. ē in Plexum superiorem Nervus intercostalis emittit.

- * Ramus ejus, qui furculo noni Pari mittitur, in musculum Sternocleidomastoideum, a p[ar]te Arteria immediate succumbentem, impenditur.

□ Sarculus reflexus in musculis cervicis posterioribus.

△ Sarculus in Nervum spinalem Patheticum.

*** Proxime ab eisdem Nervis rami principis in musculum Sternocleidomastoideum.

- L. Nervus cerebri primus origi, qui in hoc pariterque in cunctis alii cerebriales, multis foris constat, quarum manipulus ante a medulla spinali margine inferiore, ac alter a superiore procedens, obliquis facti, in eundem truncum coalescunt, qui statim in Nervos multifariam distributos dirigitur.

1. Sarculus ab hoc Neruo, in ramum decimi Pari.

2. Sarculus alium in spinalem Patheticum.

3. Ramus insignis sursum in musculis cervicis & autem emissus.

T. Sarculus a Neruo truncato, in musculis cervicis anteriores.

7. Nervus ab hoc Pari, in Nervum primum brachialem, ē que Nervus diaphragmatici radicem supremam habet.

- M. Origi Nervus secundus cerebriales, ē que ramus supremus brachialis procedit, & in quo Diaphragmatici Nervus primus radicitur. Hic Nervus brachialis in quadru-

pedibus juxta quartam aut quintam cerebriam erigitur, proindeque Diaphragmatici radicis inferius conficit.

5. Ramus iste cerebriales brachio destinatus.

Y. Diaphragmatici Nervus, cuius radices furculis ē, ē plexu cervicali accedit, & paulo inferius ab eodem plexu duo alii rami, ē. ē. in truncum ejus protenduntur. Hac communicatione Homini propria est.

6. Diaphragmatici radicis altera, ē Neruo secundo & tertio brachiali.

X. Diaphragmatici Nervus truncus inferior extralocum remittitur, qui in propriis situ Thoracis cavitate sine ulla communicatione trajiciam, recta ad diaphragma pergit, ubi in tres furculos expansus, musculosa ejus parti inseritur.

3. 4. 1. 4. Ceteri Nervus brachiales, ē quorum radicibus Nervus in Plexum intercostalem.


a. u. u. u. Nervorum cerebriales origines, ē quorum singulis radicibus ramus in Nervum intercostalem deferretur.


2. 2. Nervus spinalis ad Par vagum accessorii origo minima, cum cuspidē acuta incipiens.

♀. Eiusdem Nervus truncus ascendens, qui in toto ascensu per latius medulla spinalis incedens, Nervorum cerebriales origines medullae pertransit, & a Canaliculo medullae foras accipit.

♂. Eiusdem Nervus Truncus descendens, qui Pari vago ascendens, extrorsum reflexitur, & post communicationes cum Nervis noni & decimi Pari habitas, totus in musculis scapulae impenditur.

D. Eiusdem Nervus processus inferior.






EXPLICATIO TABULÆ XXII. Ex Cl. WILLIS de Nervis.

Exhibet Nervorum Paris Vagi & Intercoastalis ramificationes inferiores, ventriculo sc. & totius Abdominis visceribus distributas; item Nervorum Vertebraliū, qui priorum ē regione consistunt, cumque aliquibus eorum inosculantur, origines. Horum configuratio in homine ac quadrupedibus fere similis, ut hæc Tabula sit utrique communis.

- A. Ramus Stomachicus inferior, qui ex ramis Paris vagi utriusque lateris internis simul unitis consistit, & ventriculi fundum obducens, propagines in toto tractu quaquaversus dispersit.
- B. Ramus Stomachicus superior, qui ex ramis Paris vagi utriusque lateris externis simul unitis constat, & ventriculi summitatem perperat.
- C. Ramorum exteriorum coalitio.
- D. Plexus nervus ē fibris utriusque Nervi Stomachici, juxta ostium simul unitis, & velut in reticulum contextis.
- Ⓐ. a. Extremitates utriusque Nervi Stomachici, qui illic Nervis hepaticis occurrunt, cumque eis communicant.
- E. E. Nervus Intercoastalis in utroque latere juxta costarum radices descendens, ac in toto descensu ē singulis Nervis vertebraliū t. t. e. ramum accipiens.
- F. Ramus ē Nervo intercoastali lateris sinistri prodicens, & versus plexum mesentericum dimissus.
- G. Idem Nervus Mesentericus, bifidus, ramum majorem in plexum, qui & Stomachicus & Lienaris est, ac minorem in plexum Renalem emittit.
- H. Par ramus Mesentericus & Nervo intercoastali dextri lateris prodicens, & versus plexum mesentericum inclinatus.
- I. Hujus Nervi, pariter bifidi, ramus major in plexum Hepaticum, & minor in plexum Renalem.
- h. Plexus Mesentericus sinistri lateris primus, qui & Stomachicus & Lienaris est; ē quo plures Nervorum fasciculi, siue conjugationes numerosæ, multifariam emittuntur.
4. Plexus Mesentericus Renalis sinistri lateris, in quem, præter furculum mesentericum
- β. β. Duo alii Nervi ex intercoastali immediate inferuntur.
- γ. γ. E plexu hoc prope capsulam biliarum confuso, plures Nervi & fibra in Renem mittuntur.
- δ. δ. Nervi & fibra, quibus hic plexus cum plexu mesenterii maximo communicat.
- ζ. Nervorum fasciculus primus, ē priore plexu h in Lienem tendens, quem affecatus, exinde fibras quasdam in venticuli fundum reflectit.
- η. Nervorum conjugatio Secunda ē prædicto plexu in ventriculi fundam, cujus fibra cum furculis & fibris Nervi Stomachici inferioris communicant.
- θ. Nervorum conjugatio Tertia inter hunc plexum & vicinum hepaticum.
- ι. Quarta Nervorum conjugatio inter hunc & plexum mesenterii maximum.
- ♀. Plexus mesentericus Renalis dextri lateris, in quem (similiter ac in Pari ejus,) præter ramum mesentericum,
- K. K. Duo Nervi ē Nervo intercoastali producantur.
- λ. Nervi & fibra inter hunc plexum & maximum mesenterii.
- μ. Ramus insignis inter hunc plexum & vicinum hepaticum.
- ν. Insignis Nervorum & fibrarum cohors ē Plexu hoc in Renem, qui vasa emulgentia scandunt, & varie circumligant.
- ♂. Plexus mesentericus superior dexteri, qui & hepaticus.
- ο. Magna Nervorum conjugatio ex hoc plexu in hepar & cystim felleam, ē qua plures item furculi in Pylorum & Pancreas distribuntur. Hujus Nervi & fibra in ascensu versus hepar Arteriam hepaticam velut reticulo facti obducunt, & truncum ejus fere abscondunt. Horum furculi cum Nervorum stomachicorum apicibus a. a. conveniunt.
- π. π. Furculi circa Pylorum distributi.
- ρ. ρ. Alii furculi in Pancreas dispersi.
- σ. s. Nervi inter hunc plexum & mesenterii maximum protensis. Hic Plexus cum Renali vicino per μ. & cum stomachico per θ. communicat.
- ⊙. Plexus Mesentericus maximus, ē quo ingens Nervorum fasciculus ***** sub magna mesenterii glandula oriendus, exinde quaquaversus in plurimas propagines & ramos di-

- spescitur, inque omnia intestina (præter rectum) distribuantur. Nervi & fibra quaquaversus protensis, arteriis & venis mesentericis toto ambitu imittuntur, easque varie stringunt & circumligant.
- τ. τ. Propagines Nervosæ ab hoc plexu in testes femineos, siue glandulas uterinas, que ramis nervorum vertebraliū Paris vigesimi & vigesimi primi in eadem partes emissis occurrunt, cumque iis inosculantur.
- υ. υ. Rami vertebrales in Testes femineos.
- ϕ. ϕ. Plexus mesenterii infimus longe infra priores constat, & pro origine sua tres utrinque Nervos ab intercoastalibus inferioris oriundos habens.
- φ. φ. φ. Tres Nervi utrinque a Nervo intercoastali in plexum mesenterii infimum dimissi.
- χ. χ. Nervus ab isto plexu directe in maximum mesenterii plexum protensus, qui in transitu furculos aliquot ab intercoastali nervo utrinque accipit, sc. 4. 4. 5. 5. & ipse furculos duos in testes femineos mittit.
- ψ. ψ. Duo rami a nervo prædicto in testes femineos.
- Ⓢ. a. Plexus alter exiguus, paulo supra hunc infimum consistens.
- Ⓢ. a. Processus nervosus a plexu prædicto infimo in vicinum perexiguum protensus.
- a. E Plexu minimo Nervus insignis in plexum mesenterii maximum elatus, qui in toto ascensu intestinum rectum & coli partem subindit, usque propagines crebras inserit.
- b. Ramus alter ab eodem plexu deorsum missus, qui ejusdem intestini recti partem inferiorem subindit, eique propagines crebras impertit.
- C. C. Duo Nervi ē Plexus mesenterii infimo deorsum missi, qui circa imam ventris cavitatem in pelvim dimissi, binos ibidem plexus K. K. scil. unum in alterutro latere subeunt.
- K. K. Plexus gemini intra pelvim consistunt, quorum Nervis excretionibus singulis, sc. urina, stercorei & seminis, ibidem factis prospiciunt; hi Nervos d. d. versus plexum infimum mesentericum emittunt.
- d. d. Nervus a prædicto plexu utrinque juxta latus intestini recti ascendens, et propagines inserit, quibus geminus Nervus alter (b) ē plexu minimo descendens occurrat.
- ε. ε. Duo Nervi ab eodem plexu in uterum.
- f. Nervus ab eodem plexu in vesicam.
- g. Nervus in glandulas Prostatas.
- h. Nervus ē radice 28 Paris vertebralis in muscolum ani.
- i. Par vigesimum novum vertebrale, a quo
- k. Nervus in sphincterem, & reliquos musculos ani.
- l. Nervus insignis utrinque ab isto Pari in penem.
- m. Ramus alter brevior in musculos penis.
- L. L. Nervus intercoastalis infra venter.
- m. Nervulus a ramo vertebrali in muscolum cremasterem.
- n. Par vertebrale 21; cujus origo pone renes constituta delitescit: Ab hoc Nervo plures utrinque propagines in testes feminei sexus mittuntur, qui furculis aliis mesentericis eidem parti distributis occurrunt.
- o. Nervus ē Pari vertebrali 22, ē quo etiam furculi quidam in testes femineos.
- p. p. p. p. p. p. p. Nervi in crur destinati, quorum qui superius oriuntur, in descensu ramos a Nervis inferioris oriundis suscipiunt.
- q. Nervi intercoastales juxta principium ossis sacri ad se mutuo inclinati, per processum transversum & communicant.
- r. Processus alter transversus, infra ossis sacri curvaturam, duos intercoastales Nervos comectens.
- s. Uterque Nervus intercoastalis in fibras minutas desinit, que fibre in ipsum sphincterem ani distribuuntur.
- t. Nervus ē Pari 24 Vertebralis in glandulas inguinales.
- v. v. v. &c. Propagines ē Nervo Intercoastali utrinque in Uretres.
- x. Nervus qui ad Testem & Musculum cremasterem destinatur, ubi abdomine egreditur, abscissus.



EXPLICATIO FIGURÆ, TABULÆ XXIII.

Ex Cl. WILLIS de Nervis.

FIG. I.

Exhibet integram medullam Spinalem, specu-
oſſeo exemptam, & membrana inveſtiente
diſſecta ſemiexemptam, ut nervorum om-
nium vertebralium origines & productio-
nes conſpiciantur.

- A. A. Medulla ſpinalis ſummitas, ubi à coheſione
cum medullâ oblongatâ abſcinditur.
B. Arteria Spinalis per totam medullam de-
ſcendere viſa, qua tamen ab arteriis, in-
ter ſingulas vertebrarum commiſſuras in
ipſam illatis, conſlatur.
C. C. Nervus ſpinalis à quinta vel ſexta cervicis
vertebra ad Paris vagi originem acce-
dens.
D. D. Membrana medullam inveſtientis diſſecta &
evoluta portiones.
E. E. E. Nervi ſpinales, à ſuperiori medullæ margine
per manipulos emiſſi, quibus pares faſci-
culi etiam à margine inferiore elati occur-
runt, omnesque intra vertebrarum jun-
cturas in eundem truncum coaleſcunt:
dein extra illas iterum ſejuncti, in provin-
cias reſpectivas ſeruntur.
F. f. Nervi intra cervicis regionem producti.
G. g. Nervi humero & brachio deſtinati, ubi &
medulla ampliſſe, & nervorum faſciculi
maiores exiſtunt.
H. h. Nervi circa dorſum & lumbos exeuntes, ubi
& medulla corpus iterum gracilius, & ner-
vorum faſciculi paulo tenuiores ſunt.

- F. i. Nervi ad crura deſtinati, ubi & corpus me-
dullare & nervorum faſciculi denſius an-
plianſur.
K. Nervi oſſe Sacro exeuntes.

FIG. II.

Exhibet Arteriæ vertebralis ramificationes,
utrinque in ſuperiorem medullæ ſpinalis
partem, inque poſteriorem medullæ ob-
longatæ regionem, exporrectas.

- A. A. Medulla oblongatæ poſterioris regio.
B. Communis ductus ab utriſque arteriis ver-
tebralibus unitis conſtans.
C. Figura Rhomboides quam in Brutis gemina
Arteriarum vertebralium coalitio deſcri-
bit.
D. Arteriarum vertebralium ſupra medullam
ſpinalem coalitio prima, è quo loco arteria
ſpinalis deſcendit.
E. Arteria ſpinalis.
F. F. Dua Arteriæ vertebrales, à ramis axillari-
bus proſectæ.
G. Medulla Spinalis.
f. f. f. &c. Surculi arterioſi in muſculos cervicis.
g. g. g. g. Surculi in medullam ſpinalem miſſi, qui ab
utroque latere in arteria ſpinali juxta ſin-
gulas vertebrarum commiſſuras coeunt.
h. h. h. h. Surculi arterioſi, qui ſinum canales aſſe-
cuti, plexum Arterioſum, qualis in Figura
ſeq. deſcribitur, conſtituunt.
f. f. Dua arteriæ in ſpinam ab Aortâ dimiſſæ.

Fig. 2





Fig. 1



EXPLICATIO FIGURÆ, TABULÆ XXIV.

EX CI. WILLIS de Nervis.

FIG. I.

Exhibet Venas vertebrales, quæ arteriis supra-
dictis pares sunt; item Sinus vertebralis por-
tionem superiorem, ac utriusque inter se ac
sinus laterales capitis, & inter venas jugula-
res, communicationes.

- A. Sinus tertius Capitis abscissus, ubi in sinus
ejus laterales transit.
B. Sinus Capitis laterales.
C. Specus rotundus, ubi sinus lateralis utrinque
in venam jugularem cedit.
D. Vena jugularis.
B. Sinuum vertebraliū commissura superior.
F. Sinus vertebralis utrinque intra cranium
perductus, ibidemque in sinum lateralem
transiens.
G. Utriusque vena vertebralis truncus, à vena
cava profectus, ac ibidem incipiens.
H. Uterque sinus vertebralis truncus ibidem ab-
scissus, qui inferius per totum spina ductum
continuatur
h. h. h. h. h. Anastomoses utrinque intra vertebra-
rum commissuras inter venam vertebra-
lem ac sinum vertebralem.
i. i. i. i. Ductus venosi, qui extra vertebra antè
protensi, à vena unius lateris ad parem
alterius feruntur.
i. i. Sinuum & venarum omnium in summita-
te spina communicatio.
k. g. Ductus venosus è sinuum & venarum con-
cursu utrinque in venam jugularem.
l. l. l. l. &c. Sinuum utriusque lateris juxta vertebra-
rum internodia commissura.
m. m. m. m. &c. Ductus venosi, sanguinem è medulla
spinali in sinus reducentes.
n. n. n. n. &c. Canales venosi, sanguinem à musculis
cervicis regerentes.

FIG. II.

Exhibet Arteriam Spinalem, quæ intra spe-
cum osseum, juxta interiorem medullæ su-
perficiem, ab occipite ad os Sacrum, ad
formam Institæ reticularis, producitur.

- a. a. a. a. Surculi arteriosi ab arteria vertebrali, intra
processum spinalem foramina ascenden-
te, versus spinam missi.
b. b. b. b. &c. Surculi arteriosi ab Aorta versus spi-
nam missi.

- c. c. c. c. &c. Propago arteriosa à quolibet prædicto
surculo in medullam arteriorem protensa.
e. e. e. e. &c. Surculus quilibet prædictus arteriosus,
quamprimum intra specum osseum defer-
tur, statim bifidus ramulum in utramque
partem emittit, quo utrinque cum pro-
ximo ejusdem lateris, & per processum
transversum, cum pari alterius lateris ra-
mulo, communicat.
f. f. f. f. Arteriarum utriusque lateris per surculum
transversum commissura.
g. g. Surculi arteriosi osse sacro exeuntes.
h. h. Propagines arteriosæ in occipitis meningas.
i. i. Surculi arteriosi cum nervis Paris septimi
cranio egredientes.
k. k. Surculi in Rete mirabile protensi, qui in pro-
gressu inter se mutuo, ac demum cum ar-
teris carotidibus inoscuntur.

FIG. III.

Sinus spinalis divaricationes in toto
ductu ejus exhibet.

- A. Sinuum utriusque lateris commissura su-
prema.
B. B. Canales ab utroque sinu vertebrali in sinus
capitis laterales protensi.
C. C. Canales à communi sinuum & venarum
vertebraliū concursu in venas jugulares
producti.
D. D. Vena vertebrales.
e. e. Communicatio inter sinum spinalem & ve-
nam vertebralem.
f. f. f. f. Ductus venosi ab utroque sinu, in vena ver-
tebralis truncum.
g. g. g. g. &c. Ductus pariter venosi, qui inferius in
ramos vena Azyga, ac ultimo in vena
cava propagines lumbares continuantur.
h. h. h. h. &c. Ductus venosi, qui sanguinem à spinali
medulla excipientes, in sinus reducunt.
i. i. i. i. &c. Sinuum utriusque lateris, juxta singulas
vertebrarum juncturas, commissura.

FIG. IV.

Exhibet Sinus spinalis iconem in cane, qui
non uti in vitulo, ove, porco & plerisque
aliis, commissuras in toto ductu habet,
sed tantum in parte infima & suprema, ubi
per tres aut quatuor processus transversos
inter se communicat.

PARS

Fig. 2






Fig. 4



Fig. 4



P A R S XXIII.

DeValvulis Lymphæ ductuum.

*Ex Tractatu Frederici Ruysch, Medic. Doct. & Practici Hagienſis,
de Valvulis in Vasis Lymphaticis, &c.*

IN precedentibus licet de Lymphæ ductibus egerimus, de Valvulis tamen eorundem, easque demonstrandi methodo, in specie nihil additum, eo quod in hæc usque tempora sibi solis ea reservaverint eorum Inventores, inter quos præcipuè occurrunt D. Fredericus Ruysch, M. Doct. & D. Joannes Swammerdam, Med. Candidatus. Nunc verò cum utrumque communicare orbi literario voluerint, huic nostræ appendici eadem addere & debui & volui.

Accipe ergò curiosè Lector, quæ in Tractatu, paucas ante septimanas edito, quem Dilucidationem Valvularum in Vasis Lymphaticis & Lacteis appellat D. Ruysch, pag. 3. hæc de re habentur.

Post varia, inquit, (quamvis incassum) à me facta experimenta Valvulas Bilſio *ἀντομυκῶς* demonstrandi gratiâ, (alias enim fidem adhibere denegabat) tandem lymphatica vasa dextrè præscindere tentabam, ut postea in illis flatu debitè repletis, radiisque solaribus expositis, & ritè exsiccatis, valvularum constructio mihi conspicua foret. Ex voto successit experimentum istud, sic enim valvulæ, ubique geminatæ, copiosissimæ, lunæ crescentis instar, lateribus vâforum affixæ, quales illæ, quæ in venarum cavitate reperiuntur, multò tamen numerosiores, & tenuiores, luce meridianâ clarius sese oculis meis offerebant.

D E I I S D E M.

Ex communicatione D. Joannis Swammerdam, Amstelod.
Medic. Candid.

Accipe & quæ à Cl. Viro-Juvene D. Joanne Swammerdam, propriâ manu descripta & delineata, hisce diebus impetrare licuit, jam Anno 1664. 28 Junii, Lugd. Batavorum, præſente D. Nicolao Stenonis (cui etiam Figura quarta inſequentis inventionem tribuit) ut scripto suo, mihi exhibito, ipse testatur, delineata. Figuras etenim alias, ductuum horum distributiones divisionesque, maximè verò omnium gyrum Bilſianum spectantes, curiosas valdè, eo quod publico committere constituerit Clariss. Nicol. Stenonis, ab ipso exigere nolumus. His itaque contentus sis quaſo, usque dum alia videre contigerit.

FIG. I.

Prima Figura, Lymphaticorum vasorum eam solum constructionem, quæ, vel post Lymphæ retentionem, vel etiam post à flatu distentionem, observatur, exprimit: alias enim ægerrime noduli hi, duplici suâ cum valvula, aliquando etiam triplici, oculis offeruntur, sed vascula æqualia solum modo apparent. Lymphæ jam illa retentio, injectis in tempore vinculis commodissime efficitur; tubulorum verò tenuissimorum ope inflatio, in quem finem si voto successum cupias, aciem phlebotomi una tubulo jungere, simulque in venulam penetrare, oportet. Verum modum hunc operandi circa Lymphatica tenuiora tentare satius erit, in majora enim post artificiosam phlebotomo factam incisionem, facile tubulum introduces, ubi postmodum in utroque casu, statim post tubuli immissionem, ligaturam injicere, necesse erit, ac sic vas inflare, quod tamen post vasis separationem commodius obtinebis: separationem, ne aliquid lædas, inflando perficere conducit.

- A. Lymphaticum vas inflatum & exsiccatum exhibet: ubi notare licet latera hujus vasis propter tenuitatem, ab inflatione vel alia distentione, mirum in modum aliquando expandi, quod circa & ante ipsos nodulos majorem propter vasis crassitiem non item accidit.
- b.b.b.b. Noduli Lymphatici hujus vasis varii, in quibus semper fere duæ, raro triplices, reperiuntur valvulae.

FIG. II.

Secunda Figura, idem vas in umbra exsiccatum, suis cum valvulis, punctulis notatis, & flatu distentis demonstrat; ubi omnes valvulas earumque situm naturalem, modo ordine secundum annotatum numerum

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. &c. succedanea fiat amputatio, facillime lustrabis.

FIG. III.

Tertia Figura, vas illud apertum ostendit, ubi unico oculi ictu, in omnibus nodulis, binas valvulas observare, rarissimè triplices lustrare licebit.

FIG. VI.

Quarta Figura Lymphatica vasa in dextro latere ubi nulla omnino cum ductu thoracico vel aliis vasis chyli feris communicationem habent, exhibet; ita ut hic pateat insertio eorum immediate in ipsam esse venam jugularem, non vero axillarem, & hoc eo semper fere loco, ubi jugularis & axillaris venæ divaricatio conspicitur, accidit. Insertio autem illa pluries tribus, hic vero duobus, ostiolis prædita, apparet; apertiones autem illæ præter proprias valvulas, peculiare propriisque multo majores ab ipsa vena valvulas accipiunt.

- a. Vena jugularis externa.
 b. Jugularis interna.
 c. Ramulus aliquis jugularis externæ.
 d. Axillaris Vena.
 e. Ejus divaricatio.
 f. f. f. Principia vasorum Lymphaticorum ubi à glandulis originem ducunt.
 g. g. g. Tres eorum ramificationes minores.
 h. Major ejus ramificatio, cujus exortus sub angulo dextro maxillæ inferioris, prope ductuum salivarium inferiorum origines, conspicitur.
 I. I. I. Tres inosculaciones horum vasorum inter se.
 e. e. Duæ eorum apertiones sive ostiola circa venæ jugularis & axillaris divaricationem, ubi præter proprias valvulas, peculiare, ab ipsa vena exortus valvulas, adeptæ sunt.

P A R S XXIV.

De Valvulis Venarum Lactearum, easque in conspectum
producendi modo.*Ex Tractatu dicto Friderici Ruysch, Medici Hagiensis.*

Quæ de Valvulis Vasorum Lactearum, easque demonstrandi ratione adducit Clarissimus D. Ruysch, licet ferè convenient cum iis, quæ in mox prægressis de Valvulis Lymphæ Ductuum adduximus, quia tamen nova videntur & aliquâ diversitas sese exhibet, ne temerè quid omisisse dicamur, propria ejus verba hic addere consultum judicamus, Lectoris æqui judicio negotium committentes. Hæc autem ita se habent.

C A P U T II.

Modus Venarum Lactearum Valvulas in conspectum producendi.

SIquid in re Anatomica perquisitu sit arduum, haud postremum locum obtinet ocularis demonstratio Valvularum, quæ sunt in venis lacteis primi generis; idque potissimum propter sequentes rationes. Primo nisi animal debito tempore post pastum aperiatur, vix in oculos incurrunt Venæ Lactææ, multo minus Valvulæ in iis contentæ. Secundo, in venis Lacteis chylo repletis, propter chyli opacitatem, Valvulæ haud conspiciuntur. Tertio, adeo subtiles sunt Venulæ Lactææ, ut vix ac ne vix quidem tubulum admittant, quo sine demonstrari non possunt. Quartò, ægrè à mesenterio tam accuratè separari queunt quin vestigium quidem retineant, à quo postea ita obnubilantur Valvulæ, ut visus aciem prorsus effugiant: adeo ut facile non sit Venarum Lactearum Valvulas in conspectum producere. Nullus Anatomicorum Valvulas istas hætenus delineandas curavit; nemo quoque, nisi suspensâ manu de iis sermonem habuit; nullibi quoque aliquid de earum structura scriptum reperi: quapropter, num easdem revera conspicati sint, animi pendeo. Dari aliquid valvularum vice fungens, ratio ipsa dictitat; si enim Chylus à glandulis mesenterii versus intestina impellatur, variis in locis percipitur renixus, seu obstaculum. Ex eo tamen nullo modo illud, quod renixum efficit, sese oculis nostris offert: qua de causâ non abs re fore existimavi, illud examine accuratiori inquirere; eoque magis, quod animadverterim non omnes Valvulas ejusdem esse structuræ aut formæ. Sic eæ, quæ affixæ sunt venis sanguineis, ubi ramos emittunt, non servant lunæ crescentis formam, verum in longitudinem magis sunt expositæ: Quod à nemine hætenus observatum memini. Totò quoque differt cœlo Valvula, quæ ductui communi choledochi in intestino tenui præponitur, ab iis, quæ in crassis reperiuntur intestinis, in quibus non unam, aut plures observo Valvas. Quemadmodum in parte crassi intestini à me inflati & exsiccati habeo præparatas, ut viris curiosis, quoties libet, demonstrem; donec aliquando figura expressas omnibus communicem. Datur &

haud

haud exigua inter cordis Valvulas differentia. Quibus ita perpensis, multum impendi laboris, pluraque frustra adhibui experimenta, antequam curiositati meae satisfacere, valvulasque in conspectum producere potuerim: cujus veram præparationem lubens revelo. Tertia circiter hora a pastu strangulandum animal; aperto abdomine, liganda quædam venula lactea chylo repleta, circa Aselli pancreas, seu potius glandulas mesenterii, ne præpropere, simul cum lacteo succo, visum effugiat venula lactea. Postea prope exortum, qui est ab intestinorum tunicis, tubulus dextre intrudendus; quo facto, ligatura solvenda, succusque lacteus digitis abigendus. Hic ita peractis, vinculum de novo adhibendum, venula lactea spiritu oris suscitanda, pone tubulum, ne flatus erumpat, vincienda, atque a mesenterio, ut ne vestigium quidem adhæreat, accurate separanda, ærique demum exponenda, ut siccescat: Sic Valvulæ luculenter conspiciuntur, geminatae, semilunares, iis quæ in vasis serosis reperiuntur ad amussim respondentes. Notandum primo, Venas Lacteas primi generis non tanta gaudere valvularum copia, quantâ vasa serosa, imo & secundi generis lacteæ, uti Fig. III. conspiciendum exhibet. Secundo, omnes earum Valvulas cavitæ suæ glandulas mesenterii respicere; adeo ut nihil ab iis ad intestina amandari queat. Vide Fig. III. lit. b b b b b. Tertio, has Valvulas, omnibus exquisitissime peractis, conspici non posse, nisi Cælo sereno, claraque existente luce, Ne tamen verba dare videar absfona, aliquot domi servo pluribus Viris egregius ostensas lacteas balsamo conditas, in quibus Valvulæ istæ luculenter conspiciuntur: & Venas quasdam ramis præditas, quibus præponuntur Valvulæ istæ in longitudinem magis expositæ (de quibus superius mentionem feci) quæ non malè alteri parti digitalis, quo utuntur mulierculæ pro digitorum tegumento, à me comparantur: quod *Hymorum* prorsus latuisse patet ex ipsius disquisitione Anatomica corporis humani, fig: II. Tab. X. ubi omnes venarum Valvulæ ejusdem reperiuntur structuræ: Quin nullus mihi hætenus perscrutanti occurrit Anatomicus, quem id animadvertisse vidi.

EXPLICATIO FIGURÆ V. VI. VII.

FIG. V.

Equinas venas Lacteas 'primi, & secundi generis, glandulam mesenterii, & receptaculichyli portionem repræsentat.

A. Glandula mesenterii equini, ab Asellio Pancreas dicta, in cujus partem anticam venæ lacteæ primi generis sese insinuant, à postica autem parte venæ lacteæ secundi generis ortum sumunt.

B.B. Primi generis lacteæ.

b.b.b.b. Valvule in iisdem conspicuæ.

C.C.C. Earundem venarum radices ab intestinis tenuibus separatæ.

D.D. Vena lacteæ secundi generis, in quibus

Valvulæ numerosiores existunt, adeo ut ratione formæ à vasis Lymphaticis non discrepent, ut rectè observatum à Cl. D. Sylvio, in disput. de vasis Lymph. thes. 12.

FIG. VI.

A. Venula lactea cum valvulis a. a. a. a.
*. Venula lactea aperta.

FIG. VII.

A. Portionem ductus thoracici equini, in quo Valvulæ a. a. conspiciuntur, continet.

B. Pars ductus thoracici, chyli receptaculum cavitæ suæ respiciens.

PARS

P A R S XXV.


De Lymphæ ductuum distributione ab Hepate ad Receptaculum, in corpore Canino.

Ex Autopsia.

Lymphæ ductus ab Hepate tendere ad Receptaculum Chylo Lymphæque commune, jam à longo tempore *Cl. Bartholinus*, aliique demonstrarunt, Figuræque in prægressis declarant. Eadem aut omnes à 'glandulis initium sumere, vel glandulas transire hæctenus tradiderunt. Quæ res cum à nobis hisce diebus 21. nempè & 22. Septembris, cultrum dirigente *D. Joanne à Swammerdam*, præsentibus *D. D. Math. Slado, Egb. van Veen, Abrah. Quina*, Medicis experientissimis, aliisque, curiosius examinata sit, & quædam ex illis ab hepate ad receptaculum pergere invenerimus, absque ulla notabili cum glandulis communicatione, inventi delineati Figuram hîc apponere placuit.

EXPLICATIO LITERARUM FIGURÆ
hujus, quæ ordine est VIII.

A.	Hepatis Lobus.	I. I.	Communicatio hujus ductûs cum chylo receptaculo.
B.	Glandula inter venam portæ & pylorum sita.	K.	Ejus divisio sub centro mesenterii.
C.	Glandula venæ caviæ sub Renibus imposita.	L.	Alia bifurcatio circa venam portæ.
D.	Capsula atrabilaria.	M. M.	Vasa Lymphæ hepatis lobo imposita.
E.	Locus Renum.	N.	Eorum cum ductu dicto connexio, mediante ductu minore.
F.	Receptaculum Chyli & Lymphæ.	O.	Vas Lymphaticum à glandulâ renali proveniens.
G.	Ductus Thoracicus.	P. P.	Ductus Lymphæ à Renibus procedentes.
H. H. H.	Ductus Lymphæ ab Hepate ad Receptaculum tendens sine communione cum glandulis.	Q.	Ductus à glandula C. ad receptaculum tendens.



P A R S XXVI.

De Lymphæ Ductibus in Hepate, & Splene.

Ex Citato Tractatu Frederici Ruysch.

De Vasis Lymphae circa Hepar, ad venam portæ, antè satis actum. Eadem ad Hepar magis extensa, Valvulis suis donata, delineare quia placuit D. Ruysch, hic apponere figuram necesse duximus. Eadem in Splene quod spectat, pag. 38. & seq. Tractatus dicti ita de illis differit nominatus D. Ruysch.

C A P U T ejus III.

Vasa Lymphatica in Liene manifestandi modus.

Non desunt inter Neotericos, quamquam in re anatomica oculatissimos, qui Lienem Vasis Lymphaticis prorsus destitutum putarunt, quos inter *Whartonius* singularis ille Anatomicus pro meritis colendus, in *Adenographiæ* totius corporis descriptione pag. 13. *Vix autem fingi potest in quem usum liquorem hunc eliciat, nisi in nervorum. Desunt enim alia omnia vasa per quæ idem absporetur, præter nervos. Nam Lympha-ductus nulli adhuc per hanc partem (loquitur de Liene) distributi observantur. Franciscus Glissonius, in anatomia sua hepatis, profitetur quoque sese eas non vidisse, fol. 516. hisce verbis. Vasa habet (de Liene sermonem habet) arterias, venas, nervos plurimos, & nervosas fibras innumerabiles, Lympha-ductus nullos videmus, eosque propterea (si qui adfuerint) aliorum oculis perspicacioribus detegendos relinquimus. Gualternus Charleton, in œconomia animali nullos quoque in Liene admittit Lymphæ ductus. fol. 178. Lympha-ductuum duo genera constituuntur ab inventoribus; quorum alterum eos omnes; qui in abdomine sunt; complectitur: ceteros, qui ex artubus, seu exterioribus corporis partibus exoriuntur, alterum. Priores ab hepate, omento, aliisque infimi ventris partibus (liene unice excepto, in quo nulli adhuc sunt reperti) fere omnibus emergunt.*

Plures authores, qui in hac sunt opinione, recitare, facile mihi foret: ne vero simplicior, eos missos faciam, illudque tantum, quod circa Lymphæ-ductus in splene oculatus observavi, detegam. Dixi autem superius, Lienem vasis Lymphaticis scaterere, ideoque jam paucis, quo ritu illa investiganda sint, expediam. Aperiatu duabus horis à potu abdomen cujusdam animalis strangulari, aut mactati, ligenturque simul omnia vasa Splenica, tam sanguinea, quam serosa (jamjam enim effluit Lympha vasis) quo facto amputandus Lien sub ligatura, (quemadmodum Figura demonstrat) & asseri seu mensæ imponendus, ut omnia luculentur conspici possint: tunc demum tradatur digitis Lympha ab extremo ligaturam versus, sic vasa in conspectum veniunt copiosissima, per quæ Lympha nullo modo (nisi adhibita vi) reduci potest. Benè tamen observandum I. Vasa illa non solum in splenis superficie reperiri, verum etiam in parte interiori arte-

Lym-

riam splenicam, nervosque concomitari. II. In omnibus animalibus ejusdem generis, haud æque copiosa esse. III. Lienem humanum non tantâ gaudere Lymphæ ductuum copiâ, quanta quidem Vitulinus. IV. Prospiciendum in ligandis vasis Splenicis, ne dilacerentur, aut rumpantur vasa illa serosa seu Lymphatica.

P A R S XXVII.

De Arteriâ Bronchiali.

Ex eodem Tractatu Frederici Ruysch.

OBSERVATIO XV.

Arteria quædam hætenus incognita, per quam sanguis arteriosus, ab Arteria magna derivatus, ad pulmones amandatur.

EOrum quos in hunc usque diem pervolvit Anatomicos, nullus quidem, quod sciam, vasorum sanguinem Arteriosum ab arteria aorta ad pulmones deducentium mentionem facit: Imo præter venam arteriosam, seu potius arteriam pulmonalem, ex dextro cordis sinu prodeuntem, sanguinemque ut ventiletur, ad pulmones deducentem, & arteriam venosam, seu potius venam pulmonalem, ex sinistro cordis thalamo exortam, sanguinemque à pulmonibus ad cor revehentem, nullum vas sanguineum quispiam agnovit. Cui sententiæ tam diu fui addictus, donec mihi, jam ferme per biennium, in majorum animalium, puta Hominum, Equorum, Boum, & similibus pulmonibus excarnandis versanti, ut aliquid certi de vasorum sanguineorum Anastomosibus in pulmonibus mihi constaret, inopinato arteria quædam BRONCHIALIS à me dicta, in conspectum sese dederit, & quidem per sanguinem in ipsa contentum, unde eminebat, postquam Pulmonum bronchia ab eorundem Parenchymate, vena arteriosa, & arteria venosa separassent, & sanguine suo per liquorem quandam convenientem privassent. Quo viso distributionis principium indagare animus erat, quod propter abscissam Aortam, nullo modo in illis Bronchiis sum assecutus, in aliis vero omnibus quamfacillime illud postea obtinui. Hanc Arteriam à nemine adhuc esse observatam, intrepide affirmo: Viri enim in rebus Anatomicis exercitissimi, vasa sanguinea in pulmonibus contenta, describentes, hanc quasi incognitam silent. Quos inter magnus ille *Andreas Laurentius* vir sui sæculi doctissimus, in historia sua anatomica corporis humani Cap. 22. fol. 369. hæc habet. *Triplici vasorum genere caro hæc (loquitur de pulmonibus) sustinetur, & coheret, Vena arteriosa, arteria Venosa & Aspera arteria.* Nullam vero de arteria à me inventa facit mentionem. *Cl. Spigelius* in sectione anatomica nullo modo infimus, in eadem est opinione, & præter vasa à *Cl. Laurentio* prolata, nullum agnovit, ut liquet ex ejus corporis humani fabrica Cap. X. fol. 362. *Parenchyma hoc membrana cingitur, à communi vasorum, pulmonem ingredientium, tunica enata, que tenuis, mollis, & vehementer porosa est, vasa autem accepit omnis generis: Venas quidem, à vena*

Arteriali, ex dextro cordis ventriculo prodeunte, Arterias vero, ab Arteria venosa è sinistro. Illa nutrimentum, hæc vitam affert; sed utraque in duos, statim, ac primum pulmonem attingere, ramos dividuntur, mox iterum in plures. Clarissimi Bartholini verba hæc sunt. Substantia pulmonis triplicibus inter textitur vasis, non parum etiam ad robur facientibus, duo à corde veniunt, vena Arterialis, & Arteria venalis, tertium proprium est, videlicet Trachea Arteria, seu Aspera Arteria. Nulla quoque Hymorus, celebris ille Britannus, in sua corporis humani disquisitione anatomica, præter enumerata à supra citatis viris vasa, in pulmonibus recenset, ut liquet ex Cap. IX. lib. 1. fol. 168. Vasa pulmonum, quibus cordi adjunguntur, & per quæ & sanguinem pro nutritione recipiunt, & temperatum rursus cordis sinui sinistro reddunt, sunt Arteria, & Vena.

Hanc Arteriam BRONCHIALEM nominare visum fuit; supra Bronchia enim serpense ea concomitatur ad finem usque. Ortum sumit ab Arteriæ magnæ descendens postica parte, digiti latitudine, plus minus, supra supremas arteriarum intercostalium, ex aorta descendenti exortarum, aliquando etiam duorum digitorum latitudine supra arterias modo dictas, nonnunquam etiam infra eas originem habere comperio: placet enim naturæ aliquando varietate frui. Nunc unica exsurgit, nunc gemina, ita ut sæpius, Arteria magna cadavere exempta, Intercoastalibus & Bronchialibus abscissis, trunculi Bronchialium remanentes, exortum intercoastalium mentiantur. Hinc pulmones oblique subit, Bronchiaque sub arteria venosa ad extremum usque comitatur, donec capillaris facta, visus aciem effugiat. Æri ipsam curavi incidendam, ut, si quid forsân verbis exprimere non valerem, illud per figuram ad vivum depictam, perficerem. Notandum porro, me, deficiente pulmone humano, vitulinum fumpfisse; uti cuius patet ex supremo ramo, qui Pulmonibus humanis, equinis, asininis, agninis, caninis, vulpinis, denegatur: an vero præter boves & vitulos reperiantur bruta, quibus ille ramus, seu lobus conceditur, ignoro. In pulmonibus humanis observavi, hanc arteriam sæpius anticam Bronchiorum perreperire partem, quod in brutorum pulmonibus rarò vidi. Dicet forsân aliquis, hanc arteriam parvi esse momenti, si respiciamus venam arteriosam, seu potius arteriam pulmonalem, vas utpotè capacissimum, à quo sanguinis sufficiens quantitas pulmonibus suppeditari posset. Ad quod respondeo, ea quoque ratione arteriam hepaticam floccificandam fore, propterea quod respectu venæ portæ, hepatis sanguinis copiam subministrantis, quam minima sit. Quod æque absurdum mihi videretur; arteriam enim hepaticam jecur ingredientem, venamque portæ comitantem ratione pabuli nobilis illac vehendi maximi faciendam puto; quicquid enim per portam jecori communicatur, merè venosus est sanguis, ab imi ventris visceribus refluus, nullo Chylo Riolani, aut Bilsii commixtus. Eadem quoque ratione hanc arteriam bronchiale maximi faciendam esse existimo, non quidem ratione quantitatis sed qualitatis sanguinis. Sanguinem enim sinistrum Cordis thalamum transgressum, nobiliorem esse, dextri ventriculi sanguine, quis negaturus? Existimo itaque, ut finem imponam, hanc arteriam esse conditam, ut pulmonibus sanguinem nobiliorem, perfectiorem, imo magis exaltatum, communicaret.

Fig. 2.




Fig. 1





Fig. 3



EXPLICATIO FIGURARUM,

TABULÆ XXV.

EX FRED. RUYSCH, de Lymphæ Ductibus.

FIG. I.

Hepar Equinum à parte concava cum vasis Lymphaticis, eorumque valvulis demonstrat. Nota interim primò, me vasa Lymphatica respectu hepatis delineati paulò majora efformasse, quod idèò factum, ut valvulæ eò melius conspici possint. Secundo me quasdam solummodo glandulas hic expressisse, cum hac vice non tam glandularum, quam valvularum in Vasis Lymphaticis constructionem delineare animus fuerit.

- A. Hepatis equini pars concava.
 B. Vena Cava sub diaphragmate abscissa.
 C. Vena Porta.
 DD. Glandulæ conglobatæ binæ in cava hepatis parte sitæ. Nota plures plerumque ibi observari glandulas.
 EEEEE. Vasa Lymphatica ab extima hepatis parte producta, seseque in anticam glandularum partem insinuantia.
 F. Vena umbilicalis in ligamentum degener.
 GGG. Vasa Lymphatica, à postica glandularum parte ortum sumentia, & ad receptaculum chyli tendentia.
 ggggg. Valvulæ in vasis Lymphaticis luculenter conspiciuæ, receptaculum chyli respicientes, atque, nequid è receptaculo ad hepar perveniat, prohibentes.

FIG. II.

Lienem cum ligatis Vasis Lymphaticis & sanguineis ostendit.

- A. Lien Vituli.
 B. Vasa Sanguinea & Lymphatica ligata.
 C. Vena Splenica.
 D. Arteria Splenica.
 E. Nervi Splenici, quorum numerus incertus.
 F. Vasa Lymphatica in extimâ Lienis parte ortum ducentia.
 ffff. Valvulæ in iisdem Vasis.
 G. Ligatura.

FIG. III.

Asperam Arteriam Vituli à postica parte denudatam à Parenchymate venâ arteriosâ, & arteriâ venosâ, cum Aorta descendenti à corde detruncata, & arteria Bronchiali demonstrat.

- A. Aspera arteria vituli à postica parte abscissa Larynge.
 B. Ramus dexter.
 C. Ramus sinister.
 D. Arteria Bronchialis, cujus ramuli bronchia ad finem usque concomitantur.
 E. Arteriæ descendenti à corde detruncatæ postica pars, è qua intercostales proveniunt.
 Abscissi trunculi intercostalium.
 F. Summus ramus, quem in nullis animalibus, quam in vaccis & vitulis inveniri.

FINIS APPENDICIS.

SYNTAGMATE VESLINGIANO, COMMENTARIO nostro in idem,

UT ET

APPENDICE, CONTENTORUM.

A.



Bdomeu quid propriè sit, 2. cur adeo copiosam habeat pinguedinem. 9	Anus cerebri. 218, 219
Abdominis muscoli an & qua ratione respirationem adjuvent. 25	Animalibus variis cur cutis mobilis sit. 6, 11
Abomafus. 38	Antiades cur sic dictæ. 174
Abscessus filiceus. 287	Antithenar. 283
Acetabula quid sint. <i>ibid.</i>	Anthelix auris. 247
Aciculæ in vesicâ urinariâ repertæ. 80	Antitragus. <i>ibid.</i>
Adeps, pinguedo, sævum ut differant. 10	Apellæ qui sint. 95
Aër auris congenitus. 253, 254	Appendix ossis, vide Epiphysis. <i>ibid.</i>
Ægyptiorum modus inureudi partes. 6	Appetitus sedes, 38. Causa. <i>ibid.</i>
Albadara quale os. 273	Apophysis quid & quotuplex. 16
Alæ pudendi. 107	Aqua an nutriet, 66. Aquâ nutritorum exempla. 66
Alveare aurium. 249	Aqua pericardii descripta, 146. Ab Urinâ differt. <i>ib.</i>
Alveoli. 203	in omnibus hominibus naturaliter adest. Potest imminui & regenerari. Unde generetur. Ejus usus, <i>ibid.</i> An ex latere Christi effluerit. 147
Ambulatio ut fiat. 260	Aqualiculus. 3
Amor, & amoris dulcedo quid. 108	Arca cordis. 145
Amygdalæ, 174. earum ulcera curanda. <i>ibid.</i>	Arteria aorta cur sic dicta, 153. Cordis coronaria da- tur, 148. Magna non perforat Diaphragma, 142.
Anastomosis vasorum Epigastricorum & mamma- riorum sub Musculo Recto an detur. 23	Hæc cur imposita sit venæ cavæ circa divisionem in ramos Iliacos. 299
Anastomoses vasorum in hepate quales. 60	Arteriæ in hepate innumeræ sunt, 60. non subli- stunt in membrana, sed in substantiam ferun- tur, <i>ibid.</i> earum usus. <i>ibid.</i>
Anatomix utilitas. 1	Arteriæ Lienis per substantiam distribuuntur. 66
Anatomix vox & subjectum variè sumitur. <i>ibid.</i>	Arterias speciales, Venis ferè nomine correspon- dentes, vide ubi de Venis, maximè pag. 31, 34,
Ancon. 265	53, 72, 74, 83, 98, 116, 132, 141, 152, 153,
Aneurismata 153. cur iis gravidæ haud ita tenten- tur ac Varicibus. 23	154, 296, 299
Anguillæ deglutitæ & excretæ. 39	Arteria Carotis, 154. ejus in Cerebrum adscen- sus, 508. Anastomosis, 509
Anguium cutis qua ratione regeneretur. 8	Arteriæ Vertebralis in Cerebro distributio, 534
Annuli fibrosi in ductu cystico conditio & usus. 63	Arteria Bronchialis. 555
Annuli deglutiti & excreti. 39	Arte-
Anus quid, 48. Anus clausa. <i>ibid.</i>	

Arteriarum Emulgentium dispar numerus.	74
Arteriotomiæ utilitas.	296
Artus quid sint.	1
Arenulæ per poros cutis excretæ.	5
Arthron. Articulus.	274
Arthrodia quid ossium nexus.	<i>ibid.</i>
Aruspices qualis de omentis judicant.	30
Aspera arteria nervos habet, 165. cur partim cartilaginosa, partim membranosa, 164. ossiam reperit Cardanus, <i>ibid.</i> cur antèrius, gula posterius situm habeat, <i>ibid.</i> in asperam arteriam nihil ingredi queat. Cur intus humore oblita 165	
Astragalus.	271
Auditorius meatus.	248
Auditus officula quis primus invenerit.	250, &c.
Auris, 246. ejus Etymon, <i>ibid.</i> Pinna, <i>ibid.</i> Lobus, <i>ibid.</i> Auris quot habeat cavitates.	248
Auriculæ seu auris externæ descriptio.	246, &c.
Auriculæ cordis cur sic dictæ, 149. diversæ sunt à corde substantiâ, <i>ibid.</i> earum motus.	<i>ibid.</i>
Aurium alveare. 249. cerumen.	<i>ibid.</i>
Axon.	177

B.

B ilis quas per vias ad vescicam deferatur.	63
an venenum, 64. ejus usus.	<i>ibid.</i>
Brachiale.	266
Bronchus quid.	165
Bubones.	3

C.

C æsaries, 186. eâ illustres.	<i>ibid.</i>
Calculi in hepate, 59. in vesica fellis reperti, 63. in vesica urinaria, 82. circa meninges. 211.	
per umbilicum excreti.	118
Calcaneus.	271
Calva. Calvaria.	188
Calicreas quid sit.	54
Camisia quid & unde.	118
Canities subitanea.	302
Canthi oculorum.	233
Caput quid sit, 186. cur illud supremo loco collocatum, <i>ibid.</i> cur non constet ex unico ossè, 187. circa quam vertebram moveatur, 177. cur non sit adeo pinguedine oblitum, 187. Capitis diversitas, ratione tenuitatis.	187
Caput ut se habeat in foetu.	124
Caput quid sit in ossè.	16
Capsulæ atræ bilis semper habent cavitatem, 73. quem habeant usum, 74. ut se habeant in foetu.	121
Carnea massa pedis.	291

Carnosa frontis membrana malè dicitur musculus.	11
Carnosum marsupium.	288
Carpus, ejusque ossa.	267
Cartilago Cricoides seu Annularis antiquis Innominata dicta. 167. Mucronata. 135. introrsum recurvata. <i>ibid.</i> Guttalis, & gutturniformis seu Arytenoides. 168. Scutiformis s. Thyroides. 166. Clypealis, Peltata, Scutalis. <i>ibid.</i> cur pomum Adami dicatur. <i>ibid.</i> cur in viris magis quam mulieribus exstet. <i>ibid.</i> in os degeneratam vidit Wormius.	<i>ibid.</i>
Cavernulæ cordis quem usum habeant.	155
Carunculæ papillares cordis. 456. earum usus. <i>ibid.</i>	
Carunculæ. 138. Papillares renum quid sint. 75. harum usus. <i>ibid.</i> Myrtiformes. 109. Cuticulares. 207. Lachrymales.	234
Caverna ossis frontis. 189. vacua est. <i>ibid.</i> quem usum habeat disceptatur. <i>ibid.</i> Caverna ossis quarti maxillæ.	198
Cauda quid.	18
Caudatorum hominum exempla.	<i>ibid.</i>
Cauterisatio apud Arabes quo modo fiat.	6
Centrum diaphragmatis, vide Diaphragma.	
Cerebri Etymon. 213. descriptio. <i>ibid.</i> &c. Cerebrum hominis cur adeo magnum. 214. an moveatur in sua substantiâ, an ob vasa. 215. an à durâ meninge distet. 212. ejus partes descriptæ. 216. &c. lapides continens & ossa. <i>ibid.</i> ut se habeat in foetu.	124
Cerebri dissectio & descriptio quoad omnes partes ex mente Highmori. 488. &c. ad ductum Thomæ Willis.	496, &c.
Cerebri descriptio in vitulo, mure, lepore, cuniculo, &c. 498, 505. &c. in volucris & piscibus.	510, &c.
Cerebelli descriptio.	215, 504
Cervis cur cutis mobilis, vide Animalibus.	
Cervix ossis.	16
Cerumen aurium.	249
Charta virginea quid.	118
Chiroteca quid in corpore.	<i>ibid.</i>
Chorda tympani quid. 250. quis ejus usus.	<i>ibid.</i>
Chorda magna.	290
Chylus ad pancreas non venit. 53. ex Ventriculo in intestina qua ratione deferatur. 39, 361, &c. ejus color non semper est albus.	33
Chyli distributio per quæ vasa fiat. 326, &c. 361, &c. non per Cholydochum, Virsungianumque ductum, nec per venas mesaraicas vulgares.	362
Chyli receptaculum ejusque historia.	53, 361
Chyli penus, stagnus, vesica.	366
Chyli Receptaculum à Bartholino in homine inventum. 364. Glandularum specie. 365. quomodo. <i>ibid.</i> quibus præsentibus. 366. ejus varia nomina & situs. <i>ib.</i> substantia, numerus, magnitudo,	

tudo, figura, 367. color, connexio, 368. Usus, 369.
 commoda varia ad variorum explicationem, *ibid.*
 Chylificatio etiam fit in intestinis. 46
 Chyromantici quid ex manibus præfagiant. 6, 206
 Christi ex latere qualis liquor effluxerit. 147
 Cicatrix cur pilis non tegatur. 5
 Cingulum. 140
 Cilia quid. 233
 Ciliaris musculus non datur. 204
 Circulus nervus diaphragmatis, vide Diaphragma.
 offeus circa cor. 153
 Circulationis sanguinis Inventores & propugnato-
 res. 154
 Cisterna cerebri, vide Ventriculus cerebri.
 Clavicula, 261. cur sic dictæ, *ibid.* cur dicantur
 jugula, *ibid.* cur in viris quam fæminis magis
 intorqueantur, 262. an ad Thoracem refe-
 rendi. 261
 Clytoris ejusque descriptio, 107. ejus Etymolo-
 gia, *ibid.* excrefcens quomodo rescindenda, 108
 Clysteres per os rejecti. 47
 Cochlea, quæ cavitatis auris. 253
 Collum, 175. qua ratione inferviat vocis formati-
 oni, *ibid.* quot habeat vertebra, quæque earum
 specialis descriptio. *ibid.* 176
 Collum, vide Intestinum.
 Colis, vide Penis.
 Columella quid. 175
 Conarium. 218
 Condulus quid. *ibid.*
 Conceptio an sine mare fieri queat. 112, &c.
 Cotyledones quid sint & cur in homine reperian-
 tur. 120
 Cor, 147. ejus Etymologia, *ibid.* Usus, *ib.* descri-
 ptio, *ibid.* &c. quid vulgo dicatur, 42. arteriam
 habet coronariam, 148, 149. habet nervos, *ibid.*
 pinguedine sæpe occultatum, 149. bifidum, 150.
 solidum sine Ventriculis, *ibid.* an magnum timi-
 ditatem arguat, parvum audaciam, *ibid.* cur au-
 ritum dictum Oribasio aliisque, 149. Cartilagi-
 neum observatum. 156
 Cordis fovea, 40. Cor ut in foetu se habeat. 123
 Cordis absentis exemplum, 149. ejus auriculæ, *ibid.*
 figura qualis, 155. quale habeat temperamen-
 tum, 151, 155. qua ratione in medio pectoris
 situm sit, 156. ejus inflammatio, putredo, ulcera,
 tumores, &c. *ibid.* magnitudo quantum & quas
 ob causas variet, 150. motus in foetu unde pen-
 deat, 116. septum pervium non esse proba-
 tur, 155. Mucro bifidus, *ibid.* Ventriculi tres
 reperti, 150. in Ventriculis varia p. n. reperta.
 ut vermes, calculi, &c. 156
 Cordis scrutator cur Deus dicatur. 145
 Cordis Domus, Arca, Theca, Vagina. *ibid.*
 Cordis Ventriculus dexter offeus, lapideus. 151
 Cordis columnæ descriptæ. 456

Corium ut à cute differat. 3
 Cornua in cranio hominis. 162, 188
 Corpus callosum cerebri. 216, 488, 497
 Corpus olivare. 522
 Corpus cur spongiosum Hipp. dicat. 9
 Corporis humani divisio in ventres & artus. 1
 Corpora Varicosa seu pyramidalia quid, 87. Striata
 cerebri. 499
 Costæ cur veræ & spurix dictæ, 130. cur partim
 ossæ, partim cartilagineæ, *ibid.* bifurcatæ exem-
 plum, 136. cur inferiori parte sinum habeant, *ib.*
 Costarum numerus, 136. quis fuerit in Adamo, *ibid.*
 cur circularem figuram habeant, *ibid.* tubercula
 qualiter constituta, *ibid.*
 Κοτύλαι quid sint. 16
 Coxa, vide Os coxæ.
 Cranium, 187. ejus Usus varii, 188. cur constet
 ex variis officulis, *ibid.* cur non ex duplici lami-
 na, 188. an à durâ meninge distet, 180. ex cran-
 io cornua, 188. Cranii meningumque leves
 offensæ lethales. 181
 Crura Clytoridis, Fornicis, vide Clytoris, Fornix.
 Crustæ erucarum qua ratione generentur & rege-
 nerentur. 8
 Cribrum renum, vide Renes.
 Cubitus. 265
 Cuticulæ etymologia, 6. historia, *ibid.* &c. ex qua
 materia generetur, *ibid.* quam habeat causam
 efficientem, 7. quali sanguine nutriatur, 12. cur
 non sit nimis densa, 7. an sit membrana simplex
 nec ne, *ibid.* an habet sensum & vivat, *ibid.* cur
 crassior in manibus & pedibus quam in aliis par-
 tibus, *ibid.* cur *πεγνύς* id est vetula *Aristoteli*
 dicta, *ibid.* an à cute citra molestiam separabi-
 lis, *ibid.* partem esse corporis probatur, *ibid.* ejus
 Usus varii. 8
 Cutis anguim, qua ratione generetur & regeneretur.
 6
 Cutis historia Anatomica, 3, &c. an tactus sit orga-
 non, 3. cur mobilis in variis animalibus, non ita
 in homine, 5. quibus hominibus densior vel ra-
 rior sit, 4. cur nasæ piscatoriæ assimilatur 5.
 an fenestræ loco haberi possit, *ibid.* per veram
 cutem in vulnere consolidata, 4. ejus usus. 3
 Cutis superficies *Galeo* quid, cutis ultima *Aristoteli*
 quid. 3

D.

Deglutitio qua ratione fiat. 42
 Demonstrator digitus, vide Index.
 Dens in faucibus & palato enatus. 203, 204
 Dentes Canini, 203. Oculares, *ibid.* Gelasini, *ibid.*
 Genuini. Mandibulares. Maxillares. *ibid.*
 Dentium historia, 199. eorum nobilitas, *ibid.* Ety-
 mon, *ibid.* an sint ossa, 200. in quibus ab aliis
 B b b b ossi-

ossibus differant, *ibid.* Usus, *ibid.* Durities summa, *ibid.* cur habeant Arterias & Nervos, 201
an sentiant, *ibid.* cur multi adeo, 202. numerus eorum præternaturalis, *ibid.* ordo præternaturalis, *ibid.* dentis continui exemplum, *ib.* in utero geniti, 203. in senectute renati, *ibid.* qua ratione Cibum præparent, 200. cur radices adeo diversas habeant, 204. quo tempore nascantur, 203. quo renascantur, *ibid.*
Diabete verâ cur & quomodo potus talis per vesicam reddatur qualis fuit assumptus & brevi tempore, 369
Diaphragmatis Etymon, 140. cur *σπένας* dicatur, *ib.* cur dicendus musculus, 141. quæ ejus partes, *ib.* ejus centrum quid, *ibid.* cur septum transversum appellatum, 140. cur præcordia, *ibid.* cur cingulum, *ibid.* ejus nervi unde oriantur, 141. cur adeo altè oriantur, *ibid.* Diaphragmatis usus, 141. an in inspiratione fursum vel deorsum moveatur, *ibid.*
Diarthrosis quid, 274
Diastrale, vide Pulsus.
Diploë, 189. in foetu non datur, 124
Diuretica hausta cur in urinis odorem & colorem imprimant, 371
Dolor Colicus & Nephriticus cur difficulter distinguantur, 47. dolor in coitu primo unde, 109. doloris in congressu causa, in viris, 95
Domus cordis, 145
Ductus Biliarius, 63. duplex repertus, 64. non distribuitur per eum Chylus, 362
Ductus Chyliferus à *Pesquetto* inventus in animalibus, in homine à *Bartholino*, 364. & quo modo, 365. quibus præsentibus, 366
Ductus Roriferi Labyrinthus, 350, &c. à *Bilso* & *J. H. Pauli* descriptus, *ibid.*
Ductus Lymphæ, vide Lymphæ ductus.
Ductus Buccarum, 463. Sublinguales, 464. Palatini, 465. Cartilaginis Epiglottidis, *ib.* Lachrymales, 478, &c.
Ductus cysticus, 63. ejus fibrosus annulus & valvula quem usum habeant, *ibid.*
Ductus Virfungii descriptio, &c. usus, 56, 57, 402, 410, 411. Bile plenus, 57. duplex repertus, *ibid.*
Ductus novus in Teste, 88, 442
Ductus Salivalis, ejusque usus, 174. inferior descriptus, 457, &c. superior, 463
Dulcedo amoris, 108

E.

E Minentiæ ossis, vide Processus.
Enarthrosis quid, 274
Enterocoele, vide Hernia.
Entero epiplocele, 26

Epar, vide Jecur.
Epidermis quid, 6
Epididimis quid propriè sit, 87. Epididimida quem usum verè habeant, 88. eorum Vasa, *ibid.* non adjunct in muliere, 98
Epigastrium, 2. quid *Galenus* per id significarit, *ib.*
Epiglottis ossæ visâ, 160. an ea continuo operiat rimulam laryngis, *ibid.* An habeat musculos flexores, *ibid.*
Epiphyfis quid, 15. ejus Usus, *ibid.*
Epiploon undè dictum, vide Omentum.
Epiplocele quid, 27
Equis cur cutis mobilis sit, 6, 11
Erucarum crustæ quâ ratione generentur & renerentur, 8
Exuviz, vide Senectâ.

F.

F æminis cur Ventriculus minor quam viris, 37
Falx undè sic dicta, ejusvè Usus, 210, &c.
Fames quam causam habeat, 38
Fascia lata, 288
Fascia renum quid, vide Membrana adiposa.
Febrium doctrina, & quid hîc faciat succus Pancreaticus, 424
Femur, 268
Fenestra auris ovalis, rotunda, 253
Fibrosi annuli in ductu cystico conditio & usus, 63
Fibula, 271
Fistula cibaria Lactantio quid sit, 40
Fistulæ deglutitæ & excretæ, 39
Focile, 265
Fœces per umbilicum excretæ, 118
Foetus formatio qualis, 106, 112. an partes simul generentur, 113. quo nutrimento nutriatur, & per quas id vias accipiat, 122. ex quâ materia generetur, 114. an in utero respiret, 123. à qua causa ex Utero exeat, vide Partus. Nutritio per os an fiat, 122. quando ad partum maturus, vide Partus. In tubis uteri conceptus, 95-99
Folliculus fellis, vide Vesica fellis.
Fontanella seu Fons pultatilis, 191. in adultis membranosa inventa, *ibid.* quo tempore ossis fiat, *ibid.*
Foramen circa cor foetus, in adultis pervium, 123
Fornix Cerebri, 216, 489, 497
Fovea cordis, 40
Fœnum linguæ quem habeat usum, 173. præputii, usus 95. cur canis dicatur, *ibid.*
Fricatrices mulieres quænam sint, 108
Frustra carnea in collo uteri, 107
Frustra deglutita magna & excretæ, 39
Funiculus quid Medicis sit, 115
Furcula, 261

G.

Galea quid & unde, 118
Galenus sexcenta animalia viva dissectuit, 329
 Gargareon, 174
 Generatio quomodo fiat, vide *Fœtus* formatio.
 Gigantum historia, 45
 Glandes per os rejectæ, 47
 Glandularum Mesenterii numerus & usus, 52
 Glandularum distinctio in conglomeratas & conglomeratas, 412. earum usus, 416, 478
 Glandulæ Seminales, 92. earum usus, *ibid.*
 Glandulæ oris & Maxillares, 174, 457, &c. Buccarum, 463. Sublinguales, 464. Palatinæ, 465. Oculorum, 478
 Glandula pinealis, 218, 490, 501. lapillis referata, 219. ejus usus verus, *ibid.* Pituitaria, 221, 492, 502, 506, &c. ejus usus, *ibid.* ut in animalibus se habeat, 507. Renalis à quo sic dicta, 73
 Glandosus adfistens *Fallopio* quid sit, 92
 Glans penis, 95. imperforata *ibid.* cur non doleat pressa, *ibid.*
 Glottis quid sint, 16
 Glottis quid sit, 169
 Gulæ historia Anatomica, 40
 Gula cur in Thorace incurvata, 41. cur posterius, trachea anterior, situm habeat, 156. Gulam qua vi transeat cibus, 42
 Gulosi quid & cur dicantur, 40
 Gurgulio, 175
 Gustus organum quid, 204. quomodo fiat, *ibid.*
 Gynglymi differentia, 275
 Gyri cerebri, 213, 214. Gyrorum intestinorum quæ causa, 43

H.

Harmonia qualis ossium nexu, 274
 Helix auris, 247
 Hepar, vide *Jecur*.
 Hepar uterinum, vide *Placenta* uterina.
 Hernia, 27. Hernia umbilicalis quomodo fiat, 118. ejus exempla, *ibid.*
 Hilla quale Intestinum, 45
 Homines submersi cur post triduum ex aquis emergant, 157
 Homini cur cutis immobilis sit, 6, 11
 Hominum statura an at aliquid annis imminuta, 45
 Humani corporis divisio in ventres & artus, 1
 Humeri os cur *Galenus* dixit maximum, 263
 Humor acidus quid sit, quidque conferat ad Chylificationem, & unde veniat, vide *Lien*.
 Humor oculi aqueus, 242. melius dicitur *Albugineus*, *ibid.* *Cristallinus*, *ibid.* *Vitreus*, 243. Humor Palati, 472

Humores in foetum involventibus membranis, quid, quot & unde proveniant, 119, &c.
 Hydrocele, vide *Hernia*.
 Hymen quid, 108. de ea varii, *ibid.* an signum virginittis, 109. an semper debeat adesse, *ibid.*
 Hypogastrium, 3
 Hypochondria quid sint, 2
 Hypothenar, 267
 Hydatides hepatis, 59

I.

Janitor, 39
 Jecoris Etymologia, 58. Historia anatom, *ib.* &c. magnitudo varia, 60. aridi, atri, &c. exemplum, *ibid.* jecur cur supremum in Abdomine locum habeat, cur semper in dextro Hypochondrio situm sit, *ibid.* an hic situs robur lateri adferat, 62. an pars princeps, 58. an Sanguinis officina, & quomodo, *ibid.* varia habet ligamenta, 62. varii coloris, 59. in lobos distinctum est, 61. quot modis committatur ventriculo, 139. qua ratione se habeat in foetu, 121
 Ilia quid sint, 2
 Ileii morbi causæ, vide *Intestinum Ileum*.
 Inanes *Galenus* quid, 2
 Incerniculum renum, vide *Renes*.
 Incudis inventor quis, 250. ejus descriptio, 251
 Index digitus, 268
 Indusium quid & unde, 118
 Infantium Lactantium exempla, 171
 Infundibulum in corpore quid, 175. Infundibulum Cerebri, 221, 502
 Ingluvies quid, & quem usum habeat, 38
 Inguina quid sint Authori, 3
 Intestinorum historia anatom. 42, &c. exterius an interius pinguedine obfita, *ibid.*
 Intestina cur ita contorta, 43. nervis adeoque sensu prædita, 58. cur interius rugosa, 42. cur mucosa, *ibid.* Chylificationi etiam inserviunt, 46
 Intestini Coli historia usus, Cellulæ, Valvula, 47, 392
 Intestini Cœci usus, magnitudo, &c. 46. an semper excrementis plenum, *ibid.* unicum tantum habet orificium, *ibid.*
 Intestini Duodeni historia, 44
 Intestini Jejuni structura & usus, cur magis & celerius sit vacuum aliis, 45. etiam datur in foeminis, *ibid.*
 Intestini Ileii mensura, longitudo, situs, &c. *ibid.*
 Intestini Recti structura & usus, 48. non est simpliciter rectum, *ibid.*
 Intestinorum Mucus, 42, &c. coalitus p. n. & gangræna, 57
 Intestina in foetu qualiter se habeant, 120
 Bbbb 2 Inter-

Internodia digitorum, 267
 Inventa varia nova, 409
 Iris oculorum quid, 240
 Jugula quid, 261

L.

L Abia unde sic dicta, 205. cur pinguedine ca-
 reant, 9
 Labia uteri quid sint, 107
 Labra ossium quid, 16
 Labyrinthus qualis auris cavitas, 253
 Labyrinthus ductus roriferi, 350
 Lac cum urina in quibusdam per quas vias redda-
 tur, 370
 Lactis materia quæ sit, 131. per quas vias ad mam-
 mas veniat, *ibid.* 121
 Lacte an nutriatur foetus, vide Caput VIII.
 Lactantium virorum, virginum, vetularum, pue-
 rorum, exempla, 131
 Lactea vasa, vide Vasa.
 Lactis fluxus ex cervice *D. Pauli* unde, 358
 Lactei latices, 366
 Lactes quid, 54. varia appellatio, 322, &c.
 Lacuna triangularis, 191
 Lachrymarum generatio, 480
 Lapides in cerebro & circa meninges, 211. in glan-
 dula pineali, 218. in hepate, 58. in ductibus bi-
 laris & vesica fellis, 63. in musculo glutæo, 287.
 per umbilicum excreti, 118
 Larynx, 165. ejus Etymon, *ibid.* Cartilagine ossæ
 inventæ, 166
 Laryngothomia ut instituenda, 165
 Lienis Etymon, 65. Structura, *ibid.* &c. color quis
 naturalis, & præter naturalis, 67. ad interiora an
 feratur nervus 66. membrana corio similis, 65.
 situs mutatus, 68. Ufus, *ibid.*
 Lien an & qua ratione sanguificet, *ibid.* numero
 auctus, 65. deficiens, *ibid.* cur sinuosus sit, 67.
 figuram habet lingue humanæ, *ibid.* varæ
 magnitudinis, *ibid.* induratus, *ibid.* non est fru-
 stra conditus, 68. an possit è corpore eximi & in-
 uri, *ibid.* lobis præditus, 67. jecur alterum malè
 dicitur, *ibid.* reni adnascitur rarò, 68. quot mo-
 dis committatur Ventriculo, 39. in liene vasa
 capillaria non sunt vasa sed fibræ, 65, 394. vasa
 in eo valvulas habent notabiles, 66, 394, &c.
 Ligamentum carpi, 217. ciliare, 240. an tunica
 appellanda, *ibid.* Suspendorium hepatis, 69. ad
 interiora ejus transit, *ibid.* Umbilicale, 61
 Ligamenta scapulæ, 263. femoris, 268
 Linea alba quid sit, 22. cur hæc livida post par-
 tum, *ibid.*
 Linea manus naturalis, 267. Mensalis, *ibid.* Jeco-
 raria, Thoralis, *ibid.* Temporalis, *ibid.* Vitife-
 ra, *ibid.* Veneris, *ibid.*

Linea Chyromantica quid, *ibid.*
 Lingua quid, 171. ejus Etymon, *ibid.* qua ratione
 sermonis organum, *ibid.* sine lingua aliqui lo-
 cuti sunt, *ibid.* quomodo gustus organum, *ibid.*
 quæ ejus pars maximè sentiat, *ibid.* an muscu-
 lus, 172. cur vasa aded magna habeat, *ibid.*
 maximè increvit, 173. ejus frænum quem ha-
 beat usum, *ibid.*
 Liqueor inter Amnion & Foetum collectus qua-
 lis, 119
 Lobus auris quid, 246
 Locelli, 203
 Lumbi quid, 3
 Lumbrici, vide Vermes.
 Lythotriptica medicamenta per quas vias tam cito
 ad renes veniant, 370
 Lythothymia quo loco instituenda, vide Vesica
 urinaria.
 Lymphæ ductus qua ratione à *Bartholino* de-
 lecti, 384. quæ & qualia in hepate, 385. eorum
 nomina, 386. exortus, 387. insertio, substan-
 tia, color, figura, *ibid.* valvulæ, magnitudo, nu-
 merus, situs, progressus, 388. usus, 390. quem
 humorem contineant, *ib.* unde is derivetur, 389
 Lymphæ ductuum jugularium administratio, 353.
 &c. eorundem utilitas, 355
 Lymphæ ductuum Valvulæ, easque inveniendi
 modus, 548
 Lymphæ ductuum distributio ab hepate ad Re-
 ceptaculum, 552

M.

M Ala unde sic dicta, 197
 Mallei inventor quis, 250. ejus descriptio, 251.
 musculi, *ibid.*
 Malleoli pedis, 270, 271
 Mammæ acceptiones varæ, 131. descriptio, *ib.* &c.
 pulchritudo in quo consistat, 133
 Mammæ cur mulieri geminæ, 133. ex glandulis
 pluribus constant, 131. ex unicâ glandulâ vident
Riol. ibid. quatuor in muliere lac præbentes no-
 tatæ, 133. tres in alia, *ibid.* cur in pectore
 sitæ, 134. cur supra pectoralem muscolum, *ibid.*
 earum magnitudo, 133. officium, 131, 134
 Mamma cur soli homini in pectore, 380
 Mammaria & Epigastrica vasa an sub Recto Abdo-
 minis musculo uniantur, 23
 Manus officia atque præstantia, 260. Manus pro-
 na, 267. supina, *ibid.* Manus & pedes cur ha-
 beant cuticulam crassiore, 7. Manus cur ho-
 minum sint duæ, 260
 Marsupium carnosum, 288
 Mares an à dextris, femina à sinistris veniant. Sine
 mare an fieri queat conceptio, vide Cap. VIII.
 Masticatoria per quas vias educant excrementa, 202
 Matres,

Matres, vide Meninges.
 Matrix, vide Uterus.
 Maxilla undè sic dicta, 197. quod ossibus constet, 198. superioris cavitas descripta, 486. inferior quo tempore coalescat, 199
 Meatus auditorius, 248
 Meconium quid, 121
 Mediana linea uteri *Aristoteli* quid, 99
 Mediastini varia acceptio, 139. usus, *ibid.* ejus membranæ sub sterno an distent, 140
 Medullâ an nutrantur ossa, 16
 Membrana Agnina quid, 118. Adipocarnosa qualis sit, 13. carnosa frontis malè dicitur musculus, 7. Succingens, 138. musculorum communis an detur, 10. Amnios, 118. Chorion, 119. Alantoides seu Farciminalis, 119
 Membranæ carnosæ historia, 11. &c. Usus, *ibid.* in eâ quâ ratione rigor excitetur, 12
 Membranarum pituitariarum oris descriptio, 468. &c.
 Membranarum foetum involventium quæ prius generetur, 118
 Membrum virile, vide Penis.
 Meninx crassa, 208. ejus officium, *ibid.* cur sic dicta, *ibid.* Tenuis, 212. ejus officium, *ibid.* cur à cranio Crassa distet, *ibid.* an à cerebro, *ibid.* Tenuis cur adeo mollis, *ibid.* quam profunde se demittat, 213
 Menses an per mammas effluant, 23. menstrua per umbilicum excreta, 118
 Mensula quid, 267
 Mesenterii historia, 52. &c. quibus partibus alligatum sit, 53. qua ratione, se omnibus intestinis applicet, 54. cur duplex membrana, 52. cur glandulis copiosè donatum, *ibid.* quis harum usus, *ibid.* cur adeo copiosa vasa habeat, 43. 53. an habeat nervos, 53. ejus usus, 54
 Metacarpium, 267
 Metatarsus, 272
 Mola quale os, 269
 Molæ exempla, 103
 Montes manus, 267
 Monticuli chiromanticis quid, *ibid.*
 Monstrosorum foetuum exempla, vide in Liceto.
 Mortariola, 203
 Mucus intestinorum qua ratione generetur, 42. quæ sit ejus materia, *ibid.*
 Mulieres plurimæ gravidæ cur varicosæ, 23
 Mumia, 45
 Musculus cur organica pars sit, 21. Biceps geminus, 279. Ciliaris non datur, 204. Frontis non datur, *ibid.* Glutæus silice præditus, 287. Palmaris duplex repertus, 281. defuisse notatus, *ib.* Popliteus duplex, 288. Psoas minor, 286. Quadratus non lumbis, sed dorso est adscribendus, 187. Sacrolumbus non lumbis, sed dorso

est adscribendus, *ibid.* Auris à *Fallopio* optimè descripti, 247. bruta cur septem habeant musculos oculorum homo. tantum sex, 237. Intercoastalium quis verus usus, 138
 Musculos Abdominis etiam inservire respirationi probatur, 21. 25. non soli fœces alvi excludunt.
 Musculus Sphincter Gulæ seu Oesophagæus, 41. Sphincter ani, 48. Pectoralis, 130. 279. Serratus anticus major, 130. minor, 131. 180. Ciliaris, 204. Buccinator, 205. Quadratus, *ibid.* Crotaphites seu Temporalis, 206. Digastricus seu Biventer, 207. Masseterius, *ibid.* Pterigoides seu Alaris, *ibid.* Oculi superbus, 237. humilis, *ibid.* bibitorius, *ib.* indignatorius, *ib.* Deltoides, 278. Rotundus humeri, 279. Biceps, *ib.* Brachiaxus, *ib.* Longior & brevior cubiti, 280. Anconeus, *ibid.* Palmaris, 281. Profundus digitorum, 282. 291. Sublimis, *ibid.* Hypothenar, *ib.* Indicator, 283. Thenar, *ibid.* Triceps, 286. Psoas, *ibid.* Iliacus internus, *ibid.* externus, 287. Lividus, 286. Pectinæus, *ibid.* Pyriformis, 287. Membranofus, 288. Rectus tibiæ, *ibid.* Suppopliteus, *ibid.* Crureus, *ibid.* Femoreus, *ibid.* Fascialis, 289. Gracilis, *ibid.* Semimembranofus, *ibid.* Biceps tibiæ, *ibid.* Tibialis anticus, *ibid.* posticus, *ibid.* 290. Plantaris, 290. Soleus, *ibid.* Perforans, 291. Perforatus, *ibid.*
 Musculi Trapezii seu Cucullares, 180. Rhomboidei, *ibid.* Serrati superiores postici, 181. inferiores, *ibid.* Latissimi dorsi, *ibid.* 279. Levatorii, 181. Sacrolumbi, 182. Longissimi dorsi, *ibid.* Semispinati, *ibid.* Sacri, *ib.* Quadrati lumborum, *ib.* Splenii, 183. Complexi, *ibid.* Recti capitis Obliqui capitis, *ib.* Fallopiiani seu Pyramidales, 24. Cephalopharyngæi, 41. Sphæno-pharyngæi, *ibid.* Stilopharyngæi, *ibid.* Levatores ani, 48. Cremasteres, 91. Subclavii, 137. Triangulares, 177. Intercoastales, 138. Sternothyroidei, 167. Cricothyroidei, *ibid.* Hyothyroidei, *ibid.* Arytænoidei, 168. Cricotænoidei postici, *ib.* laterales, 169. Sternohyoidei, 170. Coracohyoidei, *ibid.* Stylo coracohyoidei, *ibid.* Geniohyoidei, 171. Genioglossi, *ib.* 172. Styloglossi, 172. Basiloglossi, *ibid.* Ceratoglossi, 173. Myloglossi, *ib.* Breves colli, 177. Longi colli, *ib.* Scaleni, *ib.* Mastoidei, 183. Transversales, 184. Spinati, *ibid.* Frontis, 204. Palpebrarum, *ibid.* Labiorum, 205. Narium, *ibid.* Oculorum amatori, 237. Auriculæ, 247. Suprascapulares, 279. Infrascapulares, *ib.* Pronatores, 280. Supinatores, *ib.* Flexores carpi, 281. Extensores ejus, *ib.* Digitorum, 282. Lumbicales, *ibid.* 291. Interossei, 283. 292. Glutæi, 287. Obturatores, *ibid.* Vasti, 288. Peronæi, 289. 290. Gastrocnemii, 290. Digitorum pedis, 290. &c.

N.

N Ares,	254	
Narium ductus descripti,	481, &c.	
Nasus, 254. ejus officia tria,	255	
Nates quid,	3	
Nates cerebri quid propriè sint,	218, 491, 500	
Nervus an in Lienis substantia,	66	
Nervus quid, 219. eorum usus, <i>ibid.</i> divisio,	516	
Nervi olfactorii, 220, 516. Oculorum motorii,	221, 517. Gustatorii, <i>ibid.</i> 222, 517. Auditorii, <i>ibid.</i> 519. Linguarum motorii, 222. Oculorum pathetici, 517. Accessorii,	522
Nervis an præditum sit Mesenterium,	53	
Nervi Optici, 516. maximi sunt, 220. perforati, <i>ib.</i> qua ratione conjungantur, <i>ibid.</i> propter quid nervi hi conjungantur, 221. eorum Thalami,	517	
Nervi an per parenchyma renis distribuuntur,	75	
Nervi Recurrentes, recurcivi, vocales, 36, 524. Costales, 37, 165. Manuum, 296. Pedum, 300. Cardiaci, 524. Stomachici, 525. Pneumonic, 525. Mesenterici,	526	
Nervea tunica testium an eadem cum albuginea,	92	
Nervorum par Vagum, ambulatorium, 36, 222, 522, &c.	522, &c.	
Nervorum plexus,	522, 524, 525, 526	
Nervus intercostalis, ejusque descriptio,	525, &c.	
Nervus Spinalis ad par vagum accessorius, 529. Diaphragmatis,	<i>ibid.</i>	
Nervi è spinali medullâ, 532. Brachiales,	533	
Nervorum è Cerebro paria reliqua,	531	
Nodi digitorum,	267	
Nodorum in umbilico ex numero an de sobolis futuræ numero judicandum,	115	
Nota virginitatis masculæ,	95	
Nummi deglutiti & excreti,	39	
Nuclei deglutiti & excreti,	<i>ibid.</i>	
Nymphæ quid sint, & unde sic dicantur,	107	

O.

O Culi, 235. eorum Etymon, <i>ib.</i> nobilitas, 232. descriptio, <i>ibid.</i> lux congenita, 236. qua ratione animi vascula dicenda sint, 232. quid significant, <i>ibid.</i> Oculorum muscoli, 237. Actio, 243. Tunica, 238. Humores,	242
Odoratus Organum verum quid, 254. quomodo fiat,	255, 473
Oesophagus, vide Gula.	
Oestrum veneris,	108
Olecranon,	265

Olivare corpus Fallopio quid,	522
Omasus,	38
Omenti structura, 30. cur dicatur omentum, Græcis Epiploon, <i>ibid.</i> cur ipsi adeo copiosa data sint vasa, 32. cur reticulum dicatur, 31. putrefactum, 33. quâ ratione Chylificationem juvet, 31. quâ ratione foveat Ventriculum & intestina, <i>ibid.</i> quousque se dimittat, 32. Omenti situs varius, 32, 33: quæ causa sit quod fursum supra umbilicum ferè reperiatur, <i>ibid.</i> utero alligatum, 33. pubi annexum, <i>ibid.</i> ejus usus, 31	
Omoplate,	262
Operculum primi ortus Aristoteli quid sit,	6
Ore quâ ratione audiamus,	252
Oræ ossium quid,	116
Orificium Ventriculi superius non est situm exactè sub foveâ cordis, 38. cur nervis adeo copiosis, & fibris circularibus præditum,	<i>ibid.</i>
Officulum cranii Ant-Epilepticum,	194
Ossium doctrina Anatomica,	15, &c.
Ossa abdominis,	17
Ossa Manûs, 266, &c. Carpi, 267. Metacarpi, <i>ibid.</i> Digitorum, <i>ib.</i> Pedum, 268. Tarsi, 271. Metatarsi, <i>ibid.</i> Digitorum. 272. Sphænoidea seu Cuneiformia, 272. Sefamioidea, 273. eorum Usus, <i>ibid.</i> an incorruptibilia, <i>ibid.</i>	
Ossa an sanguine vel medullâ nutriantur, 16. cur foraminulenta, <i>ibid.</i> quibus hominibus duriora sint, 14. in homine quænam sint durissima, molliora & mollissima, <i>ibid.</i> Pubis an in partu à se invicem diducantur, 20. Arcualia, 190. Cogitationis, <i>ibid.</i> Verticis, <i>ibid.</i> Rationis, <i>ibid.</i> Saxosa, 191. Lapidosa, Mendosa, Petrosa, <i>ibid.</i> Squamosa, <i>ibid.</i> Parietalia, Sincipitis, 190. Bregmatica, <i>ibid.</i> Cranii qua ratione in crassitie differant, 189. in foetu qua ratione inter se & ab ossibus adulatorum differant,	124
Ossa solida omnino nulla sunt, 14, 15. instar ceræ mollia observata,	15
Os Basilare, 193, 195. Calatorii, 195. Coronale, 188. Cribriforme, 196. Ethmoides, <i>ibid.</i> etiam datur in volucris, 513. Frontis, 188. Inverecundum, <i>ibid.</i> Jugale, 192. Lambdoïdes, 193. Memorix, <i>ibid.</i> Multiforme, 195. Nervosum, 193. Proxæ, <i>ibid.</i> Pyxidis, <i>ibid.</i> Sphenoides, 195. Cuneiforme, <i>ibid.</i> Spongiosum, 196. Zygomaticum, 192. Humeri, 263. Scapula, 262. Cubiti, 265. Ulnæ, <i>ib.</i> Radii, 266. Femoris, 268. Tibiæ, 270. Fibulæ, 271. Calcis, 271. Tali, <i>ibid.</i> Cymbiforme, 272. Cubiforme,	<i>ibid.</i>
Ossibus cur pluribus homo constet,	16
Ossium dunties qualis sit, & qualiter differat,	14
Officulum triangulare,	194
Os Coccygis, 18. Coxæ, 19. Innominatum, <i>ibid.</i> Ichiium, <i>ib.</i> Pectinis seu Pubis, 20. Sacrum, 18	

Os Eniforme seu Xiphoides, 134. Pectoris, *ibid.*
 Hyoides seu Ypsiloides, 170
 Offis frontis cavitates descripta, 487
 Officulum Luz, 273. an incorruptibile, *ibid.*
 Offium connexio, 274
 Offa circa Meningem reperta, 211
 Offa ut se habeant in foetu, 124, 125
 Officula auditus quis primus inveniit, 250. Wormiana, 194, 486
 Os oris, 205. ejus etymon, *ibid.*

P.

Palatum quid, 174. ejus Etymon, *ibid.* palati & Ventriculi consensus, 34. ad palatum per quas vias deferantur excrementa, 252
 Palati humor, 472. per quas vias exeat, *ibid.* in avibus, *ibid.* in piscibus, 473
 Palma, 266
 Palpebra, 232. earum Etymon, *ibid.* quanam mobilis in homine & animalibus, 233. usus, 235. quâ ratione moveantur, 233. cur pinguedine careant, 9
 Palpebrarum vasa, 479
 Pancreatis historia, 54, 402, 410. usus quis, 58. descriptio à *Veslingio* tradita improbat, 55, &c. an ex plurimis constet glandulis, *ibid.* non accipit chylum, *ibid.* non est origo venarum lactearum, 56. non coquit chylum, 55. lapidescens, 58. sæpe potest corrumpi sine læsione hepatis & lienis, 57. scyrrhosum, *ibid.* pancreate affecto lien & jecur sæpe etiam afficiuntur, *ibid.* quâ ratione se habeat in foetu, 121
 Pancreas *Asellii*, 52. an venarum lactearum sit principium, *ibid.*
 Pancreatici Ductus quis usus, 55
 Pancreatici Succus descriptio & usus, 408
 Panniculus carnosus, vide Membrana carnosæ.
 Papaverculum quid, 121
 Papillæ, 132. earum foramina, *ibid.*
 Papillæ mammarum, *ibid.* earum Foramina, *Tunica*, &c. *ibid.*
 Parastata quid propriè sit, 50. ejus usus, 51. non adest in mulieribus, 98
 Paristhmia quid sint, 174
 Parotides, 248
 Parotis quid, 174
 Pars stomachalis quid, 3
 Partem principem in Capite cur *Plato* constituerit, 2
 Partus quæ sint causæ, 105, 112. tempus cur adeo varium, *ibid.*
 Patellæ usus, & descriptio, 269
 Pecten manus, 266

Pectus quid, 2. quæ ejus Etymologia, 130. cur ita dicatur, 118
 Pectus manûs, 266
 Pedum officia, ac præstantia, 260. pedes cur cavi, *ibid.* cur duo homini, *ibid.* cur in articulos divisi, *ibid.*
 Pellicula summa *Celso* quid, 7
 Pelvis renum quid, 83
 Penis Etymon, 93. Structura, *ibid.* &c. Usus, *ibid.* duplex repertus, *ibid.* Offeus, 94. impervius, *ib.* an primò inferviat femini an urinæ, 93. muliebris, 108. sine Urethra, 93. cur pinguedine careat, 9
 Pericardium quid, 145. ejus Etymologia & Synonyma varia, *ibid.* quâ ratione ex corde nasci diceat, *ibid.* pericardii Aqua descripta, 146. summa est crassities, 145. rustici ex eo crumenas faciunt, *ibid.* quæ ejus figura, *ibid.*
 Pericranium quid, 187. à perioftio an distinguatur, *ibid.* unde originemumat, *ibid.*
 Perioftium, 15
 Peritonæum improprie oriri dicitur à vertebra, 24. omnibus locis an duplex, 25. & quibus locis præcipue tale sit *ib.* ubi tenuius sit & crassius, 26. in viris non est crassius in Epigastrio, *ibid.* cur mollis facta membrana, *ib.* cur valida, *ibid.* ejus productio non est perforata, *ibid.* an ex duplici membranâ constet, 27
 Phatynx quid sit, 41
 Pilorum historia, 302. Etymologia, *ibid.* an pili animati, *ibid.* an verè vivant, nutrantur & crescant, an vero tantum protrudantur, *ibid.* anima præditi sunt vegetante, non communi cum toto sed propria, 303. Usus, 303. Subjectum in quo generentur, 304. cur in cicatrice non exurgant, *ibid.* Cutis qualiter debeat esse disposita ad generationem pilorum, *ibid.* in vesica urinaria reperti, 84
 Pilorum capitis usus, 186
 Pinguedo, adeps, sævum ut differant, 10. pinguedo cur in Thorace & Capite non sit adeo copiosa, in Abdomine & lumbis copiosissima, 9. an pars continens, *ibid.* an inter partes communes recenseri possit, 3. an sentiat, 10. Calida est & Humida, *ibid.* circa renes quem habeat usum, 72.
 Pinguedinis materia vera, 10. usus varii, 9, 11 circa cor copia, 236. pinguedine nutrirî partes in inedia negatur, 11. vivere probatur, 10
 Pinna auris quid, 246
 Pituita oris per quas vias evacuetur, 468, &c.
 Placenta uterina quid sit, & an in omnibus sit, 119. sanguinem coquere negatur, *ibid.*
 Plastica vis quid, 113
 Pleura an membrana simplex, 138. ejus Etymon, *ib.* cur interius lævis sit, 139
 Plexus

Plexus Choroides, 217, 489, 502. Pampiniformis quid, & quem habeat usum, 87. Retiformis, 223, 492. Ganglioformis, 523. Cervicallis, 526. Cardiacus, *ibid.* Mesentericus, *ib.* 527. Hepaticus, 527. Lienaris, *ibid.* Renalis, *ibid.*
 Podex cur adeo sensibilis, 49
 Pollex cur sic dictus, 268
 Pomum Adami, 166. cur in viris magis quam in mulieribus protuberet. *ibid.*
 Pons cerebri, 218, 491
 Pori quid sint, 5. quando maximè conspiciantur in cute. Per eos excretus sanguis, excretæ arenulae, *ibid.*
 Porus cholydochus quid, 64. in pylorum insertus, *ibid.*
 Postbrachiale, 266
 Potus non alteratus per quas vias ad vesicam veniat, 369, &c.
 Præcordia, 140
 Præputium, 95. carnosum & magnum, 96. præputii frænum cur canis appelletur, 95
 Præsepiola, 203
 Processus quid, & quotuplex, 16. Ἀγκυροειδής. Anchoriformis, *ibid.* Belenoides, 192. cerebri Mammillaris, 220. etiam datur in volucris, 513. non est organon odoratus, *ib.* γαφιοειδής. Pterygoides seu Aliforme, 195. Κορακοειδής. 16. Μαστοειδής. Mammiformis, *ibid.* 192. ὀδοντοειδής. Dentiformis, 16. Peritonæi, 26, 88. στυλοειδής. Styloformis. 16, 192. Styloides ulnæ, 266. an & qualis sit, *ibid.* Trochanter, 269.
 Rotator, *ibid.* Falciformis, 210
 Projectura ossis, vide Processus.
 Procidencia ani cur pueris familiaris, 19
 Prostata Glandulosa, 92. eorum Usus & Structura, 93. in mulieribus non adsunt, 101
 Protuberantia ossis, vide Processus.
 Protuberantia cerebelli annularis, 504
 Prominentiæ cerebri, 500, 501
 Pterygium, vide Unguis oculi.
 Pubes quid sit, 3
 Puncta Lachrymalia, 234, 232, 480
 Per pudendum urina evacuatur in foetu, 117
 Pudoris sinus quid, 107
 Puelluli sine ossibus exemplum, 15
 Pugnus, 214
 Pulmo an nervos habeat, 158. pulmones cur excindere soleant pyratæ hominibus quos enecatos aquæ injiciunt, 157. pulmonem replere Thoracem quomodo scire queam, 158. pulmonum ulcera cur insanabilia, 157
 Pulmones absentes, 157. duri & lapidescentes, *ibid.*
 Pulmones ut in foetu se habeant, 123. ut in ranâ, 451, &c.

Pulmonum usus, 157. substantia vera, *ib.* Membrana cur adeo porosa, *ibid.*
 Pulmonum Structura & Usus ex Malpighii novis observationibus, 444, &c.
 Pulsus quid, 156. ejus causæ, *ibid.* pulsus cordis in foetu unde pendat, 123
 Pupilla quid, ejusve usus, 240
 Pus per umbilicum excretum, 118
 Pylorus, 39. Scyrrhusus, *ibid.*

R.

R Adix manus, 266
 Ranæ pulmones qualiter se habeant, 451
 Rassaeta, 266
 Receptaculum chyli, vide Chylus, 361
 Recutiti qui sint, 95
 Regio stomachalis quid propriè sit, 2
 Ren qualis inferior sit sinister an dexter, 77. calculis & vermibus sæpè præditi, 72, 79. cur eo loco in Abdomine siti, 76. plures, *ibid.* monstrosi, *ib.* in unum concreti, *ibid.* ex plurimis quasi glandulis constantes, *ibid.* membrana adiposa, 72. vasa, 75. infundibulum, 79. tubuli, *ibid.*
 Renum descriptio nova & usus, 434
 Renum Etymon, 72. Structura, &c. *ibid.* Substantia à vermibus consumpta, *ibid.* Fascia quid sit, 78. quem habeant usum, 72. cur duo, 75. color varius, 76. ut se habeant in foetu, 121
 Ren succenturiatus, vide Capsula atræ bilis.
 Renum & Ventriculi consensu unde, 75
 Respiratio ut fiat, 159
 Rete mirabile, 217, 223, 492. Galenus ita primus vocat, *ib.* an mirabilis rete recentiorum, *ib.* 223. in homine & equo non adest, 507. ejus descriptio, *ibid.*
 Reticulum, vide Omentum.
 Rigoris in febribus causa & subiectum, 12
 Robusti hominis exemplum, 206
 Ronchus quid sit, 164
 Roseta, manûs, 266
 Rosiferus ductus, vide Ductus.
 Rotula ossis humeri, 264

S.

S Accus cordis, vide Pericardium.
 Sævum, adeps, pinguedo ut differant, 10
 Sanguinis generatio qua ratione fiat, 153. fluxus ejus in primo coitu unde, 109. an semper is debeat esse, *ibid.*
 Sanguis per poros corporis effluens, 5. qualis nutrit cuticulam, 8. sanguine an nutriatur foetus, 122
 Sanguis menstruus per umbilicum excretus, 118
 San.

Sanguinis circulatio ut in foetu fiat, 122. à quo inventa, 154
 Scapula, 262. ratio Etymologiae, *ibid.* dextri lateris cur saepe gallicis in puellis sit altior sinistra, *ib.* in Germania contra, *ibid.* earum usus, *ibid.* spina scapulae quid propriè sit, 263. cervix an processus dicendus, *ib.* quorum referendae, 261. earum ligamenta, 263
 Sceletus quid, 273
 Scroti Etymon, 91. cur pinguedine careat, 9
 Scutum genu, 269
 Sectio Cæsarea, 103. Laryngis, 165
 Secundinae quid, 120
 Sella equina seu Turcica, 195
 Semen non præparatur in vasis seminariis, 50, 86. unde album sit, 88. ubi asservetur, 92, 93. feminis excretio à quâ causa pendeat, 93. quæ sit materia, 86. semen in mulieribus per quas vias ad uterum feratur, 99. cuius naturæ id sit, & virtutis, *ibid.* 100. an utrumque ad generationem concurrat, & quomodo, 101
 Senectas vel senectus quid, 8. cur eam animalia deponant, *ibid.*
 Septum cordis non est pervium, 155. Septum lucidum in cerebro quid sit, 216, 497. Septum transversum *Celso* quid sit, 140
 Serpentes deglutiti & excreti, 39
 Serpentum cutis an deponatur, 8
 Serum an ad Renes deferatur pulsione an tractione, 77. quâ vi transeat Ureteres, *ibid.* an ad vesicam deferatur tractione vesicæ, 80. an etiam in corporis parte superiore separaretur, 77. quâ ratione in renibus segregetur, 75
 Sinus ossis quid sit, quæve ejus differentia, 16. Pudoris quid, 107. duræ meningis, 212. eorum usus, *ibid.*
 Spinalis medulla, 535
 Speculum cerebri lucidum, 216
 Sphincteris ani usus, 48
 Spinalis medullæ descriptio, 224, 533. ejus Vasis, 534. Sinus, 535. non gracilescit, 225. non fertur recto ductu per foramina vertebrarum, *ib.*
 Spiritus animalis materia, locusque generationis, 213
 Splen, vide Lien.
 Staples unde sic dictum os, 251. stapedis inventor, 250
 Sternum quid sit, ejusque Etymon, 134. quando ossescat, 125. in pueris ex quot ossibus constet, *ib.* ex quot ossibus in adultis constet, 134. sterni foramen cui usui sit, 135
 Stomachus quid, 38. Ventriculus sic quandoque dicitur, 33
 Stomachalis pars aut regio, 2
 Strepitus qui oritur ubi ab Anatomico calvaria auferitur unde veniat, 212

Striæ medullares cerebri, 499
 Stupor femoris unde, 76
 Subcartilagia quid, 2
 Subiectum Anatomia variè sumitur, 1
 Subspondylus, vide Os sacrum.
 Subvertebra, vide idem.
 Succus Pancreatici historia & usus, 408, &c. eum colligendi experimenta varia, 413. ejus vitia varia, & qua ratione corrigenda, 415, &c.
 Succingens membrana, vide Pleura.
 Sudor arenulosus, 5
 Summa pellicula *Celso* quid sit, vide Cuticula.
 Sumen quid sit, 3
 Supercilia, 235
 Supercilia ossis quid, 16
 Superficies cutis, vide Cuticula.
 Superfoetatio rarissima, 106
 Surdus per quam viam sonum suscipiat, 252
 Sutura quid sit, 274
 Sutura Coronalis, 190. Mendosa, 196. Sagittalis, 194
 Symphysis qualis ossium connexio, 274
 Synchronrosis qualis, *ibid.*
 Syneurosis qualis, *ibid.*
 Synarthrosis qualis, *ibid.*
 Syllarcosis qualis, *ibid.*
 Systole quid, 156. ejus causa efficiens, *ibid.*

T.

Tactus organon an cutis sit, 3, 256
 Talus, 271
 Tarsus quid in palpebra, 233
 Tentigo quid, 108
 Tertullianus septingenta cadavera dissecuit, 327
 Testium Etymon, 88. historia Anatomica, *ib.* &c. testes in corpore delitescetes, 90. an conficiant semen, *ibid.* an ponderis subnexi loco sint, *ibid.* testis duplex, triplex aut quadruplex, 89. dexter non est sinistro calidior, *ibid.* testes viriles cur extra corpus dependant, 90, 99
 Testes muliebres an molliores virilibus, 98. an humidiores, *ibid.* cur non sint tam magni ac Viriles, *ibid.* cur in corpore, *ibid.* quem usum habeant, 99
 Testes cerebri quid propriè sint, 218, 491, 500
 Thenar, 267
 Thoracis Etymon, 130. circumscriptio, *ibid.* cur non sit adeo pinguedine oblitus, 9
 Thymus, ejusque descriptio, 154
 Tintinnabulum quid in corpore, 175
 Tonillæ quid sint, & cur sic dictæ, 174
 Trachæa quid, ejusque Etymon, &c. 164
 Tragus, 247
 Trochlea ossis humeri, 264
 Tuba-

Tubarum uteri usus, & descriptio, 100. Tumores, 101. in Tubis uteri foetus conceptus, *ibid.*
 Tubulorum renum non oriuntur ab ureteribus sed à vasis emulgentibus, 79. Lactiferi, 132
 Tunica oculi Adnata, 238. Amphiblestroides, 241. cur Reticula dicatur, *ib.* Crystallina, Aranea, *ib.* cur ita dicatur & an merito, *ibid.* Vitrea, 242. Choroides, 240. an & quomodo ab uvea differat, *ibid.* cur nigra, 241. Conjunctiva, 238. Cornea, 239. Dura, *ibid.* Innominata, 238. an vera tunica, *ibid.* Retiformis, Sclerotes, 239. Albuginea testium, 89. Elythroides, 91. Erythroides, *ibid.* Nervea, *ibid.* Rubra, *ibid.* Vaginalis, *ibid.* Uvea, 239
 Tympanum quid sit, 250
 Tympani chorda, 251. quis ejus usus, *ibid.*

V.

Vagina cordis, vide Pericardium.
 Valvula coli quid, 47. inventor ejus, *ibid.* usus, 48
 Valvulae Tricuspidales, 151. Lunares, Semicirculares, Sygmoides, 152, 153. Mitrales, 155
 Valvulae Lymphæ ductuum, 548. Lacteorum vasorum, 550
 Valvularum in ductu cystico conditio & usus, 63
 Valvularum usus ad venas cordis in auriculis, 155
 Varices cur sæpè in gravidis sint, 23
 Vas breve quem usum habeat, 34. id revera datur, *ibid.* varium sæpè, 35
 Vasa Lymphatica, vide Lymphæ ductus.
 Vasa Ranina, 172
 Vasa Epigastrica & Mammaria an uniantur, 380
 Vasa cur in Mesenterio adeo copiosa, 43, 53. Epigastrica & mammaria an sub recto musculo conjungantur, 23
 Vasa Pampiniformia, 87, 98. Deferentia quæ, 91. Ejaculatoria, *ibid.* præparantia semen, 86. id non præparant, *ibid.* eorum origo, *ibid.*
 Vasa Lactea an ad Uterum veniant, 372. quâ ratione ad Thoracem distribuuntur, 373. Thoracicarum Lactearum in axillarem venam insertio, 374. earundem Usus, 375. in praxi Medica utilitates, 377. an ad mammas perveniant, 378.
 Vasorum horum & Receptaculi Lactei Anatomica administratio.
 Vasa Pulmonaria an per Anastomosis uniantur, 447
 Vasa Lachrymalia, 478. &c. Narium, 481. &c. Spinalis medullæ, 533. &c.
 Vasorum Lacteorum inventio quo anno, 318. quo modo, 319. quibus præsentibus, *ibid.* 320. ad eorum inventionem quædam requisita, *ibid.* in quibus brutis maximè perspicua, 320. cur Lactea dicta, aut absolute Lactes, 321, 324. &c. Venæ sunt, 322, 332. an revera existant, 325. an novum sint inventum an verò etiam veteribus nota, 326. cur tam diu latuerint, 328, 381. cur adeo repente oblitterent, *ibid.* eorum Fabrica & Structura, 331. sunt partes dissimiles, 332. ex quibus partibus componantur, *ibid.* quæ eorum Temperies, 333. Conformatio, figura scilicet. Lævitas, Cavitas, 334. Magnitudo. Numerus, 335. Valvulae, 334. Situs, 336. Origo, *ib.* Finis, 337. Insertio, 338. Progressus, *ibid.* Actio, 339. ad hanc quid conferant partes componentes, 341. &c. quid Temperies, &c. 344. quid Figura, Magnitudo, Valvulae, &c. 345. &c. eorum Usus, 348
 Vasorum Mesaraicorum valvulae, & oscula, 311. an & ubi aperta hæc vasa, *ibid.* eorundem arcuati ductus, 313
 Vasorum Lacteorum Valvulae, easque inveniendi modus, 550
 Vena Portæ an trunco arboris jure comparetur, 311
 Vena Cava cur sic dicta, 137. Emulgens malè sic dicitur, 74. melius reducens, venalis, referens, &c. *ib.*
 Vena Pylorica, 34. Coronaria ventriculi, *ibid.* Brevis, *ib.* Adiposa, 72. Emulgens, 74. Renalis, *ib.* Referens, *ibid.* Reductoria, *ib.* Umbilicalis, 116. Mammaria, 132, 152. Mediastina, 148, 152. Cava, 151. Azygos, *ibid.* Sine pari, *ibid.* Subclavia, 152, 295. Intercostalis superior, 152. Cervicalis, *ibid.* Muscula inferior, *ibid.* Jugularis, *ibid.* Arteriosa, *ibid.* Pulmonalis, 154. Cephalica, 295. Axillaris, *ibid.* Cephalica manus, *ib.* Mediana, *ibid.* Communis, *ibid.* Salvatella manus, *ib.* Basilica, 295, 296. Jecoraria, *ib.* Splenica brachii, *ib.* Saphena, 297. Ichiaria, 298. Muscula, *ibid.* Poplitea, *ibid.*
 Venæ Hæmorrhoidales, 48. Epiploicæ, 31, 35. Gastricæ, *ibid.* Gastro-epiploicæ, 34. Mesaraicæ, 53, 82. Spermaticæ, 82, 98. Lumbares, *ibid.* Iliacæ, *ibid.* Musculæ, *ibid.* Sacræ, 83. Glutinae, *ibid.* Hypogastricæ, *ibid.* Iliacæ, *ibid.* Epigastricæ, *ibid.* Pudendæ, *ibid.* Crurales, *ibid.* Raninae, 172. Scapulares, 295. Thoracicae, *ib.* Crurales, 298. Surales, *ibid.*
 Venæ audaces quid sint *Avicenna*, vide Arteriæ. Lactæ unde sic dictæ, 55. non pertingunt ad hepar, nec ad lienem, *ibid.* earum origo non est pancreas, 56. Valvulis præditæ, *ibid.* Seminarie cur distincto adeo loco orientur, 86. Umbilicales unde orientur, 116
 Venæ Saphenæ sectio quam utilis, 297
 Venæ mesaraicæ circa Intestina capacitatem suam minime superant Lactæas, 314
 Venæ Lactæ, vide Vasa.
 Venerem stimulantia medicamenta qua via tam cito ad Spermatica veniant, 370
 Veneris æstrum, 108
 Venter Imus quid Latinis sit, 2. inferior improprie *ibid.* Abdomen dicitur.
 Ven-

Ventre quid sint,	1	Ulcera pulmonum cur insanabilia,	157
Ventriculi Structura & Usus,	33, &c.	Ulna, vide Os ulnæ.	
Ventriculus duplex, 37. cur viris major quam		Ultima cutis <i>Aristoteli</i> quid sit,	7
fœminis, <i>ibid.</i> quâ ratione asthma inducat, 39.		Umbilicus qua ratione ab obstetrice separetur, 118.	
quot modis committatur jecori, & lieni, <i>ibid.</i>		per umbilicum varia p. n. excreta, ut fœces, ver-	
quod duplex in animalibus, 37. non est dicendus		mes, lapilli, pus, sanguis menstruus, serum, &c. <i>ib.</i>	
carnosus, 39. in Thorace collocatus, <i>ibid.</i> in		in ligamenti soliditatem compactus, <i>ibid.</i>	
Fœtu qualiter constitutus,	120	Umbilicalia vasa cur adeo longa, 114. an nodo-	
Ventriculi orificiorum cur unum superius alterum		sa, 115. cur tortuosa, <i>ibid.</i> quem habeant	
inferius dicatur, 38. cum palato consensus, 34.		usum, 116. unde oriuntur, <i>ibid.</i> rupta mortem	
tunica interior cur rugosa, <i>ibid.</i> ejus orificium		non subito inferunt,	118
superius cur Nervis copiose adeo præditus, 35.		Ungues an sentiant, 301. an vere nutriantur, <i>ibid.</i>	
cur id fibris orbicularibus donatus,	38	usus, <i>ibid.</i>	
Ventriculus quartus cerebri quis,	217, 223	Unguis oculi quod habeat subjectum,	195
Ventriculus cordis phlegmate repletus, à <i>Veslingio</i>		Volvoli vera causa,	46
notatus,	136	Vola manus,	266
Ventriculi cerebri an excrementis colligendis in-		Vomitus in calculo renum unde,	75
ferant, 217. eorum descriptio, 486, 490, 491		Vox edita à fœtu,	123
Vermes in membranis hepatis, 58. in vesica fel-		Urachus, 81. an pervius, <i>ibid.</i> 117. per urachum	
lis, 63. in Renibus, vide Renes. Per Umbilicum		an in fœtu urina excernatur,	117
excreti, 118. in Corde,	176	Ureterum Etymon, 77. cur venæ albæ appellan-	
Vertebræ lumborum,	17	tur, <i>ibid.</i> 322. numero p. n. plures, 78. sæpe	
Vertebrarum Colli descriptio, 175. vertebrarum		maximè dissentit, <i>ib.</i> ut se in fœtu habeant, 121.	
Dorsi numerus ordinarius & extraordinarius,		cur adeo exacte sentiant, 78. qua vi eos transeat	
137. earum descriptio accurata, <i>ibid.</i>		serum, <i>ibid.</i> quo respectu oriuntur à renibus aut	
Vertebra magna <i>Hippocrati</i> quid sit,	18	vesica, 79. cur oblique in vesicam inserantur, <i>ib.</i>	
Vertex in fœtu membranosus, 124. in adultis, <i>ib.</i>		Urethra, 82. duplex aliquando, <i>ibid.</i> abfuit, 94	
Vertices digitorum quid,	267	Urina quâ via tam cito & copiose in potatoribus	
Vesica fœlis cur habeat tunicam fibrosam, 62. non		reddatur, 369. cum urinâ Lac seu Chylus per	
Bile sed sanguine nutritur, <i>ib.</i> Bile destituta, 62.		quas vias in quibusdam reddatur, 370. quâ viâ	
quâ ratione se habeat in fœtu, 121. vesicæ fel-		deglutita multa cum urinis sint reddita, 371	
læ Etymon, 62. historia, <i>ibid.</i> &c.		Urina per alia loca quam vesicam excreta,	82
Vesicæ Urinariæ historia, 80. qua ratione globosa		Uterus unde sic dictus, 101. cur dicatur matrix, <i>ib.</i>	
cum <i>Fernelio</i> dicenda, 86. septo distincta reper-		cur <i>vsqz</i> , <i>ibid.</i> ejus descriptio, 102. &c. an cel-	
ta, 81. media membrana an sit musculus, 80.		lulas habeat, 106. in gravidis an fiat crassior, 102.	
in vesica urinaria varia p. n. inventa, <i>ibid.</i> quâ		an de loco in locum moveri queat, 104. non	
vi ad eam deducatur serum, <i>ibid.</i> ut se habeat		dividitur sepimento,	106
in fœtu,	121	Uteri membrana exterior an duplex, 102. carnosâ	
Vesicæ Aquæ hepatis,	62	an sit substantia, <i>ibid.</i> ligamentum teres an po-	
Vesiculæ Seminales, 92. primus descripsit <i>Ronde-</i>		rosum, 105. in utero varia p. n. reperta, <i>ibid.</i> an	
<i>letius</i> ,	<i>ibid.</i>	sine utero mulier vivere queat, 104. an uterus	
Via stomachi, vide Gula.		rescindi queat, <i>ibid.</i> Uteri usus, 105. Rugæ	
Virga, 93. virga muliebris,	108	internæ quem habeant usum,	107
Virginitatis signum, 108. masculæ nota,	95	Uteri clausura, 109. ut se habeat in fœtu,	121
Virginum lac præbentium exempla,	131	Uvæ in digitis quid,	267
Vitis cur major ferè sit ventriculus quam fœmi-		Vulva Cerebri,	218
nis,	37	Uvula quid sit, 174. habet vasa,	<i>ibid.</i>
Virorum Lactantium exempla,	131		
Visio qua ratione fiat,	243		
Visus organum quale,	<i>ibid.</i>		
Vitta quid & unde,	118		

Z.

Zygoma, vide Os jugale.

INDEX PARTIUM APPENDICIS VESLINGIANÆ,

ET

AUTHORUM

ex quibus ea desumpta.

PARS I.

DE Osculis & Valvulis Vasorum
Meseraicorum, eorumque irra-
dicatione à Lacteorum diver-
sa. Pag. 311

*Ex Anatome Anatomia Biliana Jacobi
Henrici Pauli.*

II.

De Vasis Lacteis. 318
Ex Dissert. de Lactibus Caspari Asellii.

III.

De Labyrintho Ductus Roriferi. 350
Ex Anat. Anatomia Biliana J. H. Pauli.

IV.

De Ductu Chylifero. 361
*Ex Historiâ Anatomicâ de Lacteis Tho-
racicis Thomæ Bartholini.*

V.

De Vasis Lymphaticis, 383
*Ex Dissertat. Anatom. de Vasis Lym-
phaticis Th. Bartholini, & Exercit.
de Vasis Serosis Olni Rudbeek.*

VI.

De Valvulâ Coli, 392
Ex Observationibus Nicolai Tulpii.

PARS VII.

De Vasis Lienis. 394
*Ex Disquisitionib. Anatomicis Nathan.
Hichmori.*

VIII.

De Pancreate. 402
CAP. I. De Ductu ejus Virsungiano.
Ex Disq. Anatom. Hichmori.
CAP. II. De Liquore ejus. 408
*Ex Exercitat. Anatomica Regneri
de Graef.*

IX.

De Structurâ & Usu Renum. 434
Ex Exercit. Anat. Laurentii Bellini.

X.

De Ductu novo Testium. 442
Ex Disquis. Anat. Nath. Hichmori.

XI.

De Structurâ & Usu Pulmonum. 444
Epistola de Pulmon. Marc. Malpighii.

XII.

De Columnis Cordis. 456
Ex Disq. Anat. Hichmori.

PARS

P A R S XIII.

De Ductu Salivali Inferiori. 457
Ex Adenographiâ Warthoni.

XIV.

De Ductu Salivali superiori. 463
Ex inventione propriâ.

XV.

De Glandulis, Ductibusque variis aliis,
 Os spectantibus, Salivæ vel Muco
 dicatis. 463
Ex observationibus Anatomicis Nicol. Ste-
nonis. Et ex Libro III. de Catharris
Conr. V. Schneideri.

XVI.

De Ductibus novis Oculorum & Na-
 rium. 478
Ex Observat. Anatom. & Observat. Spe-
cimine Nicol. Stenonis.

XVII.

De Ossibus Wormianis 486
Ex Anatomie reform. Th. Bartholini.

XVIII.

De Maxillæ superioris Cavitate. *ibid.*
Ex Disq. Anat. Highmori.

XIX.

De Cavernâ Ossis frontis. 487
Ex Disq. Anat. Highmori.

XX.

De Cerebro, ejusque partibus. 488
Ex eodem Highmori.

P A R S XXI.

De Cerebro, ejusque partibus. 496
Ex Anatome Cerebri Th. Willis.

XXII.

De Nervis & Spinali Medullâ, hujus-
 que Vasis & Sinubus. 516
Ex Nervorum descriptione & Usu
Th. Willis.

XXIII.

De Valvulis Lymphæ ductuum. 548
Ex Delineatione Valvularum in Vasis
Lymphaticis &c. Fred. Ruysch.

&

Communicatione Joan. Swammerdam.

XXIV.

De Valvulis Venarum Lactearum. 550
Ex eodem Tractatu D. Ruysch.

XXV.

De Ductuum Lymphæ distributione
 ab Hepate ad Receptaculum, in cor-
 pore Canino. 552
Ex Autopsia.

XXVI.

De Lymphæ Ductibus in Hepate &
 Splene. 554
Ex Tractatu citato D. Ruysch.

XXVII.

De Arteria Bronchiali. 555
Ex eodem Tractatu.

C A T A L O G U S

Eorum, quæ Operâ meâ edita sunt.

In Quarto.

- I**N *Joannis Veslingii Syntagma Anatomicum Commentarius. Amstelod. apud Joan. Janssonium, 1659.*
Ejus Editio secunda, Revisita, Aucta, &c. ibid. apud Joan. Jansson. à Waesberge, & Elisæum Weyerstraaten, 1665.
Idem Syntagma in linguam Germanicam translatum. Lugd. Bat. apud Adrian. Wijngaarden, 1652.
Idem in Belgicam versum. Amstelod. apud Joan. Janssonium, 1659.
Impetus fac. Primerosii in Vop. Fort. Plempium, à me retusus. Amstelod. apud Joan. Ravesteyn, 1659.
Medicina Universa, Hygieines & Therapeutices Fundamenta exhibens. ibid. apud Petrum van den Berg, 1665.
Fortunius Licetus de Monstris, recensitus & auctus. ibid. apud Andræam de Vries, 1665.

Octavo.


- Joannis Pulverini Praxis Medica, recensita. Lugd. Batav. apud Francisc. Hakkium, 1649.*
Joan. Ruolani Enchirid. Anatom. & Patholog. cum Annotationibus. ibid. apud Adrian. à Wijngaarden, 1649.
Syntagma Anatom. J. Veslingii in Belgicam linguam versum. Amstel.

Duodecimo.

- Commentarius in Petr. Morellum de præscribendis formulis Remediorum. Amstelod. apud Ægidium Valkenier, 1659.*
Ejus Editio secunda, correctâ, aucta, &c. ibid. apud Caspar. Commelinium, 1665.
Comment. in Miracula Chymica Mulleri. ibid. apud eundem, 1659.
Comment. in Tyrocinium Chymicum Joan. Beguini. ibid. apud eundem & Casparum Commelinium, 1659.
Medicina Generalis, methodo novâ conscripta. ibid. apud Petrum van den Berg, 1661.
Exercitatio de Renibus Bellini, recensita & illustrata. ibid. apud Andr. de Vries, 1665.
Anatome Contracta. ibid. apud Gerbrandum Schaagen, 1665.

F I N I S.

HARVARD
MEDICAL LIBRARY



IN THE
Francis A. Countway
Library of Medicine
BOSTON

COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE

QM
21
V636
1666

RARE BOOKS DEPARTMENT





